韓国東海岸における後氷期の花粉分析学的研究

曹 華 龍

I. はじめに

筆者は数年来、韓国東海岸における平野の地形発達（地形環境の変遷）について調査研究を続けてきた。浦項（Pohang）平野の 33 m におよぶ沖積層のボーリングコアの分析の際、花粉分析もあわせ行ない、その結果については一部すでに報告（曹 1978）した。このたび、注文津（Jumoonjin）と方魚津（Bangeojin）の平野においても、泥炭層からサンプルを得て花粉分析を行なった。

本論文では後氷期における韓国東海岸地域の自然環境変遷を明らかにするためにこれらの 3 地域における花粉分析結果に、塚田松雄ら（1977）の韓国東北岸の束草（Sogcho）の南にある永朗湖の湖底堆積物の花粉分析結果を加えて植生変遷、気候変動、堆積環境の変化について検討した。さらに、今までの韓国で行なわれた花粉分析の研究を整理し、韓国の後氷期における花粉分帯設定を試みた。

II. 従来の韓国における花粉分析学的研究と問題の所在

韓国における花粉分析学的研究は極めて少なく、1940 年の山崎次男の智異山（Jirisan）の細石平田（第 1 図）の層厚 15 cm 泥炭層の花粉分析が韓国における最初の花粉分析学的研究である。韓国は気候、地質及び地形的条件から山地に湿地が形成されにくいといわれ、山崎（1940）はこの 15 cm の泥炭層発見が特記すべきことであると述べた。その花粉分析結果をみると *Pinus* と *Quercus* が断然優勢を示しており、他の樹種の混交率は非常に貧弱であって、現在の森林構成状態とよく似ており、下部から上部に向かって *Pinus* が増えるのに対して広葉樹の花粉は減少する傾向を示しているとのべ、その原因を濫伐や山火による二次的な森林の成立、さらにマツを大切にす韓国人の習慣などから説明した（山崎 1940）。しかし、筆者が分析した花粉の組成からみるとかなり古い時期から上記のような植生変遷が推察され、山崎がとりあげた原因以外にもっと根本的な原因があるように考えられる。

1941 年に松島真次は主に韓国の西海岸平野 12 ケ所（益山 Igsan；3 地点、金浦 Kimpo、温井里 Onjeongri

Fig. 1 Index map

▲; T. Yamazaki (1940) ●; S. Matusima (1941)
×; Oh Chi Young (1971) ■; M. Tsukada
■; Author

; 4 地点、安州 Anju、竜川 Yongcheon、平康 Pyeonggang；2 地点、第 1 図）の沖積層中の泥炭層から花粉分析を行なった。西海岸の泥炭は地表から深さ 60～160 cm ぐらいの表土下に厚さ 40～150 cm の泥炭層がある。さらにその下は青白色のシルトが見られるのが普通であるが、場所によって黒いシルトがつづくことがあると記載した。これらの泥炭層の花粉組成をみると *Pinus*, *Quercus*, *Alnus*, *Salix* が全体の 90% を占め、例外は竜川と平康で *Picea* が 5% をわずかにこえる出現率を示す。松島（1941）の論文には前述の 4 樹

Fig. 2 Pollen diagram of western coastal plain, Korea (by S. Matusima 1941)

種だけを示した花粉ダイアグラムがのっており、そのうち代表的な地点の分析結果は第2図に示した。松島はこれらの結果を次のように要約した。

① 調査地域の範囲内では南部の分析結果に比べて北部のものほど *Pinus* 及び *Salix* が減少し、*Abies*, *Picea*, *Batula* の増加の傾向が見られる。

② 一般に現在は最も *Pinus* の多い時代であり、過去に於て *Alnus* 及び *Quercus* の優勢な時代が数度繰返されたことが推論される。

③ 花粉の組成から推察してこの泥炭層はおよそ、10,000年 B.P. 前後のものと思われるとのべた。

しかし、最近西海岸の萬頃江 (Mangeong gang) 下

流の泥炭の C^{14} 年代報告 (朴龍安 1969) と筆者の東海岸のいくつかの泥炭層 C^{14} 年代測定や、より深い泥炭層からの花粉分析結果から考えて見ると、松島が花粉分析を行なった韓国西海岸の泥炭層は10,000年 B.P. 前後に形成したのではなく、より若い時代に形成したものであると考えられる。

山崎、松島の花粉分析学的研究以後、最近まで韓国における花粉分析の研究は行なわれず、空白期になったが1971年呉智泳の平澤 (Pyongteag) 地区の泥炭層からの花粉分析結果が報告された。しかし、その結果についてはいくつかの問題点がある¹。

塚田ら (1977, 1978) の東海岸東草 (Sogcho) 周辺

Fig. 3 Pollen diagram from Sogcho in Korea (by M. Tsukada et al.)

永朗湖の湖底堆積物の花粉分析は韓国では初めて絶対年代のそろった花粉ダイアグラムである。このダイアグラムの最下部では *Larix*, *Picea*, *Abies*, *Pinus* (Haploxylon) が高い出現率を示し、これが 15,000 年 B.P. より古い地層であることから晩氷期頃の束草周辺には亜寒帯性の針葉樹が生育しており、その後 10,000 年 B.P. から *Quercus* が優占する時代になり、6,700 年 B.P. 以後は *Pinus* が優占する時代になって現在にいたっていることが明らかにされた。しかし、この研究は稲作の起源に主な関心が注がれ、詳しい花粉分帯及び自然環境変化に関する考察は十分なされていない。

III. 調査地域の地形と植生の記載

東海岸に位置する 3 ケ所の試料採取地点は第 1 図に示したように北緯 35° から 38° 付近まで (方魚津 35° 29' 05" / 129° 25' 47", 浦項 36° 00' 25" / 129° 22' 31", 注文津 37° 53' 20" / 128° 49' 32") に位置している。しかし、地形及び現在の植生分布は類似した点が多い。

サンプル採取地点はすべて現海岸線から 0.5~1 km の距離にあり、標高は 5 m 以下 (方魚津; 1.5 m, 浦項; 2 m, 注文津; 2.7 m) の海岸平野部である。周辺地形は海側に開放され、内陸側には 100 m 前後の低い丘陵地が近接していることも 3 地点ともに共通する。丘陵地の背後には、注文津では韓国の脊梁山脈である 1,000 m 以上の太白山脈が南北に走り、浦項と方魚津では韓国の海岸山脈とも言われる 500 m 前後の佛国寺山脈が南北に走っている。注文津と方魚津低地は丘陵に囲まれ、5 万分の 1 地形図に表現されるような川は存在しないが、浦項平野は 60 km あまりの兄山江が流入している。サンプルを採取した地点の海側には 3 地点共に高さ 3~5 m の浜堤ないし砂丘が発達しており、注文津と方魚津ではその浜堤によって後背湿地がつくられ、泥炭が堆積している。

韓国の現在の植生分布はすでに公表されている韓国の 2 つの植生分布図から、調査地域の植生分布帯の位置づけを考えて見た。任慶彬 (1968) によると、韓半島は南海岸地方及び済州島に照葉樹林帯があり、半島北部の白頭山周辺の高原地方及びその高原から南にのびた脊梁山脈の高い地域が亜寒帯針葉樹林帯になり、その縁辺部が冷温帯落葉広葉樹林帯になっているが、中間部は広く暖温帯落葉広葉樹林帯になっている (第 4 図)。サンプル採取地点は 3 地点共、暖温帯落葉広葉樹林帯に属し、方魚津はこの植物帯の南端に位置している。

最近、呉修栄 (1977) は韓国のフロラを ① 全韓国

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 4 Vegetation map of Korea (Yim 1968)

- A; Warm temperate forest zone.
- B; Cool temperate forest, southern zone.
- C; Cool temperate forest, central zone.
- D; Cool temperate forest, northern zone.
- E; Subarctic forest zone.

Fig. 5 Floral map of Korea (Oh 1977)

- ; Whole Korean pattern.
- I; Northern part pattern.
- II; Central-southern part pattern.
- 1; Baegdusan pattern.
- 2; Dagelet pattern.
- 3; Southern sea side pattern.
- 4; Quelpart pattern.

分布型 (Whole Korean pattern), ② 北部分布型 (Northern part pattern), ③ 中南部分布型 (Central-southern part pattern), ④ 済州島分布型 (Quelpart pattern), ⑤ 鬱陵島分布型 (Dagelet pattern), ⑥ 白頭山分布型 (Baegdusan pattern), ⑦ 南海岸島嶼分布型 (Southern sea side pattern) の 7 つのフロラに区分した (第 5 図)。サンプル採取地点は 3 地点共に中南部分布型の植物群落地域に位置しているが、方魚津の方は南部島嶼分布型地域に接している。

サンプル採取地点付近の丘陵地は 3 地点共に現在アカマツ林になっており、広葉樹はほとんど見られない。

IV. 試料処理及び検鏡

浦項のボーリングコアは 1 m 毎に 10 cm のコアをとって管びんに密閉保管していた。このボーリングコアは第 6 図の柱状図に示すようにシルト、砂、礫層になって花粉の含有率が非常に少ないことを予測して、シルトの場合はそのまま、砂、礫層の場合はそ

Table 1 ; Data for radiocarbon ages

Region	Sample No	Material	Altitude a.s.l. (m)	Radiocarbon age y.B.P.
Pohang	TH - 267	shell fragments	- 3	1980± 90
	TH - 268	organic clay	-19	7810±160
	TH - 269	organic clay	-26	9820±195
Jumoonjin	TH - 239	peat	+1.8	1860± 95
	TH - 240	peat	+1.2	1990±100
Bangeojin	TH - 323	peat	+0.5	770± 90
	TH - 324	peat	-1.5	2350±100
	TH - 325	peat	-3.5	4060±120

Fig. 6 Pollen diagram of Pohang.
1; Silt, 2; sand, 3; gravel, 4; bed rock (Miocene)

のマトリクスだけ各 50 g を 300 cc ビーカへとり、蒸溜水と 10% KOH 溶液を数滴入れ懸濁液を作り、上澄を他のビーカにうつして濃縮し、その後化学的処理した。
注文津の泥炭は 3 m までトレンチを掘ってその露頭から 10 cm 毎にサンプリングした。方魚津は密封式のハンドオーガでサンプリングした。泥炭試料は薬包紙に包み、乾燥器に入れ、8 時間乾燥したものを 2 g とって処理した。

化学的処理は Erdtman (1934) の KOH-アセトリシス法で処理したのち花粉を濃縮するため ZnCl₂ で比重分離し、グリセリンゼリーで封入した。^{#2} 花粉ダイアグラムは試料毎に 200 個以上の花粉を読みとり、樹木花粉を基本数として百分率で示した。
各地点の C¹⁴ 年代測定結果は表 1 の通りである。

V. 結 果

A. 浦項地域

第6図は浦項地域の花粉分析の結果を示したものである。柱状図に示した沖積層は深さ33mでシルト層、砂層、礫層が3回くりかえし出現し、その下はMioceneの頁岩の基盤になっている。この断面の下部シルト層(−28m)のC¹⁴年代が9,820±195年B.P.なので、約10,000年前から現在までの花粉変化を見ることが可能である。花粉粒の数はシルト層に多く、礫層に少なかった。

この花粉ダイアグラムの花粉組成及び垂直的な変化と特色は次の通りである。

① −15mのところを境にしてそれより下部は*Quercus*が優勢で全木本花粉の40~50%を占め、*Pinus*は10%以下の低い出現率を示す。同じ時期に*Alnus*, *Corylus*, *Juglans*, *Carya*, *Castanea*等の他の広葉樹の花粉も上部層より高い出現率を示している。この境の絶対年代は不明であるが−15~−18mの砂層(中部砂層)と連続と思われる上流側のトレンチの断面の砂層露頭からとった貝殻が6,020±135年B.P.であった(曹1978)。

② −15mより上部層は*Pinus*が急激に増加し、

60~90%占める。逆に、広葉樹は減少する傾向を示す。

③ *Pinus*が優勢な時期のうち、−4~−6mのところ(上部シルト層)で*Pinus*が減少し、*Quercus*が増加する微細な変動が見られる。このシルト層からとった貝殻のC¹⁴年代が1,980±90年B.P.で約2,000年B.P.前後である。

④ 全層を通じて草本花粉の出現率は低いが−10mからGramineae(多分*Phragmites*)とTyphaceaeが増え初め、表層に向けてGramineae, Chenopodiaceae, Cyperaceae, *Artemisia*等草本類が急激に増加する。

B. 注文津

注文津の低地は平坦で泥炭層は厚いところで5~6mに達するが、高速道路の工事のため攪乱され、サンプリングには不適當であったため、海側の泥炭層の少し薄い地点でサンプリングを行なった。泥炭層の下部の白色砂層は海岸に向かってさらに浅くなる傾向を示し、地形的には顕著ではないがこれらの泥炭が埋没した浜提の後背湿地に堆積したと考えられることができる。

注文津泥炭層の花粉分析結果は第7図に示す。この泥炭層の断面は上部から−0.3mが水田土壌であり、その下−0.4~−1.5mが泥炭層である。特に−

Fig. 7 Pollen diagram of Jumoongjin.

1; surface soil, 2; peat, 3; organic silt, 4; organic silty sand, 5; sand

Fig. 8 Pollen diagram of Bangeojin
1; surface soil, 2; organic silt, 3; peat,

0.9~1.5 m までの泥炭は繊維質に富んでいる。さらにその下1.5~2.8 m までは泥炭質のシルトであり、-3.0 m 以下は白色の砂層になっている。

この花粉ダイアグラムの花粉組成及び垂直変化の特徴は次の通りである。

① 全層を通して *Pinus*, *Quercus* の二種で60%以上を占めている。*Pinus* は-2.5 m から-1.5 m までは20%以下を示すが、それより上部と下部では高い出現率を示し、特に上部の方は *Pinus* が優勢である。一方 *Quercus* は下部で高い出現率を占め、時に50%に達するが上部に向って次第に減少し、最上部では10%以下になる。

② *Corylus*, *Alnus* は *Pinus*, *Quercus* に次いで高い出現率を示し特に *Corylus* は-1.5~-2.5 m の *Pinus* が著しく減少した時期に頂点に達する。

③ 草本花粉の出現率が下部で小さく、上部に向って大きくなる傾向は浦項の傾向と類似している。特に *Typhaceae* の花粉が-0.9~-1.5 m で高い出現率を示し、前述した繊維質に富む泥炭を形成したようである。それより表層には *Gramineae*, *Artemisia* が高い出現率を占めている。

この断面からの C^{14} 年代を第7図に示したように *Pinus* の花粉が急激に増え *Typhaceae* の花粉が頂点に達する-1.5 m のところが約2,000年 B.P.を示している。

C. 方魚津

方魚津の泥炭層の花粉分析結果は第8図に示す。この泥炭層は表面から-0.5 m までは礫(直径0.5 cm)、砂まじりシルト層であり、その下20 cm が腐植泥土である。-0.7~-5.0 m が泥炭層で、さらに下部は腐植泥土になっている。

この泥炭の断面の Ignition loss を測定し第8図に示した。その結果によると Ignition loss は-2.6~-3.1 m のところに大きな山があり、-0.9~-1.0 m のところに小さな山があって特に前者の場合は70%の高い比率を示し、この変化は後述するような堆積環境の変化や気候変化に伴う草本、孢子植物の増加および有機物の未分解に関連があると思われる。

この花粉ダイアグラムの花粉組成及び垂直変化の特徴は次の通りである。

① *Pinus* の花粉は最下部-5.3 m から-4.3 m までは5%以下、-4.2 m から-2.9 m までは10~20%の低い出現率を示す。しかし、-2.9 m より上部はある程度の変化はあるが高い出現率を占めており、特に表面近くは80%をこえる。

② *Pinus* が一番低い出現率を示す-4.3 m 以下の

層は *Carpinus*, *Alnus* が高い出現率を示し、*Quercus* をうわまわる。

③ *Quercus* の花粉は全層にわたって高い出現率を示すが、その頂点は-3~-4 m で50~60%に達するがそれより上部は表層に向って減少する。-4 m 以下でも低率を示すがこれは②でのべた *Carpinus*, *Alnus* の高い出現率のため相対的に比率が低くなったものと思われる。しかし、最下部(-5.3 m)で再び高い出現率を示す。

④ この泥炭層には前2地点より *Quercus* 以外の広葉樹の花粉がより高い出現率を示しており、特に *Ulmus/Zelkova* が高い出現率を示し、かつ、2つの山をもっている。

⑤ 草本花粉は-4 m より下部層は *Artemisia* と *Typhaceae* が高い出現率を示し、-3 m から-1 m は *Gramineae* (多分 *Phragmites*), *Typhaceae*, シダ植物の孢子が非常に高い出現率を示す。特に *Typhaceae* の頂点は-1.5~-2.0 m のところにある。

この断面の C^{14} 年代は-5 m の泥炭が $4,060 \pm 120$ 年 B.P.を示して、このダイアグラムは約4,000年 B.P. ころから現在までの植生変遷を示している。*Pinus* が急に増える層より0.2 m 下の *Gramineae*, *Typhaceae*, Spore が増え初める時期でもある-3 m 地点の C^{14} 年代が $2,350 \pm 100$ 年 B.P. である。

VI. 考 察

すでにのべた花粉分析の結果からまず調査地域の後氷期における植生変遷を考えて見た。筆者がとりあつかった試料の年代幅は10,000年 B.P. から現在までで、これより古い時期は塚田ら(1977)の研究結果を引用して整理した。

調査地域の10,000年 B.P. 以後の植生変遷は *Pinus* と *Quercus* の増減によって特徴づけられる。*Pinus* と *Quercus* の大きな変化は浦項断面の-15 m のところであり、 C^{14} 年代で約6,000年 B.P. 頃である。韓国東海岸地方の10,000年 B.P. 以後現在までの花粉分帯をこの6,000年 B.P. 頃を境にして次のように2つの Stage に区分出来る。

I; *Quercus* Stage (10,000~6,000年 B.P.)

II; *Pinus-Quercus* Stage (6,000年 B.P.~現在)

6,000年 B.P. 以後の *Pinus*, *Quercus* の優勢な時期の大きな傾向は下部から上部に向って *Pinus* の増加と *Quercus* の減少である。しかし、2,000年 B.P. 頃を上限にして、下限ははっきり判別出来ないが3~4,000年 B.P. までの時期に上記の大きな傾向と逆に *Pinus* が減少し、*Quercus* が増加する時期がある。断面から

Table 2 ; Postglacial pollen chronology

Years B.P.	Scandinavia Blytt & Sernander		Japan (Nakamura, J.)	Sogcho, Korea (Tsukada,M. etal.)	Eastern coastal region, Korea (Jo, W.)
	Divisions	Climate			
1,000	Recent	Warm Dry	R IIb Sudden increase of <i>Pinus</i>	U V <i>Pinus</i>	IIc Upper <i>Pinus</i>
	Subatlantic	Cooler Very wet Oceanic			
2,000			R IIa (Decreasing warmth period) Subalpine coniferous invade deciduous forest	U IV <i>Pinus</i> <i>Quercus</i>	IIb <i>Pinus-Quercus</i>
3,000					
4,000	Subboreal	Warm Drier Continental	R II (Warm period) Subalpine forest recedes, deciduous forest dominant		IIa Lower <i>Pinus</i>
5,000					
	Atlantic	Mild Humid Oceanic	R I (Transition period) Coniferous & deciduous forests	U III <i>Quercus</i>	I <i>Quercus</i>
	Boreal	Warm Dry Continental			
10,000	Preboreal	Cool	L (Cold period) Subalpine coniferous forest	U II	
15,000	Late Glacial	Cold			
				U I <i>Abies Picea</i> <i>Larix Pinus</i>	

見ると浦項の -4~-7 m, 注文津の -1.5~-2.4 m, 方魚津で -2.8 m~-5.3 m までである。東西海岸の海岸平野に発達した泥炭の形成時期はほぼこの時期を示しており、松島 (1941) の西海岸平野で行なった花粉分析の結果もこの時期であると思われる。したがって筆者は 6,000 年 B.P. 以後、現在までの *Pinus*, *Quercus* 優勢時期をさらに下部から 3 つの Substage に区分した。

IIa 下部 *Pinus* Substage (6,000~約 3~4,000 年 B.P.)

IIb *Pinus-Quercus* Substage (約 3~4,000~2,000 年 B.P.)

IIc 上部 *Pinus* Substage (2,000 年 B.P.~現在)

このように分けた筆者の韓国東海岸の花粉分帯を塚田ら (1977, 1978) の束草の花粉分帯、日本 (中村純 1967), ヨーロッパ (Blytt, A. 1876) と比較して見たのが表 2 である。

塚田ら (1977, 1978) は約 6,000 年 B.P. 以後を、絶対花粉量で *Pinus-Quercus* の最後の激減期(この変化は人類活動の結果としている)によって UIV, UV の 2

帯に区分している。しかし、筆者は 1 万年 B.P. 以後を主として *Pinus* の急増期 (約 6,000 年 B.P.)²³ を境に大きく 2 つの花粉帯に分け、さらに約 6,000 年 B.P. 以後を *Pinus-Quercus* の出現率の変化から、上述のように、下部 *Pinus* Substage (IIa), *Pinus-Quercus* Substage (IIb), 上部 *Pinus* Substage (IIc) の 3 つの亜分帯に区分することが妥当と考える。約 1 万年 B.P. から約 6,000 年 B.P. については筆者の花粉分析の結果と塚田ら (1978) のそれとは類似している。筆者は 1 万年 B.P. 以前について論ずる独自の資料を持ちあわせていないが、塚田ら (1977, 1978) の結果や日本における中村 (1967) の区分からみて、大きな環境変化に伴う著しい植生変化があったことが推定され中村 (1967) の区分のように 1 万年を境にさらに大きな花粉分帯の区分を行なうことが必要となるとと思われる。

現在の韓国植生からして花粉にあらわれる *Pinus* はほとんどアカマツと思われる。沼田真 (1975) によるとアカマツ林は水平的に韓半島全域に分布し、垂直的には低地から山地まで分布する。また、自然条件が悪くて他の樹木の侵入が容易ではない露岩地、尾根す

じ、表土が浅い土地など、乾燥しやすい貧栄養の土壌に立地している。このような現在のアカマツの生態から考えると、気候がより乾燥すると広葉樹が衰退し、アカマツが増加するが、湿潤な気候になると広葉樹が優勢となり、アラマツが減少すると推定することができる。このような考えから 10,000 年 B.P. 以後韓国東海岸における花粉分析の結果をもとに各 Stage の気候を推定して見ると前述の I Stage と IIb Substage はより湿潤な気候であり、IIa と IIc の Substage はより乾燥な気候になる。このような気候変動をヨーロッパにおける後氷期の気候変動研究結果⁴⁴と比較して見ると、ヨーロッパの Atlantic と筆者の I Stage, Subatlantic と IIb Substage に対応し、Subboreal と IIa, Recent と IIc Substage が対応するが時間的にわずかな差が認められる。

阪口 豊 (1961) は日本各地の泥炭地の花粉分析と泥炭の分解度分析結果から B.C 5,000 年頃から気温は現在より高くなるとともに乾燥化し、B.C 1,000 年頃に気候は急変し、気温は低下し、湿潤化したがこの時代は紀元前後に終るとのべ、筆者の結果とは時間的にわずかなずれがあるが気候変動のパターンはよく対応している。

次に 6,000 年 B.P. 頃から *Pinus* が急増することを海面変動と関聯して考えて見た。10,000 年 B.P. 頃現海面より 4~50 m 下にあった海面がその後、急激に上昇して 6,000 年 B.P. 頃現海面水準、もしくは、それより 4~5 m 高い水準まで達してその後比較的安定したことは多くの研究者によって報告されている。6,000 年 B.P. 頃海岸付近に位置していた地点は、10,000 年 B.P. 頃にはかなり内陸にあった⁴⁵と思われ、10,000 年 B.P. から 6,000 年 B.P. にかけての海進の結果、塩分を含む海風によって広葉樹が衰退し、浜地に強い *Pinus* が、増加することも考えられ、6,000 年 B.P. 頃の *Pinus* 急増の傾向が海岸地域だけの傾向かもしれない。

アラマツは伐採、焼田等の人間活動により自然の森林が破壊され、土壌侵蝕が進んだところに二次林として成立することも多く、花粉分析結果から 2,000 年 B.P. 頃以後現在に向って *Pinus* が増加するのは山崎 (1940) がのべたように人間活動の結果と思われる。

このように韓国東海岸地域の植生変遷は気候変動、海面変動及び堆積環境変動、人間活動などが総合的に作用した結果であると考えられる。

次に草本花粉の変化について考えて見る。草本花粉の変化は局地的な現象である。しかし、筆者がとりあげた 3 地点で共通な 2 つの傾向がある。その 1 つは表

面 (現在) に近い層に Gramineae, Chenopodiaceae, *Artemisia*, Cyperaceae の草本が急に増加する傾向であり、他の 1 つは 2,000 年 B.P. 頃 Typhaceae, Gramineae (多分 *Phragmites*) の出現率の高さである。前者は人間活動にともなう作物 (イネ) や水田及び畑地雑草に由来すると考えられる。後者の場合はとくに 2 地点 (注文津, 方魚津) で Typhaceae, Gramineae (多分 *Phragmites*) などの常時水を湛えているところに見られる植物の花粉が多いことから、東海岸平野の低湿地は 2,000 年 B.P. 前後に水をたたえたラグーン性湿地になったと考えられ、このような変化は海水準のこまかな変動に起因するものと推定することができる。Typhaceae の花粉が高く出現する層は注文津で -0.9 ~ -1.7 m (a.s.l 1.8~1.0 m), 方魚津で -1.5 ~ -3.0 m (a.s.l 0 ~ -1.5 m) でわずかな高度差がある。

方魚津泥炭層を対象にして泥炭の成長速度を計算すると 1.2~1.3 mm/年となり、日本の平均 1 mm/年よりややはやいが類似している。

VII. ま と め

以上のべた花粉分析結果をまとめると次の通りである。

① 10,000 年 B.P. 以後の韓国東海岸地域における植生変遷は *Pinus*, *Quercus* の増減により 2 つの分帯と 3 つの亜分帯に分けられる。

I *Quercus* Stage (10,000~6,000 年 B.P.)

II *Pinus-Quercus* Stage (6,000 年 B.P.~現在)

IIa 下部 *Pinus* Substage (6,000~約 3~4,000 年 B.P.)

IIb *Pinus-Quercus* Substage (約 3~4,000~2,000 年 B.P.)

IIc 上部 *Pinus* Substage (2,000 年 B.P.~現在)

② 調査地域の植生変遷は後氷期の気候変動に大きく支配されているが、部分的には海面変動及び人間活動の影響も加わっているように見られる。

③ 植生変遷から 10,000 B.P. 以後現在までより乾燥な時期とより湿潤な時期が 2 回ずつくり返したことが推察出来る。

本研究を行うにあたって日頃より御指導いただいている東北大学西村嘉助教授、韓国慶北大学の洪慶姫教授に心より感謝いたします。

花粉分析については宮城県農業短期大学の日比野紘一郎先生にご教示頂き、北海道教育大学の大内定先生にはご助言を頂いた。韓国植物生態については韓国慶北大学の呉修榮先生にご指導いただいた。

東北大学理学部地理学教室の小元久仁夫先生にはC¹⁴年代測定に御指導いただき、中田高先生には有益な教示をいただいた。韓国慶北大学校範大学地理学教室の金相漢氏、韓国関東大学の孫明哲氏には現地調査に同行いただき試料採取にご協力いただいた。これらの方々に厚く感謝いたします。

(1978年11月11日投稿)

(1979年1月1日受理)

註

- ① 呉は松島(1941)の研究でとりあつかった海岸平野の泥炭層と類似した地層の分析を行ったが花粉の組成は松島の報告と異なり、上部に向かって *Abies* が増える傾向と *Ligustrum*, *Carpinus* が全層にわたって高い出現率を示している。また、呉が推定した3000年B.P.頃の *Abies*, *Carpinus* が高い出現率を示すのは韓国で行なわれた他の研究例ではまったく認められない独特な傾向であり、泥炭形成年代推算にも理解しがたいところがある。
- ② 浦項の沖積層はZnCl₂処理後の水洗の時花粉が流失する傾向がかあったので水洗をやめZnCl₂溶液にうかんだ花粉をそのままとってグリセリンゼリーで封入した。
- ③ 日本では *Pinus* の急増期は約1,500年B.P.であり、時間的に大きな差がある。
- ④ Blytt (1876), Sernander (1910) の研究による。
- ⑤ 海図から見ること、浦項の場合、-40 m の等深線の位置は現海岸線から約20 km の沖合にある。

文 献

- Blytt, A.; Essay on the Immigration of the Norwegian Flora during Alternating Rainy and Dry Periods (Kristiania) (1876), cited by G. Erdtman (1943)
- Erdtman, G. (1934); Über die Verwendung von Essigsäure-anhydrid bei Pollenuntersuchungen Svensk Bot. Tidskr., 28, 354~361

- Fairbridge, R.W. (1961); Eustatic changes in sea level. Physics and Chemistry of the Earth, 4, pergamon press 99~185
- 藤 則雄(1966); 日本における後氷期の気候変遷. 第四紀研究, 5, 150~156
- 曹 華龍(1978); 韓国浦項周辺平野の地形発達. 東北地理, 30, 153~160
- 松島眞次(1941); 花粉統計による朝鮮の森林変遷の考察. 日本林学会誌 23, 441~450
- 中村 純(1967); 花粉分析. 古今書院, 1~232
- Nakamura, J. (1952); a comparative study of Japanese pollen records. Research reports of the Kochi University 1, 1~20
- 沼田 真, 岩瀬 徹(1975); 図説日本の植生. 朝倉書店, 1~178
- 呉 智泳(1971); 平澤地区土炭の花粉分析. 生物学会誌(韓国), 14, 66~73
- 呉 修榮(1977); 韓国維管束植物のフロラと分布に関する研究. Natur and Life (韓国), 7, 13~39
- Park, Y. (1969); Submergence of the Yellow Sea Coast of Korea and stratigraphy of the Sinpyeongcheon marsh, Kimje, Korea. Jour. Geol. Soc. Korea 5, 57~66
- 阪口 豊(1961); 北日本の完新世の気候変化. 地理学評論, 34, 259~268
- Shepard, F.P. and Suess, H.E. (1956); Rate of Postglacial rise of sea level. Science 123, 1082-1083
- 島倉巳三郎(1973); 日本植物の花粉形態. 大阪市立自然科学博物館収蔵資料目録第5集
- 塚田松雄, 金 遵敏, 任 良宰, 洪 淳喆, 安田喜憲(1977); 韓国における環境変遷史I 束草における植生史. 日本第四紀学会講演要旨集 6, 21
- 塚田松雄, 安田喜憲(1978); 韓国における環境変遷史と農耕の起源, 自然科学手法による遺跡古文化財等の研究. 昭和52年度年次報告書 190~198
- 山崎次男(1940); 花粉分析による朝鮮南部の樹種変遷に関する研究. 日本林学会誌, 22, 73~85
- Yim, Y. and Kira, T. (1975); Distribution of forest Vegetation and Climate in the Korea Peninsula. Jap. Jour. Ecology, 25, 77~88

Palynological Studies on Postglacial Age in Eastern Coastal Region, Korea Peninsula

Wharyong Jo

In these analyses the author treats two peat samples (Jumoonjin and Bangeojin) and one boring core of alluvium (Pohang) from eastern coastal region of Korean Peninsula (Fig. 1, 6, 7, 8).

The forest change in eastern coastal region, Korean Peninsula, since the Late Glacial Age is divided into two stages and three substages. It may be summarized as follows.

I; Quercus Stage (10,000-6,000 y.B.P.)

II; Pinus-Quercus Stage (6,000 y.B.P.-present)

IIa; Lower Pinus dominant Substage (6,000-4,000/
3,000 y.B.P.)

IIb; Pinus, Quercus Substage (3,000/4,000-2,000
y.B.P.)

IIc; Upper Pinus dominant Substage (2,000 y.B.P.
-present)

The change of the forest in study area was controlled mainly by climate, partly by sea level change and human activities.

From forest change of Postglacial Age, the author considered that the Stage I and Substage II (b) were under relatively humid climate, but the Substage II (a) and II (c) were under relatively dry climate.

Plate. 1 Photomicrographs of pollen and spores from eastern coastal region, Korea (1)
 1; *Abies* 2; *Pinus* 3; *Platycarya* 4; *Castanea* 5, 6; *Fagus* 7; *Quercus*
 8; *Carya* 9; *Juglans* 10; *Ulmus/Zelkova* 11; *Carpinus* 12, 13; *Alnus*
 14; *Corylus* 15; *Ericaceae* ($\times 600$)

Plate. 2 Photomicrographs of pollen and spores from eastern coastal region, Korea (2)
 16; *Tilia* 17; *Elaeagnus* 18; *Betula* 19; *Thalictum* 20; Gramineae
 21; Umbelliferae 22; *Artemisia* 23; *Persicaria* 24; Chenopodiaceae
 25; Typhaceae 26; Cyperaceae 27; *Trapa* 28, 29; Fern spore (Monolete
 type) 30; Fern spore (Trilete type) ($\times 600$)