東京都江戸川区における緑地空間の 変遷と分布特性

宮 原 弘 匡*

要 旨 本稿は、東京都江戸川区を事例として、緑地空間を地理学的にとらえ、その変遷および分布特性の分析を試みたものである。その結果、次の諸点が明らかになった。1. 江戸川区の生産緑地は、都市化の方向に一致して、北部と西部の既成市街地や主要交通路周辺から次第に失われ、現在では、区の東部と中部に主に畑地として残存し、軟弱野菜を中心とする近郊農業が営まれている。これに対し、公園緑地の整備過程は、都市化に対応し、既成市街地と主要交通路を中心に拡散現象が認められ、特に児童遊園はこの傾向が強い。2. 生産緑地率は、既成市街地からの距離が増すごとに連続的に高まる傾向があり、また、人口との関係にもほぼ負の相関が認められ、生産緑地率が都市化の段階を把握する一つの指標となる可能性を意味している。公園緑地率は公園の利用圏を反映してか非連続的な分布を示している。3. 江戸川区の北部と西部の既成市街地は建ぺい空間率が極めて高く、緑地空間が著しく欠乏している。一方、土地区画整理事業により開発された区南部は生産緑地率は低い、公園緑地率が高い。都市化の中で新たな緑地空間が創造された地域である。さらに、区の東部から中部にかけては生産緑地率が高いが、公園緑地率、建ぺい空間率がともに低く、江戸川区の中でも最も都市化の遅れた地域といえる。しかしながら、現在ミニ開発が進み、十分な緑地空間の創造が危ぶまれている。

I. はじめに

都市とは本来人工的なものであり、自然を改変し、集積の利益に基づいて、高密度社会を築き上げてきたものである。わが国では、特に高度経済成長期(1960~1970年)に都市的土地利用が急激な拡大をみた。その結果、都市の自然的要素の総合指標の1つと考えられる緑地の著しい減少を招いた。佐々木(1977)は、首都50 km圏についてメッシュ法を用いて緑地率を算出し、さらに都心からの距離によって圏域ごとに集計し、首都30 km付近が当時の都市化前線に相当することを指摘した。また、1905年から1970年に至るまで緑地面積の経年変化に関する実態を解析し、首都20 km圏では緑地の3割が過去70年間に壊滅したことをはじめ、緑地面積の減少は著

しく、緑地空間確保の必要性を述べた。橋詰(1979)は首都50 km圏の緑地減少を農業センサスより算出し、緑地率とその経年変化を市町村別に求め、緑地の変動と人口動態との関係から都市化と緑地減少の関係を説明した。

このように、都市的土地利用の急激な拡大により、緑地面積は減少の一途をたどっていることが報告された。しかしながら、健全な都市生活を維持してゆくには、緑と大気および水などの確保される環境条件が必要であり、その基盤である緑地の確保は不可欠である。田畑(1979)は、緑被地¹⁾と人口密度の関係を明らかにするとともに、緑被地の減少と都市病理現象の相関関係を求め、緑被地の面積の減少が人間生活に大きな悪影響を及ぼしたことを指摘した。佐藤(1971)は、横浜市を事例に都市開発における農地の設定を緑地空間の一類型としてとらえ、農地および農業が都市の重要な緑地機能を果たすもので

* 長野県立中野高校

あることを述べた。緑地空間は、高密度な土地利用になって過密になりがちな都市空間にオープンスペースの役割を与えるとともに、緑・大気・水などの自然環境の蘇生を実現するものである。

本研究は、都市化の波を被った地域で緑地空間を設定し、従来の研究例では不十分であった緑地空間それ自身の変遷や分布特性を明らかにすることを目的とする。近年、従来の農業的土地利用の卓越した地域から都市的土地利用の卓越した地域へと移行してきた東京都江戸川区を研究対象地域に定めた。

II. 緑地の概念について

緑地の問題が一般に関心と呼んだのは1960年代後半以降であるが、「緑地」という言葉が都市計画の中に専門用語として生まれたのは50年以上も前で、Grünflächen, espace libreの訳語として昭和初期にさかんに使われていた。

この緑地の概念を日本で最初に公式に定義し、内容を分類したのは、1933年、東京緑地計画協議会である。これによると、「緑地トハ其ノ本来ノ目的ガ空地ニシテ宅地、商工業用地及煩雑ナル交通用地ノ如ク建ベイセラレザル永続的ノモノヲ謂フ」と定義され、普通緑地及び生産緑地の2つに大分されている。普通緑地は直接に一般大衆または多数の慰楽休養に資し得るもの、生産緑地は直接的に農林業に使用するものであるが、これに緑地としての効果を望み得るものとしている。また、公私専用の庭、その他法律によって保存される保存地等は緑地に準ずるものとして取り扱われている。この考え方は今日まで踏襲されており、本研究も大筋でこの考え方に沿うものである。

緑地の機能とは、窪谷(1977, p. 138)によれば、次のようなものがある。

- ①温度、湿度などの気候の調整作用
- ②大気の浄化機能
- ③防塵、防音機能

- ④保安林や洪水防止作用をもつ水田のような自然災害防止機能
- ⑤都市地域でその機能が発揮される地震、火災などの際の避難先としての防災機能
- ⑥自然景観 (landscape) の保全機能
- ⑦動植物、水域などの自然保護機能
- ⑧リクリエーション空間としての機能
- ⑨文化財、史跡などの保全機能
- ⑩遮断緑地としての都市拡大あるいはスプロールの都市化の防止機能
- ⑪農地、山林、内水面などが有する農林漁業の生産基盤としての機能
- ⑫将来の多様な土地利用に備えての保留地としての機能

これらの機能のうち、①②③④⑥⑦⑩⑫は緑地の存在効果、すなわち、緑地が存在することによって、その機能が発揮されるものであり、⑤⑧⑨⑪は緑地の利用効果、すなわち、緑地を利用することによってその機能が発揮されるものである。しかし、農地のように緑地の存在効果と利用効果とは相互補完的な関係にある。

本研究では、緑地を、東京緑地計画協議会が定義したように、その本来の目的が空地で、宅地、商工業用地及び交通用地により建べいされておらず一時的でないもの、としてとらえる。また、農用地を含めた土地・水・緑を主体とする非建べい地で、緑地の存在効果あるいは緑地の利用効果が認められるものと考えている。

III. 江戸川区における緑地空間の変遷と現況

緑地空間のうち、都市化に伴い面積を減ずる農用地のような緑地と、面積の増加する傾向にある公園のような緑地とを区別して考えなければならない。前者の典型として生産緑地、後者の典型として公園緑地を対象にした。

1. 生産緑地の変遷と現況

1955 年当時、江戸川区の全耕地面積は約 1,500 ha で、農家世帯数も約 3,000 戸あった。しかし、その後の都市化の進展により両者とも減少し、耕地のうち特に田²⁾は激減した。それに比べ畑地は漸減傾向を示していたが、1974 年の時点で田と畑地の面積は逆転し、その後、定常状態となっている。第 1 図は生産緑地の分布を経年のとらえたものである。都市化を示す指標として、建物の密集地も表した。図によると、1932 年には江戸川区一帯は水田が卓越する地帯であった。この年は、東京市域拡張による江戸川区誕生の年であり、当年以降、文字通り都市化の影響を被ることになった。この時点では、荒川放水路以東の江戸川区全体が 1 つの緑地空間をなしていたといえる。1945 年になると、1 つであった緑地空間が今井街道で大きく 2 つに分断された。総武本線の小岩駅周辺の市街化により、生産緑地が蚕食され始めた。1961 年には、かつて面的な広がりをもせていた生産緑地が、区の東部及び中部、南部だけに限られ、市街地周辺では、畑地がモザイク状に分布していた。とりわけ小岩駅周辺は無秩序な都市化（スプロール現象）が認められた。1970 年になると宅地化が進んで、もはや生産緑地は面的な広がりをもち得ず、小面積の分布を示すようになった。とくに区南部の葛西地区では大規模な土地区画整理事業³⁾が相次いで施行され、広大な生産緑地が消失した。1976 年（図省略）には、さらに宅地化が進み、生産緑地は区東部や中部に畑地というかたちで残存するのみであった。しかし、限られた生産緑地で典型的な近郊農業が現在まで営まれている。第 1 表は江戸川区内にある農地の作物別作付面積を示している。これによれば、小松菜、つまみ菜だけで全体の 6 割を占め、軟弱野菜の生産が主体であることがわかる。また、区の東部の鹿骨地区では苗木、はち物の生産が卓越する。

以上のように、残存する生産緑地は面的広がりを持ち得ないが、農業生産の基盤として、主に近郊農

第 1 表 江戸川区の作物別作付面積
(1982 年 8 月 1 日現在)

作物名	面積 (a)	割合 (%)
小 松 菜	10,137	49.6
つ ま み 菜	2,606	12.7
苗 木	1,043	5.1
ほ う れ ん 草	961	4.7
は ち 物	604	3.0
青 刈	602	2.9
枝 豆	506	2.5
高 菜	444	2.2
切 花	373	1.8
ね ぎ	329	1.6
果 樹	235	1.1
米	176	0.9
春 菊	161	0.8
れ ん 根	70	0.3
その他野菜一般	2,207	10.8
合 計	20,454	100.0

資料：江戸川区役所 経済課

注) 10 a 以上の経営農家の作付面積の合計

業という集約化されたかたちでその機能を果しているといえる。また、長期営農継続農地認定により、10 a 以上の耕地の保全が行なわれている⁴⁾。これは、農業生産の基盤の保全と、空間確保の 2 つをねらいとしている。後者は緑地の機能のうち、保留地に該当し、無秩序な都市化を防ぐものである。本研究では生産緑地を都市化に伴い面積の減ずるものとみなしているが、近年のこのような動きは新しい「生産緑地」の出現と考えられ、緑地空間内部の変化として注目に値する。

2. 公園緑地の変遷と現況

第 2 図より、公園面積がいずれの種類とも 1970 年代以降、飛躍的に増加していることがわかる⁵⁾。この背景は、1969 年に入り、環境浄化運動が始まり、1972 年に、「環境をよくする 10 年計画」が策定され、緑化が一大目標に掲げられて、公園整備が本格化したことに依っている。一方、江戸川区の都市化が進み、生活環境の整備が促されたことを明示している。1970 年 12 月には区役所の環境部の中に緑化公園課が設置され、公園整備が着実に押し進められた結果、

第1図 江戸川区における生産緑地の経年的変化（1932～1970年）
資料：各年測量の地形図

児童遊園数が東京 23 区内で第 1 位（1983 年）となった。

第 3 図は公園緑地の経年的変化⁶⁾を示したものである。1950 年（図省略）においては、数が少なく、児童遊園は区の北部や西部の既成市街地に分布し、ほとんどが神社の境内を借用したものであった。1960

年には、児童遊園の数が増したが、大部分は既成市街地や主要交通路沿いに分布していた。1970 年には、既成市街地でも未整備だった小岩駅南部や区の南東部の旧江戸川沿岸などに整備された。一方、すでに整備されていた既成市街地もその数を増した。1975 年には、河川敷が都市緑地⁷⁾として整備されて

第2図 江戸川区の種別公園面積の推移
 注) 区立公園のみ取り扱い、都市緑地はのぞいた。
 資料: 江戸川区役所 緑化公園課

おり、面積を飛躍的に増大させた。未整備状態であった区の東部でも、都有地が一時開放広場となった。この状況は宅地化が進んだ結果、生産緑地がもはや残存した畑地だけになったため、緑の空間に対する危機感が心理面で生じ、公園整備の必要性が高まり、都有地の解放が要求されたと考えられる。公園緑地の出現にはこのような公園緑地の必要性の高まる段階というものが存在すると考えられ、都市化の過程を考える上でもその究明は重要な課題であるといえる。また、当期は公園緑地の整備がピークに達し、さまざまな空間が公園緑地として確保された。たとえば、住宅指導⁹⁾による大規模な集合住宅地内の公園緑地、土地区画整理公園、首都高速道路の高架下の空間に設けられた児童公園⁹⁾、内水路を被って設置された水上公園などである。1980年に至ると、未整備状態であった区南部に、大規模な土地区画整理公園が出現した。また、全国でも初めての親水公園¹⁰⁾が区の中央部の古川を改造してつくられた。

都市化により、緑地空間が減少した地域では、生

活環境整備の一貫として、公園緑地の空間確保が問題とされる。都市化が進展すると、地価が上昇し、高密度な土地利用が優先され、低密度を志向する公園緑地の空間確保は困難となる。江戸川区の場合、その地形が河川にはさまれた沖積低地であることから、河川敷や内水路などに関係した空間を公園緑地にあて、空間確保につとめており、山の手と異なる特性を有している。前述した親水公園はこの典型で、線的な形態から緑のネットワークや緑地率の向上に果たす役割は大きく、有意義である。

以上をまとめると、江戸川区の公園緑地の経年的変化は都市化に対応して、既成市街地、主要交通路沿いを中心に拡散現象が認められ、特に児童公園はこの傾向が強い。巨視的には、公園緑地の整備前線が区の北部および西部から旧江戸川沿岸そして南部に移っている。鹿骨地区等の区東部は生産緑地がかなり残っており、一時的広場の出現はみられるものの公園整備は最も遅れている。このことから、生産緑地の後退からみた都市化の方向を公園整備が後追いつける結果となっていることがわかる。つまり、公園整備の拡大化現象はいわゆる都市化の対応の結果として出現したものであるといえる。橋詰(1980)は東京都の公園整備前線が鉄道路線の都市化を後追いつけていることを指摘したが、区レベルでも同様のことが認められた。

IV. 江戸川区における緑地空間の分布特性

1. 生産緑地と公園緑地率

前項のような経年的変化を示して現在に至った緑地空間の分布特性を知るために、メッシュ法を用いて、町丁別の生産緑地率、公園緑地率を求めた¹¹⁾。使用した資料は江戸川区土地利用現況図(1981年8月)¹²⁾である。その結果を示したのが第4, 5図である。

生産緑地率(第4図)は荒川放水路沿いの両岸約1 km幅に入る町丁、小岩駅周辺、旧江戸川沿岸、東

第3図 江戸川区における公園の経年的変化（1960～1980年）

注1) 点で表現できない公園緑地は面で表示した。国は国有，都は都有を意味する。

2) 都立篠崎公園は別とした。

3) 町丁境界線は1983年現在のものである。

資料：江戸川区役所 緑化公園課

第4図 江戸川区の町丁別生産緑地率（1981年8月）
資料：江戸川土地利用現況図

第5図 江戸川区の町丁別公園緑地率（1981年8月）
資料：江戸川土地利用現況図

西線周辺が低いのにに対し、区の東部から中部にかけての鹿骨、篠崎、春江、西瑞江、一之江などの町丁で高くなっている。生産緑地率は既成市街地および主要交通路から距離が増すごとに連続的に高くなっているといえる。これは都市化を受けた地域における生産緑地が非緑地空間へ改変されるのをまぬがれた残存の形態を示しているという事実によっている。従って、生産緑地率が土地利用からみた都市化の段階を知る上での重要な指標の1つになりうると思われる。

公園緑地率（第5図）は区南部などの大規模な土地区画整理事業を受けた町丁や、伝統的な公園の存在する町丁で高くなっている。逆に低率な地区は区西部や北部の既成市街地と区の東部である。前者では早くから無秩序に市街化が進んだため、公園緑地の空間が十分確保し得なかったからといえ、後者では生産緑地率が高く、生活環境の悪化が相対的に深

刻でないことから、整備が進んでいないと考えられる。また、都立篠崎公園の存在も大きい。しかし、このような区東部も、近年ミニ開発が進み、公園緑地の必要性が叫ばれ、都有地が一時解放広場となった。

公園緑地率の場合は、生産緑地率のような数値の連続性は認められず、率の高い町丁と低い町丁が隣合う分布がみられる。これは、公園緑地が主に点の分布であることや、公園の利用圏を反映したものと考えられる。このような公園緑地の有する階層性の解明については今後の課題としたい。

2. 人口密度との関係

第6図は町丁別の人口密度を示したものである。人口密度の高率地区は区北部の京成電鉄および総武本線にはさまれた西小岩、小岩駅南部、平井などの既成市街地と春江町1丁目、下篠崎町、上篠崎町、西葛西4丁目、中葛西4丁目などの大規模集合住宅の存在する町丁である。これに対し、低率地区は区の

第6図 江戸川区の町丁別人口密度
(1982年1月1日)
資料：統計江戸川

東部および東西線以南の葛西地区である。これらの地区は区の北部や西部に比べ、人口収容量に余裕があり、今後の人口増加が予想される。

第4図と第6図の比較により、人口密度の高い町丁では生産緑地率が低く、生産緑地率の高い町丁では人口密度が低いといえる。ただし、これらの逆は必ずしも真とはいえない。たとえば、大規模な土地区画整理事業で開発された区南部では、生産緑地率、人口密度とも低くなっている。これは、土地区画整理事業により生産緑地が面的に失われ、宅地造成地に変容したが、人口の流入はそれに対応するほど急激ではなく、なかなか宅地として利用されないことによる。さらに、土地投機の点から、一時的な空地や荒地が多いことも関係している。

公園緑地率と人口密度との関係は、第5図と第6図の比較からわかるように、生産緑地と人口密度の関係ほど明瞭ではないが、次のように解釈できる。

第7図 江戸川区の生産緑地率・公園緑地率・建ぺい空間率による地域類型の分布
(注) I～IVは生産緑地率・公園緑地率・建ぺい空間率により4つに類型化したものである。
資料：江戸川土地利用現況図

- ①区の北部および西部の既成市街地では人口密度は高いが、公園緑地率は低い傾向にある。
- ②都市計画で開発された区南部では人口密度は低いが、公園緑地率は高い傾向にある。
- ③生産緑地率の高い区の東部では人口密度、公園緑地率とも低い傾向にある。
- ④大規模集合住宅の存在する町丁では人口密度、公園緑地率とも高いところがある。

3. 緑地空間と非緑地空間との関係

土地利用からみた都市化を緑地空間から非緑地空間への変換と考えた場合、両者の関係を考察してみた。その際、農村を構成する生産緑地のような緑地空間が非緑地空間に変換されるが、健全な都市空間の創造から公園緑地のような緑地空間が二次的に現

れると考えることができる。このような考えに基づき、生産緑地率、公園緑地率、建ぺい空間率 $(1-(\text{生産緑地率}+\text{公園緑地率}))$ を求め、町丁別に三角座標上にプロットした。その結果、4つの類型を得た。これを地図化したのが第7図である。

類型Ⅰは建ぺい空間率95%以上の町丁で、生産緑地率、公園緑地率ともに極めて低い。無秩序な都市化により、公園緑地の空間創造が十分実現できなかった区の北部と西部の既成市街地に該当している。

類型Ⅱは生産緑地率10%以上の町丁で、建ぺい空間率、公園緑地率は相対的に低い。区の東部から中部に該当し、江戸川区の中で最も都市化の遅れた地域とみることができる。

類型ⅢはⅡ以外で公園緑地率5%以上の町丁である。土地区画整理事業を受けて開発された区南部や親水公園、近隣公園等の整備された町丁に該当し、都市化の中で新たな緑地空間が創造された地域といえる。

類型ⅣはⅠ、Ⅱ、Ⅲ以外の複合型で、たとえばⅡからⅠへ、ⅠからⅢへ等の漸移帯と考えることができる。

以上より、生産緑地や公園緑地の分布特性は、都市化の過程と密接に関連し合っているといえる。

V. おわりに

筆者が緑地空間に関する概念を検討したのは、それが都市化の段階を把握するための一指標になり得ると考えたからである。本稿はその第一歩として、緑地空間それ自体の地理学的分析を試みた。その結果、緑地空間のうち生産緑地は都市化に対応していることが認められたが、公園緑地の場合、その整備前線が都市化に対応しているとみられるものの、その分布特性は必ずしも対応したものとはいえない。このような結果に至るのは、生産緑地と異なり、公園緑地が行政側の提供する公共の施設である点によるも

のと考えられる。したがって、公園緑地を都市化の段階を知る指標とするためには、今後、公園緑地の空間確保の難易度、公園配置の有する階層性、公園緑地の需要度や利用度などをとらえ、考察していかねばならず、以上の諸点は今後の課題としたい。

謝 辞

本稿は、筆者が1984年3月、筑波大学第一学群自然科学類へ提出した卒業論文の一部である。研究に際して、筑波大学の山本正三教授、奥野隆史教授、高橋伸夫助教授、斉藤功助教授ら多くの先生方の御指導を賜りました。本稿をまとめるに際しては、朝倉隆太郎教授(現上越教育大学)から多くの御助言を賜りました。資料収集および現地調査に際しては、東京都江戸川区役所、江戸川区教育委員会、東京都庁都市計画局の方々から御協力いただきました。記して以上の方々に厚く御礼申し上げます。

(1986年10月14日 受理)

注

- 1) 田畑(1979)によれば、緑被地とは一定の地域に独立または一団の樹林地、草地、林地、水辺、湿草地など植物で被われた土地の総称である。
- 2) 田という範疇には水田、ハス田がふくまれる。
- 3) 江戸川区の土地区画整理事業については、山崎憲治(1981): 江戸川区南部、堀江土地区画整理事業の展開と土地、農業問題、地理評, 54, 247~268. 参照。
- 4) 対象は10a以上の耕地面積を有する者または付近の耕地を含めて10a以上の耕地面積となる者である。前者は農業生産の基盤、後者は空間確保の観点にたっている。
- 5) 対象とした公園は区立公園のみで、都市緑地はここでは除いてある。区立公園は公園、児童遊園、一時解放広場にわかれる。
- 6) 区立公園の開園年次によった。
- 7) 都市緑地は都市における自然地の保全、都市環境の整備および改善、公災害の防止その他地域相互の緩衝または緊急時における避難用等の目的に共するものである。
- 8) 江戸川区は1972年12月1日、「宅地開発および集団住宅建設指導要綱」を定めた。
- 9) 首都高速七号線の高架下の空間には、緑化のキャッチフレーズの「ゆたかな心、地に緑」にちなみ、それぞれを頭文字にする12の児童遊園が

ある。

- 10) 不用になった内水路が汚水のまま放置されることを憂い、美しい水と緑の公園を建設したものである。区内には他に小松川境川親水公園があり、区民のいこいの場となっている。
- 11) 河川敷の土地利用は除外した。
- 12) 江戸川区土地利用現況図は、東京都が5年おきに23区の土地利用現況図を作成するために整える原資料をもとに、江戸川区が12,000分の1でまとめたものである。

文 献

- 青野壽郎，尾留川正平編(1974)：日本地誌第7巻東京都，二宮書店。
- オーガスト・ヘックシャー著，佐藤昌訳(1981)：オープンスペース アメリカ都市の生命，鹿島出版会。
- August Hecksher (1977)： *Open Spaces The Life of American Cities. The Twentieth Century Fund, Inc.*
- 江戸川区 (1976)：江戸川区史 (全3巻)，江戸川区。
- 江戸川区区民部(1982)：統計江戸川，昭和56年度版，江戸川区区民部。
- 橋詰直道 (1979)：東京大都市圏の緑地減少について，駒沢地理，15，83～92。
- 橋詰直道(1980)：東京都における都市公園の発達過程とその分布構造，地理評，53，189～202。
- 木内信蔵 (1979)：都市地理学原理，古今書院。
- 窪谷順次(1977)：首都圏における緑地空間分布の規則性について，農業総合研究，31-2，133～161。
- 中里喜一後援会(1980)：逞しき挑戦—江戸川区長中里喜一の十五年，徳間書店。
- 日本公園百年史刊行会 (1978)：日本公園百年史 (全2巻)，第一法規。
- 佐々木博(1977)：首都50 km 圏の緑地面積の変動，筑波大学人文地理学研究，1，101～119。
- 佐藤昌(1977)：日本公園緑地発達史(上)，都市計画研究所。
- 佐藤俊雄(1971)：都市開発における農地—緑地空間の一類型として—，日本大学経済集誌，41，54～81。
- 斉藤一雄 (1977)：緑地土木環境系の形成技術として，森北出版。
- 田畑貞寿 (1979)：都市のマトリックス，鹿島出版会。
- 只木良也 (1981)：みどり—緑地環境論，共立出版。
- 高原栄重(1974)：環境緑地 I，都市緑地の計画，鹿島出版会。
- 高津斌彰 (1973)：オープンスペース・都市公園と都市化過程—都市空間・環境論序説 (新潟)—，新潟大学教養部研究紀要，4，1～40。
- 辰巳修三 (1974)：緑地環境論—都市域の緑地造成計画，地球社。
- ウィリアム H. ホワイト著，華山謙訳(1971)：都市とオープンスペース，鹿島出版会，Whyte, W.H. (1968)： *The last landscape*. Doubleday & Company, Inc.

The Transition and Distribution of Green Land Spaces in Edogawa Ward, Tokyo Metropolitan Prefecture

Hiromasa MIYABARA*

In this paper, the author made clear the transition and distribution of green land space in Edogawa Ward, Tokyo Metropolis. Green land means the earth surface mostly is covered with vegetation. The results of this study are summarized as follows:

1) The productive green land of Edogawa Ward was once all consisted of rice field. However, its north western part faced urbanization, and rice fields in the east and south turned into dry vegetable fields of suburban agriculture.

2) The park green land was set up from the areas near the oldest built-up areas and along main roads.

The park green land is distributed at the following areas:

- a) on areas featured by water;
- b) at the sites of large-scale apartment houses;
- c) in areas recently transformed by land readjustment.

3) There are two types of process in which green land space changes into non-green land space:

- a) gradual loss of green land because of urban sprawls;
- b) instantaneous transformation as a result of land readjustment. But park green land is created by planning.

*Nakano High School, Nagans Prefecture