科学の成果を人間科学リテラシー構築に生かす

「いのち」を担う女性の脳

菊池吉晃

ジェンダーの問題については、脳科学でも従来から脳の構造や機能の性差について多くの知見が得られてきた。残念なのは、このような知見が巷に降りていくと、男性（脳）優位とか女性（脳）優位というあまりに単純すぎる二極対立に陥ってしまうことが少なくなかったことである。筆者は、脳科学を実践する一人の研究者として、男性脳と女性脳との単純な対立というよりは、むしろ男性性や女性性が、命や人間性を考える上でどのような「意味」を持つのかを理解することこそが重要であると考えている。とくに、生命を生み育む、いわば生命を担う女性の脳を理解することは、きわめて重要である。

科学の世界において、数の上では少なくとも男性が優位を占めてきたことを考えると、おそらく科学の方向性、実践方法、アウトカムの評価において男性性的視点が優位であったに違いない。したがって、これまで人間全体にとって本当に「意味」のある科学が実践されてきたかどうかについては、いささか疑問なのである。今日の科学技術が飛躍的な発展を遂げたのは事実であろう。しかし、一方でその見かけの合理性によって、人は本来辿るべき正しい方向性を見失い、精神の豊かさを失い、人として生まれてきた喜びが何であるのかさえ忘れかけているように思われるのである。この現況を目の当たりにして、これまでの科学の方向性や評価に対して、不安や焦燥の念に駆られてしまう

のは、おそらく筆者だけではないだろう。ここに、女性性を基盤とした科学の新しい方向性への提言に対して、大いなる期待を持つに至るのである。そして、現実的には、女性科学者や研究者のさらなる活躍や女性性の科学的理解をさらに深めていくべきであると筆者は考えるのである。

本稿では、女性を対象とした女性性や人間性の神経基盤に関する筆者らの最新の研究事例をいくつか紹介したい。

我が子を愛しむ脳

まず、母親の我が子に対する「愛情」の神経基盤に関する研究である。対象者は1～2歳児をもつ母親である。対象者には、fMRI撮像時に我が子と他人の子の動画をランダムに提示した。この動画は二種類の場面からなり、一つは、シャボン玉で遊んでいる時の楽しそうな場面、もう一つは、これとは対照的に、母親を求めて泣いている（発達心理学でいう「分離不安」）場面とした。このような実験条件で得られる母親の脳活動と主観評価などの結果に基づき、母親の「愛情」の神経基盤である4つの脳領域を抽出することに成功した（Noriuchi, Kikuchi, et al, Biological Psychiatry, 2008）。

一つは、眼球のすぐ上に位置する前頭前野眼窩皮質という領域である。この領域には左右差が認められ、左側の前頭前野眼窩皮質の活動は

「楽しい」とか「幸せ」というような母親のポジティブな感情と正の相関を示した。一方、右側の活動は「心配」の感情と正の相関を示した(図1)。この感情は養育行動においてとくに重要な感情である。この前頭前野眼窩皮質は、脳のいわゆる「報酬系」のコアとなる領域である。自分自身の心身状態と外界の認知情報などがここで統合され、今置かれている状況や対象の「価値」や「意味」などの評価をおこない、その評価結果から次にどう行動すべきかという意思決定において重要な役割を果たすと考えられている。すなわち、この領域は「動機づけ」にとって非常に重要な領域である。二つ目が、中脳水道周囲灰白質である(図2右下)。これは、

PROFILE

菊池吉晃
(きくち よしあき)
首都大学東京大学院人間健康科学研究科教授(医学博士、工学博士)、
Journal of Physiological Anthropology
のEditorial Board、National Science
Foundation (NSF:米国科学財団)の
Reviewerなど
専門:脳機能イメージング(fMRI、MEG
など)を用いた認知神経科学的研究

中脳にある神経構造で、母性ホルモンであるオキシトシンの受容体が豊富にあり、動物ではここが損傷されると母性行動ができなくなってしまうこともわかっている。つまり、動物の母性行動において重要な領域が、ヒトの母親においても重要であることが明らかにされたのである。三つ目は線条体である。この領域は、前述の「報酬系」と同様にドーパミンの作用によっ

て行動と報酬とを連合する上で重要である。四つ目は、「島」という「身体性」に関係する領域で、とくに、前方が母親の「愛情」と関連することがわかった(図2左上)。島の機能の詳細については後述するが、ここでは、母親と我が子との肌と肌との温かな触れ合いの感覚に関係すると思われる。

線条体と前頭前野眼窩皮質は「ドーパミン報酬系」に属し、島、中脳水道周囲

図1 母親の我が子に対する愛情と関連する前頭前野眼窩皮質(OFC)の活動とその左右差

図2 母親の我が子に対する愛情に関連する右の島前部（左上）と中脳水道周囲灰白質（右下）の活動

灰白質、さらには前頭前野眼窩前頭皮質もまた「内受容性情報処理系」に属する。人間の身体や内臓の状態は時々刻々変化している。「内受容性情報処理系」はこのような生理情報を処理・コントロールする系で、いわゆるホメオスター

図3 母親の我が子に対する愛情の神経基盤

シスに関係する。この身体や内臓の状態に関する情報は、通常は脳幹レベルで自律的にコントロールされるが、大脳皮質にも送られていく。その代表的な場所が島の後部である。そこから、前部へと情報処理が進むにつれて、これらの情報が認知情報などと統合されていき、そこではじめて自分の身体や内臓の状態、さらには情動の状態に気づく（アウェアネス）ようになる。中脳水道周囲灰白質は、この「内受容性情報処理系」の中でも遠心性の機能を有することがわかっている。したがって、母親の「愛情」の神経基盤は、「報酬系」と「内受容性情報処理系」の2つの系が、前頭前野眼窩前頭皮質において統合されるというシステムであることがわかる（図3）。すなわち、母親にとって我が子の存在は、母親にとっての大切な「報酬」や「動機づけ」であると同時に、母親自身の生命を保ち続けるためのホメオスターシスそのものとも密接に関係するということが明らかになったのである。

懐かしさを感じる脳

図4は、人のサイクルを単純な模式図として表したものである。乳幼児期は、多くの子供にとって母親は安全基地（secure base）であって、母親を基地として子供は自由に探索行動ができ、外界と関わりを持ちつつ成長し続けていく。しかし、児童・思春期になってくると、いつまでも母親だけが安全基地のままではいられな

図4 人のサイクル

くなる。人が自立し、さらに逞しく成長していくためには、自分自身の中にあらたな安全基地を作っていくことが重要になると筆者は考えている。すなわち、自分自身の中に安全基地があるからこそ、人は外界にうまく適応し、自由

図5 大切に懐かしい記憶に関連する中脳黒質の活動

に、かつ、発展的に生きていくのである。人には、このような安全基地が様々あるかもしれないが、筆者は其中でもとくに「自分にとって大切で懐かしい思い出」に着目している。この記憶は、何かのきっかけでふと蘇り懐かしい感覚を誘発するが、その時の脳メカニズムについても研究をおこなっている。

筆者らの研究結果によると、嗅周囲皮質と黒質（図5）という2つの脳領域が上述の現象の

神経基盤となることがわかった。黒質にはドーパミンニューロンが豊富にあり、「報酬系」やそれに基づく「強化学習」において起始的で重要な機能を有することがわかっている。また、嗅周囲皮質は記憶のゲートキーパーとしての機能を有している。懐かしいという感覚は、ドーパミン作用による「報酬（あるいは動機づけ）」と「個人にとって大切で意味のある記憶対象」とが強く連合することで引き起こされることが考えられる。人が、ある対象や状況に対して懐かしさを感じるのは、それを分析的あるいは努力的に認知した結果というよりは、そのほんのわずかな手がかりに触れるだけで充分なのである。すなわち、ほんのわずかな手がかり情報が人の記憶システムに作用し、それがその人にとって意味のある大切な懐かしさを感じる記憶である場合には、それに連合する「報酬系」

が自動的に高い活動性を示すのである。つまり、人の脳には、自分の大切な記憶によって自分自身の「報酬系」を活性化することができるという、巧妙な自己の安全基地としての神経メカニズムが存在することが明らかにされたのである。

自己肯定性を守ろうとする脳

自己肯定性 (self-positivity) とは、人は誰でも基本的に自分が平均よりは良いあるいは正しいというように、常に自己を肯定的にとらえようとする性質のことである。人には、あえて他人に言葉では言わないにしても、必ず自己肯定性が備わっていて、「良きもの」と「自己」とが強く連合していることが社会心理学的研究によって実証されている。このような暗示的 (implicit) な連合の強さを測定する方法として「潜在連合テスト (IAT: implicit association test)」がある。この方法を使うと、暗示的に「悪しきもの」と「自己」とを連合させることができ、人の心の中にある種の葛藤状態を引き起こすことができる。このような自己肯定性に対する危機的な状態を暗示的に作ることで生じる葛藤状態における脳活動の性差について検討した (Miyamoto, Kikuchi, PLoS ONE, 2012)。

その結果、女性と比較して男性では有意に高い活動性を示す脳領域がほとんどなかったのに対して、女性では多くの脳領域が複雑で高い活動性を示した。人の脳には、自分がこれまでの人生の中で獲得してきた経験に基づいて、「自

分とはこういうものだ」という自己に関する図式が記憶されている。自己肯定性に反する状況に置かれると、その危機的状況に対して自己肯定性を守ろうと、まずこの自己図式検索に関与する脳領域が自動的に活性化する。その主な領域は腹内側前頭前野であり、ここが活性化することでさらに脳幹レベルにある様々な神経核の活性化を誘発し、過去の経験に基づいて形成された「状況」に対応する「身体反応」が誘発されると同時に、体性感覚野などにも作用し身体感覚を誘発する (図6)。しかし、この結果を受けて、女性は男性に比べて情動的であるという単純な結論を下すことは誤りである。むしろ、女性の脳には、自分を取り巻く外界を敏感かつ繊細に受け入れ、これまで獲得してきた自

図6 自己肯定性を守るための脳活動

己図式や記憶を瞬時に検索し、対峙している状況や対象の「意味」を自分の心身全体で受け止めようとすると同時に、深い自己内省的処理をおこなうことで、もともと持っていた自己図式をさらに強化し、今後遭遇し得る同様な危機的状況への耐性を獲得するための巧妙な神経メカニズムが存在していると考えられるのである。

以上、これらの知見が、女性性や人間性を少しでも理解するための布石となることを確信するとともに、これらの研究が女性科学者の主体的関与によるものであることから、女性ならではの科学の領域がすでに存在していることを示す事例でもあることを明記しておきたい。