水産資源研究と物理学・数理学の接点

中田英昭

1. はじめに

水産学の分野では、古くから水産資源を適正に管理していくための科学的な基礎となる「水産資源解析学」や、水産資源を漁獲する漁具の性能等を力学的な観点から考究する「漁具物理学」、「水産物理学」など、比較的狭い専門分野で物理学や数理学の手法を用いた研究が行われてきた。その後、水圏における生物生産の基本的な枠組みとして物理環境が重要な役割を担っているという認識が広まり、様々な時間・空間規模における物理環境と生物の相互作用の研究や、環境変化の水産資源への影響予測・評価のための数理的なアプローチに対するニーズが急速に高まってきた。また、水産資源の変動予測や資源管理についても、生態系に基礎を置いた方法論の必要性和重要性が強調されるようになり、水産資源を量的に把握しその変動要因を探索するだけでなく、資源変動の仕組み全体を一つのシステムとしてとらえ、そのダイナミクスを数理的に追究する方向が強く求められている。しかしながら、そうした新たな研究の方向に関する体系的な整理が十分に進んでいる訳ではない。

ここでは、上記のような研究のニーズを踏まえながら、水産資源変動の基盤となる問題に関する物理学・数理的なアプローチの事例をいくつか紹介し、水産資源研究に物理学・数理学の方法論を導入した新たな学術分野の体系を展

望してみる。

2. 水圏の生物生産の基本的な枠組みとしての物理環境

水圏において陸上の農耕地における生物生産力と同程度の生産力を得るためには、陸上のおよそ10倍の物理的なエネルギーが必要と考えられている（図1）。それは水圏における植物プランクトンの一次生産に必要な光と栄養塩の分布の不一致に原因している。すなわち、水中では陸上と異なり光が表面から急速に減少し、その一方で栄養塩は光がわずかししか利用できない水圏の下層に主に蓄積されているため、外洋をはじめとする水圏のほとんどは貧栄養で生物生産力の低い砂漠のような状態になっている（図2参照）。したがって、生物生産を増大させるためには、この下層の栄養塩を光が豊富な表層に輸送する物理的なエネルギーが必要となる。

図2に示した海表面の植物プランクトン色素量

図1 農耕地と海洋（植物プランクトン）の一次生産に必要な付加的エネルギーの比較（Margalef, 1978）

図2 人工衛星の海色センサーによって計測された海表面の植物プランクトンのクロロフィル色素量の分布 (Mann and Lazier, 1996)

(一次生産の大きさの指標) の分布を見ると、沿岸海域に生産力の大きい場所が偏在していることが分かる。これは、水深が浅い沿岸海域ほど下層の栄養塩が表層に回帰されやすいことに加えて、潮汐・潮流や風の応力に起因する流れ(沿岸湧昇)、河口域の海水循環等の物理環境の働きによるものである。沿岸湧昇が発生する海域の生産力はとりわけ大きく、海洋の表面積ではわずか0.1%を占めるにすぎないが、世界の魚類生産のおよそ50%はそこで生産されると見積もられている。

一方、外洋でも、たとえば黒潮の沿岸縁辺部に見られる不連続な海洋構造(前線)の変動に伴って形成される、「前線渦」と呼ばれる反時計回りの渦流で湧昇がしばしば発生し、貧栄養な外洋でいわば砂漠のオアシスのような働きをしている可能性があることが報告されている(図3)。このように従来よりも微細な規模

PROFILE

中田英昭
(なかた ひであき)
長崎大学水産学部教授
専門: 水産海洋学

で生起する海洋の物理現象についてはまだ不明の点が多く、そのメカニズムや生物生産における普遍的な意義を明らかにすることは重要な課題である。著者らが海洋物理学・化学・生物資源学の研究者で共同体制を組み、黒潮前線渦において先駆的な研究を実施してから20年近く

図3 黒潮前線渦とその周辺におけるクロロフィルaおよびカイアシ類ノープリウス幼生の分布と時間変動 (Okazaki et al. 2003)
▼: 漂流ブイで標識した前線渦の中心部の推定位置
Transect IIIはTransect Iの2日後に観測を実施

を経過するが、最近も東オーストラリア海流の
前線渦について、詳細な現場観測とモデリング
を組み合わせた研究が継続されており、その重
要性が確認されている（Mullaney and Suthers,
2013; Everett et al. 2015）。

3. 生物輸送は海洋物理学と 水産資源学の接点

海洋における水産資源量の水準は、発育初期
の卵～仔稚魚期における生き残りの程度で決定
されると言われており、資源量の変動過程は図
4に示したようなスイッチ回路で表すことがで
きる。遊泳する能力に乏しい発育初期には、流
れによる生物の輸送が、そのスイッチのオン・
オフの重要な要因となる。すなわち、水産資源
生物はその生活史の一部あるいは大部分を流れ

に依存しながら、それぞれの生き残りや繁殖に
適した場所への移動を実現しており、何らかの
原因でそれまで適応していた流れのパターンが
変化すれば、それは時として水産資源の大きな
変動を引き起こす可能性がある（中田, 1991）。
その意味で、流れによる生物輸送は、海洋物理
学と水産資源学を直接に結びつける基本的な要
素の一つとなっている。

最近、精度の高い流れの数値モデルの開発
が進み、産卵場所や仔稚魚の成育に適した場所
に関する情報や、日周期の鉛直運動等の仔稚魚
の行動特性をモデルに入力することによって、
卵・仔稚魚の産卵場所からの輸送やその過程で
の生き残りの状況を数値実験で調べる試みがな
されている。卵や仔稚魚の発生・発育に伴う鉛
直方向の挙動の変化と流れとの相互作用や、ス
トームなど荒天条件下での輸送状況をフィール

図4 水産資源生物の発育初期の生き残りによって資源量の水準が変動する仕組み（模式図）

ドで定量的にとらえることは不可能に近く、このようなモデルを用いたアプローチは、その意味できわめて有用である。しかしながら、生き残りにかかわる生物過程等の定式化やモデルの各種パラメータの設定にはまだ不確定の要素が多く、モデルによる予測とそのフィールド情報に基づく検証を一体のものとして機能的に連係させていくことが必要である。

4. 水産資源—環境系（高次生産生態系）のモデリングへの期待

水産資源の数量変動や生産のメカニズムの解明を進めるためには、これまでの定性的な現象解析を中心とする生態系の研究を、より定量的で動的な要素を組み込んだ多次元・多変量の生態系解析に発展させていく必要がある。モデリングがそのためのきわめて有効なツールとなることは間違いない。先に述べた生物輸送モデルも大きくとらえればその一環をなすものと言える。

水産資源—環境系のモデリングに期待される点の一つは現象の定量化であり、とくに生態系の食物網や物質循環系の解析への適用は効果的と考えられる。また、資源量の変動予測や人間活動による影響評価等に関する将来予測の機能もこれからますます重要となる。さらに、資源や環境の変動に関する思考実験など変動過程の本質を実験的に探求するツールとしての機能は、水産資源—環境系の科学を推進していく上

でもっとも有用性の高いものとして注目される。

しかしながら、水産資源として重要な高次栄養段階の生物までつながりを持った生態系の全体を対象としたモデリングについては、まだほとんど手がつけられていない。生態系の高次栄養段階になるほど生物のサンプリングが難しく、データや情報が限定的なためモデルの検証が困難であること、移動能力や環境変化に対する能動性が高まるため、広範囲における行動の把握が必要となること、さらには相対的に寿命が長いため、発育や成長に伴って環境要因や食物関係が複雑に変化することなど、検討を要する課題が多く残されている。まずはフィールドにおける実態を十分に把握し、それから優占種の個体群動態のモデル、多魚種・多次元の生態系モデルの開発へ、段階的にモデルの機能を拡充していくことが必要であろう。

5. おわりに

以上に述べたように、これから水産資源研究とくに資源の変動機構に関する現象解析を有効に進めていくためには、それを生物輸送や生態系のモデリングと機能的に結びつけた研究を組織的に推進していくことが不可欠と考えられる。その意味で、水産資源—環境系の研究の体系は、資源生物学と物理環境学等の学問体系の集合体というよりも、むしろフィールド研究、実験的な研究と生態系等の数理的なモデリン

グを機能的に結びつけた、問題解決のための方法論の体系としてとらえるべきではないだろうか。今後、そのような体系に基づく学際的な研究の事例をできるだけ多く積み上げていくと同時に、それを支える問題解決型の機能集団を育成していくことが大きな課題となる。たとえば、少し古い話になるが、カナダのニューファンドランド島の砂浜海岸におけるカラフトシシャモの資源変動に関する基礎的な研究を組織的に展開したLeggett博士を中心とするグループは、生物学をベースにしながらも物理過程を理解するに足る十分な知識を身に付け、しかも変動予測モデリングを含むデータの数理的な解析にも優れた能力を発揮していた (Leggett et al. 1984)。このような人材をどのようにして継続的に育成し確保していくのかは、この分野の研究の発展の成否にかかわる課題と言える。

なお、日本水産学会（水産教育推進委員会）から、2011年に『農学・水産学系学生のための数理科学入門』という教科書が出版されており、その内容には数学や統計学に加えて力学や電磁気学等の物理学の基礎も含まれている。こうした活動の根底には、物理学・数理学・工学・経済学等の多様な分野との連携が、農学現場の問題解決に必要不可欠であり、現象の関係性を理論的に考究する基礎能力を持つ学生を育成したいとの思いがあったことは言うまでもない。このような学生教育のための努力を今後も地道に継続していくことが必要であろう。

引用文献

- Everett, J.D., H. Macdonald, M.E. Baird, J. Humphries, M. Roughan and I.M. Suthers (2015) Cyclonic entrainment of preconditioned shelf waters into a frontal eddy. *J. Geophys. Res. Oceans*, 120, doi:10.1002/2014JC010301.
- Leggett, W.C., K.T. Frank and J.E. Carscadden (1984) Meteorological and hydrographic regulation of year-class strength in capelin (*Mallotus villosus*). *Can. J. Fish. Aquat. Sci.*, 41: 1193-1201.
- Mann, K.H. And J.R.N. Lazier (1996) Dynamics of Marine Ecosystems: Biological-Physical Interactions in the Oceans, 2nd Ed., Blackwell Science, Inc., Plate 1.
- Margalef, R. (1978) Life-forms of phytoplankton as survival alternatives in an unstable environment. *Oceanologica Acta*, 1: 493-509.
- Mullaney, T.J. and I.M. Suthers (2013) Entrainment and retention of the coastal larval fish assemblage by a short-lived, submesoscale, frontal eddy of the East Australian Current. *Limnol. Oceanogr.*, 58: 1546-1556.
- 中田英昭 (1991) 仔稚魚の輸送・生残・加入にかかわる沿岸海洋過程, 沿岸海洋研究ノート, 28: 195-220.
- 日本水産学会水産教育推進委員会編 (2011) 農学・水産学系学生のための数理科学入門, 恒星社厚生閣, 東京, 148pp.
- Okazaki, Y., H. Nakata, S. Kimura and A. Kasai (2003) Offshore entrainment of anchovy larvae and its implication for their survival in a frontal region of the Kuroshio. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, 248: 237-244.