宇宙開発と農学の接点

―閉鎖生態系生命維持システムの構築―

北宅善昭

1. はじめに

原生人類の祖先はアフリカで誕生し、その後約7万年前に世界中に広がっていったとされている（アフリカ単一起源説）。その移動を後押ししたのは、新たな土地への「好奇心」であったかもしれない。また、15世紀半ばから始まる大航海時代、欧州の人々は資源を求めて未知の大陸に進出するが、危険を承知で未知の世界へ行こうとする動機の中にも、やはり様々な「好奇心」があったと考えられる。現在、「なぜ人類は宇宙を目指すのか」といった議論があるが、その根底にも科学的「好奇心」があるように思われる。

地球から約400 kmの距離にある国際宇宙ステーション（ISS）での宇宙飛行士の常時滞在が開始されてから16年が経過し、多くの観測や科学実験が行われてきた。今後、地球から約38万 km離れた月へ、さらには約7,800万 km離れた火星への有人ミッションが十数年内に予定されており、人類の火星移住という壮大な構想もある。

将来、月や火星に人が長期滞在する場合、地球上（以下、地上）に似た生存環境を作る必要がある。またそれ以前に予定されている長期有人宇宙探査で、人が輸送機に乗り宇宙に出ていく場合にも、生命維持の環

境が不可欠である。

2. 長期有人宇宙活動支援のための閉鎖生態系生命維持システム

現在の飛行技術では、火星への往復のみでも約17ヶ月を要する。NASAの試算によると、成人男性一人が通常の活動を行う場合の一日分のエネルギー（2,800 kcal）摂取のために必要な食料は乾重で0.62 kg、水は3.08 kg、呼吸に必要な O_2 は0.84 kgであり、排出される固形物は0.11 kg、水は3.42 kg、 CO_2 は1.0 kgである¹⁾。一人が一日に約4.5 kgの物質を取り込み、排出する。現在の技術では、無人機を用いて1 kgの物資をISSまで運ぶだけでも数百万円の経費が必要である。火星滞在期間を含めて、複数乗員

図1 閉鎖生態系生命維持システムにおける物質循環の概要

の生命維持のための物資は膨大な量となり、全てを地球から運ぶことは技術的にも経済的にも困難である。このように長期間宇宙に滞在する場合、人の生存に不可欠な食料の生産、空気や水の浄化、物質リサイクルなどを閉鎖環境下で行なう閉鎖生態系生命維持システム (Controlled Ecological Life Support System、略して CELSS (セルス)、図1) が必要となる。CELSSでは基本的に、人を含む動物の呼吸により排出される CO_2 は植物の光合成で吸収・固定され、その時に発生する O_2 が動物の呼吸に利用される。また動物の排泄物や植物の非可食部分は、酸化されて水と CO_2 およびその他の無機物に変換されるので、その酸化に必要な O_2 の供給および発生する CO_2 の吸収も植物の光合成が担える。さらに人に有害な微量ガスや不快臭気の吸収、除去も植物に依存できる。また飲用水には、栽培植物からの蒸散水を凝縮して用いる。さらに、強度の肉体的・精神的ストレスに曝される宇宙飛行士が、生鮮野菜を摂取し、生きた植物と接触することは、ストレス緩和に有効である。したがって CELSS では、食料生産機能に加えて、ガス処理、水処理、アメニティ機能などを併せ持つ多機能植物栽培システムの構築が重要となる。

3. 宇宙での農業

宇宙開発における輸送機開発、惑星探査、深宇宙観測などは物理学、数理学、工学の領域で

ある。そこに有人活動が加わると、CELSS など生存のための技術が重要課題となり、農学との接点が生じる。人の生存の基本は食料生産であり、農学領域の知見や技術が貢献できる。地上とは異なる環境下、限られた空間・資源・エネルギーの中で安全かつ計画的に食料を人に供給するためには、健全に成長する植物の挙動を正確に把握し、生産速度を最大にする環境制御が必要となる。そのためには、発芽から栄養・生殖成長を含む植物生育全段階における形態形成、ガス交換、水収支などの情報を、個体あるいは組織レベルで正確に自動計測し、即時の解析結果に基づくフィードバック・フィードフォワード制御を駆使した環境制御が必要となる。すなわち、物理学・数理学の観点からの環境制御を中心とした高効率植物生産技術が重要となる。

4. 宇宙での植物栽培の問題点

宇宙農場での栽培植物として、可食部に含まれる栄養素、栽培の容易さなどを考慮して、コムギ、ダイズ、ピーナッツ、サツマイモ、ジャガイモ、レタス、ニンジン、トマトなど、また微細藻類として、クロレラ、スピルリナ、ユーグレナなどが候補になる。

CELSS において効率的な植物生産を行うための環境制御技術を確立するためには、植物のガス交換および成長に対する物理的環境要素 (光強度、明暗周期、光質、温度、湿度、 CO_2 濃度、

気流など)の影響に加えて、微小重力や低圧環境など宇宙特有の環境の影響を把握することが重要となる。

これまで、ISSなどでの微小重力環境を利用することにより、地上では重力影響に隠されてきた種々の環境要素に対する屈性や形態形成など植物の潜在的機能に関する生理学的研究が行われ、また微小重力下でも、植物は長期間生育できることが示されている。しかし宇宙農場では、食料としての植物の高速大量生産を追求しなければならない。

これまでのISSでのコムギやカラシナなどを用いた宇宙実験では、開花したもの、種子数や稔性の低下、種子形質の変異が報告されている。種子を食料とする場合や、種子繁殖の必要性がある場合、生殖過程の異常は重要問題である。

微小重力下では、熱対流(密度対流)が生じにくい。航空機の放物線飛行を用いた短時間(連

図2 航空機放物飛行中の重力の変化とそれに伴うオオムギ葉各部位の葉温変動⁴⁾

PROFILE

北宅善昭

(きたや よしあき)

日本学術会議連携会員、大阪府立大

学大学院生命環境科学研究科教授

専門: 農業環境工学、生態工学

続20秒間)の微小重力実験の結果を紹介する。

微小重力下では、強制空気流動が無い場合、熱対流の抑制により植物葉と周辺空気との熱交換が抑制され、約2～3℃の葉温上昇が生じた²⁾。

とくに微小重力下での蒸散抑制による潜熱輸送の抑制が、葉温上昇に大きく関与した。また葉先端の細い部位における葉温上昇が、葉の広い部位に比べて顕著であった(図2)。重力1 G下ではほぼ常に対流が生じており、葉でのガス・熱交換の抵抗となる葉面境界層⁵⁾が、葉先端の細い部位では葉の広い部位に比べて薄く、そのため細い部位の葉温は広い部位より低い。しかし対流のない微小重力下では、葉の幅に関係なく葉面境界層の厚さがほぼ一定となるので、葉温も葉の幅に関係なくほぼ同じ値に近づく。そのため重力が1 Gから0.01 Gに低下すると、狭小な部位の温度上昇が顕著になり、葉面での温度分布は均一化される。したがって、微小重力下で熱対流が生じない場合、オシベの葯やメシベの柱頭のような微小な生殖器官の温度は2～4℃上昇し(図3)、生殖異常の原因になり得ることが示唆された。このように生殖成長期には、微小重力に起因する熱対流の欠如による植物葉

面でのガス交換（光合成・蒸散）抑制や生殖器官での温度上昇が生殖過程の異常を引き起こす原因となるので、気流制御による対流促進が不可欠となる。

現在著者らは、環境ストレス耐性の大きいサツマイモを対象として、その栽培装置を開発中である。サツマイモは食用となる根部および茎葉部に栄養素がバランス良く含まれ、その可食部比率は95%以上である。さらにビタミンA、CおよびE、食物繊維、タンパク質などが豊富であり、特

に茎葉部には抗酸化物質を豊富に含む。また、種子繁殖ではなく、栄養繁殖で容易に増殖できる。空間容積、エネルギー使用量が限られる宇宙農場では、蔓性の茎葉部を収穫して葉面積密度を適正に制御し、群落としての受光効率を高め、成長速度を高めることができる。これまでの研究結果に基づく試算では、一人あたりの必要栽培面積は54 m²であり、例えば3×3×3 m³の栽培空間に6段の栽培棚を設置すると、一人分の食料生産と同時に、蒸発散により一日約200 Lの清浄水を回収できる。なお地上の一般農地での作物生産では、この6倍以上の耕地面積が必要である。

図3 植物生殖器官の表面温度に及ぼす重力の影響⁶⁾

- (A) 測定部位の写真
- (B) 航空機放物線飛行中の異なる重力 (1、2、0.01 g) 下での熱画像
- (C) 植物生殖器官の表面温度に及ぼす重力の影響を示すグラフ

5. 地上への貢献と今後の展望

以上のような宇宙での植物栽培技術の開発は、地上では重力の影響で覆い隠されていた植物と環境との相互影響についての本質、例えば流体である大気と植物の相互影響や重力の潜在的な植物影響を解明することに繋がり、地上での植物生産（農業生産）において、農業物理学の側面から、ガス交換（光合成や蒸散）促進、高温障害回避、水収支改善などに結びつく新たな技術の発展に繋がることが期待できる。

また閉鎖系植物生産の応用例として、最近注目されている植物工場栽培への展開が考えられる。例えば、明期には光合成によりCO₂を吸

収し、 O_2 を放出する植物と、常時 O_2 を吸収し、 CO_2 を放出するキノコの栽培室を連結し、両者の成長を促進することができる。また、キノコ菌糸の培地に植物生産システムから排出される植物残渣を用いることも可能である。さらに植物成長計測・情報解析とフィードバック・フィードフォワード制御に基づく栽培環境制御の自動化技術

は、自動化植物工場への応用が期待される。

さらにCELSSの概念は、農業を取り入れた都市圏生態系へと展開できる（図4）。系外からの入力物質、および太陽エネルギー以外の入力エネルギー量を最少にできれば、系外への負荷も最少となる物質循環型の社会に近づく。都市圏における人、物質、エネルギーなどの流れのビッグデータに基づいた解析などを駆使した正確な予測の下に、物理学・数理的な思考を基礎とした農学を取り入れて、都市圏の再構築を図っていく必要がある。そのためには、人工的に生態系を創成するCELSSの基本概念が役立つと考えられる。

図4 都市圏での人間活動および環境保全を持続的に両立させるための物質循環およびエネルギーの流れ⁸⁾

参考文献

- 1) 新田慶治, CELSSのシステム構築上の諸問題, CELSS研究会誌, 1, 5-12, 1989.
- 2) Kitaya, Y., et al., The effects of gravity on surface temperatures of plant leaves. Plant Cell Environ. 26: 497-503, 2003.
- 3) Hirai, H. and Kitaya, Y. Effects of Gravity on Transpiration of Plant Leaves. Ann. N.Y. Acad. Sci., 1161, 166-172, 2009.
- 4) Kitaya, Y., et al., Heat and gas exchanges between plants and atmosphere under microgravity conditions. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1077, 244-255, 2006.
- 5) 矢吹萬壽, 風と光合成, 農山漁村文化協会, 1990.
- 6) Kitaya, Y., Hirai, H., Thermal Situation of Plant Reproductive Organs Affected by Gravity and Light Intensity. J. Jpn. Soc. Microgravity Appl., 24(4), 325-329, 2007.
- 7) Kitaya, Y. et al., The effect of gravity on surface temperature and net photosynthetic rate of plant leaves. Adv. Space Res. 28, 659-664, 2001.
- 8) 北宅善昭, 閉鎖生態系・生態工学ハンドブック (大政ら監修), アドスリー, 84-90, 2015.