とろみ調整食品が速崩壊性錠剤の崩壊、溶出、薬効に及ぼす影響

富田 隆,^{*,a} 幸田 幸直,^b 工藤 賢三^aEffect of Food Thickeners on the Disintegration, Dissolution,
and Drug Activity of Rapid Oral-disintegrating TabletsTakashi Tomita,^{*,a} Yukinao Kohda,^b and Kenzo Kudo^a

^aDepartment of Clinical Pharmaceutics and Pharmacy Practice, School of Pharmacy, Iwate Medical University;
2-1-1 Nishitokuta, Yahaba-cho, Shiwa-gun, Iwate 028-3694, Japan; and ^bFaculty of Health Sciences,
Tsukuba International University; 6-20-1 Manabe, Tsuchiura, Ibaraki 300-0051, Japan.

(Received August 19, 2017)

For patients with dysphagia in medical facilities and nursing homes, food thickeners are routinely used to aid the ingestion of medicines such as tablets. However, some types of thickeners affect the disintegration and dissolution of tablets, such as rapidly-disintegrating magnesium oxide tablets and donepezil hydrochloride orally disintegrating tablets. Additionally, delayed disintegration and dissolution of tablets affect a drug's efficacy. As an example, with Voglibose orally disintegrating tablets, marked differences are observed in changes in glucose levels during glucose tolerance testing. When using food thickeners to aid tablet ingestion, it is therefore necessary to select a product that has little effect on drug disintegration, dissolution, and activity.

Key words—food thickener; dysphagia; disintegration; dissolution; drug activity; oral-disintegrating tablet

1. はじめに

嚥下障害を有する高齢者や患者においては、咀嚼力や唾液分泌能の低下が生じ、食物や水分を摂取する際、飲み込むことが難しい状態に陥ることがある。さらに、嚥下障害者は、嚥下時に水分や食物の一部が気管に流れ込んでしまう、のどの奥に食物が残ってしまう等の問題が生じることから、食物や細菌が気管に入り込む誤嚥に結び付き、誤嚥を繰り返すことで、誤嚥性肺炎を発症する危険性が高いことが知られている。その誤嚥や誤嚥性肺炎の発症を予防するために、現在、医療施設や介護施設では嚥下補助食品として「とろみ調整食品」（以下、とろみ剤）が汎用されている。

近年、とろみ剤を使用して錠剤を服用した患者の便中に未崩壊の錠剤が観察されたことが報告¹⁾され、とろみ剤が錠剤の崩壊に影響することが示唆さ

れた。そこで、筆者らは、とろみ剤が錠剤の崩壊、溶出、及び薬効に及ぼす影響を検討し、錠剤服用時におけるとろみ剤使用上の注意点について新たな知見を得た。なお、本稿では口腔内崩壊錠と崩壊・溶出の速い錠剤を併せて、速崩壊性錠剤と定義する。

2. とろみ調整食品について

とろみ剤は、嚥下障害を有する高齢者や患者が固形物や液体を摂取し易くするために食物や飲料などに添加して簡便にとろみを付ける食品のことであり、その認知の高まりとともに医療施設や介護施設で汎用されるようになってきた。2014年に特別用途食品の活用に関する研究会（公益財団法人 日本健康・栄養食品協会）がとろみ剤の使用状況を調査した報告書によると、調査の対象となった922施設のうち97%の医療施設や介護施設でとろみ剤を使用していることが明らかにされている。

とろみ剤は、含有する増粘剤によってデンプン系（第1世代）、グアーガム系（第2世代）、及びキサンタンガム系（第3世代）に分類される。そのとろみ剤には、各製品に含まれる増粘剤の種類や含有量によって、調製後の粘度がばらついてしまう問題点があることから、日本摂食・嚥下リハビリテーショ

^a岩手医科大学薬学部臨床薬剤学（〒028-3694 岩手県紫波郡矢巾町西徳田 2-1-1）、^bつくば国際大学医療保健学部（〒300-0051 茨城県土浦市真鍋 6-20-1）

*e-mail: tatomita@iwate-med.ac.jp

本総説は、日本薬学会第137年会シンポジウム S50 で発表した内容を中心に記述したものである。

ン学会では、とろみ剤の粘度の標準化を目指し、粘度と相関性を持つ line spread test (LST) 値を提案している。この LST 値とは、ラインスプレッドテスト用プラスチック測定板に内径 30 mm の金属製リングを置き、その中に試料を 20 mL 注入し、30 秒後にリングを持ち上げる。その 30 秒後に試料の広がり距離を 6 点測定し、その距離の平均値 (mm) である。段階 1 の「薄いとろみ」は LST 値として 36-43、段階 2 の「中間のとろみ」は LST 値として 32-43、段階 3 の「濃いとろみ」は LST 値として 30-32 と定義している。

現在、介護施設や医療施設では、内用薬の服用時にもとろみ剤が使用されているが、とろみ剤が内用薬である速崩壊性錠剤の崩壊、溶解、及び薬効に及ぼす影響について、十分に検討されているとは言い難い状況である。

3. とろみ剤は速崩壊性錠剤の崩壊に影響する

速崩壊性錠剤をとろみ剤に浸漬させた後、日局崩壊試験を実施してとろみ剤が速崩壊性錠剤の崩壊に及ぼす影響を検討した。速崩壊性錠剤としては、ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 [薬価基準に収載されている 29 銘柄のうち入手できた 10 銘柄 (先発品 1 銘柄を含む)] を用いた。とろみ剤はキサンタンガム系を用い、LST 値を約 32 [3.0% (w/v)] に調製し、ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠を 1 分間あるいは 10 分間静置浸漬させ、その後、直ちに日局崩壊試験法を準用して崩壊時間 (錠剤が完全に崩壊するまでに要した時間) を測定した。²⁾

とろみ剤非浸漬の場合、崩壊時間の中央値は 13.0-34.0 秒であり、ばらつきはみられるものの崩壊速度は速く、速崩壊性錠剤の特性を有していた。とろみ剤に 1 分間浸漬した場合、崩壊時間の中央値は 62.0-178.5 秒であり、とろみ剤非浸漬よりも最大 6.7 倍の崩壊時間の延長が観察された。また、とろみ剤に 10 分間浸漬した場合、崩壊時間の中央値は 109.0-440.0 秒であり、とろみ剤非浸漬よりも最大 22.8 倍の崩壊時間の延長が観察された (Fig. 1)。

第十七改正日本薬局方崩壊試験においては、速崩壊性を持つ錠剤を特定した規定はなく、即放性製剤である素錠は 30 分以内に崩壊するものとされている。筆者らは既に即放性製剤である酸化マグネシウムの素錠において、とろみ剤浸漬によってその崩壊時間に延長がみられ、同崩壊試験法において規定され

Fig. 1. Disintegration Profile of Donepezil Oral-disintegrating Tablets

ている 30 分間では錠剤の形状に全く変化を来さない場合があることを報告している。³⁾ また、ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠のような速崩壊性の錠剤であっても、素錠であることからとろみ剤の影響を受けることを明らかにした。²⁾ さらに、一般用医薬品として上市されている 5 種類の速崩壊性錠 (水なしで服用できる口腔内崩壊錠として胃腸薬 1 銘柄と止瀉薬 2 銘柄、水とともに服用する速崩壊性錠剤として鎮痛薬 2 銘柄) においても、とろみ剤に浸漬することにより、その崩壊時間が延長する現象を捉えている。⁴⁾

崩壊試験で使用したキサンタンガム系のとろみ剤は、医療現場で汎用されている銘柄であることから、口腔内崩壊錠を含む速崩壊性錠剤の崩壊がとろみ剤の使用で影響を受ける可能性が示唆される。

4. とろみ剤は速崩壊性錠剤からの有効成分の溶出に影響する

キサンタンガム系とグアーガム系のとろみ剤に浸漬させた速崩壊性錠剤である酸化マグネシウム錠からの酸化マグネシウムの溶出について、日局溶出試験法 (溶出試験液: 第 1 液, パドル法 50 rpm) を適用して検討した。キサンタンガム系のとろみ剤 (LST 値: 約 32) とグアーガム系のとろみ剤 (LST 値: 約 33) の LST 値を同程度に調製し、酸化マグネシウム錠の浸漬時間を 30 分に設定した。浸漬時間は、医療現場の聞き取り調査の結果、食前に酸化マグネシウム錠をとろみ剤に浸漬し、食後に服用させた事例が多かったことから、その平均時間の 30

Fig. 2. Dissolution Profile of Magnesium Oxide from the Magnesium Oxide Tablets Immersed in Food Thickeners
●: Xanthan gum-based thickener (LST=31.7), ○: Guar gum-based thickener (LST=33.3), ▲: No immersed.

分とした。³⁾

キサンタンガム系のとろみ剤に酸化マグネシウム錠を浸漬し、30分後の膨潤・崩壊状況を観察したところ、わずかに膨潤したが崩壊しなかった。グアーガム系のとろみ剤では、浸漬させた酸化マグネシウム錠は、膨潤も崩壊も認められなかった。

120分後の溶出率は、非浸漬の場合、約82%であったが、キサンタンガム系のとろみ剤浸漬時は約26%と溶出速度の低下がみられた。さらにグアーガム系のとろみ剤浸漬時は約3%と非常に低く、とろみ剤の増粘剤が溶出に大きく影響することが判明した (Fig. 2)。

一般病棟に入院している患者のうち、キサンタンガム系のとろみ剤で酸化マグネシウム錠を服用して

いた患者6名の酸化マグネシウムの平均投与量 (1705 mg/日) は、とろみ剤を使用していなかった患者126名の平均投与量 (1380 mg/日) に比べ多かったことを明らかにした。³⁾ このことから、とろみ剤による酸化マグネシウムの溶出率の低下によって、酸化マグネシウムの胃酸との反応に影響を及ぼしていることが予測され、その結果、緩下作用が低下したことが示唆される。

5. とろみ剤は薬効発現に影響する

とろみ剤がボグリボース口腔内崩壊錠の食後過血糖改善効果におよぼす影響を検討するために、35歳から55歳の6名 (男性4名、女性2名) の健康成人を対象とした経口投与試験を実施した。健康人は、薬剤アレルギー歴の既往のない者、消化器疾患の既往歴のない者、糖尿病の既往歴のない者、臨床検査において適切であると判断された者とした。経口投与試験の実施に先立ち、試験の目的、内容等について詳細な説明を実施し、文書による同意を得た。なお、試験計画は、ホスピタル坂東臨床研究倫理委員会及びいわき明星大学薬学部臨床研究倫理審査委員会において承認を得た。とろみ剤はキサンタンガム系を用い、LST値を約32に調製した。10時間以上絶食した被験者に空腹時血糖測定のための採血を行った直後に、とろみ剤非浸漬のボグリボース口腔内崩壊錠あるいは、とろみ剤に浸漬させた同錠を投与し、直ちにスクロース100gを水150mLに溶解したものを服用させた。服用後120分まで一定間隔で採血して血糖値を自己測定した。服用後120分までの最高血糖値を C_{max} 、 C_{max} 到達時間を T_{max}

Fig. 3. Effect of Food Thickener Immersing on Restraint of Post-prandial Blood Glucose Level by Voglibose Oral-disintegrating Tablet

—: with food thickener immersing,: without food thickener immersing. ** $p < 0.01$ (two way ANOVA followed by Tukey-Kramer test).

とした。⁵⁾

とろみ剤に浸漬させたボグリボース口腔内崩壊錠を服用した場合、 $T_{\max}$ はとろみ剤非浸漬錠を服用した場合よりも 15 分短縮した。 $C_{\max}$ はとろみ剤非浸漬錠を服用した場合よりも 1.1 倍とわずかに高値であったが、内服後 120 分までの血糖値は、とろみ剤非浸漬錠よりも常に高値で推移しており、とろみ剤は薬効の発現にも影響をおよぼすことが明らかになった (Fig. 3)。

経口投与試験で使用したとろみ剤非浸漬ボグリボース口腔内崩壊錠の崩壊時間の中央値は 35.0 秒であり、崩壊速度は速く、口腔内崩壊錠の特性を持ったものであった。一方、とろみ剤に浸漬させたボグリボース口腔内崩壊錠の崩壊時間は 351.0 秒 (中央値) であり、非浸漬時よりも 10.8 倍に延長した。ボグリボースを始めとする α -glucosidase 阻害剤は、他の糖尿病治療薬と併用される場合が多く、これらもボグリボースと同様に口腔内崩壊錠が市販されている。とろみ剤の使用によってボグリボース口腔内崩壊錠の崩壊時間が延長したことから、ボグリボース口腔内崩壊錠と同様に、とろみ剤がこれらの口腔内崩壊錠の崩壊性にも影響を及ぼす可能性が高いと考えられる。

今回使用したとろみ剤は、キサンタンガム系であるが、現在、多くの施設で使用されている第 3 世代のとろみ剤 (表示主要原材料: デキストリン, キサンタンガム, 乳酸カルシウム, クエン酸三ナトリウム) であること、また、とろみの程度については、推奨範囲内の 3% (粘度 約 470 mPa·s) としたので、多くの医療施設や介護施設の現状を反映した条件と考える。

6. おわりに

医療施設や介護施設では、嚥下障害を有する患者や入所者に対して日常的にとろみ剤が使用されている。とろみ剤は服薬時にも使用されているが、とろみ剤の種類によっては、錠剤の崩壊、溶出、及び薬効の発現に影響を及ぼすものがあり、速崩壊性錠剤であっても影響を受けることがある。

服薬時にとろみ剤を使用する場合には、薬剤の崩壊、溶出、及び薬効の発現に影響が小さいことを確認して製品を選択する必要がある。

利益相反 開示すべき利益相反はない。

REFERENCES

- 1) Yamaguchi H., Ochiai A., Takiya H., Abstracts of papers, the 24th Annual Meeting of Japanese Society of Pharmaceutical Health Care and Sciences, Nagoya, September 2014, p. 371.
- 2) Tomita T., Goto H., Sumiya K., Nakanishi R., Kojima C., Yoneshima M., Yoshida T., Tanaka K., Kohda Y., *Igaku no Ayumi*, **253**, 677–678 (2015).
- 3) Tomita T., Goto H., Yoshimura Y., Tsubouchi Y., Nakanishi R., Kojima C., Yoneshima M., Yoshida T., Tanaka K., Sumiya K., Kohda Y., *Yakugaku Zasshi*, **135**, 835–840 (2015).
- 4) Goto H., Tomita T., Sumiya K., Nakanishi R., Kojima C., Yoneshima M., Yoshida T., Tanaka K., Kohda Y., *J. Community Pharm. Pharm. Sci.*, **8**, 88–91 (2016).
- 5) Tomita T., Goto H., Sumiya K., Yoshida T., Tanaka K., Kohda Y., *Yakugaku Zasshi*, **136**, 1171–1176 (2016).