YAKUGAKUZASSHI

Journal of the Pharmaceutical Society of Japan

Editor: Y. Asahina.

Subeditor: K. Hattori.

S. Keimatsu & S. Sugasawa: *Synthese der Glutaminsäure.*
(I.) (*dl-Glutaminsäure aus Acrolein.*)

Das Mononatriumsalz der *d*-Glutaminsäure bildet den in Japan sehr geschätzten Geschmackstoff „Ajino-Moto.“

Bisher wurde die Glutaminsäure durch Hydrolyse von Weizen oder anderer vegetabilischer Eiweissstoffe mittels Mineralsäuren in Form eines Salzes der *d*-Säure gewonnen.

Synthetisch lässt sie sich nach der Wolffschen Methode durch Reduktion der α -Oximinoglutarsäure mittels Zinn und Salzsäure (A. **260**, 119) und nach dem Verfahren von Menozzi und Appiani durch Kochen der Pyrrolidoncarbonsäure mit Salzsäure oder Barytwasser (G. **24**, I, 383; R. A. L. [5], **3**, I, 38) erhalten. Beide Methoden liefern racemische Glutaminsäure, deren Spaltung in ihre optischen Antipoden wie bei anderen Racematen geschehen kann.

Das Ausgangsmaterial unserer Synthese bildet Acrolein. Wir erhielten durch Einleiten von Salzsäuregas in die absolutalkoholische Acroleinlösung zunächst β -Chlorpropionacetal. Letzteres wurde in wässrig-alkoholischer Lösung durch Zusatz von Jodkalium und Cyankalium in β -Cyanpropionacetal übergeführt.

β -Cyanpropionacetal wurde durch Verseifung mit alkoholischer Kalilauge in γ -Diäthoxybuttersäure und letztere durch Behandeln mit

verdünnter Schwefelsäure in Bernsteinsäurehalbaldehyd umgewandelt. Über das Cyanhydrin dieses Halbaldehyds wurde γ -Cyan- γ -aminobuttersäure und durch Behandeln derselben in konzentrierter Salzsäure schliesslich die *d*-Glutaminsäure hergestellt.

Die nach obigen Verfahren hergestellte Glutaminsäure wurde in ihr salzsaures Salz übergeführt und aus wässriger Lösung umkrystallisiert. Der Schmelzpunkt bzw. Zersetzungspunkt lag bei 192–193°. Auch stimmten die Zahlen der Elementaranalyse mit denen der Theorie überein.

(Autoref.)

K. Kafuku u. N. Itikawa: *Oxydation von Isosafroengenol zu Safrovanillin.*

(Mitteilung aus dem Laboratorium der industriellen Abteilung, Government Research Institute of Formosa, Taihoku.)

In einer früheren Mitteilung wurde über die erfolgreiche Aufspaltung des Dioxymethylenätherrings des Safrols und Isosafrols berichtet.* Es gelang K. Kafuku die Konstitution der neugebildeten Körper durch ihre Oxydation nach der Methylierung zur 3-Methoxy-4-Äthoxy-Benzoesäure und durch ihre Reduktion zu der entsprechenden Dihydroverbindung als 1-Allyl-3-Oxy-4-Äthoxy-Benzol bzw. 1-Propenyl-3-Oxy-4-Äthoxy-Benzol festzustellen.†

Im Laufe weiterer Arbeiten über den Oxydationsverlauf beim Isosafroengenol kamen die Verfasser zu dem Resultat, dass es zu einem

* Report of the Department of Industry, Government Research Institute of Formosa, No. 6, p. 1–14, 1925.

† Diese Zeitschrift, No. 521, pp. 609; Acta Phytochimica, Vol. II, No. 3, p. 113.

藥 學 雜 誌

第五百三十一號 大正十五年五月發行

〔 原 報 〕

グルタミン酸の合成的研究 (第一報)

S. Keimatsu u. S. Sugasawa: Synthese der Glutaminsäure. I.
(*dL*-Glutaminsäure aus Acrolein.)

藥學博士 慶 松 勝左衛門

藥學士 菅 澤 重 彦

グルタミン酸は最も普通なる アミノ酸の一種にして、其右旋性酸のモノナトリウム鹽は我國に於ては「味の素」の主成分として普く知らるゝ所なり。而して從來グルタミン酸の製法として行はるゝものは殆んど小麥或は其他の蛋白質を鹽酸を以て分解する法にして、此際得らるゝものは α -化合物なり。

合成法として從來知らるゝものは α -オキシミノグルタル酸を錫の鹽酸を以て還元する Wolff 氏法¹⁾ 及びピロリドンカルボン酸又は其アミドを鹽酸又は1分子量のバリット水と共に加熱する Menozzi & Appiani 兩氏法²⁾ 等にして、此場合生ずるものはラセミ型化合物なり。該ラセミ化合物は2種の光學的 Antipoden に分ち得る事は他の一般のラセミ化合物と同様なり。

近來アクロレインは之をグリセリンの酸性硫酸カリ及び硫酸カリより加熱に依て比較的簡単に製し得るに到り、之を合成化學研究の原料となし得るに到れり。Indoläthylamin の如きは其適例なりと云ふべし。依て余等はアクロレインよりグルタミン酸の合成を企て之に成功したり。即ちアクロレインを無水酒精の鹽酸ガスに依りて β -クロールプロピオンアセタールとなし、之を含水酒精溶液中にて少量のヨードカリの存在に於てチアンカリを作用せしめて β -チアンプロピオンアセタールを得。次に之を酒精製カリにて鹼化して γ -チエトキシ酪酸を作り、之を稀硫酸にて鹼化して琥珀酸半アルデヒドを得。之より對應するチアンヒドリンを

1) A. **260**, 119. 2) G. **24**, I, 383; R. A. L. [5], **3**, (I), 38.

經て γ -チアン- γ -アミノ酪酸を得. 之を濃鹽酸にて鹼化してグルタミン酸を得たり.

上記反應經過を式を以て示せば下の如し.

本法は原料猶高價なる アクロレインにして、目下の所何等經濟的の意義なく、唯グルタミン酸を之より合成し得る新法を確め得たるものなり.

實 驗 之 部

γ -Diäthoxybuttersäure.

アクロレインを原料として β -Chlorpropionacetal を經て β -Cyanpropionacetal を作り、本化合物 50g を苛性カリ 76g を酒精 400g に溶解したる酒精製カリ液に加へ、還流冷却器を附し、炭酸を除去したる乾燥空氣を通じつゝ水浴上に加熱する事約 24 時間にしてアムモニア發生せざるに到る. 依て乾燥炭酸ガスを通じて苛性カリを炭酸カリにして沈澱せしめ、炭酸飽和後吸引濾過し、濾液を減壓に於て蒸溜し去れば後に少量の炭酸カリを混じ居れる γ -Diäthoxybuttersäures Kali を得. 茶褐色を呈せる半固形體にして、グルタミン酸合成の目的には精製の必要を認めざる故、之を直ちに次操作に移したり.

Succinaldehydsäure.

前記 γ -Diäthoxybuttersäures Kali を可及的小量の水に溶解し、稀硫酸を以て酸性となすときは γ -Diäthoxybuttersäure は茶褐色の油狀物質となりて液面に浮び來る. 然る時還流冷却器を附して水浴上に之を加熱すれば約 30 分の後折出せし油は再び水に溶解し去り、同時に液は著しきアルデヒド臭を有するに到る. 冷却後充分鹽折を行ひ、エーテルにて再三再四 ausschütteln し、全エーテルを無水芒硝上に乾燥し、エーテルを溜去すれば暗褐色の琥珀酸半アルデヒドを得. フェーリング液及アムモニア性硝酸銀液を著しく還元し、之を減壓下に蒸溜すれば一部分分解しつゝ蒸溜す. 其中沸點 14mm にて 130-135° の部分を取り、セミカルバチッドを作用せしむるに發熱して直ちにセミカルバツォーンの白色結晶を生ず. 其融點(分解點) 177-178° にして、從來の記載に一致す. 又フェニルヒドラチン

の同量と 150–160° に 10–15 分間加熱し、冷却し、之にエーテルを加へ研磨する時直ちに黄白色結晶性沈澱を生ず。之を氷醋酸より再結晶せしむる時融點 188–189° を示す。即 Succinaldehydsäurephenylhydrazidphenylhydrazon なるを知る。蒸溜前の收得量 20g. 即ち β -Cyanpropionacetal に對し理論數の 62% なり。

γ -Cyan- γ -oxybuttersäure.

琥珀酸半アルデヒドに濃厚なる酸性亞硫酸ソーダ水溶液を加ふる時發熱し、冷却後白色の結晶性物質を析出し來る。即ち兩者の附加成績物なり。之を吸濾し、少量の水にて粥狀となし、之に對稱量のチアンカリを濃厚溶液として滴加せしむる時少しく發熱し、結晶一度溶消し、後再び亞硫酸ナトリウムカリウムの結晶を析出し來る。冷却後水を加へて亞硫酸ナトリウムカリウムを溶解し、鹽酸々性となし、エーテルを以て再三抽出し、全エーテルを合して燒芒硝を以て乾燥後、エーテルを溜去すれば黄色の油を残す。本化合物は既にアルデヒドの反應を有せず。

dl-グルタミン酸.

上に得し Oxycyanbuttersäure を其儘其 1 分子量に對し 2 分子量のアムモニアを無水酒精性溶液として加へ、密栓耐壓器中或は封管中にて 70–80° に加熱する事 4 時間、然る後當量の濃鹽酸と混じ、1 夜放置後倍量の水を加へ、還流冷却下に水浴上に 2 時間加熱して鹼化を終了せしめ、然る後全液を水浴上に蒸發乾燥する時著量の鹽化アムモンを混じ居れる粗製グルタミン酸の鹽酸鹽を得。依て之を無水酒精を以て處理する時大部分の鹽化アムモンは不溶の儘殘留す。其濾液を眞空中にて充分蒸發乾燥せしめ、乾燥殘渣を更に無水酒精と其 $\frac{1}{5}$ – $\frac{1}{4}$ 量の無水エーテルとより成る混液とにて抽出する時は殆ど完全に鹽化アムモンを分ち得べし。其濾液の乾燥殘渣を更に無水酒精と無水エーテルとの同容混合物にて處理する時グルタミン酸の鹽酸鹽の一部を不溶狀態に於て白色粉末狀態に得べし。酒精・エーテル混合液は之を水浴上に蒸發し、殘渣を水に溶解し、熱時濕潤酸化銀にて處理し、鹽化銀を濾別し、濾液に硫化水素を通じて銀を沈澱せしめ、濾液を獸炭にて 2,3 回處理脱色し、水浴上に水分を蒸發し、眞空乾燥器内に放置するに數日後底部に少量のグルタミン酸の結晶と思しきものを析出せるのみにて、全體は粘稠の舍利別狀にして結晶すべき様子なく、味も著しく酸くしてグルタミン酸獨特のものにあらず。是れ水浴上に蒸發中一部脱水しラクタム環を形成し Glutaminsäure となりグルタミン酸と混じ居れる爲にかゝる狀態を呈せるなり。試みに舍利別物質の一部を取り、水を加へて數度水浴上に乾燥せしむるの操作を繰り返す時終に濃縮液より放置する時美しき菱柱狀の結晶を生じ、其融點 182° にして同時に分解す。即ちグルタミン酸の夫れと同一なり。依て此結晶と前の舍利別物質とを混じ、之に過剰の濃鹽酸を加へ、水浴上に加熱濃縮する時容易に其ラクタム環を開き得。即ち蒸發濃縮したるものを硫酸眞空乾燥器中に放置する時暫く後全體結晶

す。依て之を少量の水にて研磨し表面に付着せる少量の舍利別物質を溶解し、此を吸引濾過し、猶少量の水にて洗ひ、素焼板上に乾燥後最初に得たるグルタミン酸鹽酸鹽を混じ、之を可及的小量の水に溶解し、外部より寒劑を以て冷却しつゝ乾燥鹽酸ガスを通じ飽和せしむる時グルタミン酸鹽酸鹽を析出し來る。然る後之を吸引濾過し、鹽酸飽和の無水酒精にて洗ひ、更にエーテルを以て遊離鹽酸の無くなる迄洗ふ時容易に分析純度の物質を得べし。其融點 $192-193^{\circ}$ にして同時に分解す。

分 析

物質 0.1202g	N 7.8cc (764.7mm, 18°C)	N% 7.39
$\text{NH}_2\cdot\text{HCl}$		
$\text{HOOC}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}_2\cdot\overset{\text{NH}_2}{\underset{ }{\text{CH}}}\cdot\text{COOH}=\text{C}_5\text{H}_9\text{O}_4\text{N}\cdot\text{HCl}$ として理論數		N% 7.63
物質 0.0810g	$\text{AgCl} = 0.0628\text{g}$	Cl% 19.18
$\text{C}_5\text{H}_9\text{O}_4\text{N}\cdot\text{HCl}$ として理論數		Cl% 19.34

斯くして得たる鹽酸鹽を少量の水に溶かし、アムモニアにて嚴密に中和する時容易に遊離酸を得。

斯くして得たる遊離グルタミン酸は融點 $195-196^{\circ}$ にして同時に分解す。其分析數下の如し。

物質 0.1054g	N 8.4cc (763 mm, 13°C)	N% 9.46
NH_2		
$\text{HOOC}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}_2\cdot\overset{\text{NH}_2}{\underset{ }{\text{CH}}}\cdot\text{COOH} = \text{C}_5\text{H}_9\text{O}_4\text{N}$ として理論數		N% 9.5

イソサフロオイゲノールより サフロヴニリンの生成

K. Kafuku u. N. Itikawa: Oxydation von Isosafro Eugenol zu Safrovanillin.

理學博士 加 福 均 三

理學士 市 川 信 敏

著者の1人(加福)は曩にサフロール及びイソサフロールを稍、高温に於てグリニアル試藥(沃化マグネジウムメチル)に作用せしめ、其反應生成物を水蒸汽を以て分解しサフロオイゲノール及びイソサフロオイゲノールなるフェノールエーテルを得、¹⁾更に其構造に就て探究したる結果サフロオイゲノール及びイソサフロオイゲノールは夫れ夫れ 1-アリール-3-オキシ-4-エトキシベンゾール及び 1-

¹⁾ 臺灣總督府中央研究所工業部報告, 第6號.