Der Verfasser erhielt aus der Mutterlauge des Trilobinhydrobromids durch die übliche Methode eine neue Base (vergl. diese Zeitschrift, No. 511, September 1924). Sie bildet farblose, sternförmig gruppierte Prismen vom Smp. 213–215°, $[\alpha]_D^{19.5} + 293.1^\circ$, von der Zusammensetzung C 74.6, H 6.41, N 4.46. Hinsichtlich des Schmelzpunktes und der Zusammensetzung steht ja die neue Base dem Trilobin sehr nahe. Da sie aber das polarisierte Licht umgekehrt dreht, so ist der Verf. der Ansicht, dass es sich hier um eine Homologe handelt. Er liess ihr die Formel $C_{20}H_{21}NO_3$ (ber. C 74.2, H 6.5, N 4.3) und nannte sie Homotrilobin.

Homotrilobin krystallisirt wasserfrei, ist im Momente des Freimachens aus Salze leicht löslich in verschiedenen, organischen Lösungsmitteln, später wird schwer löslich. Zweckmässig wird es aus heissem Aceton umkrystallisirt. Es enthält 1 $CH_3 \cdot O$ und 1 $N \cdot CH_3$ und lässt sich durch Wijssche Methode eine Doppelbindung nachweisen. Das Hydrochlorid krystallisirt in Prismen vom Smp. 310°, das Jodmethylat (Prismen) zersetzt sich bei 262°.

T. Nakazato: *Ueber Trilobin II. (VIII Mitteilung ueber Sinomenium- und Cocculusalkaloide von H. Kondo.)*

Früher liessen die Verfasser (diese Zeitschrift, No. 511, Sept. 1924) dem Trilobin, dem Hauptalkaloid von *Cocculus trilobus* DC, die Formel $C_{19}H_{19}NO_3 = C_{17}H_{11}(OCH_3)(NCH_3)(OH)_2$ zukommen. Hierbei wurden die zwei Hydroxylgruppen nicht direkt (etwa durch Acyliren), sondern durch die Bildung von $C_{17}H_{11}(OCH_3)(OCO_2C_2H_5)(NCH_3)(Cl)(CO_2C_2H_5)$ (Einwirkungsprodukt von $Cl \cdot COOC_2H_5$) nachgewiesen.

Diazomethan wirkt auf Trilobin nicht ein, Erhitzen mit Säureanhydride ruft die Ringspaltung hervor. Ebenso wenig liefert die

Methode von Zerewitinoff zum Nachweis von aktivem H-Atom ein entscheidendes Resultat.

Sowohl durch Schütteln mit Grignardschem Reagenz, als auch durch Erhitzen mit alkoholischem Kali wird Trilobin nicht geändert. Es ist also weder Karbonylverbindung noch Lakton od. Laktam. Nach der Wijsschen Methode wurde im Trilobin eine Doppelbindung (gef. 0.86) ermittelt, durch katalytische Reduktion wurde aber keine Wasserstoffabsorption beobachtet.

Erwärmt man nun Trilobin mit Essigsäureanhydrid einige Minuten (bis zum vollständigen Auflösen) auf 50–60° und neutralisirt die ueberschüssige Essigsäure mit Sodalösung, so erhält man eine farblose, neutral reagirende, in lange Prismen krystallisirende Substanz. Sie enthält N-stoff, ist leicht löslich in CHCl_3 , schwer löslich in Alkohol, Aether u. Benzol, unlöslich in Petrolaether u. Wasser. Sie schmilzt bei 254–257°, $[\alpha]_D^{16} = -317.6^\circ$.

Ihr kommt die Zusammensetzung $\text{C}_{23}\text{H}_{23}\text{NO}_5$ (gef. C 69.48, H 6.33, N 3.8; ber. C 70.19, H 5.9, N 3.57) zu. Sie enthält ebenfalls eine Doppelbindung (gef. 0.85). Kocht man nun das Produkt mit $\text{N}/_2$ alkoholischer Kalilauge 4 Stunden auf dem Wasserbade, so erhält man eine farblose, prismatische Krystallsubstanz (Smp. 254–257°, eine Mischprobe mit $\text{C}_{23}\text{H}_{23}\text{NO}_5$ schmilzt schon bei 245–252°) vom der Zusammensetzung $\text{C}_{21}\text{H}_{21}\text{NO}_4$ (gef. C 71.51, H 6.19, N 4.02; ber. C 71.77, H 6.03, N 3.99). Durch Kochen mit Phenylisocyanat wird es in gelblichem, amorphem Produkt (Smp. 207°, $\text{C}_{21}\text{H}_{20}\text{NO}_3 \cdot \text{O} \cdot \text{CO} \cdot \text{NHC}_6\text{H}_5$) verwandelt. Diese Umwandlung erklärten die Verf. durch folgende Schemata :

Die Einwirkung von Benzoesäureanhydrid (bei 100°) auf Trilobin und darauffolgende Verseifung etc. verläuft ähnlich:

る。

クロロフォルム溶液は鹽化カルチウムにて脱水したる後、クロロフォルムを逐ひ出し、残渣をエーテルにて浸出するに悉く溶けさり、エーテル液の一部をこりてエーテルを除き、アルカリにて長く煮れば悉くアルカリに溶け不溶解物を残さず。

(大正 15 年 2 月 19 日認)

Sinomenium 及び Cocculus 屬 アルカロイドの研究 (第八報)

H. Kondo: VIII Mitteilung über die Alkaloide von
Sinomenium- und Cocculusarten.

藥學博士 近 藤 平 三 郎

Trilobin の研究 (2)

T. Nakazato: Ueber Trilobin. II.

藥學士 中 里 辰 雄

余等は先に¹⁾ アラツヅラフヂ *Cocculus trilobus* D.C. より融點 235° の結晶性アルカロイド Trilobin を得、その組成構造を研究し、之に

なる式を與へたるが、最後の 2 個の水酸基はトリロビンにクロル炭酸エステルを働かしめ $C_{17}H_{11} \cdot (O \cdot CH_3) \cdot (O \cdot CO_2 C_2 H_5)_2 \cdot Cl \cdot N(CH_3) \cdot (CO_2 C_2 H_5) = C_{28}H_{32}NO_9 Cl$ に相當する鹽素化合物を得て想像したるものにして、尙疑問の點なきに非ず。且つその後の研究によりトリロビンはデアツォメタンの作用によりメトキシ基の増加せる物質を得難く、無水醋酸無水安息香酸により變化を受くれず、寧ろ核開裂に基く變化にして水酸基の水素の置換したるものに非ず。従つてトリロビンの水酸基の有無は誘導體によらずして直接決定する事必要なるに至れり。

此の目的のため Tschugaeff 及び Zerewitinoff の方法により物質にメチルマグネシウムヨーデッドを働かしてその中に存在する活性水素に相當するメタン瓦斯を定量して水酸基の有無を検せり。此の結果幾分のメタン瓦斯の發生あれど、2 個

¹⁾ 本誌, 511 號, 691 (1924).

の水酸基の存在を確證するに至らず。

次にトリロビンには還元性あるを以てケトン・アルデヒド基の有無を検せんため、その醋酸溶液に鹽酸ヒドロキシルアミン及び醋酸ソーダを働かしめたるに鹽酸トリロビンの結晶を析出し、木精溶液にて遊離のヒドロキシルアミンを作用せしめたるも又變化せざる鹽基を回收せるのみ。

尙ほ Thebain に Grignard 反應を行ひたるが如く、トリロビンをエーテルに浮遊せしめフェニルマグネシウムブロミッドのエーテル溶液に加へ行き反應せしめしも何等變化を見ず。即ちトリロビンの還元性はアルデヒド・ケトン基の存在によるに非ざるを知る。

又トリロビンは酒精製加里によりては熱時雖も變化を受くることなく、ラクトン、ラクタムの存することなし。

トリロビンを Wijs 法に従ひ沃度附加體を作り二重結合の数を定めんとするに、その沃度附加體はクロロフォルム、醋酸に溶け難く、極めて不安定なるが故に滴定法の終末點顯著ならず。然れ共 10-15 分放置するも更に沃度を析出せざる程度を以て終末點と見做せば、二重結合大約 1 個（實驗數 0.8624 個）ありとす。

此處に於てトリロビンを醋酸溶液とし、白金コロイドを用ひて水素を作用せしむるに殆んど吸収することなく、何等變化なき物質を回收す。即ちトリロビンに存する二重結合は水素を附加し難きを知る。

トリロビンに無水醋酸を加へ、水浴上にて數分間 50-60° に温むれば全溶し、過剰の無水醋酸を稀薄なる炭酸アルカリにて分解中和すればクロロフォルムに易溶なる無色長柱狀の結晶を得。此の物は窒素を含有すれ共、酸に溶けざる中性物質にして、木精に稍溶け、酒精、エーテル、ベンツォルに難溶、石油エーテル、水に不溶なり。融點 254-7° にして、その組成 $C_{23}H_{23}NO_5$ 、強き左旋性 $[\alpha]_D^{20} = -317.6^\circ$ なり。二重結合数を測定するにトリロビンと同一にして、0.8558 個なり。

$C_{23}H_{23}NO_5$ なる物質は $N/2$ 酒精製加里液を加へて水浴上 4 時間煮沸すれば 1 分子に相當する醋酸を放ちて融點 254-7° の無色柱狀の結晶を得。クロロフォルムに溶け易けれ共、一般有機溶媒に溶け難く、水、酸、アルカリに不溶なり。その組成 $C_{21}H_{21}NO_4$ に該當し、之れをフェニルイソチアネートと砂浴上にて數分煮沸すれば結晶は變化し、有機溶劑に難溶なる帶黃色無晶形物質となり、分解點 207° $C_{21}H_{20}NO_3 \cdot O \cdot CO \cdot NHC_6H_5$ に相當するフェニルカルバミン酸エステルなるを知る。

之れを要するにトリロビンは無水醋酸によりて容易に核を開裂し、窒素にアセチル基、隣接せる炭素に $-O \cdot CO \cdot CH_3$ を附加し、同時に他の部分より 1 分子の水の脱離を促して爲に新たなる橋狀酸素を生じたるものと見做すを得べし。即ち

1) M. Freund: Ber. **38**, 3248 (1905).

次にトリロピンを無水安息香酸とよく混じて水浴中にて6時間 100° にて反應せしめたるにクロロフォルムに溶け易き帶黄色の長柱狀結晶を得、融點 309° を示す。此の物質も窒素を含有するも、酸にこけず、鹽基性全く失はれたるを知る。

その組成 $C_{33}H_{31}NO_7 = (C_{19}H_{19}NO_3)(C_6H_5CO)(C_6H_5CO_2) \cdot H_2O$ にして、クロロホルム以外の有機溶媒に溶け難し。強い左旋性 $[\alpha]_D^{16} = -241.7^\circ$ を示す。(物質は 110° にて乾燥し分析したれ共尙結晶水の如く 1 分子の H_2O を有す)。此の物質は酒精製加里にて 4 時間鹼化するに 1 分子の安息香酸を放ち $C_{26}H_{23}NO_4$ に相當する融點 $252-7^\circ$ の無色柱狀晶を得。その溶媒に對する性質融點 309° のものと相似たり。

$\text{C}_{26}\text{H}_{23}\text{NO}_4$ はフェニルイソチアネートに作用して有機溶媒に極めて難溶なる黄色無晶形物質に變じ、その分解點 276° $\text{C}_{26}\text{H}_{22}\text{NO}_3 \cdot \text{O} \cdot \text{CO} \cdot \text{NHC}_6\text{H}_5 = \text{C}_{33}\text{H}_{28}\text{N}_2\text{O}_5$ に相當する窒素を含有す。

即ち

即ちトリロビンは無水安息香酸によりては、無水醋酸に對するに異り、その操作稍複雑にして説明困難なれど、而かも斯の如く水の附加する實例は最近 Gadamer 氏の Oxyacantin に關する研究報告中に之を認む¹⁾。之れを加水分解すればアセチル化合物と同様窒素の隣りに 1 個の水酸基を新生す。

以上の研究を綜合すれば問題の 2 個の酸素は恐くは 2 個の水酸基として存在するなるも、比較的容易に脱水して 1 個の橋狀酸素を残してエーテル型となるが故にアチル化に際してその作用を受けず、ツェレウィチノフの方法に於ても直に同様の變化を營みメタンの發生十分ならずと考へざるべからず。猶ほ前報クロル炭酸エステル作用及びカルボニル ($C=O$) の反應明かならざるは以上の想像を裏書するに庶幾からんか。

トリロビンを約 20 倍の亞鉛末と混じ常壓にて乾溜するに黄色油狀物質並びに鹽基を得たり。

鹽基の中揮發し易きものは鹽酸に溶かし鹽化金複鹽を作るに分解點 248° 。金分析の結果トリメチルアミンの金鹽 $(CH_3)_3N \cdot HCl \cdot AuCl_3$ に相當す。此の外微量のピロル誘導體並びにヒノリン臭ある鹽基性物質を得たれ共、少量にして精査し得ざりき。

乾溜成績體中酸に不溶なるものは悉くエーテルに取るに紫色を呈し、之れを稀薄なる苛性アルカリ液にて振れば一部溶解し、エーテル溶液は血赤色に變ず。中性物質はエーテルを除けば綠色に變じ、その中より少許の結晶を生ずれど、全部は固結せず。結晶は帶黃色柱狀にして、分解點約 185° (一定ならず)。尙ほ此の綠色物質を氷醋酸にかし、臭素を吸收せしむるに稍吸收して暗青色の沈澱を得。此の沈澱は有機溶媒に難溶にして、分解點 280° 以上なり。

沈澱をのぞきたる物は再び石油エーテルにて扱ひたるに褐色の物質を残す。

エーテル溶液より苛性加里液に來る物質はクレゾル臭強き物質にて稍着色し長く放置するも固結せず。鹽化鐵溶液にて呈色せず。アルカリに溶かしてベンツォイルクロリッドにて扱へば少量のエーテルに溶け易きベンツォアート (融點不明) ミエーテルに難溶にしてクロロフォルムに溶くるベンツォアート (分解點 $213-230^{\circ}$) なる 2 者を得たれど精査するに足らず。

トリロビンは沃度メチルと直接作用してベンツォールに不溶なる結晶性ヨードメチラート $C_{20}H_{22}NO_3J$ (分解點 276°) を生ずるに先には叙べたり。此のヨードメチラートは水に難溶なる故粉末となし、多量の水に浮遊せしめ、濃厚なる苛性加里液を加へ水浴上に熱す。アルカリを更に増加し熱すれば帶紅色結晶性の物質を析出して數時間熱するも遂に變化せず。即ち固體を濾別し、水にて洗ひたる後、熱ベンツォールにて扱ふに溶解するものゝ然らざるものゝあり。溶解するものはベン

1) Arch. **264**, 197.

し、融點をはかるに 307° にして、更に之等を悉くアルカリ性となし、生ずる鹽基を濾別し、クロロフォルム、アセトンの混液より結晶せしむれば長柱状衆品を得。その融點 235° トリロビンと混融するも變化なし。

次にトリロビン 0.5g を醋酸 0.2g を含むメチルアルコールにまかし、之に別に遊離せるヒドロキシルアミンの木精溶液を加へ醋酸を中和しやゝアルカリ性を呈する程度にて數日放置す。漸次結晶を析出すれ共、融點 235° にして、トリロビンとの混融にて全く變化せざる鹽基なることを知る。

尙セミカルバチッドも同様にトリロビンに作用せず。

トリロビンに對するフェニルマグネシウムブロミッドの作用。

乾燥エーテル 100cc にブロムベンツォル 2g、少量の沃度、マグネシウム紐 0.3200g を加へ、三徑コルベン中にて攪拌し全くマグネシウムを溶かし、鹽基 1g を多量のエーテルに浮遊せしめたるものを徐々に加ふるも全く溶け去るに到らず。浮遊せるものを濾別し、濾液を稀薄醋酸にてふり鹽基をまかし、その水溶液にヨード加里を加へ沃度水素酸鹽として沈澱せしめ、その鹽類を水に浮遊せしめアルカリ性として生ずる鹽基をアセトンにて再結晶して融點をはかるに 230° を示し、混融の結果トリロビンに外ならざるを知る。

トリロビンの二重結合測定。(Wijs 法)

物質 0.1382g を 10cc のクロロフォルムにまかし、Wijs 氏液 15cc を加へ、48 時間放置し時々振盪す。別にクロロフォルム 10cc に Wijs 氏液 15cc を加へ、同様に放置し、夫々 $N/10$ $Na_2S_2O_3$ 溶液を以て滴定す。

盲檢 $N/10$ $Na_2S_2O_3$ の消費量：27.65cc

物質 0.1382g の吸収する沃度に對するもの 20.40cc

物質 0.1382g の吸収する沃度の量は

$$\frac{(27.65-20.40) \times 0.9558 \times 12.7}{1000} g = 0.0879g$$

沃度附加體中の沃度の%は 38.90%

$C_{19}H_{19}NO_3J_2$ 中の J% 45.09%

二重結合の数 0.8624個。

トリロビンの還元。

醋酸鹽化白金、アラビアゴム末にて作れる白金コロイドに十分精製せる水素を吸収せしめおき、鹽基 1g を 10% の醋酸 20cc に溶かしたるものを加へ、更に水素を吸収せしむるも吸収量少く 70cc に達せず。液をアルカリ性となし、鹽基を濾別し、アセトンより再結晶す。融點 233° (トリロビン)。

トリロビンの無水醋酸との作用。

トリロビン 1g を 10g の無水醋酸に和したるに白色沈澱を生じ溶解せず。水浴上にて 5-6 分、 $50-60^{\circ}$ にて温むれば全溶し、1 晝夜放置するも纔かに絮状沈澱を生

するのみ。即ち炭酸アルカリにて過剰の無水醋酸を分解中和し、生ずる沈澱を悉くクロロフォルムに取りて、クロロフォルムを逐ひ出し、クロロフォルム、アルコールの混液より再結晶す。融點 254-7°。窒素を含有し、水酸、アルカリに不溶、クロロフォルムに易溶、木精に溶け、酒精、ベンツォル、エーテルに難溶なり。

元素分析.

物質	CO ₂	H ₂ O	C%	H%	Ncc	N%
0.1134g	0.2893g	0.0655	69.58	6.46		
0.1210g	0.3098g	0.0670	69.38	6.19		
		平均	69.48	6.33		
0.1148g					3.70	3.83
					(13,°761.4mm)	
C ₂₃ H ₂₃ NO ₅ さして理論數			70.19	5.90		3.57

比旋光度.

物質 0.0740g をクロロフォルム 10cc に溶かし、1d の管にて測定す。

$$\alpha_D^{16} = -2.35^\circ$$

$$[\alpha]_D^{16} = -317.6^\circ$$

二重結合測定. (Wijs 法.)

盲驗の結果 N/10 Na₂S₂O₃ 消費量 34.60cc, 物質 0.1304g を附加したる液の同様消費量 28.40cc.

物質 0.1304g の吸収したる沃度の量

$$= \frac{(34.60 - 28.40) \times 1.0558 \times 12.7}{1000} = 0.0655g$$

$$\text{沃度化合物中の J\%} = 33.42\%$$

$$\text{C}_{23}\text{H}_{26}\text{NO}_5\text{J}_2 \text{ 中の J\%} = 39.06\%$$

$$\text{二重結合の數は} 0.8558 \text{ 個なり.}$$

C₂₃H₂₃NO₅ の鹼化.

物質 0.3083g を N/2 酒精製加里液 (F. = 0.9338) 15cc と共に水浴上に 4 時間沸騰せしめ、冷して生ずる沈澱を濾別し、酒精、水にて數回洗滌したる濾液をメチルオレンジを標示藥として還測す。

$$\text{鹼化に要したる N/5 加里液(換算)} 3.77cc$$

$$\text{物質 C}_{21}\text{H}_{20}\text{NO}_3 (\text{OCOCH}_3) \text{ さして} 3.91cc$$

即ち 1 個のアセチル基を放ちしを知る。

沈澱は乾燥してクロロフォルムにさかし、酒精を加へて再結晶す。融點 254-7° (C₂₃H₂₃NO₅ の混融。 242° にて收縮し、245-252° にて分解す.)

元素分析.

物質	CO ₂	H ₂ O	C%	H%	Ncc	N%
0.1076g	0.2754	0.0564	71.42	6.00		
0.1235g	0.3242	0.0704	71.60	6.38		
		平均	71.51	6.19		

0.1077g 3.70(18,° 759mm) 4.02

C₂₁H₂₁NO₄ として 71.77 6.03 3.99

C₂₁H₂₁NO₄ に對するフェニルイソチアネートの作用.

物質 0.5g をフェニルイソチアネートに砂浴上にて數分間熱したる成績體をエーテル、ベンツォル、酒精にてよくあらひ黄色粉末を得たり。分解點 207.° 一般有機溶媒に難溶なり。

窒素の分析.

物質	N cc	N%
0.1218g	7.30 (21,° 743 mm)	6.70
C ₂₆ H ₂₆ N ₂ O ₅ として		5.96

トリロピンのベンツォイル化.

鹽基 2g に無水安息香酸 5g をよく混じて水浴の沸騰時に 6 時間作用せしむれば安息香酸の昇華を見、結晶性の帶黄色物質をのこす。之れをエーテルにて扱ひ反應せざる無水安息香酸を除き、クロロフォルムに溶かし、酸、アルカリにて洗滌したる後、クロロフォルムを逐ひ出し、酒精にて扱へば帶黄長柱狀の衆品を得。融點 309.°

クロロフォルムに易溶にして、その他の有機溶媒に溶け難く、水、酸、アルカリに不溶なり。

元素分析.

物質 g	CO ₂ g	H ₂ O g	C%	H%	Ncc	N%
0.1215	0.3192	0.0646	71.65	5.95		
0.1098	0.2870	0.0585	71.24	5.96		
0.1320	0.3465	0.0705	71.59	5.98		
		平均	71.51	5.96		

0.1428 3.10(15,° 738.6mm) 2.50

C₃₃H₃₁NO₇ として 71.57 5.65 2.53

比旋光度

$\alpha_D^{16} = -1.61,^\circ$ 0.0667 g をクロロフォルム 10cc にさかし、1d の管にて檢す.

$[\alpha]_D^{16} = -241.7^\circ$

二重結合數(Wijs 氏法)

物質 0.1317g の吸收したる J の量

$$= \frac{(34.60 - 28.65) \times 1.0558 \times 12.7}{1000} = 0.0627 \text{ g}$$

沃度附加體中の J の %	= 32.26 %
$C_{33}H_{31}NO_7J_2$ として J %	= 31.41 %
二重結合數	1.027 個.

$C_{33}H_{31}NO_7$ の鹼化.

物質 1.0205g に $N/2$ 酒精製加里液 15cc を加へ、4 時間水浴上にて熱し、沈澱を濾別し、乾燥後クロロフォルム、アルコールにて扱ひ長き柱狀の結晶を得たり。濾液は酒精をのぞき、酸性とし、エーテルにて振り有機酸を得たり。融點 121° アムモニウム鹽として鹽化鐵液にて淡褐色の沈澱を生じ、明に安息香酸なるを認む。

鹼化により得たる結晶は融點 $257-8^\circ$ ($C_{33}H_{31}NO_7$ の混融 252° 以下にて分解)、クロロフォルム以外の有機溶媒に比較的難溶、酸、アルカリに不溶なり。

元素分析.

物質 g	CO_2 g	H_2O g	C%	H%	N cc	N%
0.1114	0.3083	0.0575	75.48	5.77		
0.1417	0.3926	0.0726	75.57	5.73		
0.1059	0.2927	0.0546	75.38	5.77		
	平	均	75.48	5.76		
0.1139					3.75 (16.5°, 748mm)	3.32
$C_{26}H_{23}NO_4$ として			75.51	5.61		

$C_{26}H_{23}NO_4$ に對するフェニルイソチアナートの反應.

物質 0.5g をベンツォルに浮遊せしめ、過剰のフェニルイソチアナートを加へ、砂浴上にかく沸騰するこゝ $1/2$ 時間、結晶消滅してかろき綿狀の沈澱を見る。即ちベンツォルを濾別し、残れる黃色物質を數回エーテル、アルコールにて洗ひ、融點をはかるに 276° にて分解す。有機溶媒に難溶なり。

窒素の分析.

物質 g	N cc	N%
0.1214	5.60(746 mm, 20°)	5.28
$C_{26}H_{22}NO_3 \cdot O \cdot CO \cdot NHC_6H_5 = C_{33}H_{28}N_2O_5$ として		5.36

トリロビンの亞鉛末乾溜.

トリロビン 7.5g に亞鉛末 150g、硫化亞鉛、酸化亞鉛少量宛を加へてよく混和し、2 分して硝子管につめ、2 時間にて各々乾溜す。

始め水、次に無色の液體、最後に黃赤色の油を溜出し、油は 30 分の後漸く固化し、稍結晶性を呈す。生ずる鹽基は稀鹽酸にて捕集す。溜出終れば悉くエーテルに溶かし、稀鹽酸及稀苛性カリ液にてふり、エーテルを低温にて速に溜去し、乾燥器中に蓄ふ。

エーテル溶液は始め紫色を呈せしが、苛性アルカリ液にて振れば血赤色に變じ、蒸發すれば綠色を呈す。乾溜成績體中鹽酸に来るものはエーテルを加へてアルカ

り性となし、そのエーテル溶液を酸性磷酸カリ液にてふればピロル以外の鹽基は水溶液に來るべき也。

此の水溶液はエーテルを加へたる後、アルカリ性となし、エーテルを溜去し、輕き鹽基は鹽酸を加へたる受器にてエーテルと共に捕捉す。此の鹽酸鹽より鹽化金複鹽を作るに分解點 243° の黃色單斜晶を得たり。

金の定量。

物質 g	Au g	Au%
0.1334	0.0664	49.78
$(\text{CH}_3)_3\text{N} \cdot \text{HCl} \cdot \text{AuCl}_3$ として		49.41

即ちトリメチルアミンの金鹽なり。

トリメチルアミンを溜去せる鹽基は油狀にして、ヒノリン臭あり。鹽基をのぞけるピロル化合物のエーテル液は蒸發すれば少許の綠褐色の物質をのこすのみ。

最初のエーテル液より苛性加里液に來るものは鹽酸々性となし、再びエーテルにこり、エーテルを去れば稍着色せる油少許をのこし、長く放置するも固結せず。炭酸加里、水に溶けず、強く特異臭あり、鹽化鐵にて呈色せず。即ち苛性アルカリ液に溶かし、ベンツォイルクロリッドにてベンツォイル化すればベンツォイル誘導體はエーテルに易溶のもの（融點不明）と難溶にしてクロロフォルムに來るもの（分解點 $213-30^{\circ}$ ）とあり。共に少許なり。

窒素化合物を除きたる綠色のエーテル殘渣は長く放置すれば漸く少量の結晶を生ず。集めて檢するに帶黃柱狀晶にして、分解點 185° 以上なり。綠色の油狀物質は氷醋酸にて一部臭素を吸収し藍青色の物質（融點 280° 以上）を得れど、大部分は氷醋酸に溶け、水を加ふれば白濁し、エーテルにこるに褐色油狀を呈す。

トリロビンのホフマン分解。

トリロビン 1g をベンツォルに溶かしおき、沃度メチルを加へて放置すれば約 1.5g のヨードメチラートを得。その 1g を水 100g に浮遊せしめ、33% の苛性カリ液 50g を加へ、水浴上にて煮沸するに漸次沈澱をまし、30 分以後は殆んど變化なし。更に 20g の苛性カリを加へ鐵網上にて 1 時間煮沸するも殆んど變化なし。生じたる帶紅白色沈澱を濾別し、乾燥してベンツォルにて扱ひ、溶け來るものはベンツォルを追ひ出すも結晶し難く、石油エーテルにて扱ひ粉末狀となす。分解點 176° 附近、醋酸には溶くれど、鹽酸、硫酸に溶け難し。クロロフォルム、アルコール、アセトンに溶くれど、エーテルに難溶なり。

比旋光度。

物質 0.1186 g を 10cc のクロロフォルムに溶かし、1d の管にて測定。

$$\alpha_D^{16} = + 1.5^{\circ}$$

$$[\alpha]_D^{16} = + 126.5^{\circ}$$

ヨードメチラート。

物質 0.5 g をベンツォルに溶かし、0.5 g のヨードメチルを加へ放置すれば結晶性物質を沈澱す。此の物質は酒精に溶くれず、水には難溶なり。分解點 263°。

ヨードの分析。

物質 g	AgJ g	J%
0.1223	0.0611	27.01
$C_{21}H_{24}NO_3J$ として		27.29

トリロビメチンクロルメチラートの Emde 法分解。

トリロビメチンヨードメチラート 1g を水に浮遊せしめ、1g の硝酸銀より新につくれる鹽化銀を加へ熱しつゝ置換せしめ、鹽化銀を加ふるも更に沃度銀を生ぜざるに到り濾過し、水浴上にて濃縮し、液の $\frac{1}{3}$ 量となりたる後、之に 5% のナトリウムアマルガムを加へ、水浴上にて煮沸す。かろきアミンを發生して分解し、アミンの發生せざるに到りて反應成績體を濾別し、水銀をのぞき、残渣をクロロフォルムにこる。

生ずるアミンは悉く稀鹽酸中に捕捉し、鹽化金溶液を加へて複鹽をなし、1 度水より再結晶し單斜晶を得たり、融點 245°。トリメチルアミンなること明かなり。

クロロフォルム液はクロロフォルムを除き、アセトンにて扱ふに稍着色せる物質を得たれど、結晶し難く、分解點 225-6°(210° にて收縮す)、窒素を含まず。

(大正 15 年 4 月 1 日 認む)

o-ニトロフェニル醋酸及 o-ニトロベンツアルデヒドの無水醋酸による縮合

N. Kishi : Kondensation von o-Nitrophenyllessigsäure mit
o-Nitrobenzaldehyd mittelst Essigsäureanhydrid.

藥學士 貴 志 二 郎

余は近藤教授指導の下に或合成法研究中未知の成績體を得、從て新合成法を知りたるが故に報告す。

Perkin 及 Claisen に依る酸ニアルデヒドの縮合を o-ニトロフェニル醋酸に應用するに、 α 炭素の水素はカルボニル基及びニトロ基の影響を受けて甚だ不安定にして、アルデヒド或はケトンに縮合し水を放ちて不飽和結合をなし、桂皮酸系化合物を生ず。此は R. Pschorr 等に依り研究され、多くの製品あり。縮合劑として使用せらるゝ物は無水醋酸にして、縮合容易なる場合にては 100-120°C に於て