メチールヒドロキノリン類の研究補遺 其一

S. Yamaguchi: Beiträge zur Kenntnis der Methylhydrochinoline.

薬學博士 山口 誠 太 郎

緒 言

1834 年 Runge 氏は石炭タール中より C_9H_7N なる集成を有する鹽基を分離し得て、之を Leukol (=Chinolin) と命名せり。次で 1842 年 Gerhardt 氏¹⁾ は Chinconin を苛性加里と共に蒸溜して鹽基 Chinolein を得たり。其後之れ等 Chinolin 類に關して Hofmann²⁾, Hoegewerff, van Dorff³⁾, Jacobsen, Reimer⁴⁾, O. Fischer⁵⁾ 氏等の研究ありて以來此兩鹽基が同一物なる事を知るに至り、Chinolin なる化合物は或種の植物鹽基の構造の基礎をなし、アルカロイド化學上重要な物質なる事を知るに至れり。

Chinconin の外 Chinin, Strychinin の如き重要アルカロイドも亦苛性アルカリと共に蒸溜するときは其分解成績體として等しく Chinolin 鹽基を得。⁶⁾

又最近に至り近藤・佐藤兩氏⁷⁾ は苦蔘の鹽基マトリンの構造研究の目的を以て該鹽基を亞鉛末と共に乾溜し、*N*-Methyldecahydrochinolin の集成 $C_{10}H_{19}N$ に一致する鹽基を得たり。

斯の如く Chinolin 及其加水素體は或種のアルカロイドの構造に密接の關係を有するを以て、之れに關する研究はアルカロイド化學上重要なものとす。然るに Chinolin 類及 Py-Tetrahydrochinolin 類に就ては從來各方面に亘り幾多の研究行はれ居るに不拘、其他の加水素體殊に Bz-テトラヒドロキノリン類、ヘキサヒドロキノリン類、デカヒドロキノリン類にありて總論各節に記するが如く其研究甚だ遺漏多し。著者は茲にメチールヒドロキノリンの研究を企て、從來に於ける研究の缺を補ひ、以てアルカロイド研究に對し幾分の資料をなさんと欲す。

第一章 總 論

第一節 メチールキノリン類並に加水素體に就て

著者の研究成績を述ぶるに先たち、下に Methylchinolin 並に其加水素體に關し少しく記せん。

Chinolin 核は次に示すが如く 7 個の水素を有するを以て、其れより誘導し得ら

1) A. **42**, 310; **44**, 279 2) A. **47**, 37; **74**, 15 3) R. I. 1, 107; 2, 41 4) B. **16**, 513, 1082 5) B. **16**, 720 6) Gerhardt; A. **44**, 279 7) 本誌大正 10 年第 474 號

るる Monomethylchinolin, Dimethylchinolin, Trimethylchinolin は理論上甚だ多數成立し得るも、從來製出せられたるものは其約半數にして次の如し。

即ち Monomethylchinolin は理論上 7 個成立し得。從來製出せられたるものも亦 7 個なり。Dimethylchinolin に於ては理論上 21 個成立し得。然れども從來製出せられたるものは 2,3-; 2,4-; 2,6-; 2,7-; 2,8-; 3,4-; 4,6-; 4,7-; 4,8-; 5,6-; 5,8-; 6,8-Dimethylchinolin の 12 種にす。又 Trimethylchinolin にありては理論上 35 個成立し得るも從來製出せられたるものは 2,3,4-; 2,3,6-; 2,4,6-; 2,4,7-; 2,4,8-; 2,5,7-; 2,6,7-; 2,6,8-; 5,6,8-Trimethylchinolin の 9 種にして其中 2,4,7-; 2,4,8-Trimethylchinolin の 2 種は著者によりて始めて製出せられたり。¹⁾

以上の Chinolin 類を加水素するときは水素の數によりて夫々 Dihydro-, Py-Tetrahydro-, Bz-Tetrahydro-, Hexahydro-, Dekahydrochinolin とすを得。而して Oktahydrochinolin は Chinolin 核の構造の關係上生成し得ずと云はる。²⁾

上の中著者の研究に關係なき Dihydrochinclin 類に就きては之れを略し、他のヒドロヒノリン類に就きては以下總論各節に於て從來に於ける研究の歴史並に著者によりて新たに行はれたる研究成績を記せんす。

第二節 メチール-Bz-テトラヒドロヒノリン類

ヒノリン類の還元によりて生成する四水素化合體は主としてヒノリン核のピリジン半部に加水素せられたる 1,2,3,4-Tetrahydrochinolin 即ち Py-Tetrahydrochinolin (I) のみぞ知られたり。此際ベンツォール半部に加水素せられたる Bz-Tetrahydrochinolin (II) の生成する事につきては從來記載せられざりき。

然るに 1922 年 Julius v. Braun 氏³⁾ は Adorf Petzold, Jon Seemann 氏等と共

1) 本誌大正 13 年第 503 號 2) Bamberger, Lengfeld B. **23**, 1140 3) B. **55**, 3779.

4) A. **426**, 1192.

に曩に Schröter 氏¹⁾ がナフタリンに行ひたるニッケル鹽類を觸媒とする高壓還元法をヒノリン及其メチール誘導體に施したるに、ヒノリン其ものに於ては全然從來の Py-Tetrahydrochinolin のみを生成するに拘はらず、或種のメチール誘導體にありては好んでベンツォール半部にも水素を吸収し、其結果ピリジン型に屬する Bz-Tetrahydrochinolin を副生成する事を發見せり。即ちヒノリン核の窒素に對し β の位置にエチール、アミール及フェニールを以て置換せられたるヒノリン類に於ては 30-50% の割合を以て Bz-Tetrahydrochinolin を生成し、又窒素に對し α の位置にフェニール基を以て置換せられたる α -Phenylchinolin 及ベンツォール核の 6 の位置にメチール、又はクロールを以て置換せられたるヒノリン類にありては少しも Bz-Tetrahydrochinolin を生成せざる事を認めたり。

其後 Braun 氏は Walter Gmelin, Adam Schultheiss 氏等²⁾ と共に置換群の種類及位置が Bz-Tetrahydrochinolin 類の生成に對する影響につきて研究を繼續し、2-, 3-, 4-, 6-, 7-, 8-Methylchinolin につきて前記の如く還元を行ひたる結果、6-, 7-, 8-, の如くベンツォール半部に置換群を存するものにありては全然 Bz-Tetrahydrochinolin を生成せざるに反し、3-, 4-, の如くピリジン半部に置換群を有するものにありては最初の試験の結果と同じく Py-Tetrahydrochinolin と同時に Bz-Tetrahydrochinolin を副生する事を認めたり。但しピリジン半部に置換群を有するものと雖 2-Methylchinolin に於ては前記 α -Phenylchinolin の場合と同様に他のピリジン半部置換ヒノリン類と趣を異にし、殆ど Bz-Tetrahydrochinolin の生成を見ざる状態にある事を認めたり。又置換群の種類に就ては 3-Amylchinolin が 50% の Bz-Tetrahydro-化合物を生成するに反し、3-Methyl- 及 3-Aethylchinolin にありては約 30% なり。斯の如く置換群の分子量の大なる程 Bz-Tetrahydrochinolin の生成に對して好影響を生ずるを見たり。又 2,3-; 2,4-; 2,3,4-Methylchinolin に就きて試験を行ひ、下の如く置換群の位置及數が Bz-Tetrahydrochinolin の生成に影響する事を認めたり。

斯の如くして Braun 氏等は置換群の位置によりて從來の Py-Tetrahydrochinolin の外 Bz-Tetrahydrochinolin を生成する事を發見せり。

之れを時を同ふして著者は會、ヒノリン類の各種還元剤による還元成績體に就きて研究中、恰も 2,4-; 2,7-Dimethylchinolin のヨード水素酸鹽（結晶し易きを以

1) A. 426, 1 (1922) 2) B. 56, 1333 (1923), 1338

て本鹽を撰びたり)を彼のデカヒドロ化合體製出の場合に於けるが如くヨード水素酸及赤燐にて還元し、其成績體として從來の Py-Tetrahydrochinolin 又は Hexahydro hinolin の生成を豫期せしに拘はらず全く別種の還元鹽基を得たり。而も其收得量良好にして、副産物の量甚だ少なし。著者は始め此物質が Bamberger 氏の Hexahydrochinolin (第五節)にあらざるやの疑を以て鹽基並に各種鹽類につきて分析を試みたるに、意外にも其成績は實驗の部に記するが如く四水素鹽基の夫れに一致するを認めたり。茲に於て著者は本鹽基の各性質を彼の Ladenburg 氏還元法によりて製出せる Py-Tetrahydro-鹽基の夫れに比較したるに次の如く全然異なるを認めたり。

	2,4-Dimethyl		2,7-Dimethyl	
	新 鹽 基	Py-四水素鹽基	新 鹽 基	Py-四水素鹽基
熔融點	19-20°C	液 體	37-38°C	液 體
沸騰點	250-251°C	253°C	238°C	260-261°C
鹽酸鹽 F.P.	265°C	228°C	192°C	208°C
ブroom水素酸鹽 „	198°C	201°C	201°C	208°C
ヨード水素酸鹽 „	177°C	214°C	169°C	184°C
鹽化白金複鹽 „	233°C	196°C	221°C	220°C

又此等の新四水素鹽基は彼の Py-Tetrahydrochinolin の如く亞硝酸鹽によりてニトロソアミンを生成する事なく、又ヨードメチールと作用せしむるに甚だ良く附加化合體を生成する事實よりして本鹽基の窒素は第三級なる事を思はしめ、且つ新鹽基は一般 Py-Tetrahydrochinolin 類の如く鹽化金又はアンモニヤ性硝酸銀溶液を還元する事なし。又若し新鹽基が Py-Tetrahydrochinolin なりしすれば更にヨード水素酸にて還元を進むるときは Dekahydrochinolin となし得べきに反し、著者が 2,4- 及 2,7-Dimethylchinolin より得たる新鹽基につきて試験するところによると、アルコール溶液にて金屬ナトリウムを以て還元するときにはデカヒドロ化合體となし得べきに反し、ヨード水素酸にては此目的を達し得ず。(何等變化を受けず)以上の諸試験によりて茲に得たる新鹽基は從來の Py-Tetrahydrochinolin と全く別種の四水素鹽基なる事を確め得たり。時恰も前記 Julius Braun 氏の報告を得て、氏等が得たる 2,4,-Dimethyl-Bz-tetrahydrochinolin の諸性質を著者が 2,4-Dimethylchinolin より得たる新鹽基の夫れに比較し次の如く兩者良く一致する點あるを認めたり。

	Julius Braun 氏の鹽基	著者の新鹽基
沸騰點	122-123°C (12mm)	250-251°C (759mm)
鹽酸鹽 F. P.	195°C	205°C
ピクリン酸鹽 F. P.	144°C	144°C
ヨードメチラート F. P.	163°C	163°C

Braun 氏は Py-四水素鹽基の沸騰點が Bz-四水素鹽基の夫れに比して少しく高き旨を記載せり。著者が檢したる兩者の常壓に於ける沸騰點を比較するに次の如く Braun 氏の記載に一致するを見たり。

	Py	Bz
K. P.	253°C	250-251°C

又 Braun は Bz-Tetrahydrochinolin 類がアルコール溶液に於て金屬ナトリウムにて還元する時はデカヒドロ化合物なる事を認めたり。著者は此方法を著者が得たる新鹽基類に行ひ、其成績體を Bamberger 氏の法(總論第四節)によりて得たる Dekahydrochinolin 類に比較し、全然一致するを確めたり。

以上の結果により著者の得たる新鹽基は Bz-Tetrahydrochinolin 類なる事を確むるを得たり。

而して Braun 氏の行ひたる接觸還元に於てはヒノリン核のベンツォール半部に置換群を有するものにありては Bz-テトラヒドロ化合物となすを得ざるに反し、著者の行ひたる方法に於ては其何れを問はず、皆等しく目的を達し得。斯くして著者は下記十種の Bz-テトラヒドロヒノリン類を製出し、其性質を研究せり。

- Bz-Tetrahydrochinolin I. 2-Methyl-Bz-tetrahydrochinolin II.
 8-Methyl-Bz-tetrahydrochinolin III. 2,4-Dimethyl-Bz-tetrahydrochinolin IV.
 2,6-Dimethyl-Bz-tetrahydrochinolin V. 2,7-Dimethyl-Bz-tetrahydrochinolin VI.
 2,8-Dimethyl-Bz-tetrahydrochinolin VII, 2,4,6,-Trimethyl-Bz-tetrahydrochinolin VIII.
 2,4,7-Trimethyl-Bz-tetrahydrochinolin IX. 2,4,8-Trimethyl-Bz-tetrahydrochinolin. X.

I

II

III

次に何故にヒノリン類は直接ヨード水素酸にて還元するときは上記の如く Bz-テトラヒドロヒノリンを生成するやに就て下に著者の假説を記せんす。

即ち濃厚なる沃度水素の存在に於ては下記第三級の窒素はヨード水素酸鹽を形成して五價となりて飽和の状態にあり。

不飽和

飽和

故に Bamberger, J. Thiele 氏等の説に従へば 8 殊に 5 の位置に於ける炭素の Partialvalenz は他の炭素の夫れに比して非常に強大にして、従つて容易に水素を吸収して 5 次に 8 の二ヒドロ化合物にまで還元し、其結果續て 6 及 7 の位置の炭素は普通のエチレン結合の如く容易に 1 分子の水素を受け入れて Bz-テトラヒドロ化合物となるならん。

次にヒノリン類其もののハロゲン水素酸鹽をヨード水素酸(比重 1.96)及赤燐にてボンベン管中に還元し、冷後管の内容を検するに暗褐色の銅鐵様光輝ある結晶を以て充たされ固結するを見る。此結晶はアルコールに溶解し易く、エーテルには難溶なり。それ故にアルコール溶液をなし、これにエーテルを加ふるときは皆立派なる結晶として析出せしめ得。此結晶はアルコールに溶解するときは赤褐色のヨード溶液様の外見を呈し、之に次亜硫酸曹達を加ふるときは脱色す。又此結晶は水に散布し、苛性曹達を以てアルカリ性となし、水蒸氣蒸溜を行ふときは漸次分解せられて前記の Bz-Tetrahydrochinolin を蒸溜す。之によりて見るに此結晶は Bz-Tetrahydrochinolin が沃度水素酸を形成する以外に其分子中に緩和に結合するヨードを含有するものと認め得べし。今前記結晶體の中 2,4,7-Trimethyl-Bz-tetrahydrochinolin の場合に得たるものにつきてヨードの定量を行ひしに次の如く高き百分比を示し、ヨードの附加してポリヨードの状態にあるを想像せしむ。

第一回	物質	0.1141g	67.68
第二回	„	0.1230g	67.94
第三回	„	0.0971g	69.80
理論數	$C_{12}H_{17}N \cdot JH + 2J$		68.30

今前記ヨード附加體を見るに一見ヨード其物の如き外見を呈し、水に溶解し難く、アルコール溶液は次亜硫酸ソーダによりて脱色せらるゝ等の事實に基きヒノリン類にヨードの附加する状態を考ふるに恰も彼のストリキニーネ其他のアルカロイドに見るが如く極めて緩慢に附加してポリヨードを形成する事を想像し得。

次に Bz-Tetrahydrochinolin 類の性質を通覽するに、低級メチル體に於ては液體をなせども、メチル基の数の増大と共に結晶性となる傾向を有する事恰も原ヒノリン體の場合に於けるが如し。即ち Bz-Tetrahydrochinolin, Bz-Tetrahydrochinaldin, 8-Methyl-Bz-tetrahydrochinolin, 2,8-Dimethyl-Bz-tetrahydrochinolin の如きにありては液體をなせども、2,4-Dimethylchinolin (熔融點 $19-20^{\circ}$), 2,6-Dimethyl-Bz-tetrahydrochinolin (熔融點 33°), 2,7-Dimethyl-Bz-tetrahydrochinolin (熔融點 $37-38^{\circ}$), 2,4,6-Trimethyl-Bz-tetrahydrochinolin (寒剤にて冷却するときは固結す), 2,4,7-Trimethyl-Bz-tetrahydrochinolin (熔融點 $20-21^{\circ}C$) 等の如く、メチル基の多きもの

別表 A

	沸騰點	熔融點	比重	屈折率 n_D	分子		屈折論數	折數	通過	超過
					實驗	數				
Bz-Tetrahydrochinolin	218°(756.5 mm)		$d_4^{10} = 1.0504$	1.57263(10°)	41.740		$[C_9H_9N]_3(N-\omega_3)$ 41.901		(-) 0.161	(-) 0.129
2-Methyl-	224°-225° (757.1 mm)		$d_4^{10} = 1.0074$	1.54016(10°)	45.842		$[C_{10}H_{13}N]_3(N-\omega_3)$ 46.519		(-) 0.677	(-) 0.460
8-Methyl-	220°-221° (764.5 mm)		$d_4^{14} = 1.0052$	1.53643(14°)	45.665		"		(-) 0.854	(-) 0.580
2,4-Dimethyl	250°-251° (759 mm)	19°-20°	$d_4^{20} = 1.0043$	1.54147(20°)	50.419		$[C_{11}H_{15}N]_3(N-\omega_3)$ 51.137		(-) 0.718	(-) 0.445
2,6-Dimethyl	236.5° (764 mm)	33°								
2,7-Dimethyl	238° (760 mm)	37°-38°								
2,8-Dimethyl	233°-234° (755.9 mm)		$d_4^{31} = 0.99165$	1.53990(31°)	50.975		$[C_{11}H_{15}N]_3(N-\omega_3)$ 51.137		(+) 0.362	(-) 0.224
2,4,6-Trimethyl	256°-257° (758.5 mm)		$d_4^{14} = 0.9845$	1.53007(14°)	54.951		$[C_{12}H_{17}N]_3(N-\omega_3)$ 55.755		(-) 0.804	(-) 0.460
2,4,7-Trimethyl	259°-260° (766.3 mm)	20°-21°	$d_4^{36.5} = 0.97559$	1.52111(26.5°)	54.676		"		(-) 1.094	(-) 0.627
2,4,8-Trimethyl	251°-252° (760 mm)		$d_4^{14} = 0.99196$	1.53575(14°)	55.035		"		(-) 0.720	(-) 0.411

は常温又は寒冷時に於て結晶體をなす。比重は原ヒノリン體に比し著しき變化なし。沸騰點は皆 Py-Tetrahydrochinolin 類の夫より低く、デカヒドロ化合物の夫れより高し。又原ヒノリン體の沸騰點に比して一般に 20° 内外低下せられ、原ヒノリン體及デカヒドロ化合物に比較し恰も中間に位するを見る。

今製出せる Bz-テトラヒドロヒノリン類中液體及熔融點低きものにつき比重及屈折率を測定するに次表の如くにして、此場合に於ける比過超は何れも負數なること異なる點にして、チオフエン誘導體等の場合に於けるが如し。

臭氣は各化合物を通じて原ヒノリンに比し一般に強く、原ヒノリン體よりは寧ろデカヒドロ化合物に接近す。一般に醋酸々性水溶液より水蒸氣にて幾分蒸留し得るも、彼の Py-Tetrahydrochinolin 類に於ける如く容易ならざる點より考へ、本鹽基類は後者に比し、幾分鹽基性强きを知る。

ハロゲン水素酸鹽は皆相當に結晶さして製出し得るも、一般を通じて皆水に溶解易し。金、白金、水銀、亞鉛等の金屬復鹽は皆よく難溶性の結晶となりて析出す。ピクリン酸鹽も亦各鹽基を通じて皆よく結晶し、本鹽を経て鹽基を精製するに便なり。ヨードメチールに作用して皆よく結晶性のヨードメチラートを生成す。

Julius Braun¹⁾ 氏に據るに Bz-テトラヒドロヒノリン類は之れをアルコール溶液となし、金屬ナトリウムにて還元を行ふときは容易にデカヒドロ化合物となし得。著者も亦製出せる Bz-テトラヒドロ鹽基中數種につきて此實驗を行ひ容易にデカヒドロ化合物となすを得るを確め、總論第四節所記の如き理由によりデカヒドロヒノリン類の製造に際してはヒノリン類をヨード水素酸、磷にて先づ Bz-テトラヒドロ化合物となし、然る後ナトリウムの還元によりてデカヒドロ化合物に到達する事の得策なるを主張す。

メチール-Bz-テトラヒドロヒノリンの各性質は別表 A に示す。

第三節 メチール-Py-テトラヒドロヒノリン類

Py-テトラヒドロヒノリン類はヒノリン類の還元成績體中最も廣く研究せられたるものにして、從來知られたるヒノリン類の多數につきて製出せられたり。然るに著者がデカヒドロヒノリン類の製造原料として各種メチール-Py-テトラヒドロヒノリンの製造を行ひたる際下記四種四水素加體が全然記載なきか又は記載不完全なるを知りたるを以て之れが研究を行ひ下に其成績を記せん。

2,7-Dimethyl-Py-tetrahydrochinolin

2,4,6-Trimethyl-Py-tetrahydrochinolin

2,4,7-Trimethyl-Py-tetrahydrochinolin

2,4,8-Trimethyl-Py-tetrahydrochinolin.

¹⁾ B. 56, 1338.

著者は又此際メチールヒノリン類が還元剤の如何によつて Py-テトラヒドロ化合體となるに難易あるを知り得てそれがため此四水素加體の製造に對して最も適當なる還元法につきて研究したるを以て茲に記せん。

ヒノリン類を還元してピリジン半部四水素加體となさんがため從來最も普通に行はれたる方法は錫及鹽酸による還元法なり。著者も亦此方法に従ひて各種のメチール-Py-テトラヒドロヒノリンの製出を試みたりしが其際ヒノリンの種類によりては容易に目的を達し得るものゝ然らざるものゝある事を實驗せり。例へばデメチールヒノリン類につきて見るに 2,6- 及 2,8-デメチールヒノリン類に於けるが如く何等困難なく還元し得るに不拘、2,7-デメチールヒノリンに於ては抵抗性強く、多量の錫及鹽酸を使用し長時間行ふも四水素加體の收得量甚だ不良なり。又 2,4-デメチールヒノリンに於ては一層抵抗性強く殆んど全く還元せられず。又トリメチールヒノリン類に就て見るに、2,6,8-トリメチールヒノリンが此還元法によりて Py-テトラヒドロ化合體となる記載あるに反し、2,4,6-, 2,4,7-, 2,4,8-トリメチールヒノリンにありては全然還元し得ず。斯の如くヒノリンの種類の如何によりては錫及鹽酸にて還元し得るものゝ然らざるものゝあり。其理由は恐らくは各種ヒノリンの鹽酸鹽の解離度の如何に由るなるべし。即ちメチールヒノリン類を錫及鹽酸にて還元する際 Py-テトラヒドロ化合體を化生し得るは水の存在に於てヒノリンの鹽酸鹽が解離を來たし一部分不飽和の窒素即三價の窒素を生ずるによるならん。

上の如きを以てメチール-Py-テトラヒドロヒノリンの製造に於ては錫による還元法は其應用一般的ならず。且つ錫及鹽酸による方法に於ては高價なる錫の多量(ヒノリン 1 分に對し 5-6 分)を使用するにあらざれば良好なる收得量を得難く、それがため甚だ多量の鹽酸を必要とす。且つヒノリン類の錫復鹽は皆極めて難溶性なるを以て金屬錫の表面に沈着し、煮沸時に於ても溶解し難く、それがため著しく鹽酸の作用を妨ぐるに至る。又還元後の處理比較的厄介なる嫌あり。即ち反應液より鹽基を遊離せんがため、(1)硫化水素法によるか、(2)反應液に直接苛性アルカリを加へて水蒸氣蒸溜を行ふ法によらざるべからず。然るに第一法に於ては多量の錫を沈澱するため甚だ長時間を要し、且つ此際比較的稀釋せる溶液に於て行ふも、難溶性の四水素加鹽基の錫復鹽は硫化錫の沈澱中に包擁せられて共に沈澱せらるる場合あり。又第二の法は一見簡單なるが如く見ゆれども反應液に苛性アルカリを加へてアルカリ性となすときは遊離せられたる鹽基は錫の沈澱と共に賦狀の集塊をなし、斯くして水蒸氣蒸溜は著しく妨げられ、未だ多量に残存せるに拘はらず、如何に水蒸氣を通ずるも蒸溜困難に陥り、鹽基の分離に甚だ手数を要するを常とす。斯の如く比較的缺點多し。それが爲他に良法を求めたる結果アルコホ

ル溶液に於て金屬ナトリウムを以て還元する方法を最も適當とするを認めたり。此還元方法に於てはヒノリンの Py 環中の窒素は三價にして不飽和を見做すを得べく従て容易に Py-1,4-デヒドロ化合物を生成し、次に 2,3 に 1 分子の水素の附加して Py-テトラ-水素加化合物を生ずる。こゝ第二節の場合と同様に説明するを得べし。事實に於てもまた前記の如き抵抗性強き諸種のヒノリン類の還元に応用して容易に Py-テトラヒドロ化合物となし得るのみならず、他の一般メチールヒノリンに對して除外例なくよく目的を達し得、且つ還元に要する時間は彼の錫法に比して著しく短かく、還元後の處理も亦甚だ簡單なり。即ち還元終はれる後鹽酸々性に於て先づアルコール分を蒸溜し去り、然る後苛性ソーダにてアルカリ性となし水蒸氣蒸溜を行ひ容易に鹽基を分離し得。此還元法は強力なる還元に屬するを以て其際ヒノリン類は或は四水素化合物以上に還元せらる懸念なきにあらざれども Bamberger 氏¹⁾に従へば、たゞひアミールアルコールを溶媒となして行ふも決してデカヒドロ化合物となるが如き事なしと云へり。著者も亦遊離の Py-テトラヒドロノリンに就きて此事實を精査し全く變化なきを確めたり。一般にベンツール核はピリジン核に比して還元及酸化に對して抵抗性強し、之れ核中に窒素一個を有する否とによりて非常に相違するこゝ明かなり。

本節に記する Py-テトラヒドロヒノリン類は皆錫及鹽酸による還元法に對して抵抗性強きものにして、著者は其製法として金屬ナトリウムによる還元法を採用せり。

2,7-デメチール-Py-テトラヒドロヒノリンは其母體たる 2,7-デメチールヒノリンが比較的古老より製出せられ居るに不拘、未だ全く記載なし。其製法として前記の如く 2,7-デメチールヒノリンを錫及鹽酸にて還元する際收得量良好ならざるに反し、金屬ナトリウムにて行ふときは容易に製出し得。斯くして得たるものは無色油狀の液體にして實驗の部に記するが如き性質を有す。又 2,4,6-Trimethyl-Py-tetrahydrochinolin に就きては 1918 年 R. Müller, Paula Merkel²⁾の兩氏によりて製出せられたり。兩氏は 2,4,6-Trimethylchinolin をアルコール溶液に於て金屬ナトリウムにて還元を行ひ其成績體を鹽酸にて中和し、析出せる結晶を再結晶によりて精製し、熔融點 $236-338^{\circ}$ となし、之れより遊離したる鹽基の熔融點を検して 80° となせり。氏等の試験せるところによるに其收得量甚だ不良にして 10 g を還元し、4 g の四水素體を得たるに過ぎずして、氏等は其收得量を良好ならしめんがため、エチールアルコールに代へてアミールアルコールを用ひて行ひたるに依然として其目的を達し得ずと云ふ。又氏等は前記鹽酸鹽の母液中に變化を受けざる原ヒノリン及び一種不明の油狀鹽基を認めたるも、之れ等に就きては未だ試験を行はざる旨を記載す。

1) B. **23**, 1142. 2) J. pr. **100**, 101.

著者も亦 2,4,6-Timethylchinolin をアルコール溶液にて金属ナトリウムにて還元を行ひたるに前記兩氏の記載の如く毎回多量に油狀の鹽基を副生するを見たり。今記載を簡略にせんがため假りに前記熔融點 80° 度の固體鹽基を A 鹽基となし、又油狀鹽基を B 鹽基となす。

A 鹽基の鹽酸鹽は B 鹽基の夫れに比して水に對し難溶性なるを以て粗製鹽基を鹽酸にて中和し放置するときは先づ A 鹽基の鹽酸鹽を析出す。但し B 鹽基の鹽酸鹽も亦比較的水より結晶し易きを以て此際幾分同時に析出し、A 鹽基の鹽酸鹽中に混入す。然れども 1-2 回の再結晶を反覆するときは容易に分離し得。前記兩氏は A 鹽基の鹽酸鹽の熔融點の $236-238^{\circ}$ なる旨を記載するも、著者の試験するところによるに 243° を示し、遊離鹽基は $265^{\circ}-266^{\circ}$ (758mm) にて分解なく沸騰し、熔融點に於ては兩氏の記載に一致す。

A 鹽基の鹽酸鹽を採取したる母液を濃縮して放置するときは B 鹽基の鹽酸鹽を析出す。但し A 鹽基の鹽酸鹽にて夾雜せらるるを以て反覆再結晶を行ひ精製するときは遂に熔融點 181° の物質となし得。之れより遊離せる鹽基は無色油狀の液體にして、 $261-262^{\circ}$ (762.5mm) にて沸騰す。

A, B 鹽基共第二級四水素鹽基なる事は次の事實によりて確知し得。

1. 鹽基及各種ハロゲン水素酸鹽の分析数は皆四水素鹽基の夫れに一致す。
2. 兩鹽基共に亞硝酸によりて良くニトロゾアミンを生成す。而して A 鹽基の夫れは油狀にして、B 鹽基にありては柱狀の結晶をなし析出す。
3. 一般 Py-Tetrahydrochinolin 類の如く アンモニアアルカリ性硝酸銀溶液を還元す (Bz-Tetrahydrochinolin 類にありては然らず)。
4. 兩鹽基共に 鹽化金溶液を直に還元し金鹽を生成せず、又重クロム酸加里溶液によりて分解せらる (Bz-Tetrahydrochinolin 類にありては然らず)。
5. 兩鹽基共に沃度メチールに反應し難し (Bz-Tetrahydrochinolin 類は良好に反應す)。

今兩鹽基が加水素せられたる位置を想像するに兩種の中其一は 1,2,3,4 の位置 (I) に加水素せられたる事疑ふの餘地なし。又他の一種は加水素せられたる四個の水素中二個は 1,2 の位置に加水素せられたる事は第二級鹽基たる事實によりて明かなり。而して殘餘の二個はベンツオール半部の 5,6 (II) 又は 7,8 (III) 又は 5,8 (III) の中何れかならざるべからず。就中 5,8 間の二重結合は他の二重結合に比し水素を附加し易き状態にあるを以て此位置に附加せられたる事は推定するに難からず。

又、兩鹽基は實驗の部に記す如く其分析結果は共に四水素化合體なるを示す。故に同質異性體たるは疑ひなし。今 2,4,6-トリメチルヒノリンは之れをピリジン半部に四水素加するときは二個の 不對稱性の炭素を生ずるを以て、此處に記する A,B 兩鹽基が萬一立體異性體ならずやと想像し、兩鹽基の鹽酸鹽の 5% 水溶液につきて旋光性を試験せしに全く陰性なるを認めたり。又兩鹽基共に之れをヨード水素酸にて還元するときは同じくデガヒドロ化合體なる。尙ほ A,B 兩鹽基は何れもアルコール溶液をなし、金屬ナトリウムに還元を反覆するに何等變化なきを認めたり。斯くの如くにして 2,4,6-トリメチルヒノリンをアルコール溶液に於て金屬ナトリウムにて還元する際生成する所の固體鹽基 A 及油狀鹽基 B は正確なる判定を下す能はざるも恐くば次の二説の内何れかに屬するものなるべし。

即ち一は 1,2,3,4 及 1,2,5,8 四水素加化合體を生成せる事、他は 1,2,3,4, 四水素加化合體にしてそのビペリジン環中に存在する 二個の不齊炭素(2,4)の關係によりて一個のラセミ體及一個のメゾ異性體を生成したる事を考へらるゝなり。

2,4,7-Trimethyl-Py-tetrahydrochinolin は未だ製出せられ居らず。今 2,4,7-Trimethylchinolin をアルコール溶液をなし、金屬ナトリウムを以て還元する事前記 2,4,6-Trimethylchinolin の場合の如く行ひ、粗製鹽基を鹽酸にて中和するときは鹽酸鹽は結晶となり析出するを以て再結晶を行ひ精製を行ふときは其大部分は熔融點 248° の物質にして、少量(0.5%内外)別種の成績體を得たり。然れども其得量少なきがため未だ精査せず。

前記鹽酸鹽より遊離したる鹽基は無色の油狀にして後段記するが如き性質を有し、一般第二級四水素鹽基の如く反應す。

2,4,8-Trimethyl-Py-tetrahydrochinolin も亦未だ文獻に記載なし。今 2,4,8-Trimethylchinolin を前記兩場合の如く還元を行ひ、其成績體を鹽酸にて中和し、析出せる鹽酸鹽は之れを再結晶によりて精製するに、熔融點 239° の單一の物質より成るを認めたり。之れより遊離したる鹽基は無色油狀にして後段記するが如き性質を有し、一般第二級四水素鹽基の反應を呈す。

一般に Trimethyl-Py-tetrahydrochinolin 類は鹽基性甚だ弱く、中性は勿論、醋酸々性水溶液より水蒸氣にて揮散せしめ得るのみならず、2,4,8-Trimethyl-Py-tetrahydrochinolin の如きにありては硫酸強酸性 (!) 水溶液より水蒸氣にて揮散せしめらる。

沸騰點は次に示すが如く、原ヒノリン類に比して一般に低下す。

	K. P.
2,4,6-Trimethylchinolin	277—278°C
2,4,6-Trimethyl-Py-tetrahydrochinolin	265...266°C(A) 261...262°C(B)
2,4,7-Trimethylchinolin	280...281°C

2,4,7-Trimethyl-Py-tetrahydrochinolin	269...270°C
2,4,8-Trimethylchinolin	269...270°C
2,4,8-Trimethylhydrochinolin	260...261°C

今新たに製出せる前記四種の Py-テトラヒドロキノリンの比重及屈折率を測定し、同時に既知数種の Py-テトラヒドロキノリン類につきて測定を行ひ比較するに別表 B の如し。

第四節 メチールデカヒドロキノリン類

Chinolin 類のデカヒドロ化合物の研究は 1887 年 Bamberg¹⁾ 氏¹⁾ によりて始めらる。氏は Lengfeld 氏と共に Py-Tetrahydrochinolin の鹽酸鹽をヨード水素酸にて還元して Dekahydrochinolin を得たり。其後 Bamberger 氏は Williamson 氏²⁾ と共に製造法、性質、誘導體に就きて研究を續行せり。其の後絶えて此方面の研究を見ざりしが 1908 年に至り W. Ipatiw 氏³⁾ は同氏考案の高壓接觸還元法に於て Chinolin を酸化ニッケルを觸媒として 240°, 110 氣壓に於て 12-20 時間加熱し、Py-Tetrahydrochinolin の傍ら Dekahydrochinolin を製出するを得たり。其後 Sabatier, M. Murat 兩氏⁴⁾ は 130-140° に於て Chinolin 蒸氣を水素瓦斯と共に還元ニッケル上を通過せしめ、稍々良好なる成績 (65%) を以て Dekahydrochinolin を製出するを得たり。又最近 A. Skita, W. A. Meyer 兩氏⁵⁾ は Chinolin を氷醋酸溶液に於て膠狀白金を觸媒として 4 氣壓の水素を以て還元を行ひ、其の際吸収せらるる水素の量に従ひ夫々 Py-Tetrahydrochinolin 及び Dekahydrochinolin を製するを得たり。又 Burno Veneziani 氏⁶⁾ は Dekahydrochinolin の鹽酸鹽を α -Bromcamphersulfosäure の銀鹽にて分解し、得たる鹽を水より再結晶を行ひ、二種の光學的異性體に分離する得て各其物理的性質を研究せり。

Methylchinolin 類のデカヒドロ化合物は其研究甚だ遺漏多く、僅に下に記する數種に過ぎず。即ち Sabatier, Murat⁷⁾ の兩氏は前記 Dekahydrochinolin の製造に際して用ひたるニッケル還元法を前者に比して稍々高き温度 (180°) に於て Chinaldin に行ひ、Dekahydrochinaldin を製出するを得たり。氏等は之れに就きて物理的並に化學的性質及二三の誘導體に就きて記載せり。又 H. Finger, W. Breiwieser⁸⁾ 兩氏は α -Cyan-6-methyl-chinolin を無水アルコール溶液に於て金屬ナトリウムにて還元して一種の鹽基を得たり。氏等は其粗製鹽基をエーテル溶液となし、之れに鹽酸瓦斯を通じて沈澱する方法を反覆して最後に鹽酸鹽を Acetnitril によ

1) B. **23**, 1138. 2) B. **27**, 1458. 3) B. **41**, 991. 4) C. r. **158**, 309-311; C. 1914, I, 1089. 5) B. **45**, 3593; C. 1913, I, 398. 6) R. A. L. [5] **23**, II, 276-277; C. 1915, I, 745-746. 7) C. r. **158**, 309; C. 1914, I, 1089. 8) J. p. **79**, [2] 445.

別表 B

	比 重	屈 折 率 _D	分 子 屈 折		超 過	比 過 超
			實 驗 數	理 論 數		
Py-Tetrahydrochinolin	$d_{4}^{26.5} = 1.0531$	1.5862(26.5°)	42.429	$C_9H_{11}N \sqrt[3]{N - (c_2)} = 41.560$	(+) 0.869	(+) 0.652
2-Methyl-Py-tetrahydrochinolin	$d_{4}^{26.5} = 1.0141$	1.56363(26.5°)	47.157	$C_{10}H_{13}N \sqrt[3]{N - (c_2)} = 46.178$	(+) 0.979	(+) 0.665
8-Methyl-Py-tetrahydrochinolin	$d_{4}^{26.5} = 1.0354$	1.57697(26.5°)	47.082	"	(+) 0.904	(+) 0.613
2,4-Dimethyl-Py-tetrahydrochinolin	$d_{4}^{26.5} = 0.9979$	1.554205(26.5°)	51.759	$C_{11}H_{15}N \sqrt[3]{N - (c_2)} = 50.796$	(+) 0.963	(+) 0.598
2,7-Dimethyl-Py-tetrahydrochinolin	$d_{4}^{26.5} = 0.99544$	1.55588(26.5°)	52.022	"	(+) 1.226	(+) 0.768
2,8-Dimethyl-Py-tetrahydrochinolin	$d_{4}^{26.5} = 0.9989$	1.56478(20°)	52.522	"	(+) 1.726	(+) 1.0712
2,4,6-Trimethyl-Py-tetrahydrochinolin	$d_{4}^{31} = 0.97548$	1.544354(31°)	56.713	$C_{13}H_{17}N \sqrt[3]{N - (c_2)} = 56.414$	(+) 1.299	(+) 0.741
2,4,7-Tunechyl-Py-tetrahydrochinolin	$d_{4}^{20} = 0.9857$	1.55591(20°)	57.109	"	(+) 1.695	(+) 0.967
2,4,8-Trimethyl-Py-tetrahydrochinolin	$d_{4}^{20} = 0.98639$	1.55598(20°)	57.074	"	(+) 1.660	(+) 0.947

り再結晶を行ひて精製し、鹽酸鹽の元素分析を行ひ、右鹽基を 6-Methyl-dekahydrochinolin なりとし、沸騰點 222-225° 及熔融點 44° なる事を示せり。又 1922 年 Julius von Braun 氏等¹⁾ は第二編 Bz-Tetrahydrochinolin の項に記載せる如く、Bz-Tetrahydrochinolin がアルコール溶液に於て金屬ナトリウムにて還元する際デカヒドロ化合體となる事を認め、次記五種の Dekahydrochinolin 類を製出し、2,3 の鹽類及誘導體に就きて記載せり。

3-Methyldekahydrochinolin

4-Nethyldekahydrochinolin

3-Phenyldekahydrochinolin

2,3-Dimethyldekahydrochinolin

2,4-Dimethyldekahydrochinolin

Dekahydrochinolin 類に關する研究は大略以上記載する如くにして、從來知られたる多數の Chinolin 類中僅かに數種に過ぎず。而も鹽基、鹽類、及誘導體に關する記載未だ全く正確を期し難きもの少なからず。例へば沸騰點及熔融點の如き物理的性質に於ても從來最も深く研究せられたる Dekahydrochinolin に就てすら其記載下の如く甚だ不確實なり。

Bamberger (B. **23**, 1144) K.p. 204°C(714mm) F.p. 48.2-48.5°C

Sabatier (C. r. **158**, 309) „ 204-207°C(氣壓記載なし) „ 40°C以上

Ipatiwi (B. **41**, 991) „ 207-210°C(„) „ 45°C

Skita. (B. **45**, 3591) „ 204°C („) „ 48°C

上諸氏の中 Sabatier, Ipatiwi, Skita の諸氏は各々彼等の考案せる接觸還元法を Chinolin に對して試み、斯くして Bamberger 氏の製出せし Dekahydrochinolin に一致する還元成績體を得たる事を記せるのみにして、其性質等につきては詳細なる研究を行はざりき。又 Bamberger 氏の示す沸騰點 204° も今日著者が多量の精製物質に就きて精査するところによるに甚だ相異なるを認めたり。即ち著者の試験によるに 199-200°(759mm)に於て沸騰し、48° に於て熔融す。

又 Dekahydrochinaldin に於ても Sabatier 氏の記載は著者の試験成績と甚だ異なるなり。即ち Sabatier 氏は沸騰點を 216°(752mm)と記載するも、著者が精製鹽酸鹽より遊離したる鹽基につきて實驗するに 206°(759mm)にして前者に比して 10° 餘低きを見たり。又其鹽酸鹽の如きも Sabatier の記載する如く潮解性ならずして極めて良好なる結晶として製出し得。其他の物質的性質に於ても著者の試験成績と異なる事實の部に記載するが如し。

又 6-Methyldekahydrochinolin に於ても前記の如く、Finger 氏は沸騰點 222-225° (750mm)及熔融點 44° なる旨を示すも、著者が精製鹽酸鹽（水より結晶せしめ得

¹⁾ B. **55**, 3780; **56**, 1338.

て極めて良好に精製し得らる)よ、遊離したる鹽基にて檢するに沸騰點 212° (760 mm), 熔融點 67° を示せり。

著者が各種の Dekahydrochinolin 類を製出するに際して得たる經驗に徴するに、一般に Dekahydrochinolin 類は Tetrahydrochinolin 及 Hexahydrochinolin によりて夾雜せられて不純なる場合には常に高き沸騰點を示すを見たるを以て前記諸氏によりて示されたる沸騰點も亦供試鹽基の未だ全く精製せられざるに歸因せしなるべし。

Dekahydrochinolin 類の製法は前記の如く數種あり。著者は初め Skita (前出)の方法を撰び、之れにより製出を試みたり。此方法に依りて、Chinolin, Chinaldin, 6-Methylchinolin 及び 2,6-Dimethylchinolin の四種に就きて還元を試み、夫々デカヒドロ化合物となすを得たり。然れども本法は多量物質の製出には甚だ長時間を要し良好なる結果を得ざりしを以て、其後 Bamberger 氏の法を探るに至れり。此方法は往々爆發のため物質を損失する事あるも、短時間に多量を處分し得る利あり。此方法に於ては先づ原料として Py-Tetrahydrochinolin 類を製出せざるべからず。此目的のため著者は Chinolin 類を還元して四水素化合物となす諸種の還元法中何れが最も適當なるやを試験して其成績を總論第三節テトラヒドロヒノリンの項に記載せり。其後著者は第二節 Bz-テトラヒドロヒノリンの項に記する如く簡単に此種の四水素鹽基を製出する法を發見したるを以て本鹽基を経てデカヒドロ化合物に到達する實驗を行ひ、前記 Bamberger 氏の法に比して一層容易に且つ有利にデカヒドロ化合物を製出し得る事を確めたり。

今上の二種の法を比較するに、共にヒノリンよりデカヒドロ化合物に到る迄に於て二階段の異なりたる還元を経過するものにして、前者は第一段に於てヒノリンを還元して Py-テトラヒドロ化合物となし、然る後第二段に於てヨード水素酸還元法を施す。後者に於ては第一段に於てヒノリン其物を先づヨード水素酸にて還元して Bz-テトラヒドロヒノリンとなし、然る後第二段の還元を行ふものなり。上の二法何れによるも前後何れかの階段に於てヨード水素酸の還元を経過せざるべからず。然るに此還元法は最高濃度のヨード水素酸を管中に封入し 300° 附近に加熱する方法なるを以て、化學反應中最も困難且つ危險の操作に屬するものにして、熔閉管の品質をよく撰定し、管の熔閉、加熱等充分の注意を拂ひて行ふに不拘、必ずしも安全を保し難く、否、頻々たる爆發に會ふを常とす。若し夫れ上の諸注意に缺くるまゝころあらば、必ず爆發を招來し、貴重なる内容を空しく飛散し盡すに至る。それ故に、第二の方法の如く行ふときはたまひ爆發に會ふも失ふ物質は未だ何等の加工を経ざる原ヒノリン體なるを以て、前記第一の方法に於けるが如く種々の加工を経たる Py-テトラヒドロ化合物を失ふに比して勞力の損失を幾分輕からしむるを得べし。

加之收得量に於ても第二の方法によるきは Bamberger 氏の方法によるよりは良好なり。即ち、第二の方法に於て Chinolin より Bz-Tetrahydrochinolin を還元に於ては總論第二節所載の如く、收得量良好にして、且つ粗製の状態に於ても殆ど不純物なく、其儘 Dekahydrochinolin 製造の原料となし得べく、又 Bz-Tetrahydrochinolin より Dekahydrochinolin に到達する反應に於ては殆ど定量的の收得量を以て行ひ得。

Bamberger 氏の方法に於て、Py-Tetrahydrochinolin の收得量は不良と云ふにあらざれども、之れより Dekahydrochinolin に到る還元に於ては種々の副反應を伴ひ、目的たる Dekahydrochinolin 類の收得を著しく減少せしむ。

以上記する二方法によりて著者は下記 12 種のデカヒドロキノリン類を製出し、其性質を研究せり。

Dekahydrochinolin I.

Dekahydrochinaldin II.

6-Methyldeka'ydrochinolin III.

7-Methyldekahydrochmolin IV.

8-Methyldekahydrochinolin V.

2,4-Dimethyldekahydrochinolin VI.

2,6-Dimethyldekahydrochinolin VII.

2,7-Dimethyldekahydrochinolin VIII.

2,8-Dimethyldeka'ydrochinolin IX.

2,4,6-Triethyldekahydrochinolin X.

2,4,7-Trimethyldekahydrochinolin XI.

2,4,8-Trimethyldekahydrochinolin XII.

XII

今 Dekahydrochinolin 類の性質を通覧するに、原 Chinolin 類及低級加水素體に比して鹽基性著しく強く、四水素及六水素加化合物にありては醋酸々性水溶液より水蒸氣蒸溜を行ひ得るに反し、Dekahydrochinolin 類にありては何れも蒸溜し得ず。臭氣も亦加水素の度と共に漸次軽く、原 Chinolin 類が一般に重き臭氣を有する反して甚だ軽く、脂肪族アミンに類する臭氣を有するに至る。而して各種の Dekahydrochinolin を通じて甚だ相似たり。又沸騰點は加水素の度と共に著しく低下せられ、且つ置換メチール基の數に畧正比例して高き事第六節附表の如し。

今製出したるデカヒドロヒノリン類中液體及熔融點低きものにつきて比重及屈折率を測定するに別表Cの如くにして比過超は畧分子量に正比例し増大するを見る。又蒸氣壓も加水素の度と共に漸次高く、原 Chinolin 類及四水素加化合物が水蒸氣蒸溜によりて比較的蒸溜し易からざるに反し、Dekahydrochinolin 類にありては甚だ容易に蒸溜し得。

又 Dekahydrochinolin 類は其多くは常温に於て無色の油狀をなせども Chinolin 6-Methylchinolin, 2,6-Dimethylchinolin, 2,7-Dimethylchinolin 等のデカヒドロ化合物の如く常温又は冬期に於て固體をなすものあり。

ハロゲン水素酸鹽はモノメチール及デメチール體に於ては1,2 例外を除き一般によく結晶し得るも、トリメチール體に於ては一般に甚だ溶解し易く、結晶困難なり。金屬復鹽中、鹽化白金復鹽は一般に良好に析出するも、鹽化金復鹽に於ては白金復復に比して一般に結晶し難く油狀に析出するもの少なからず。

Dekahydrochinolin 類の鹽酸鹽水溶液は二級鹽基たるに拘はらず彼の Py-Tetrahydrochinolin 類に於けるが如く、鹽化金溶液、アンモニア性硝酸銀溶液を還元する事なく、又重クロム酸加里溶液に會ひて分解する事なく、ビクロマートを生成す彼の Py-Tetrahydrochinolin 類に於けるが如く常温に於て亞硝酸鹽類と共に油狀のニトロソアミンを生成する事なし。

第五節 數種メチールヘキサヒドロヒノリンに就て

Hexahydrochinolin 類はヒドロヒノリン類中其研究最も不完全の狀態にあり。

別表 C

	沸騰點	熔融點	比重	屈折率 n_D	分子屈折		過超	比過超
					實驗數	理論數		
1-Dekahydrochinaldin	206° (759 mm)		$d_4^{14} = 0.9147$	1.48175 (14°)	47.756	47.579 [C ₁₀ H ₁₈ N, N-(C ₃)]	(+) 0.177	(+) 0.1155
6-CH ₃ -Dekahydrochinaldin	213° (760 mm)	67°						
7-CH ₃ "	218° (756 mm)		$d_4^{31} = 0.9210$	1.48505 (31°)	47.668	"	(+) 0.090	(+) 0.0587
8-CH ₃ "	208-209° (757 mm)		$d_4^{31} = 0.9150$	1.479122 (31°)	47.482	"	(-) 0.097	(-) 0.063
2,4-Dimethol- "	219° (759 mm)		$d_4^{31} = 0.90076$	1.474908 (31°)	51.699	52.197 [C ₁₁ H ₂₁ N, N-(C ₃)]	(-) 0.438	(-) 0.298
2,6-Dimethyl "	218°-219° (757 mm)	20°-21°	$d_4^{31} = 0.8909$	1.47234 (31°)	52.575	"	(+) 0.378	(+) 0.226
2,7-Dimethyl "	220° (757.5 mm)	29°	$d_4^{31} = 0.8905$	1.47068 (31°)	52.443	"	(+) 0.246	(+) 0.149
2,8-Dimethyl "	216° (757.5 mm)		$d_4^{31} = 0.89636$	1.474418 (31°)	52.455	"	(+) 0.258	(+) 0.154
2,4,6-Trimethyl "	236°-237° (758.2 mm)		$d_4^{31} = 0.90062$	1.47775 (31°)	56.924	55.465 [C ₁₂ H ₂₃ N, N-(C ₃)]	(+) 1.459	(+) 0.803
2,4,7-Trimethyl "	241°-243° (764.5 mm)		$d_4^{29} = 0.9196$	1.49606 (20°)	57.563	"	(+) 2.098	(+) 1.157
2,4,8-Trimethyl "	242°-243° (760 mm)		$d_4^{24} = 0.9344$	1.49673 (24°)	56.777	"	(+) 1.312	(+) 0.724

1890 年 Bamberger, Lengfeld ¹⁾ の兩氏が鹽酸テトラヒドロヒノリンをヨード水素酸及赤磷にて還元してデカヒドロヒノリンを製出する際副生物として得たるを始めし、其後 Tietz 氏 ²⁾ は Bamberger 氏より材料を譲り受け其研究を續行せり。斯くして氏はヘキサヒドロヒノリンに就てフェニール尿素、フェニールチオ尿素、*N*-ベンツォイル化合物の如き誘導體を製出し、少しく詳しく研究を行ひたり。其後今日に至るまで他のヒノリン類に就きては全然製出せられたるを見ず。之れ蓋しヘキサヒドロヒノリン類は常にデカヒドロヒノリン類の製造に際し副生物として少量に生成するのみにして現今特に本品のみを製出する方法なきを以てなるべし。

著者はデカヒドロヒノリン類を製出するに際し、副生物として下記ヘキサヒドロヒノリン類を得たるを以て其試験成績を記せん。但し本鹽基の副生する量は常に甚だ少なくして、ヒノリンの種類及反應の狀況により殆ど捕集し得ざる如き場合あり。又著者の實驗中最も多量に生成するを見たる 7-Methylchinolin の場合にありても 33g の四水素鹽基鹽酸鹽を原料とし、僅に 3g 弱を得たるに過ぎざりき。如何なる條件にて行はば最も多量に生成せしめ得べきやに就きては未だ其成績を得ず。他日を期して解決する事とし、下に分離し得たる數種類に就てのみ記載するに止めん。著者の分離し得たるは次の 3 種とす。

7-Methylhexahydrochinolin

8-Methylhexahydrochinolin

2,7-Dimethylhexahydrochinolin

上の中 7-Methylhexahydrochinolin は精製遊離鹽基(鹽酸鹽より遊離す)として約 3g を得たるを以て、其物理學的性質の如きも比較的詳細に試験し得たるも、8-Methylhexahydrochinolin に於ては僅々數滴に過ぎず。それがため沸騰點の如きも辛うじて著者の方法 ³⁾ によりて試験し得たる状態なり。

上の如き不完全なる試験の結果を以てヘキサヒドロヒノリン類一般につきての通性を論ずるが如きは甚だ早計に屬す。雖、著者の實驗し得たる結果より推察するに、ヘキサヒドロヒノリン類は其沸騰點は次の如く Py-Tetrahydrochinolin 類より低く、Bz-Tetrahydrochinolin より高きが如し。

	Py-Tetrahydro.	Hexahydro.	Bz-Tetrahydro.
Chinolin	244-245°(724mm)	226°(720°mm)	218°(756.5mm)
8-Methyl „	255-257°(717mm)	237-238°(760mm)	220-221°(764.5mm)
7-Methyl „	143°(18mm)	235°(757.5mm)	

此處に得たる 3 種メチールヘキサヒドロヒノリン中 7 メチールヘキサヒドロヒノ

1) B. **23**, 1144. 2) B. **27**, 1479. 3) 本誌大正 7 年第 834 號

リンにつきてのみ比重及屈折率の測定を行ひ得て、實驗の部第五節の如き成績を得たり。ハロゲン水素酸鹽は皆よく難溶性の結晶となりて析出し、結晶形の如きも、鹽酸鹽、ブroom水素酸鹽共に何れも長き針狀結晶をなす。Py-Tetrahydrochinolin 類は異なりてアンモニアアルカリ性硝酸銀溶液を還元せざれども、鹽化金溶液を還元し、金複鹽を生成し難き點に於て一致す。鹽化白金鹽は皆よく生成す。醋酸々性水溶液より水蒸氣によりて蒸溜せらる。又 Py-Tetrahydrochinolin 類は異なり、亞硝酸曹達により冷時にニトロゾアミンを生成する事なし。重クロム酸加里によりて温時直ちに分解せらる。

鹽類(ハロゲン水素酸鹽、白金複鹽)は何れも昇華する性質を有す。臭氣はピリヂン半部四水素化合物の夫れに近かし。

第六節 各種メチールヒドロヒノリン類の比較

以上各節に於て著者が製出したるメチールヒノリン類の各種ヒドロ化合物の性質を比較するに次の如し。

1. 外見。メチールヒノリン類の各種加水素體の大部分は液體をなせども、常温又は氷冷時に於て固體をなすもの少なからず。彼の 2,4,6-トリメチール-Py-テトラヒドロヒノリンの如く熔融點 80° を示すものあり。一般に原ヒノリン體が固體をなすものは Bz-テトラヒドロ化合物及デカヒドロ化合物共に固體をなす。然れども Py-テトラヒドロ化合物に於ては各メチールヒノリンを通じて固體をなすもの甚だ少し。又 6-メチールヒノリンに於けるが如く、原ヒノリン體が液體なるに不拘、テトラヒドロ化合物(熔融點 38°)及びデカヒドロ化合物(熔融點に 67° に於て固體をなすものあり。

2. 臭氣。各種ヒドロヒノリン類の臭氣は之れを記載に現はすは困難にして、各メチール體に於て各々異なれども、概してヒノリン原體、Bz-テトラヒドロ化合物、Py-テトラヒドロ化合物、Py-デカヒドロ化合物及ヘキサヒドロ化合物の各團に於て各メチール體は各々共通せる殊異の臭氣を有し、少しく之れに慣るるときは其臭氣によりて何れのヒドロ化合物に屬するやを知るを得べし。デカヒドロ化合物に於ては一般に甚だ輕き臭氣を有し、脂肪族アミンの夫れに近似す。原ヒノリン體に於ては甚だ重く、又 Bz-テトラヒドロ化合物と Py-テトラヒドロ化合物とを比較するに共に相當に重き臭氣を有するも、前者の方幾分デカヒドロ化合物の臭氣に近し。而してヘキサヒドロヒノリン類にありては臭氣相當に輕きも鼻感には Py-テトラヒドロ化合物に相似る。

3. 比重。比重は兩種四水素化合物に於ては原ヒノリン體に比して大差なれども、デカヒドロ化合物となるときは一般に低下す。

4. 沸騰點。沸騰點は加水素の度と共に低下す。而してピリヂン半部に加水素せられたる場合に於ては原ヒノリン體に比して少しく低下せらるるに過ぎざれども

別表 D

	沸 騰 點		
	原 體	Bz-四水素化合物	Py-四水素化合物
Chinolin	237°	218° (756.5 mm)	244°-246° (720 mm)
Chinaldin	244°-245° (750 mm)	224°-225° (757.1 mm)	246°-248° (709 mm)
6-Methylchinolin	257°-258° (745 mm)		262.3° (712 mm)
7-Methyl "	259.7° (747 mm)		143° (18 mm)
8-Methyl "	247°-248° (751 mm)	220°-221° (764.5 mm)	255-257° (717 mm)
2,4-Dimethyl "	264°-265°	250°-251° (759 mm)	253° (755 mm)
2,6-Dimethyl "	266°-267°	236.5° (764 mm)	267°
2,7-Dimethyl "	264°-265°	238° (760 mm)	260°-261° (761.8 mm)
2,8-Dimethyl "	252°	233-234° (755.9 mm)	260-262°
2,4,6-Trimethyl "	277°-278°	256°-257° (758.5 mm)	(A) 265°-266° (758 mm) (B) 261.5° (762.5 mm)
2,4,7-Trimethyl "	280°-281° (760 mm)	259°-260° (766.3 mm)	269°-270° (759 mm)
2,4,8-Trimethyl "	269°-270° (759 mm)	251°-252° (760 mm)	260°-261° (759 mm)
			236° (720 mm)
			206° (760 mm)
			213° (760 mm)
			218° (756 mm)
			208°-209° (757 mm)
			215° (756.5 mm)
			218-219° (757 mm)
			220° (757.5 mm)
			216° (757.5 mm)
			236°-238° (758.2 mm)
			241°-243° (764.5 mm)
			243°-243° (760 mm)
			235° (757.5 mm)
			237°-238° (760 mm)

ベンツオール半部に加水素せられたるものにありては低下の度著しく、原ヒノリン體に比して 20° 内外の降下を見る、又ピリジン、ベンツオール 兩核に 加水素せるデカヒドロ化合物にありては益々低下せられ、原ヒノリン體に比し 40° 内外の降下を見る、之れによりて見るに一般に 沸騰點の降下は ベンツオール半部に加水素せられたる場合に著しく、ピリジン半部に 加水素せられたる 場合に於ては其影響前者に比して少なきを知る。沸騰點は各種ヒドロヒノリン共に分子量の大小(メチールの數)に比例して高き事別表Dの如し。

5. 屈折率。屈折の度は Py-テトラヒドロ化合物に於ては最も強く、デカヒドロ化合物に於ては最も少なく、Bz-テトラヒドロ化合物に於ては其中位にあり。比過超はデカヒドロ化合物及 Py-テトラヒドロ化合物共に(+) (デカヒドロ化合物中 1,2 例外あり)にして前者に於ては理論數に近き實驗數を示すも後者に於ては過超の度幾分大なり。而して比過超は畧々分子量に正例して増大するを見る。又 Bz-テトラヒドロ化合物にありては比過超は各種を通じて何れも負數なり。此等の事實によりて見るにヒノリン核に於てはピリジン半部に 加水素せられたるものは正數の比過超を示すに反し、ベンツオール半部に 加水素せられたるものにありては負數の比過超を示し、又デカヒドロ化合物にありては比過超は甚だ少なくして、分子屈折は畧々理論數に近く、恰も前二者の正、負相殺の如き結果を示す。

6. 鹽類。

a. ハロゲン水素酸鹽。

原ヒノリン體のハロゲン水素酸鹽はメチール基の多數なる トリメチールヒノリン類に於ては一般によく結晶するもモノメチールヒノリンに於ては一般に潮解性なり。Py-テトラヒドロ化合物に於ては各メチールヒノリン共に一般によく結晶するに反し、Bz-テトラヒドロ化合物にありては各メチールヒノリンを通じて一般に結晶し易からずして製出に困難を感ず。又デカヒドロ化合物に於ては多くはよく結晶して製出し得るもトリメチールヒノリンの夫れに於ては皆結晶し易からずヘキサヒドロ化合物に於ては水に對する溶解度小なるがためよく結晶す。而して其結晶形は各種相似て皆長針狀となり析出す。

d. 金屬複鹽。

金、白金等の金屬複鹽は原ヒノリン體及 Bz-テトラヒドロ化合物にありては皆よく析出し易し。Py-テトラヒドロ化合物にありては白金鹽はよく析出するも鹽化金は容易に還元せられ、それがため複鹽を生成し難し。此點はヘキサヒドロヒノリンも亦性質を同うす。デカヒドロ化合物に於ては白金鹽は一般によく析出す。金複鹽は前記 Py-テトラヒドロ化合物、ヘキサヒドロ化合物の如く還元せらるる事なく、其多くはよく結晶するも、針狀となり析出するものも少なからず。

7. 最後に各種ヒドロヒノリン類の重クロム酸加里、亞硝酸加里、アンモニヤ性

硝酸銀液、鹽化金等に對する反應の比較を記すべし。蓋し之れ等の反應は各種ヒドロヒノリン類相互の判別に應用し得ればなり。

a. 重クロム酸加里に對する反應

原ヒノリン體の重クロム酸加里に對する抵抗は甚だ強大にして、各ヒノリン共之れを硫酸々性重クロム酸加里液と共に煮沸するも何等變化なし。Bz-テトラヒドロ化合物、デカヒドロ化合物も亦共に冷時に於ては何等變化なく、よくピクロマーを生成し得。之れに反して Py-テトラヒドロ化合物、ヘキサヒドロ化合物にありては冷時に於ても直ちに分解せらる。

b. 亞硝酸に對する反應

デカヒドロヒノリン類は其窒素が第二級なるに不拘、常溫に於ては亞硝酸水溶液によりてニトロゾアミンを生成する事なし。Bamberger 氏はデカヒドロヒノリンのニトロゾアミンを製出せんが爲めに高壓高温にて亞硝酸鹽を作用せしめ、始めて目的を達するを得たり。¹⁾ 如斯狀態なる故に一般デカヒドロヒノリン類の鹽酸々性水溶液は亞硝酸ソーダ溶液を作用せしむるに何等反應なく、液は透明に止まり、油狀のニトロゾアミンを析出する事なく、此液をアルカリ性となすときは再びデカビトロ鹽基を析出せしむ。ヘキサヒドロヒノリン類に於ても亦窒素が第二級なるに不拘、前記デカヒドロ化合物の場合と同じくニトロゾアミンを析出せず。然るに Py-テトラヒドロヒノリンに於ては冷時よく亞硝酸に作用して油狀(時に結晶性の)ニトロゾアミンを析出す。Bz-テトラヒドロ化合物にありては窒素は第三級なるを以て亞硝酸に作用せざるは當然なり。

c. アンモニヤ性硝酸銀液に對する反應

デカヒドロ化合物、ヘキサヒドロ化合物、Bz-テトラヒドロ化合物共に溫時に於ても亦本試薬を還元する事なし。然るに Py-テトラヒドロ化合物にありては冷時よく之れを還元する性質を有す。

d. 鹽化金に對する反應

本試薬に對してはデカヒドロ化合物、Bz-テトラヒドロ化合物共に何等還元作用を呈せざれども Py-テトラヒドロ化合物及ヘキサヒドロ化合物にありては冷時よく還元するを以て金複鹽を製出し難し。以上の如く各種ヒドロヒノリン類に於て上の如き各種試薬に對する反應を異にす。今之れを表示すれば次の如し。

	重クロム酸	亞硝酸	アンモニヤ性硝酸銀	鹽化金
ヒノリン體	分解せず	反應せず	還元せず	還元せず
Br-テトラヒドロ化合物	分解せず	反應せず	還元せず	還元せず
Py-テトラヒドロ化合物	分解す	反應す	還元す	還元す

¹⁾ B. 23. 1150.

ヘキサヒドロ化合物	分解す	反応せず	還元せず	還元す
デカヒドロ化合物	分解せず	反応せず	還元せず	還元せず

第二章 實 験 之 部

第一節 メチールヒノリン類の製造

第一 ヒナルヂンの製造

ヒナルヂンの製法は種々あれども O. Doebner, W.v. Müller 氏⁴⁾の改良法⁴⁾に準據して次の如く行ふを良しとす。即ちアニリン 90 分、濃鹽酸(36%)180分、熔融クロール亞鉛 60 分を混じ、水浴上に加熱して之れに 80 分のアセトアルデヒドを約 1 時間半を費して滴下し、然る後約 1 時間半砂浴上にて靜かに煮沸せしめ反應を完結す。反應液は先づ酸性のまま水蒸氣を通じて揮發性副産物を去り次に苛性ソーダにてアルカリ性となし、水蒸氣蒸溜を行ひ、粗製鹽基を分離す。粗製鹽基中には多量に副産物として N-エチールアニリンを含有するを以て之れを分離せんがため鹽酸に溶解し、氷冷しつつ之れに亞硝酸ソーダ溶液を加へて全部ニトロゾアミンとして析出せしめ、(此際ヒナルヂンは變化なく水溶液中に存す)エーテルにて振盪して完全に溶取し去り、水溶液はアルカリ性として水蒸氣蒸溜を行ふときは比較的純粹の状態となりて蒸溜す。尙ほ完全に精製せんがためクロール亞鉛復鹽(六邊長板狀の結晶にして 245°にて熔融す)を経て行ふをよしとす³⁾

第二 6-メチールヒノリンの製造

6-メチールヒノリンは Chr. A. Kneuppel 氏によりて行はれたる Skraup 氏ヒノリン合成法の改良方法⁴⁾を基礎とし、之れに Nölting 氏⁵⁾の所説を加味して次の如く行ひたり。即バラトルイヂン 100g, 砒酸 133g, グリセリン 280g, 濃硫酸 260g の混合を徐々に加熱し、沸騰し始まるに至りて加熱を止め、爾後は反應熱により反應せしめ、反應靜止したる頃再び加熱し、長時間靜かなる沸騰状態に保つ、此際 Nölting 氏は約 20 時間加熱を繼續せしむるときは原料トルイヂンと畧ほ同量なるヒノリン體を得て、且つ爾後斯の他の方法にて得たる如く、亞硝酸ソーダ又は重クロム酸加里による精製法を省畧し得と云へり、著者も亦此説に従ひ、約 20 時間加熱し、冷後多量の水にて稀釋し、濾過して苛性ソーダにてアルカリ性となし水蒸氣蒸溜を行ひ、粗製鹽基を分離したり。粗製鹽基は Nölting 氏の如く、比較的純粹なりしも、著者は最純品を必要とせし關係上クロール亞鉛の復鹽(無色柱狀結晶にして 175-176°にて熔融す)を経て精製せり。バラトルイヂ

1) B. **16**, 2435. 2) D. R. P. 28214, 3) 著者本誌大正 13 年第 503 號 4) B. **14**, 1002.
5) B. **23**, 3654.

ン 200g を使用して精製品として 120g. 余を得たり. 無色油状の液体にして 257-258° (745mm)にて沸騰す.

第三 7-Methylchinolin の製造.

7-Methylchinolin の製法として著者は *m*-Toluidin 100g, 砒酸 130g, 硫酸 260g, グリセリン 280g の割合を以て前記 6-メチルキノリンの例に倣ひし Skraup 氏の Chinolin 合成法を試みたり. 斯くして得たる粗製鹽基は割温蒸溜を試むるに寒暖計は急遽上昇して 250° 附近に於て全部蒸溜するを見る. 然れども幾分變化せざる トリイデン を含有する虞れあるを以て稀鹽酸に溶解し, 亞硝酸曹達にて分解して トリイデン を去り, 精製するに 殆ど純粹の域に達し, 恒一の沸騰點を示し, 其少量をアルコールに溶解し, 之れにピクリン酸のアルコール溶液を加へて沈澱せしめて得たるピクリン酸鹽は彼の Skraup 氏によりて記載せられたる熔融點 237° を示し, 再結晶によりて熔融點を變ぜず.

今 *m*-Toluidin に Skraup 氏反應を施すときは其構造の關係上二種の Chinolin 體 I, II を生成すべき理なり.

Skraup 氏¹⁾ は上記の合成法に於て 7-Methylchinolin の外少量に其異性體たる 5-Methylchinolin を生成する旨を記載す. 然れども上記の實驗によるに殆ど全く 5-メチルキノリンを見出し得ざりき.

第四 8-Methylchinolin の製造.

8-Methylchinolin は Chr. A. Kneuppel 氏によりて改良せられたる Skraup 氏の ヒノリン合成法²⁾ によりて *o*-Toluidin 100g, グリセリン 280g, 濃硫酸 260g, 砒酸 133g を用ひ, 前記 6-メチルキノリンの場合と同様に行ひたり. *o*-トリイデンの場合には ヒノリン體の收得量甚だ良好にして, 彼の Nöling 氏所載の如く原料トリイデンの量と同量なる粗製ヒノリン體を得たり. 精製にはクロール亞鉛復鹽(短柱状にして 198° にて熔融す)を経て行ひたり. 無色液体にして 247-248° (751mm) にて沸騰す.

第五 2,4-Dimethylchinolin の製造.

Carl Baeyer³⁾ 氏の方法を基礎として次の如く行ひ製出せり. 即ち Paraldehyd 120g, Aceton 200g の混和液を冷却しつゝ之れに乾燥鹽酸瓦斯を通じて飽和せし

1) M. **3**, 381; M. **7**, 140. 2) B. **14**, 1002 3) J. pr. (2) **33**, 401.

め、1-2 日間放置し、之れをアニリン 200g、濃鹽酸 400g より成る 混和液中に 徐々に滴下せしめ、水浴中に於て 6 時間加熱し、冷後水を以て稀釋し、酸性のまゝ水蒸氣を通じて Aceton の縮合體を揮散せしめ、次にアルカリ性となし再び水蒸氣蒸溜を行ひ採取せる粗製鹽基は先づ割温蒸溜によりて 低温度にて蒸溜する部分を分離し去り、然る後重クロム酸鹽を経て精製せり。無色の液體にして 264°-265° にて沸騰す。精製品の收得量は原料アニリンの約 $\frac{1}{3}$ 量とす。

第六 2,6-Dimethylchinolin の製造。

2,6-Dimethylchinolin は O. Doebner, W. v. Miller 氏等¹⁾ のヒナルデン合成法及び其改良法²⁾ によりパラトルイデン 102g、濃鹽酸 (36%) 180g、熔融クロール亞鉛 60g を混和し、水浴上に加熱して之れに 80g のアセトアルデヒドを添加し反應せしむる事、前記ヒナルデン合成の場合と全く同様に行ひたり。副産物として *N*-エチールパラトルイデンを多量に生成するを以て、ヒナルデン製造の場合の如く、ニトロソアミンとて除去し、斯くして粗製鹽基とて原料トルイデンの半量弱を得るを常とす。尙一段の精製品となさんためクロール亞鉛の複鹽(無色放射線針狀にして 205° にて熔融す)を経て精製するをよしとす。精製鹽基は無色柱狀結晶にして 60° にて熔融し、266-267° にて沸騰す。

第七 2,7-Dimethylchinolin の製造。

2,7-Dimethylchinolin はメタトルイデン 102g、濃鹽酸 (36%) 180g、熔融クロール亞鉛 60g、アセトアルデヒド 80g を原料とし、前記ヒナルデン又は 2,6-Dimethylchinolin の製造の場合と全く同様の方法によりて行ひ、粗製鹽基は先づ副生物たる *N*-エチールメタトルイデン³⁾ を分離せんがため鹽酸々性水溶液に於て亞硝酸ソーダを作用せしめてニトロソアミンとなし、エーテルにて振盪して除去し、水溶液は苛性曹達にてアルカリ性となし、鹽基を分離せり。精製にはクロール亞鉛の複鹽(針狀結晶にして 219° にて熔融す)を経るをよしとす。收得量前記 2,6-ジメチールヒノリンの場合に略同じ。此方法によりて製出せしものは無色針狀結晶の鹽基にして 60° にて熔融し、264-265° にて沸騰す。

第八 2,8-Dimethylchinolin の製造。

2,8-Dimethylchinolin は前記 2,6-Dimethylchinolin の製造に於けるパラトルイデンの代はりに オルトトルイデンを使用し 前記と全く同様に行ひ製出し得べく、收得量も亦略同様なり。精製はクロール亞鉛複鹽(無色短柱狀結晶にして 275° にて

1) B. 16, 2464.

2) F. R. P. 28214.

3) 著者本誌大正 13 年第 508 號参照

熔融す)を経て行ふをよします。精製鹽基は無色油狀にして 25° にて沸騰す。

第九 2,4,6-Trimethylchinolin の製造。

2,4,6-Trimethylchinolin は W. Pfizinger¹⁾ の方法により次の如く行ひたり。即バラアルデヒド 90g 及アセトン 120g を混合し氷冷しつゝ之れに乾燥鹽酸瓦斯を通じ充分飽和せしめ冷所に 1 夜放置し、之れをバタトリーデン 130g 及濃鹽酸 230g の混合中によく攪拌しつゝ添加し、絶えず振盪しつゝ 6-8 時間水浴中に加熱し、冷後水にて稀釋し、水蒸氣を通じて副産物たるアセトン及アルデヒドの縮合體を驅逐し去り、然る後苛性ソーダにてアルカリ性となし再び水蒸氣蒸溜を行ふ時は最初に不變のバタトリーデンを蒸溜し、次で目的の鹽基を蒸溜す。精製は先づ蒸溜法によりて不變のトリーデン(約 $\frac{1}{3}$ 量)を去り、難溶性なる鹽酸鹽(無色細針狀結晶にして 260° にて熔融す)を経て行ふをよします。固體の結晶にして 277°-278° にて沸騰し、空氣中にて 1 分子の結晶水をこりて 63°-64° にて熔融する結晶となる。

第十 2,4,7-Trimethylchinolin の製造。

本品は前記 2,4,6-Trimethylchinolin 製造に於ける W. Pfizinger 氏の方法を基礎とし、少しく改良して行ひたり。²⁾

第十一 2,4,8-Trimethylchinolin の製造。

前記 2,4,7-Trimethylchinolin の場合に於ける メタトリーデンの代はりにオルトトリーデンを使用し、全く同様に行ひて製出し得。³⁾ 水蒸氣蒸溜によりて得たる粗製鹽基は前記 2,4,7-Trimethylchinolin の場合の如く蒸溜して 3 部分に分ち、240° 以上にて蒸溜する部分はクロール亞鉛複鹽(無色細針狀結晶にして 295-296° にて熔融す)となし水より再結晶を行ひて精製す。之れより遊離せる鹽基は無色固形體にして、肉眼的に結晶形明かならず。42° にて熔融し、269°-270° にて沸騰す。

第二節 Bz-テトラヒドロキノリン類

第一 Bz-Tetrahydrochinolin $C_9H_{11}N$

イ. 製法。

鹽酸キノリン 5g, ヨード水素酸(比重 1.96) 20g, 赤磷 2g をボンベン管中に封入し、230-240° に於て 3-4 時間加熱反應せしむ。冷後管の内容を検するに黄色透明の液中に暗褐色の融解し易き結晶を以て充たさるを見る。今内容は第一編

¹⁾ J. pr. Chem. [2] **32**, 240; **38**, 41. ²⁾ 著者: 本誌第 503 號 23 頁 ³⁾ 著者: 本誌第 50 號, 26 頁

總論に記載せる Dekahydrochinolin 類の場合に同様な方法にて處分したり。鹽酸ヒノリン 15g を原料とし、粗製鹽基 8g 餘を得たり。粗製鹽基は少量に第二級アミンを含有するを以て稀鹽酸に溶解し、亞硝酸曹達溶液を加ふるときは油狀のニトロゾアミンとなりて析出するを以てエーテルにて溶取し去り、鹽酸々性水溶液は苛性曹達にてアルカリ性とし、水蒸氣を通じ蒸溜せり。斯くして得たる鹽基は相當純粹にして、其沸騰點の如きも後段ピクラートを経て精製せるものに比して變化なく、更にナトリウムを以て還元して Dekahydrochinolin を製出する原料となすには此狀態に於て充分なり、尙一層純粹をなさんと欲せばピクリン酸鹽(熔融點 165°)を経て精製するときは容易に目的を達し得。

2. 性質.

a 鹽基.

精製鹽基は無色透明油狀の液體にして臭氣は原ヒノリンに酷似して強し。總論附表の如き物理的性質を有す。

ハロゲン水素酸鹽は一般に水に溶解し易きも、金、白金、水銀、亞鉛等の金屬複鹽は皆よく結晶性沈澱となり析出す。

分析

- 1 物質 0.0788g CO_2 0.2348g H_2O 0.0563g C 81.26% H 7.99%
理論數 C 81.14% H 8.33%
- 2 物質 0.0891g N 8.5cc (764mm 14°) = 11.12% 理論數 10.52%

b. 鹽酸鹽 $\text{C}_9\text{H}_{11}\text{N} \cdot \text{ClH}$

本鹽は甚だ水に溶解し易く、且つ潮解し易し。水溶液を蒸發するときは放線狀に集まる羽毛狀の結晶を生ぜしむるも暫時にして潮解す。硫酸乾燥器中に於て乾燥せしめたるものは 123° にて鋭敏に熔融す。

分析

物質 0.1195g AgCl 0.1008g Cl 20.86% 理論數 20.91%

c. ブローム水素酸鹽 $\text{C}_9\text{H}_{11}\text{N} \cdot \text{BrH}$

鹽基をブローム水素酸にて中和し、蒸發するときは結晶をなすも、水に甚だ溶解し易きを以て、精製の目的には右の結晶をアルコールに溶解し、エーテルを加へて析出せしむるをよします。斯くして得たるものは厚き無色の長方形の結晶にして 141° にて熔融す。

分析

物質 0.0714g AgBr 0.0623g Br 37.12% 理論數 37.34%

d. 鹽化金複鹽 $C_9H_{11}N \cdot ClH \cdot AuCl_3$

鹽基の鹽酸鹽水溶液に鹽化金溶液を加ふるときは直ちに黄色細針狀の結晶となり析出す。158°-159°にて熔融し結晶水を含まず。

分析

物質 0.0892g Au 0.0372g = 41.70% 理論數 41.67%

e. 鹽化白金複鹽 $(C_9H_{11}N \cdot ClH)_2PtCl_4$

鹽基の鹽酸鹽溶液に鹽化白金溶液を加ふるときは直ちに良好なる結晶性沈澱として析出す。淡褐色なる厚き四角板狀の結晶にして 220°にて分解し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1102g Pt 0.0312g = 28.31% 理論數 28.42%

f. ピクリン酸鹽 $C_9H_{11}N \cdot C_6H_3(NO_2)_3OH$

鹽基のアルコール溶液にピクリン酸のアルコール溶液を加ふるときは結晶性の沈澱となりて析出す。アルコールより再結晶を行ひ精製し得。斯くして得たるものは短き斜方柱狀の結晶にして 165°にて熔融す。

分析

物質 0.0810g CO_2 0.1486g H_2O 0.0256g C 50.03% H 3.53%

理論數 C 49.70% H 3.89%

g. ヨードメチラート $C_9H_{11}N \cdot CH_3J$

鹽基約 0.5cc を 2 倍量のヨードメチールと共に厚壁試験管中に封入し、水浴中に於て 20-30 分間加熱するときは内容は固結するに至る。再結晶にはアルコールに溶解し、之れにエーテルを加へ析出せしむるをよします。斯くして得たるものは淡黄色柱形針狀の結晶にして 130°にて熔融す。

分析

物質 0.1113g AgJ 0.0943g J 45.78% 理論數 J 45.15%

h. 鹽基の還元。

鹽基約 1cc を約 10cc の無水アルコールに溶解し、還流冷却器を裝置し、約 2g の金屬ナトリウムを少量宛投下し、水浴上に於て加熱しつつ溶解せしめ、先づ鹽酸性となしてアルコール分を蒸發し去り、次にアルカリ性となし、析出する油分をエーテルに溶取し、エーテルを揮散せしむるときは Dekahydrochinolin に全く一致する臭氣を有する還元鹽基を得。還元前の四水素鹽基の鹽酸鹽が甚だ潮解性なるに反し、還元鹽基は之れを鹽酸にて中和するときは甚だよく結晶し、菱形又は六角

板狀の結晶にして $275-276^{\circ}$ にて熔融し, Dekahydrochinolin の夫れに一致す.

第二 2-Methyl-Bz-tetrahydrochinolin.

1. 製造.

2-Methylchinolin (實驗の部第一節第一) のヨード水素酸鹽 8g をヨード水素酸 (比重 1.96) 20g と共にボンベン管中に封し $230-240^{\circ}$ にて 2-4 時間加熱す. 管の内容は一見ヨードに類する板狀結晶を以て充たさる. 今内容をアルカリ性となし, 水蒸氣蒸溜を行ふときは粗製の還元鹽基を得べし. 前記ヨード水素酸鹽 24g を原料となし 9g 余の粗製還元鹽基を得. 粗製品と雖之れを精製鹽基に比較するに甚だ純粹の度にあるを認めたり. 精製はピクリン酸鹽 (熔融點 154°) を經て行ふとき容易に目的を達し得.

2. 性質.

a. 鹽基.

精製鹽基は無色透明油狀にして, 一般 Bz-Tetrahydrochinolin に共通なる臭氣を有し, 總論附表の如き物理的性質を有す.

分析

- 1 物質 0.1116g CO_2 0.3360g H_2O 0.0849g C 82.10% H 8.51%
理論數 C 81.57% H 8.90%
- 2 物質 0.0857g N 7.2cc (766mm 14°) = 9.92%
理論數 9.52%

b. 鹽酸鹽 $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{N}\cdot\text{ClH}$

本鹽は甚だ水に溶解し易きを以て, 其製出には鹽基をエーテルに溶解し, 之れにアルコール製鹽酸を加へて析出せしむるをよしとす. 無色針狀の結晶にして 161° にて熔融す.

分析

物質 0.1021g AgCl 0.0793g Cl 19.21% 理論數 19.30%

c. ブローム水素酸鹽 $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{N}\cdot\text{BrH}$

鹽基をブローム水素酸にて中和し, 蒸發して得たる結晶をアルコールに溶解し, 之れにエーテルを加ふるときは放線狀に集合する無色細針狀の結晶として析出す. 173° にて熔融す.

分析

物質 0.1052g AgBr 0.0864g Br 34.04% 理論數 35.03%

d. 鹽化金複鹽 $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{N}\cdot\text{ClH}\cdot\text{AuCl}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$

鹽基の鹽酸鹽水溶液に鹽化金溶液を加ふるときは黄色細針狀の結晶となり析出す。風乾せるものは 75° 附近にて不明瞭に熔融し、結晶水の存在を思はしむ。又減壓 100° に於て乾燥せるものは 118° に於て熔融す。

分析

物質	0.0766g	金	0.0289g (110° に於ける失量 0.0054g)
實驗數	Au 37.85%	H_2O	7.65%
理論數	„ 37.69 „	„	6.90 „ (結晶水 2 分子として)
„	„ 39.03 „	„	3.58 „ (結晶水 1 分子として)

上の成績により 2 分子の結晶水を含有する事を知る。

e. 鹽化白金複鹽 $(C_{10}H_{13}N \cdot ClH)_2PtCl_4$

鹽基の鹽酸鹽水溶液に鹽化白金溶液を加ふるときは淡褐色多面體顆粒狀の結晶として析出す。 214° にて熔融分解し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1264g Pt 0.0343g = 27.54% 理論數 27.67%

f. ビクリン酸鹽 $C_{10}H_{13}N \cdot C_6H_5(NO_2)_3OH$

鹽基のアルコール溶液にビクリン酸のアルコール溶液を加ふるときは黄色の方形又は長方形板狀の結晶となりて析出す。アルコールより再結晶を行ひ精製し得。 154° にて熔融す。

分析

物質 0.1014g CO_2 0.1905 H_2O 0.0401g C 51.23% H 4.42%

理論數 C 51.04% H 4.28%

g. ヨードメチラート $C_{10}H_{13}N \cdot CH_3J$

鹽基約 0.5g を約 2cc のヨードメチールと共に厚壁管中に封入し、水浴中に於て約 20 分加熱するときは固結す。結晶はアルコールに溶解し、之れにエーテルを加へ析出せしめ精製す。斯くして得たるものは帶黄白色細針狀の結晶にてし好んで水分を吸収し黄色に變化す。減壓にて乾燥したるものは $109-110^{\circ}$ にて熔融す。

分析

物質 0.1287g AgJ 0.1050g J 44.09% 理論數 43.98%

鹽基の還元。

鹽基約 1cc を無水アルコール溶液にて金屬ナトリウムにて還元する事前記 Bz-Terhydrochinolin の場合と全く同様に行ひ、斯くして得たる還元鹽基は臭氣全く一變し、Dekahydrochinaldin の夫れに一致し、還元前の四水素鹽基鹽酸鹽が基だ結晶し難きに反し、還元後に於ては鹽酸にて中和するときは直ちに結晶す。菱形板狀にして Dekahydrochinaldin の鹽酸鹽の熔融點を示す。

第三 8-Methyl-Bz-tetrahydrochinolin

1. 製造.

逆離の 8-Methylthiolin (實驗部第一節第四の一) 5g をヨード水素酸(比重 1.96) 27g, 赤燐 2g と共に加熱還元する事前記諸種の場合と同様に行ひたり. 此場合に得たる粗製鹽基は沸騰點甚恒一ならずして, 且つ亞硝酸曹達にて處理するに相當に多量のニトロゾアミンを生成する事により, 第三級アミンの傍ら第二級アミンの夾雜する事を知りたるを以て之れを分離せんがため粗製鹽基を稀鹽酸に溶解し, 亞硝酸曹達溶液を加ふるときは第二級鹽基は油狀のニトロゾアミンとなりて析出するを以てエーテルにて浸出し完全に除去し, 水性溶液は再び苛性曹達にてアルカリ性となし, 水蒸氣蒸溜を行ふ. 此狀態に於ても既に純粹にして恒一なる沸騰點を示す. 尚ほ一層精製せんを欲せば甚だ良好に結晶するピクリン酸鹽(後出)を経るを良しとす. 原料鹽基 10g を使用し, 精製四水素鹽基 6g 餘を得たり.

2. 性質.

a. 鹽基.

本鹽基は一種特異の臭氣を有する油狀にして總論附表の如き物理的性質を有す. 各種金屬複鹽は良好に析出するも, ハロゲン水素酸鹽は一般に甚だ水に溶解し易し.

分析

1 物質 0.1077g CO_2 0.3217g H_2O 0.0853g C 81.46% H 8.86%

理論數 C 81.57% H 8.90%

2 物質 0.0941g N 8.1cc (765.5mm, 15°) = 10.10%

理論數 9.52%

b. 鹽酸鹽 $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{N}\cdot\text{ClH}$

鹽基を鹽酸にて中和し, 蒸發して得たる結晶を濕氣を避けてアルコールに溶解し, エーテルを加ふるときは無色菱形板狀の結晶となりて析出す. 164° に於て熔融し, 甚だ水に溶解し易し.

分析

物質 0.1299g AgCl 0.0999g Cl 19.02% 理論數 19.30%

c. ブローム水素酸鹽 $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{N}\cdot\text{BrH}$

本鹽も亦甚だ水に溶解し易く, それがため製出には鹽基をブローム水素酸にて中和し, 蒸發し, 減壓乾燥器中に永く放置し, 辛ふじて得たる結晶を水分を避けつゝアルコール溶液となし, 之れにエーテルを加ふるときは無色の柱形針狀の結晶として析出す. 133° に於て熔融す.

分析

物質 0.0765g AgBr 0.0649g Br 34.69% 理論數 35.03%

d. 鹽化金複鹽 $C_{10}H_{13}N \cdot ClH \cdot AuCl_3$

鹽基の鹽酸々性水溶液に鹽化金溶液を加ふるときは良く結晶す。鹽酸々性の水より再結晶するときは芝狀に集まる針狀結晶となり析出す。134° にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.0362g Au 0.0349g = 40.43% 理論數 40.47%

c. 鹽化白金複鹽 $(C_{10}H_{13}N \cdot ClH)_2PtCl_4$

鹽基の稀鹽酸溶液に鹽化白金を加ふるときは良く結晶す。淡褐色短形柱狀の結晶にして 193° にて分解し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.0977g Pt 0.0269g = 27.53% 理論數 27.67%

f. ピクリン酸鹽 $C_{10}H_{13}N \cdot C_6H_2(NO_2)_3OH$

鹽基をアルコールに溶解し、之れにピクリン酸のアルコール溶液を加ふるときは結晶性沈澱となり析出す。アルコールより細き黃色長方形板狀の結晶となり析出し、125° に於て熔融す。

分析

物質 0.0640g CO_2 0.1197g H_2O 0.0268g C 51.00% H 4.68%

理論數 C 51.04% H 4.28%

g. ヨードメチラート $C_{10}H_{13}N \cdot CH_3J$

鹽基を少過剰のヨードメチールと共に厚壁試験管中に封入し、之れを水浴中に於て約 20 分間加温するときは内容は固結す。結晶はアルコールより再結晶し得、帶黃白色針狀の結晶にして 189° に於て熔融す。

分析

物質 0.1102g AgCl 0.0889g J 43.60% 理論數 43.98%

bei der Mischprobe ein Gemisch von VII und V bei gewöhnlicher Temperatur, sodass die beiden nicht identisch sind. Es ist nicht ausgeschlossen, dass VII ein von Claisen bereitetes Isomer von Phenylmethylpyrazol (F.P. 37–39°) ist. Dieser Punkt wird später weiter untersucht. Ausserdem ist das Chlor in I so fest gebunden, dass es durch Einwirkung von feuchtem Silberoxyd nicht abgespalten wird.

Durch Erhitzen von I mit Jodmethyl im Einschlussrohr auf 130° während 5 Stunden erhält man eine Verbindung $C_{11}H_{11}N_3ClJ_2$ vom F.P. 225°, welche mit 1-Phenyl-3-methyl-4-jod-5-chlorpyrazolmethyljodid (Claisen, Ber. **32**, 2411) identisch ist.

Auf Grund obiger Tatsachen zieht Verfasser für I die folgende Konstitution in Erwägung.

Dass die früheren Forscher Michaelis und seine Mitarbeiter (Ber. **31**, 2907; **32**, 2398) bei ähnlichen Reaktion die Verbindung I nicht erhielten, liegt wahrscheinlich daran, dass sie bei zu hoher Temperatur arbeiteten. (T. K.)

S. Yamaguchi: Beiträge zur Kenntnis der Methylhydrochinoline.

Der Verfasser hat die hydrierten Chinoline, besonders Benzol-tetrahydrochinolin, Dekahydrochinolin, gleichzeitig auch die bisher in der Literatur nicht verzeichneten Arten von Py-Tetrahydrochinolin, Hexahydrochinolin studiert.

Julius von Braun (Ber. **55**, 3779; **56**, 1338, (1923)) hat zuerst Bz-Tetrahydrochinolin dargestellt. Dieser Forscher hat mit seinen Mitarbeitern Chinolin und dessen Alkylderivate mit Nickel als Katalysator unter hohem Druck hydriert und gefunden, dass, falls an der

Benzolhälfte des Chinolinkernes kein Substituent haftet, hierbei ausser dem schon bekannten Py-Tetrahydrochinolin das nur in der Benzolhälfte hydrierte Bz-Tetrahydrochinolin entsteht.

Zugleich hat der Verfasser halogenwasserstoffsäure Salze der Chinoline der direkten Reduktion mit Jodwasserstoffsäure ($d=1,98$) und rotem Phosphor unterworfen und dabei die bisher in der Literatur nicht verzeichneten Tetrahydroverbindungen in reinem Zustande (ohne jede Verunreinigung) in guter Ausbeute erhalten. Dieselben sind nach dem Resultate der Untersuchung Bz-Tetrahydrochinolinderivate. Nach v. Braun bekommt man solche Hydroderivate nicht, wenn im Benzolring des Chinolinkerns Substituenten haften, während dies nach der Methode des Verfassers bei allen Halogenderivaten des Chinolins leicht gelingt.

Auf diese Weise hat der Verfasser die folgenden zehn Derivate, nämlich

Bz-Tetrahydrochinolin,			2-Methyl-Bz-Tetrahydrochinolin,		
8-Methyl-Bz-	„	,	2,4-Dimethyl-Bz-	„	,
2,6-Dimethyl-Bz-	„	,	2,7-Dimethyl-Bz-	„	,
2,8-Dimethyl-Bz-	„	,	2,4,6-Trimethyl-Bz-	„	,
2,4,7-Trimethyl-Bz-	„	und	2,4,8-Trimethyl-Bz-	„	

dargestellt, ihre Eigenschaften festgestellt und die folgenden Resultate erhalten. (Tabelle I.)

Bei der Reduktion der Bz-Tetrahydrochinoline in alkoholischer Lösung mit metallischem Natrium erhält man leicht die Dekahydroverbindung. Auf diese Weise hat der Verfasser die 11 folgenden Dekahydrochinolinderivate dargestellt und ihre Eigenschaften genau studiert. Das Besondere an diesen Verbindungen ist, dass ihre spezifische Exaltation wie bei den Thiophenderivaten negativ ist.

Dekahydrochinoline haben Bamberger (Ber. **23**, 1138 ; **27**, 1458),

TABELLE I.

	K. P.	F. P.	d_4^t	n_D	$\frac{n^2-1}{n^2+2} \cdot \frac{M}{d_4^t}$		e_{MD}	$e_{\Sigma D}$
					Gef.	Ber.		
Bz-Tetrahydrochinolin	218° (756.5 mm)	—	$d_4^{10} = 1.0504$	1.57263 (10°)	41.740	$(C_9H_{11}N\frac{1}{3}N^{-(c)}_3)$ 41.901	(-) 0.161	(-) 0.129
2-Methyl-Bz-tetrahydrochinolin	224°-225° (757.1 mm)	—	$d_4^{10} = 1.0071$	1.54016 (10°)	45.842	$(C_{10}H_{13}N\frac{1}{3}N^{-(c)}_3)$ 46.519	(-) 0.677	(-) 0.460
8-Methyl-Bz-tetrahydrochinolin	220°-221° (764.5 mm)	—	$d_4^{14} = 1.0052$	1.53643 (14°)	45.665	„	(-) 0.854	(-) 0.580
2,4-Dimethyl-Bz-tetrahydrochinolin	250°-251° (759 mm)	19°-20°	$d_4^{10} = 1.0043$	1.54147 (20°)	50.419	$(C_{11}H_{15}N\frac{1}{3}N^{-(c)}_3)$ 51.137	(-) 0.718	(-) 0.445
2,6-Dimethyl-Bz-tetrahydrochinolin	236.5° (764 mm)	33°	—	—	—	—	—	—
2,7-Dimethyl-Bz-tetrahydrochinolin	238° (760 mm)	37°-38°	—	—	—	—	—	—
2,8-Dimethyl-Bz-tetrahydrochinolin	233°-234° (755.9 mm)	—	$d_4^{31} = 0.99165$	1.53990 (31°)	50.975	$(C_{11}H_{15}N\frac{1}{3}N^{-(c)}_3)$ 51.137	(+) 0.362	(+) 0.224
2,4,6-Trimethyl-Bz-tetrahydrochinolin	256°-257° (758.5 mm)	—	$d_4^{14} = 0.9845$	1.53007 (14°)	54.951	$(C_{12}H_{17}N\frac{1}{3}N^{-(c)}_3)$ 55.755	(-) 0.804	(-) 0.460
2,4,7-Trimethyl-Bz-tetrahydrochinolin	259°-260° (766.3 mm)	20°-21°	$d_4^{26.5} = 0.97559$	1.52111 (26.5°)	54.676	„	(-) 1.079	(-) 0.627
2,4,8-Trimethyl-Bz-tetrahydrochinolin	251°-252° (760 mm)	—	$d_4^{14} = 0.99196$	1.53575 (14°)	55.035	„	(-) 0.720	(-) 0.411

TABELLE II.

	K. P.	F. P.	d_4^t	n_D	$\frac{n^2-1}{n^2+2} \cdot \frac{M}{d_4^t}$		e_{MD}	$e_{\Sigma D}$
					Gef.	Per.		
Dekahydrochinaldin	206° (759 mm)	—	$d_4^{14} = 0.9147$	1.48175 (14°)	47.756	$(C_{10}H_{19}N, N^{-(c)}_2)$ 47.579	(+) 0.177	(+) 0.1155
6-Methyl-dekahydrochinolin	213° (760 mm)	67°	—	—	—	—	—	—
7-Methyl-dekahydrochinolin	218° (756 mm)	—	$d_4^{31} = 0.9210$	1.48505 (31°)	47.668	„	(+) 0.090	(+) 0.0587
8-Methyl-dekahydrochinolin	208°-209° (757 mm)	—	$d_4^{31} = 0.9150$	1.479122 (31°)	47.482	„	(-) 0.097	(-) 0.063
2,4-Dimethyl-dekahydrochinolin	219° (759 mm)	—	$d_4^{31} = 0.90076$	1.474908 (31°)	51.699	$(C_{11}H_{21}N, N^{-(c)}_2)$ 52.197	(-) 0.498	(-) 0.298
2,6-Dimethyl-dekahydrochinolin	218°-219° (757 mm)	20°-21°	$d_4^{31} = 0.8909$	1.47234 (31°)	52.575	„	(+) 0.378	(+) 0.226
2,7-Dimethyl-dekahydrochinolin	220° (757.5 mm)	29°	$d_4^{31} = 0.8905$	1.47068 (31°)	52.443	„	(+) 0.246	(+) 0.149
2,8-Dimethyl-dekahydrochinolin	216° (757.5 mm)	—	$d_4^{31} = 0.89636$	1.474418 (31°)	52.455	„	(+) 0.258	(+) 0.154
2,4,6-Trimethyl-dekahydrochinolin	236°-237° (758.2 mm)	—	$d_4^{20} = 0.9062$	1.47775 (31°)	56.924	$(C_{12}H_{23}N, N^{-(c)}_2)$ 55.465	(+) 1.459	(+) 0.803
2,4,7-Trimethyl-dekahydrochinolin	241°-243° (764.5 mm)	—	$d_4^{20} = 0.9196$	1.49606 (20°)	57.563	„	(+) 2.093	(+) 1.157
2,4,8-Trimethyl-dekahydrochinolin	242°-243° (760 mm)	—	$d_4^{24} = 0.9344$	1.49673 (24°)	56.777	„	(+) 1.312	(+) 0.724

W. Ipatiew (Ber. **41**, 991), Sabatier (C. r. **158**, 309–311), Skita und Meyer (Ber. **45**, 3593), Bruno Venetiani (R.A.L. (5) **23**, II, 276–277), H. Finger und W. Breitwieser (Jour. pr. Ch. (II) **79**, 455 und J. von Braun (B. **55**, 3780; **56**, 1338) dargestellt. (Tabelle II.)

Py-Methyltetrahydrochinolin ist unter den hydrierten Chinolinderivaten am besten untersucht; da die unten verzeichneten vier Tetrahydrochinoline noch nicht oder nur unvollkommen in der Literatur verzeichnet sind, so habe ich dieselben, nämlich

2,7-Dimethyl-Py-Tetrahydrochinolin,		
2,4,6-Trimethyl-Py-	„	,
2,4,7-Trimethyl-Py-	„	und
2,4,8-Trimethyl-Py-	„	.

studiert und beschrieben.

Bamberger, Langfeld (Ber. **23**, 1144), Tietz (Ber. **27**, 1479) haben sich nur auf die Untersuchung des Hexahydrochinolin beschränkt ohne die anderen Hydrochinolinderivate darzustellen.

Der Verfasser hat 7-Methyl-, 8-Methyl-, 2,7-Dimethylhexahydrochinolin hergestellt und die folgenden Eigenschaften festgestellt:

K. P.	d_4^{20}	n_D	$\frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} \cdot \frac{M}{d_4^{20}}$		EM _D	EΣ _D
			Gef.	Ber. $C_{10}H_{15}N^{(C)_2}$		
7-Methylhexahydrochinolin 235° (757,5mm)	$d_4^{16} = 0,9506$	1,54098(16°)	49,293	46,654	(+)2,639	(+)1,775
8-Methylhexahydrochinolin 237-238° (760mm)						

Vergleicht man die Siedepunkte verschiedener Arten hydrierter Chinoline miteinander, so beobachtet man in den Fällen, wo der Pyridinring im Chinolinkern hydriert ist, keine bedeutende Siedepunktserniedrigung; ist dagegen der Benzolring hydriert, so findet man (mit dem ursprünglichen Körper verglichen) eine durchschnittliche Erniedrigung um etwa 20°C und wenn beide Ringe des Chinolinkernes hydriert

sind, so ist die Erniedrigung eine bedeutende und zwar etwa 40°C. Dies geht auch aus der folgenden Tabelle hervor. (Tabelle III.)

Der Refraktionsindex ist, wie dies aus Tabelle 1 und 2 hervorgeht, beim Py-Tetrahydrochinolin am stärksten, beim Dekahydrochinolin am schwächsten und der des Bz-Tetrahydrokörpers liegt dazwischen.

Die spezifische Exaltation ist bei jedem Py-tetrahydriertem Chinolin positiv, beim Bz-tetrahydrierten Derivat (vergl. folgende Tabelle) negativ. Bei Dekahydrochinolinderivaten ist sie meist positiv, bei einigen jedoch negativ. (Tabelle IV.)

Kinzô Kafuku, D. Sc., Nobutosi Itikawa, u. Ryô Katô:

Über die Aufspaltung des Dioxymethylenätherringes durch Methylmagnesiumjodid. (Mitteilung aus dem Laboratorium der industriellen Abteilung, Government Research Institute of Formosa, Taihoku, Formosa.)

Einer der Verfasser (K. Kafuku) hat früher über die Wirkung des Methylmagnesiumjodids auf Safrol, Isosafrol, und Hydrosafrol gearbeitet und über die Aufspaltung ihres Dioxymethylenätherringes unter Bildung von Safroegenol, Isosafroegenol, resp. Hydrosafroegenol berichtet⁽¹⁾. In diesen Fällen spaltet der Methylenätherring sich in ein Hydroxyl und ein Äthoxyl auf, und das erstere nimmt die Lage (3) gegen die Kohlenwasserstoffseitenkette (1) ein, während das Äthoxyl bei (4) gebildet wird. Nun trat an uns die Frage heran, ob jeder Dioxymethylenätherring auf demselben Wege genau wie bei den vorigen Fällen zu einem Hydroxyl und einem Äthoxyl mittels Methylmagnesiumjodid aufgespalten werden kann. Zu ihrer Klärung behandelten wir Apiol, Isoapiol, Myristicin, und Isomyristicin nach unserer Methode und

(1) Report of the Department of Industry, Government Research Institute of Formosa, No. 6 p. 1-14, 1925; Diese Zeitschrift, 521-609; Acta Phytochimica, II (3), 113.