メチールヒドロキノリン類の研究補遺 其二

S. Yamaguchi: Beiträge zur Kenntnis der
Methylhydrochinoline. II.

薬學博士 山口 誠 太 郎

第四 2,4-Dimethyl-1-Bz-tetrahydrochinolin $C_{11}H_{15}N$

1. 製法

2,4-Dimethylchinolin の沃度水素酸鹽 7g をヨード水素酸 (比重 1.96) 21g, 赤燐 2g と共にボンベン管中に於て加熱還元する事前記諸種の場合と同様に行ふ。前記ヨード水素鹽 35g を原料として粗製鹽基約 15g を得たり。精製は下記鹽酸鹽又はピクリン酸鹽を経て行ふ時はよく目的を達し得。

2. 性質

a. 鹽基

精製鹽基は夏時は無色透明の液體をなせども、寒冷時に於ては長板狀の結晶となり固結し、總論附表の如き物理的性質を有す。

分析

1. 物質 0.1296g CO_2 0.3890g H_2O 0.1075g C 81.85% H 9.28%
理論數 „ 81.92% „ 9.32%
2. 物質 0.0956g N 7.2cc (755.5mm, 13°) = 8.80% 理論數 8.69%

b. 鹽酸鹽 $C_{11}H_{15}N \cdot ClH$

鹽基を乾燥エーテルに溶し、之れにアルコール製鹽酸を加ふるときは良く結晶す。無色短柱狀の結晶にして、水に溶け易く、205° にて溶融し、結晶水を含まず。

分析

- 物質 0.1139g AgCl 0.0820g Cl 17.81% 理論數 17.93%

c. ブローム水素酸鹽 $C_{11}H_{15}N \cdot BrH$

鹽基をブローム水素酸にて中和し、蒸發して得たる結晶をアルコール溶液となし、之れにエーテルを加ふるときは良好なる結晶となりて析出す。四角短柱狀の結晶にして、水に溶解し易く、198° に於て溶融す。

分析

- 物質 0.1091g BrAg 0.0846g Br 32.99% 理論數 33.00%

d. ヨード水素酸鹽 $C_{11}H_{15}N \cdot JH$

鹽基をヨード水素酸にて中和するときは結晶す。水又はアルコールより再結晶せしめ精製し得。無色長針狀の結晶にして、176-177° に於て溶融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1287g AgJ 0.1042g J 43.76% 理論數 43.91%

e. 鹽化金複鹽 $C_{11}H_{15}N \cdot ClH \cdot AuCl_3$

鹽基の鹽酸鹽水溶液に鹽化金溶液を加ふるときは結晶となり析出す。水より再結晶し得べく、黃色細長針狀の結晶となり析出す。128°にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1212g Au 0.0474g = 39.10% 理論數 39.34%

f. 鹽化白金複鹽 $(C_{11}H_{15}N \cdot ClH)_2 \cdot PtCl_4$

前項鹽化金複鹽と同様な方法にて製出し得。四角板狀の結晶にして、232-233°にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1358g Pt 0.0359g = 26.43% 理論數 26.61%

h. ヨードメチラート $C_{11}H_{15}N \cdot CH_3J$

鹽基約 0.5g を約 2cc のヨードメチールと共に厚壁試験管中に封入し、水浴中に於て約 20 分間加熱し、固結せる結晶はアルコール溶液をなし之れにエーテルを加へ析出せしむる法によりて精製す。帶黃白色六角板狀の結晶にして、163°にて熔融す。

分析

物質 0.1520g AgJ 0.1174g J 41.74% 理論數 41.88%

g. ピクリン酸鹽 $C_{11}H_{15}N \cdot C_6H_2(NO_2)_3OH$

鹽基のアルコール溶液にピクリン酸のアルコール溶液を加ふるときは結晶となり沈澱す。黃色骰子形の結晶にして、144°にて熔融す。

分析

物質 0.0885g CO₂ 0.1688g H₂O 0.0352g C 52.01% H 4.45%
理論數 „ 52.28% „ 4.65%

i. 鹽基の還元

鹽基をアルコール溶液にて金屬ナトリウムにて還元する事前記 Bz-Tetrahydrohinolin の場合の如く行ひ、斯くして得たる鹽基は臭氣全く還元前と異なり、一般デカヒドロ鹽基の夫れに類するに至り、鹽酸鹽、ブroom水素酸鹽、ヨード水素酸鹽は結晶形、熔融點共にデカヒドロ鹽基の夫れに一致す。

第五 2,6-Dimethyl-Bz-tetrahydrochinolin $C_{11}H_{15}N$

1. 製法

2,6-Dimethylchinolin の沃度水素酸鹽を原料をなし、之れをヨード水素酸及赤燐にて還元する事前記の場合と同様に行ひ、ヨード水素酸鹽 23g を使用し粗製鹽基

13g を得たり。粗製鹽基は後段ピクラートを経て精製するを便す。

2. 性質

a. 鹽基

精製鹽基は無色四角柱狀の結晶にして、 33° にて熔融し、 236.5° に於て沸騰す。

ハロゲン水素酸鹽は一般に水に溶解し易く、金、白金、水銀等の複鹽は甚だよく結晶す。他の Bz-テトラヒドロ化合物に於てはヨードメチルを附加して良好に結晶するヨードメチラートを生成するに反し、本鹽基に於てはヨードメチラート、ヨードエチラート共に結晶せず。

分析

1. 物質 0.1033g $\{CO_2$ 0.3107g H_2O 0.0842g C 82.02% H 9.12%

理論數 „ 81.92% „ 9.32%

2. 物質 0.1696g N 13.2cc (761.6mm, 28°) = 8.51% 理論數 8.69%

b. 鹽酸鹽 $C_{11}H_{15}N \cdot ClH$

甚だ潮解性にして、結晶困難なり。蒸發乾燥によりて恒量を得たるものを分析し次の成績を得たり。

物質 0.1579g AgCl 0.1139g Cl 17.83% 理論數 17.93%

c. ブローム水素酸鹽 $C_{11}H_{15}N \cdot BrH$

甚だ潮解性にして、アルコール溶液よりエーテルを加へて析出せしむるときは短柱形結晶として析出す。 137° にて熔融し、結晶水を含ます。

分析

物質 0.1532g AgBr 0.1174g Br 32.66% 理論數 33.00%

d. 沃度水素酸鹽 $C_{11}H_{15}N \cdot JH$

水に溶解し易きも、前記鹽酸鹽、ブローム水素酸鹽の如く甚だしき潮解性を有せず。水より析出せしめたるものは四角板狀の結晶にして、 $139-140^{\circ}$ に於て熔融す。結晶水を含ます。

分析

物質 0.0940g AgJ 0.0755g J 43.41% 理論數 43.91%

e. 鹽化金複鹽 $C_{11}H_{15}N \cdot ClH \cdot AuCl_3$

鹽基の鹽酸鹽水溶液に鹽化金液を加ふるときは黄色細針狀の結晶として析出す。 $136-137^{\circ}$ に於て熔融し、結晶水を含ます。

分析

物質 0.2739g Au 0.1077g = 39.32% 理論數 39.34%

f. 鹽化白金複鹽 $(C_{11}H_{15}N \cdot ClH)_2 \cdot PtCl_4 + 2H_2O$

鹽基の鹽酸鹽水溶液に鹽化白金溶液を加ふるときは淡褐色長板狀の結晶となり析出す。 197° にて熔融し、2 分子の結晶水を含ます。

分析

1. 物質(風乾) 0.1610g 100°, 減壓に於て 0.0077g を失ひ恒量を得たり.
 H_2O 4.73% 理論數 4.69%(結晶水 2 分子として)
 2. 物質(無水) 0.1525g Pt 0.046g = 26.62% 理論數 26.65%

g. 昇汞複鹽 $\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{N}\cdot\text{ClH}\cdot\text{HgCl}_2$

鹽基の鹽酸鹽水溶液に昇汞溶液を加ふるときは始め油狀に析出し、後固結す。長き斜方柱狀の結晶にして、103° にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

- 物質 0.1156g SHg 0.0573g Hg 42.73% 理論數 42.72%
 h. ピクリン酸鹽 $\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{N}\cdot\text{C}_6\text{H}_2(\text{NO}_2)_3\text{OH}$
 鹽基のアルコール溶液にピクリン酸のアルコール溶液を加ふるときは結晶となり沈澱す。アルコールより再結晶を行ひ良く精製し得。黃色長方形板狀の結晶にして、148-149° に於て熔融す。

分析

- 物質 0.1188g CO_2 0.2280g H_2O 0.0405g C 52.34% H 4.66%
 理論數 „ 52.28% „ 4.65%
 i. ヨードメチラート $\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{N}\cdot\text{CH}_3\text{J}$
 鹽基は之れをヨードメチールと共に厚壁管中に封入して水浴中に加温するときはよく反應し結晶すれども、生成せるヨードメチラートは著しく潮解性にして、結晶形を保ちつつ精製する事困難なり。

第六 2,7-Dimethyl-Bz-tetrahydrochinolin $\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{N}$

1. 製法

2,7-Dimethylchinolin (實驗の部第一節第七)のヨード水素酸鹽を原料とし、ヨード水素酸及赤磷にて還元する事前記 2,4-Dimethylchinolin の場合と全く同様な方法にて行ふ。粗製鹽基の收得量前記同様良好なり。粗製鹽基はピクリン酸鹽又は昇汞複鹽を経て精製するを便す。

2. 性質

a. 鹽基

精製鹽基は無色の固體にして次の物理的性質を有す。

熔融點 37-38° 沸騰點 238°(760mm)

ハロゲン水素酸鹽及各種金屬複鹽は皆良好に結晶し、就中水銀複鹽の如きは沸湯より再結晶するときは吋長大の針狀結晶となる。

分析

1. 物質 0.1314g CO_2 0.3954g H_2O 0.1110g C 82.06% H 9.45%
 理論數 „ 81.92% „ 9.32%
 2. 物質 0.1101g N 8.2cc (767mm, 12°) = 8.88% 理論數 8.69%

b. 鹽酸鹽 $C_{11}H_{15}N \cdot ClH$

鹽基のエーテル溶液にアルコール製鹽酸を加ふるときは結晶となり沈澱す。水に溶解し易く、水より析出せしめたるものは無色長板狀の結晶にして、 192° にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1138g $AgCl$ 0.0826g Cl 17.95% 理論數 17.93%

c. ブローム水素酸鹽 $C_{11}H_{15}N \cdot BrH$

鹽基をブローム水素酸にて中和し、蒸發して得たる結晶をアルコールに溶解し、エーテルを加へて析出せしむるときは羽毛狀の結晶となり析出す。水に溶解し易く、 201° にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1116g $AgBr$ 0.0868g Br 33.09% 理論數 33.00%

d. ヨード水素酸鹽 $C_{11}H_{15}N \cdot JH$

鹽基をヨード水素酸にて中和し、蒸發乾燥し、アルコール溶液となし、エーテルを加へて析出せしむるときは無色鱗片狀の結晶となり析出す。 169° にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1211g AgJ 0.0983g J 43.87% 理論數 43.91%

e. 鹽化金複鹽 $C_{11}H_{15}N \cdot ClH \cdot AuCl_3$

鹽基の鹽酸鹽水溶液に鹽化金溶液を加ふるときは直に結晶性の沈澱となり析出す。黃色細針狀の結晶にして、 105° にて熔融す。

分析

物質 0.0775g Au 0.0303g = 39.09% 理論數 39.34%

f. 鹽化白金複鹽 $(C_{11}H_{15}N \cdot ClH)_2 \cdot PtCl_4$

鹽基の鹽酸鹽溶液に鹽化白金を加ふるときは直に結晶性の沈澱となり析出す。黃褐色羽毛狀の結晶にして、 221° にて分解す。

分析

物質 0.1082g Pt 0.0288g = 26.61% 理論數 26.61%

g. 鹽化水銀複鹽 $C_{11}H_{15}N \cdot ClH \cdot HgCl_2$

鹽基の鹽酸鹽水溶液に昇汞溶液を加ふるときは結晶となり沈澱す。水より再結晶するときは吋長大の無色針狀結晶となり析出す。 169° にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1247g SHg 0.0619g Hg 42.70% 理論數 42.72%

h. ピクリン酸鹽 $C_{11}H_{15}N \cdot C_6H_2(NO_2)_3OH$

鹽基のアルコール溶液にピクリン酸のアルコール溶液を加ふるときは黄色、放線状に集まる短針状の結晶となり析出す。アルコールより再結晶し得べく、 153° に於て熔融す。

分析

物質	0.0782	CO ₂	0.1491g	H ₂ O	0.0309g	C	52.00%	H	4.42%
						理論數	„ 52.28%	„	4.65%

i. ヨードメチラート $C_{11}H_{15}N \cdot CH_3J$

鹽基を計算量より少しく過剰のヨードメチールと共に厚壁試験管中に封入し、水浴中に於て約 20 分間加熱するときは内容は固結するに至る。冷後内容をエーテルにて洗滌し、アルコール溶液をなし、エーテルを加へて析出せしむ。斯くして製出せるものは帶黄白色柱状の結晶にして、 $185-186^{\circ}$ にて熔融す。

分析

物質	0.1183g	AgJ	0.0911g	J	41.62%	理論數	41.88%
----	---------	-----	---------	---	--------	-----	--------

j. 鹽基の還元

鹽基をアルコール溶液に於て金屬ナトリウムにて還元する事前段 2,4-Dimethyl-Bz-tetrahydrochinolin の場合の如く施行したり。還元鹽基は臭氣全く 2,7-Dimethyl-dekahydrochinolin に同じく、鹽酸鹽、臭化水素酸復鹽、白金復鹽も亦其熔融點相一致す。

第七 2,8-Dimethyl-Bz-tetrahydrochinolin $C_{11}H_{15}N$

鹽基の製造

2,8-Dimethylchinolin の鹽酸鹽 5g を沃度水素酸 (比重 1.96) 21g, 赤燐 2g を共にボンベン管中に封入し、加熱還元する事前記諸種 Bz-Tetrahydrochinolin 類の製造の場合と全く同様に行ひたり。鹽酸鹽 20g を原料をなし粗製鹽基 12g 弱を得たり。精製は後段所載のピクラートを経て行ふときはよく目的を達し得。

性質

a. 鹽基

精製鹽基は無色油状の液體にして、一般 Bz-テトラヒドロヒノリン類に共通なる臭氣を有し、總論附表の如き性質を有す。

ハロゲン水素酸鹽は甚だ水に可易し。又金、白金、水銀等の金屬復鹽はよく析出す。

分析

1. 物質	0.1159g	CO ₂	0.3526g	H ₂ O	0.0953g	C	82.26%	H	9.12%
						理論數	„ 81.92%	„	9.32%

2. 物質	0.1201g	N	9.8cc (762mm, 29°)				8.82%	理論數	8.69%
-------	---------	---	--------------------	--	--	--	-------	-----	-------

b. 鹽酸鹽 $C_{11}H_{15}N \cdot ClH$

鹽基を鹽酸にて中和、濃縮するときは放線狀に集まる針狀結晶として析出す。水に甚だ溶解し易し。229-230° 附近にて昇華しつつ熔融す。

分析

物質 0.1221g AgCl 0.0876g Cl 17.74% 理論數 17.93%

c. ブローム水素酸鹽 $C_{11}H_{15}N \cdot BrH$

鹽基をブローム水素酸にて中和し、液を濃縮するときは結晶を析出す。無色細針狀結晶にして、233-234° にて熔融す。

分析

物質 0.1131g AgBr 0.0877g Br 32.99% 理論數 33.00%

d. 鹽化金複鹽 $C_{11}H_{15}N \cdot AuCl_3$

鹽基の鹽酸々性溶液に鹽化金溶液を加ふるときは水に難溶性なる黄色不整形多面體結晶となり析出す。アルコールに幾分溶解し易く、これより析出するときは芝狀に集まる短針形の結晶をなす。148° に熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1016g Au 0.0401g = 39.46% 理論數 39.34%

e. 鹽化白金複鹽 $(C_{11}H_{15}N \cdot ClH)_2 \cdot PtCl_4 + 2H_2O$

鹽基の鹽酸々性水溶液に鹽化白金溶液を加ふるときは難溶性なる淡褐色短形柱狀の結晶となり析出す。259-260° にて分解す。2 分子の結晶水を含む。

分析

1. 物質(風乾) 0.1131g 100°, 減壓にて 0.0056g を失ひ恒量を得たり
 H_2O 4.95% 理論數 4.69%(結晶水 2 分子として)
2. 物質(無水) 0.1112g Au 0.0296g = 26.61% 理論數 26.65%

f. 鹽化水銀複鹽 $C_{11}H_{15}N \cdot ClH \cdot HgCl_2$

鹽基の鹽酸々性水溶液に昇汞溶液を加ふるときはよく析出す。水より再結晶し得。無色細針狀の結晶にして、208° にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1580g HgS 0.0780g Hg 42.56% 理論數 42.72%

g. ヨードメチラート $C_{11}H_{15}N \cdot CH_3J$

鹽基をヨードメチルと共に厚壁管中に封入し、水浴中にて約 20 分加熱するときは反應して内容は固結す。本品は甚だ潮解性にして、それがため良好なる結晶として製出する事困難なり。辛うじて檢し得たる熔融點は 123° 附近を示す。
 100°, 減壓にて恒量を得たるものにつきて分析を行ふに次の如し。

物質 0.1383g AgJ 0.1069g J 41.77% 理論數 41.88%

h. ピクラート $C_{11}H_{15}N.C_6H_2(NO_2)_3OH$

アルコールより黄色針状に析出す。179-180°にて熔融す。

分析

物質	0.0991g	CO ₂	0.1898g	H ₂ O	0.0406g	C	52.23%	H	4.58%
						理論數	„ 52.28%	„	4.65%

第八 2,4,6-Trimethyl-Bz-tetrahydrochinolin $C_{12}H_{17}N$

1. 製法

2,4,6-Trimethylchinolin の鹽酸鹽 6g に對してヨード水素酸 (比重 1.96) 20g 及赤燐 2g を採り、ボンベン管中に封入し、240° 附近にて 3-4 時間加熱す。冷後内容を検するに銅鐵様光輝ある黒褐色長板狀結晶にて充たされ、液は黄色透明なり。今内容は苛性曹達にてアルカリ性となし、水蒸氣蒸溜を行ふときは油狀の鹽基を蒸溜す。前記鹽酸鹽 24g を使用して粗製鹽基 14g 強を得たり。粗製鹽基は其沸騰點甚だ恒一にしてピクリン酸鹽を経て精製せるものゝ殆ど變はりなく、又粗製狀態に於て其稀鹽酸溶液は彼の 8-Methyl-Bz-tetrahydrochinolin の場合と異なり亞硝酸曹達にてニトロゾアミンを析出する事なし。精製にはピクリン酸鹽を経るを便す。

2. 性質

a. 鹽基

精製鹽基は無色油狀の液體にして、寒劑にて強く冷却するときは固結す。總論附表の如き物理的性質を有す。

分析

1. 物質	0.0780g	CO ₂	0.2354g	H ₂ O	0.0673g	C	82.30%	H	9.65%
						理論數	„ 82.21%	„	9.77%
2. 物質	0.1118g	N	8.0cc (766mm, 12°)	= 8.5%		理論數	8.00%		

b. 鹽酸鹽 $C_{12}H_{17}N.ClH$

鹽基を無水アルコールに溶解し、之れにアルコール製鹽酸を加ふるときは結晶となり沈澱す。斯くして得たる結晶をアルコールに溶解し、之れにエーテルを加へ析出せしむるときは容易に精製し得。無色六角板狀の結晶にして、178°にて熔融す。

分析

物質	0.0899g	ClAg	0.0600g	Cl	16.51%	理論數	16.69%		
----	---------	------	---------	----	--------	-----	--------	--	--

c. ブローム水素酸鹽 $C_{12}H_{17}N.BrH$

鹽基をブローム水素酸にて中和し、蒸發して得たる結晶をアルコールに溶解し、之れにエーテルを加ふるときは無色の長き柱形針狀となり析出す。186°にて熔融し、水に溶解し易し。

分析

物質 0.6919g BrAg 0.0667g Br 30.88% 理論數 31.20%

d. 鹽化金複鹽 $C_{12}H_{17}N \cdot ClH \cdot AuCl_3$

鹽基の鹽酸鹽水溶液に鹽化金溶液を加ふるときは水に難溶性なる黄色細針狀の結晶として析出す。153°にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1061g Au 0.0407g = 38.36% 理論數 38.27%

e. 鹽化白金複鹽 $(C_{12}H_{17}N \cdot ClH)_3 \cdot PtCl_4$

鹽基の鹽酸鹽水溶液に鹽化白金溶液を加ふるときは淡褐色長板狀の結晶となり析出す。219°にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.0995g Pt 0.0254g = 25.52% 理論數 25.6%

f. ビクリン酸鹽 $C_{12}H_{17}N \cdot C_6H_5(NO_2)_3OH$

鹽基をアルコール溶液となし、之れにビクリン酸のアルコール溶液を加ふるときは析出す。アルコールより再結晶するときは兩端腐蝕せられたる黄色長方形板狀の結晶となり析出し、151°にて熔融す。

分析

物質 0.0858g CO_2 0.1687g H_2O 0.0380g C 53.62% H 4.95%
理論數 „ 53.44% „ 4.93%

g. ヨードメチラート $C_{12}H_{17}N \cdot CH_3J$

鹽基約 0.5g を少過剰のヨードメチールと共に厚壁試験管中に封入し、水浴中にて約 20 分間加熱するときは内容は全く固結するに至る。結晶はアルコール溶液となし、之れにエーテルを加へ析出せしめ精製し得。帶黃白色、小なる多面體顆粒狀結晶にして、198°にて熔融す。

分析

物質 0.1071g A·J 0.0790g J 39.86% 理論數 40.02%

第九 2,4,7-Trimethyl-Bz-tetrahydrochinolin $C_{12}H_{17}N$

1. 製法

2,4,7-Trimethylchinolin のヨード水素酸鹽 8.5g をヨード水素酸 20g 及赤燐 2g にて還元する事前記 2,4,6-Trimethyl-Bz-tetrahydrochinolin の製造の場合と同様に行ひたり。反應後内容物の外觀は全く前記の場合と同じ。前記沃度水素酸鹽 25.5g を使用し、粗製鹽基 9g 餘を得たり。粗製鹽基も亦沸騰點恒一にして夾雜物なきを思はしむ。ビクリン酸鹽を経て精製するを便す。

2. 性質

a. 鹽基

精製鹽基は無色透明の液體にして、冬期は固結す。總論附表の如き物理的性質

を有す。

分析

1. 物質 0.1468g CO_2 0.4449g H_2O 0.1251g C 82.65% H 9.53%

理論數 „ 82.21% „ 9.77%

2. 物質 0.0931g N 6.4cc (768mm, 11.5°) = 8.22% 理論數 8.00%

b. 鹽酸鹽 $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N} \cdot \text{ClH}$

比較的水に溶解し易きを以て、鹽基をエーテルに溶解し之れにアルコール製鹽酸を加へ析出せしむる方法により製出するをよこす。斯くして製出したるものは短柱狀の結晶にして、 191° にて熔融す。

分析

物質 0.1057g AgCl 0.0703g Cl 16.45% 理論數 16.69%

c. ブローム水素酸鹽 $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N} \cdot \text{BrH}$

前記 2,4,6-Trimethyl-Bz-tetrahydrochinolin の場合と同様なる方法にて製出し得。無色の厚き菱形板狀の結晶にして、 178° にて熔融し、水に溶解し易し。

分析

物質 0.1121g BrAg 0.0820g Br 31.12% 理論數 31.20%

d. 鹽化金復鹽 $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N} \cdot \text{ClH} \cdot \text{AuCl}_3$

鹽基の鹽酸鹽水溶液に鹽化金溶液を加ふるときは水に難溶性なる黄色細針狀の結晶として沈澱す。 139° にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.0940g Au 0.0362g = 38.51% 理論數 38.27%

e. 鹽化白金復鹽 $(\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N} \cdot \text{ClH})_2 \cdot \text{PtCl}_4$

鹽基の鹽酸鹽水溶液に鹽化白金溶液を加ふるときは淡褐色微細なる結晶性沈澱として析出す。水に難溶性にして、水より再結晶せしめたるものは微細の長方形板狀となり析出し、 228° にて分解し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.0772g Pt 0.0196g = 25.38% 理論數 25.63%

f. ピクリン酸鹽 $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N} \cdot \text{C}_6\text{H}_2(\text{NO}_2)_3\text{OH}$

前記 2,4,6-Trimethyl-Bz-tetrahydrochinolin の場合の如く製出し、精製にはアルコールより再結晶せしむるをよこす。黄色長方形板狀の結晶にして、 137° に於て熔融す。

分析

物質 0.0631g CO_2 0.1235g H_2O 0.0284g C 53.37% H 5.02%

理論數 „ 53.44% „ 4.98%

g. ヨードメチラート $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N} \cdot \text{CH}_3\text{J}$

鹽基約 0.5g に約 2cc のヨードメチールを混じ、管中に封入し、水浴中にて約 20 分間加熱し、固結せる内容をアルコール又は水より再結晶し精製す。他の同族體の夫れに比しアルコール又は水に難溶なり。帶黃白色多面體顆粒狀の結晶にして、 $210-211^{\circ}$ にて熔融す。

分析

物質 0.0877g AgJ 0.0649g J 39.89% 理論數 40.02%

第十 2,4,8-Trimethyl-Bz-tetrahydrochinolin $C_{12}H_{17}N$

1. 製法

2,4,8-Trimethylchinolin のヨード水素酸鹽 8.5g をヨード水素酸 20g 及赤燐 2g にて還元する事前記 2,4,6-, 2,4,7-Trimethyl-Bz-tetrahydrochinolin の製造の場合と全く同様に行ひたり。反應後に於ける管の内容物は其外觀前記兩種の場合と同一。

前記ヨード水素酸鹽 25.5g を原料となし、7g 強の粗製鹽基を得たり。精製はピクリン酸鹽を経て行ふを便す。

2. 性質

a. 鹽基

精製鹽基は無色透明油狀にして、總論附表の如き物理的性質を有す。

分析

1. 物質 0.1197g CO_2 0.3623g H_2O 0.1047g C 82.47% H 9.78%
理論數 „ 82.21% „ 9.77%

2. 物質 0.1185g N 8.4cc(766mm, 11°) = 8.47% 理論數 8.00%

b. 鹽酸鹽 $C_{12}H_{17}N \cdot ClH$

水に甚だ溶解し易きを以て製出に際しては鹽基のエーテル溶液にアルコール製鹽酸を加ふるときは無色斜方柱狀の結晶として析出す。 174° にて熔融す。

分析

物質 0.1135g $ClAg$ 0.0747g Cl 16.28% 理論數 16.69%

c. ブローム水素酸鹽 $C_{12}H_{17}N \cdot BrH$

鹽基をブローム水素酸にて中和し、蒸發して得たる結晶をアルコール溶液となし、エーテルを加へて析出せしむ。微細なる結晶性粉末にして、水に甚だ溶解し易く、 157° にて熔融す。

分析

物質 0.1199g $BrAg$ 0.0871g Br 30.91% 理論數 31.20%

d. 鹽化金複鹽 $C_{12}H_{17}N \cdot ClH \cdot AuCl_3$

鹽基の鹽酸々性溶液に鹽化金溶液を加ふるときは水に難溶性なる黃色針狀の結晶となり析出す。風乾せるものは 143° にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.0829g Au 0.0316g = 38.12% 理論數 38.27%

c. 鹽化白金複鹽 $(C_{12}H_{17}N.ClH)_2 \cdot PtCl_4$

鹽基の鹽酸々性水溶液に鹽化白金溶液を加ふるときは難溶性にして好んで羊齒葉狀に集まる細微なる四角板狀の結晶として析出す。219°にて分解し、結晶水を含みず。

分析

物質	0.0695g	Pt	0.0178g	Pt	25.61%	理論數	25.63%
----	---------	----	---------	----	--------	-----	--------

f. ピクリン酸鹽 $C_{12}H_{17}N.C_6H_5(NO_2)_3OH$

鹽基のアルコール溶液にピクリン酸のアルコール溶液を加へ放置するときは結晶として析出す。アルコールより再結晶せしものは黄色不正多面體顆粒狀結晶にして、144°にて熔融す。

分析

物質	0.1155g	CO ₂	0.2270g	H ₂ O	0.0505g	C	53.59%	H	4.88%
						理論數	„ 53.44%	„	4.93

g. ヨードメチラート $C_{12}H_{17}N.CH_3J$

前記諸種の場合と同様に行ひ製出し得。アルコールに甚だ溶解し易く、再結晶にはアルコールに溶解し之れにエーテルを加へて析出せしむる法によるを可す。斯くして得たるものは帶黄白色の短形柱狀結晶にして、137-138°にて熔融す。

分析

物質	0.1065g	AgJ	0.0789g	J	40.04%	理論數	40.02
----	---------	-----	---------	---	--------	-----	-------

第三節 メチール-Py-テトラヒドロヒノリン類

第一 2,7-Dimethyl-Py-tetrahydrochinolin $C_{11}H_{15}N$

1. 製法

2,7-Dimethylchinolin を15倍の無水アルコールに溶解し、2倍量の金屬ナトリウムを徐々に加へて還元を行ひ、先づ鹽酸々性にてアルコール分を蒸溜したる後、苛性曹達にてアルカリ性となし、水蒸氣蒸溜を行ふ。收得量良好にして、粗製狀態にて其原料たるヒノリンと同量なり。本四水素鹽基の製造に際し錫及鹽酸にて行ふ還元は第一編に記載せるが如く收得量甚だ不良にして、多量の錫を以て行ひしに拘はらず僅かに一部を還元し得るに過ぎず。粗製鹽基は鹽酸鹽を経て精製するを便す。

2. 性質

a. 鹽基

斯くして得たる精製鹽基は無色透明油狀にして、260-262°(761.8mm)にて沸騰し、總論附表の如き物理的性質を有す。

分析

1. 物質	0.1001g	CO ₂	0.3010g	H ₂ O	0.0814g	C	82.00%	H	9.09%
						理論數	„ 81.92%	„	9.32%

2. 物質 0.1020g N 7.9cc(765mm, 16°) = 9.04% 理論數 8.69%

b. 鹽酸鹽 $C_{11}H_{15}N \cdot ClH$

鹽基を鹽酸にて中和するときは良好に結晶す。無色の短形六角柱狀の結晶にして、水より再結晶し得。208°にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1030g AgCl 0.0746g Cl 17.91% 理論數 17.93%

c. ブローム水素酸鹽 $C_{11}H_{15}N \cdot BrH$

鹽基をブローム水素酸にて中和するときは良く結晶す。放線狀に集まる無色の六角板狀の結晶にして、水より再結晶し得べく、前記鹽酸鹽と同様 208°にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1093g BrAg 0.0846g Br 32.94% 理論數 33.00%

d. ヨード水素酸鹽 $C_{11}H_{15}N \cdot JH$

鹽基をヨード水素酸にて中和するときは結晶す。水に比較的溶解し難く、水よりよく再結晶し得。無色長板狀の結晶にして、184°にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1225g AgJ 0.0993g J 43.81% 理論數 43.91%

e. 鹽化白金複鹽 $(C_{11}H_{15}N \cdot ClH)_2 \cdot PtCl_4$

鹽基の鹽酸鹽水溶液に鹽化白金溶液を加ふるときは結晶性沈澱となり析出す。淡褐色斜方六面體の結晶にして、220°に於て分解し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.0841g Pt 0.0221g Pt 26.27% 理論數 26.61%

第二 2,4,6-Trimethyl-Py-tetrahydrochinolin $C_{12}H_{17}N$

1. 製法

本四水素鹽基の原料たる 2,4,6-Trimethylchinolin は實驗之部第一節第九に詳記せる方法によりて製出せり。之れを還元して標題の四水素鹽基となすには鹽基を 15 倍量の無水アルコールに溶解し、2 倍量の金屬ナトリウムを少量宛投入し、水浴温度にて還元を行ひ、先づ鹽酸を以て酸性となしアルコール分を蒸溜し、次で苛性曹達にてアルカリ性となし水蒸氣蒸溜を行ひ粗製鹽基を採取す。

粗製鹽基は之れを鹽酸にて中和するときは最初に難溶性にして累重せる六角長板狀の結晶を析出し、次で其母液より比較的溶解し易き厚き六角板狀の結晶を析出す。何れも水より良好に再結晶し得べし。今兩者を區別せんがため前者を A 鹽基の鹽酸鹽となし、後者を B 鹽基の鹽酸鹽とす。A・B 各々は數回再結晶を反覆したるに A は 243°にて熔融し、B は 181°にて熔融す。

2. 性質

a. 鹽基

A より遊離したる鹽基は無色固體にして、前記 R. Müller, Paula Merkel 兩氏の示せるが如く 80° にて熔融し、 $265-266^{\circ}$ (758mm) にて沸騰す。本品は兩氏が 2,4,6-Trimethyl-Py-tetrahydrochinolin なり と記載せる物質なり。又 B 鹽より遊離したる鹽基は無色油狀の液體にして、 261.5° (762mm) にて沸騰し、總論附表の如き物理的性質を有す。

精製鹽基の收得量は大約 A 鹽基の 6 に對し、B 鹽基 4 の比を示す。

A・B 兩鹽基共に一般 Py-Tetrahydrochinolin の如く亞硝酸によりてニトロゾアミンを析出し、鹽化金溶液、アムモニアアルカリ性硝酸銀溶液を還元す。(Bz-Tetrahydrochinolin 類にありては此事なし。)

分析

A 鹽基 (R. Müller 氏等の記載にあるを以て略す)

B 鹽基

1. 物質 0.1336g CO_2 0.4012g H_2O 0.1135g C 81.89% H 9.37%
理論數 „ 82.11% „ 9.77%
2. 物質 0.1018g N 7.2cc(758mm, 18°) = 8.10% 理論數 8.60%

b. 鹽酸鹽 $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N} \cdot \text{ClH}$

鹽基 A の鹽酸鹽は前記の如く比較的水に溶解し難く、沸湯より再結晶するときは累重する六角長板狀の結晶となり析出し、 243° にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1158g AgCl 0.0781g Cl 16.68% 理論數 16.69%

c. B 鹽基の鹽酸鹽は A 鹽基の夫れに比し水に溶解し易きも、尚ほよく水より再結晶し得。厚き六角の板狀結晶にして、 181° にて熔融す。

分析

物質 0.1020g AgCl 0.0687g Cl 16.66% 理論數 16.69%

d. ブローム水素酸鹽 $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N} \cdot \text{BrH}$

A 鹽基をブローム水素酸にて中和するときは良く結晶す。水より再結晶し得べし。無色の不正六角板狀の結晶にして、 225° にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1051g BrAg 0.0770g Br 31.17% 理論數 31.20%

e. B 鹽基も亦ブローム水素酸にて中和するときはブローム水素酸鹽は無色の短かき四角柱狀の結晶として析出す。水より再結晶し得べく、 178° にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.0740g BrAg 0.0541g Br 31.23% 理論數 31.20%

f. ヨード水素酸鹽 $C_{12}H_{17}N \cdot JH$

A 鹽基をヨード水素酸にて中和するときは良く結晶す。水に難溶性にして、水より再結晶するときは無色長針狀の結晶をなし、 229° にて熔融し、結晶水を含まず分析

物質 0.0974g AgJ 0.0753g J 41.79% 理論數 41.87%

g. B 鹽基のヨード水素酸鹽は前記 A 鹽基の場合と同様に製出し得。冷水に溶解し難く、水より再結晶するときは無色多面體顆粒狀の結晶として析出し、 212° にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1301g AgJ 0.1003g J 41.67% 理論數 41.87%

第三 2,4,7-Trimethyl-Py-tetrahydrochinolin $C_{12}H_{17}N$

1. 製法

標題四水素鹽基の原料たる 2,4,7-Trimethylchinolin は實驗の部第一節第十に記せる如く製出せり。之を還元して四水素鹽基となすには 15 倍量の無水アルコール及 2 倍量の金屬ナトリウムにて還元する事前記 2,4,6-Trimethylchinolin の還元の場合の如く行ふ。斯くして得たる粗製鹽基は鹽酸鹽を経て精製せり。

2. 性質

a. 鹽基

遊離鹽基は無色油狀の液體にして、總論附表の如き物理的性質を有す。

分析

1. 物質 0.1689g CO_2 0.3285g H_2O 0.6927g C 82.27% H 9.59%
理論數 „ 82.21% „ 9.77%

2. 物質 0.1166g N 8.1c(762mm, 16°) = 8.30% 理論數 8.00%

b. 鹽酸鹽 $C_{12}H_{17}N \cdot ClH$

鹽基をエーテルに溶解し、之れにアルコール製鹽酸を加ふるときは結晶となり析出す。水より結晶するときは無色の方形六面體をなす。 248° にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1161g AgCl 0.0785g Cl 16.72% 理論數 16.69%

c. ブローム水素酸鹽 $C_{12}H_{17}N \cdot BrH$

鹽基をブローム水素酸にて中和するときは結晶す。水より再結晶するときは無色の尖頭六角柱狀の結晶となり析出す。 288° にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.0786g AgBr 0.0576g Br% 31.18% 理論數 31.20%

d. ヨード水素酸鹽 $C_{12}H_{17}N \cdot JH$

鹽基をヨード水素酸にて中和するときは結晶す。冷水に難溶性にして、沸湯より析出せしむるときは細長針狀の結晶となり析出す。214°にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1015g AgJ 0.0779g J 41.48g 理論數 41.87%

第四 2,4,8-Trimethyl-Py-tetrahydrochinolin $C_{19}H_{17}N$

1. 製法

標題四水素鹽基の原料たる 2,4,8-Trimethylchinolin は實驗の部第一章第十一に記せる如く製出せり。之れを還元して四水素鹽基となすには、アルコール溶液となし金屬ナトリウムにて還元する。事前記諸種の場合と同様に行ひ、粗製鹽基は鹽酸鹽を経て精製せり。

2. 性質

a. 鹽基

遊離鹽基は無色油狀の液體にして 260°-261°(759mm)にて沸騰し、總論附表の如き物理的性質を有す。鹽基性甚だ弱く、硫酸々性水溶液より水蒸氣蒸溜し得。

分析

1. 物質 0.0753g CO_2 0.2258g H_2O 0.0345g C 81.78% H 9.32%
理論數 „ 82.22% „ 9.7%

2. 物質 0.1034g N 7.7c (759mm, 19.2°) = 8.48% 理論數 8.40%

b. 鹽酸鹽 $C_{19}H_{17}N \cdot ClH$

鹽基を鹽酸にて中和するときは結晶す。水より再結晶するときは無色柱狀の結晶となり析出す。本鹽基は前記の如く鹽基性弱く、従つて鹽酸鹽の如きも再結晶に際し強鹽酸々性の溶液より行はされば鹽基は揮散する恐れあり。239°に於て熔融と同時に發泡昇華し、100°の水浴乾燥器中に於ても著しく揮散す。

分析

物質 0.0983g AgCl 0.0667g Cl 16.70% 理論數 16.69%

c. ブローム水素酸鹽 $C_{19}H_{17}N \cdot BrH$

鹽基をブローム水素酸にて中和するときは良く結晶す。水より再結晶するときは無色楔形の結晶となり析出す。221°にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.0863g BrAg 0.0629g Br 31.01% 理論數 31.20%

d. ヨード水素酸鹽 $C_{19}H_{17}N \cdot JH$

鹽基をヨード水素酸にて中和するときは結晶す。水に難溶性にして、沸湯より再結晶するときは無色梯形板狀の結晶となり析出す。213°にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.0988g AgJ 0.0758g J 41.43% 理論数 41.87%

以下第五乃至第十一に記載する Py-テトラヒドロキノリン類は既に文獻に記載あれど、第四節デカヒドロ化合物製出の原料として其製法性質の 大要を示す必要あるを以て、之れを次に略記す。尚著者は總論第六節に示すが如く各種ヒドロキノリン類の性質の比較に必要上是等 Py-テトラヒドロキノリン類の分子屈折を測定せり。總論第六節附表第四の如し。

第五 Py-Tetrahydrochinaldin

Dekahydrochinaldin の製造原料たる標題四水素鹽基の鹽酸鹽は下記 2 法の何れかにより製出し得。即ち 1 分の Chinaldin を 10-15 分の濃鹽酸(36%)及 3 分の錫と共に煮沸しつつ還元するか、又は 1 分の Chinaldin を 10-15 分の無水アルコールに溶解し、水浴上に加熱しつつ 2 分の金屬ナトリウムを以て還元す。斯くして得たる粗製鹽基は乾燥エーテルに溶解し、乾燥鹽酸瓦斯を通じ、析出する結晶を煮沸アルコールより再結晶す。無色の厚き六角板狀の結晶にして、136-137.5°にて熔融す。精製鹽基は無色の液體にして、246-248° (70.1 mm) にて沸騰す。

第六 6-Methyl-Py-tetrahydrochinolin

6-Methylchinolin の四水素化合物は次の 2 法の中何れかによりて製出し得。

(1) Bamberger, P. Wulz 氏等の方法¹⁾によりて、6-Methylchinolin 25g、濃鹽酸 280g、錫 75g との割合に採り、煮沸時還元し、然る後アルカリ性となし水蒸氣蒸留を行ひ、得たる鹽基を乾燥エーテルに溶解し、鹽酸瓦斯を通して鹽酸鹽を析出せしめ、煮沸アルコールより再結晶せしむ。長針狀結晶にして、189°にて熔融す。

(2) 鹽基を 15 倍量の無水アルコールに溶解せしめ、1.5-2 倍量の金屬ナトリウムを加へ、水浴温度にて還元し、先づ鹽酸々性にてアルコール分を蒸溜し去りたる後、苛性曹達にてアルカリ性となし、水蒸氣蒸留によりて粗製鹽基を得、前記の如く鹽酸鹽となす。精製鹽基は 38°にて熔融し、262.3° (712mm) にて沸騰す。²⁾

第七 7-Methyl-Py-tetrahydrochinolin

本四水素鹽基は其記載甚だ稀れにして、1912 年に W. König, G. A. Becker 兩氏³⁾は色素製造の原料として初めて之れを製出し、其沸騰點 143° (19mm) なる事及び鹽基の分析成績のみを記載し、他に何等示すところなかりき。1923 年 Julius Braun 氏⁴⁾は 7-Methylchinolin に接觸還元を行ひ、此四水素鹽基を製出し、鹽酸鹽の熔融點 175° なる旨を示せり。

著者はデカヒドロ鹽基の製造原料として前記ピクリン酸鹽より遊離したる鹽基(沸騰點 254.° 759mm)をアルコール溶液に於て金屬ナトリウムにて還元し、斯く

¹⁾ Doebner, Müller: B. **16**, 2467. ²⁾ B. **24**, 2066. ³⁾ Bamberger, Wulz: B. **24**, 2066

⁴⁾ J. pr. [2] **85**, 382. ⁵⁾ B. **56**, 1341.

して得たる粗製鹽基をエーテル溶液となし、アルコール製鹽酸を加へて鹽酸鹽を析出せしめ、アルコールより再結晶せしめ精製せり。斯くして製出したるものは無色六邊長板狀の結晶にして、好んで放線狀に集まり、 180° にて熔融す。

分析

物質 0.1266g AgCl 0.0983g Cl 19.20% 理論數 19.30%

第八 8-Methyl-Py-tetrahydrochinolin

本品は Eng. Bamberger, P. Wulz 氏等の方法¹⁾により 8-メチールヒノリンを鹽酸溶液に於て金屬錫にて還元するか又はアルコール溶液に於て金屬ナトリウムにて還元するか何れの方法にても良く目的を達し得べし。四水素鹽基の鹽酸鹽は六角板狀の結晶にして、 214° にて熔融す。精製鹽基は無色の液體にして、 $255-257^{\circ}$ (717mm)にて沸騰す。²⁾

第九 2,4-Dimethyl-Py-tetrahydrochinolin

本四水素鹽基は次の如く製出せり。即ち前項 2,4-Dimethylchinolin を 10-15 倍量のアルコールに溶解し、1.5 倍量の金屬ナトリウムを以て還元し、一般四水素鹽基製造の場合の如く處分す。斯くして原料たる Chinolin 體と略ほ同量の粗製還元鹽基を得。

四水素鹽基の鹽酸鹽は水より相當に結晶し得るも、製出の目的には粗製鹽基のアルコール溶液にアルコール製鹽酸を加ふるときは純粹の状態となり析出す。無色長柱狀の結晶にして、 $227-228^{\circ}$ にて熔融す。又遊離鹽基は無色透明の油狀液にして、 258° (755mm)にて沸騰す、原 2,4-デメチールヒノリンは錫及鹽酸による還元に對して甚だ抵抗強く、何等反應なきを以て本四水素體の製造にはナトリウム法によらざるべからず。

第十 2,6-Dimethyl-Py-tetrahydrochinolin

本品は實驗部第一節第六に記載せる 2,6-Dimethylchinolin を Doebner, Miller の法³⁾によりて錫及鹽酸にて還元するか又はアルコール溶液にて金屬ナトリウムにて還元する事前記諸例の如く行ひ製出し得。四水素鹽基の鹽酸鹽はよく水より再結晶し得。無色柱狀の結晶にして、 $180-183^{\circ}$ にて熔融す。又精製四水素鹽基は榴狀の塊にして、 $31-32^{\circ}$ にて熔融し、 267° にて沸騰す。

第十一 2,8-Dimethyl-Py-tetrahydrochinolin

本品は實驗部第一節第八に記載せる 2,8-Dimethylchinolin を前記 2,6-Dimethylchinolin の例に倣ひて錫及鹽酸の法又は金屬ナトリウムによる方法によりて製出し得。但し四水素鹽基の鹽酸鹽は比較的水に溶解し易きを以て、ヨード水素酸鹽となし、デカヒドロ化合物製出の原料となすをよしとす。ヨード水素酸鹽は無色にして兩端尖がれる六角短柱狀の結晶にして、 $192-193^{\circ}$ にて熔融す。精製鹽基は

1) B. **24**, 2061. 2) Bamberger, Wulz: B. **24**, 2061. 3) B. **16**, 2464.

無色油状にして、260-262° にて沸騰す。¹⁾

第四節 デカヒドロヒノリン類

第一 Dekahydrochinaldin $C_{10}H_{19}N$

1. 製法

(a) 前記四水素化合物鹽酸鹽 5.5g を沃度水素酸 (比重 1.96) 20g 及赤燐 2g と共にボンベン管中に封入し、230-240° に於て 3-4 時間加熱す。冷後管の内容は暗褐色泥状の物質の外、黄色透明の液上に少量に油状の浮遊物質を認む。内容は總論記載の如く處分し、粗製鹽基は鹽酸鹽 (熔融點 276-277°) を經て精製せり。四水素鹽基鹽酸鹽 33g を使用し、精製鹽基 12g 内外を得たり。

(b) 實驗の部第一節の 2-メチール-Bz-テトラヒドロヒノリンを無水アルコール溶液となし、計算量の約 3 倍の金屬ナトリウムを以て還元を行ひ、總論所載の如き方法にて處分するときは殆ど定量的の收得量を以て製出し得。

2. 性質

a. 鹽基

總論に記せし如く、Sabatier 氏は已に本鹽基を製出し、物理的性質並に 2-3 鹽類につきて記載するも、著者の試験せる結果と甚だ異なるを以て次に之れを記せん。精製鹽基は無色油状の液體にして、總論附表の如き物理的性質を有す。Sabatier 氏は本鹽基の鹽酸鹽は甚だ潮解性なるが如く記載するも、著者の試験するところによると、ハロゲン水素酸は一般に皆よく結晶し、鹽酸鹽の如きも決して潮解性ならず。金・白金復鹽も亦よく結晶し、白金復酸の如きも、Sabatier 氏記載の如く潮解性ならず。

分析

1. 物質 0.1010g CO_2 0.2904g H_2O 0.1116g C 78.41% H 12.30%
理論數 „ 78.34% „ 12.50%

2. 物質 0.1184g N 9.1cc(752mm, 14°) = 8.90% 理論數 9.14%

b. 鹽酸鹽 $C_{10}H_{19}N.ClH$

鹽基を鹽酸にて中和し、析出せる結晶を水又はアルコールより再結晶せしめ製出し得。無色菱形板状の結晶にして、282° に於て熔融す。結晶水を含まず。

分析

物質 0.1050g AgCl 0.0789g Cl 18.59% 理論數 18.68%

c. ブローム水素酸鹽 $C_{10}H_{19}N.BrH$

鹽基をブローム水素酸にて中和し、析出する結晶を水より再結晶せしめて精製す。無色六角板状の結晶にして、283° にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

¹⁾ Doeblner, Miller: B. **16**, 2464.

物質 0.181g AgBr 0.0859g Br 33.73% 理論數 34.12%

d. ヨード水素酸鹽 $C_{10}H_{19}N.JH$

鹽基をヨード水素酸にて中和するときは無色長針狀の結晶として析出す。比較的水に溶解し難く、水より再結晶し精製し得。275° に於て褐變熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1427g AgJ 0.1182g J 44.77% 理論數 45.15%

e. 鹽化金複鹽 $C_{10}H_{19}N.ClH.AuCl_3$

鹽基の鹽酸鹽水溶液に鹽化金溶液を加ふるときは黄色方形板狀の結晶となりて析出す。152° にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1482g Au 0.0589g = 39.75% 理論數 39.97%

f. 鹽化白金複鹽 $(C_{10}H_{19}N.ClH)_2.PtCl_4$

鹽基の鹽酸鹽水溶液に鹽化白金溶液を加ふるときは暫時の後結晶性となり沈澱す。淡褐色六角板狀の結晶にして、沸湯より再結晶し得。水には比較的溶解し易きも、決して Sabatier 氏の記載の如く潮解性ならず。228° にて分解し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1132g Pt 0.0306g = 27.03% 理論數 27.25%

第二 6-Methyldecahydrochinolin $C_{10}H_{19}N$

1. 製法

前節にて得たる Py-テトラヒドロ化合物の鹽酸鹽 5.5g, ヨード水素酸(比重1.96) 20g, 赤燐 2g をボンベン管中に封入し、230-240° に於て 3-4 時間加熱反應せしむ。冷後管の内容を検するに、暗褐色泥狀の物質にて充たされ、且つ黄色透明の液上に少量に油狀の物質(炭化水素)の存在するを見る。今内容は總論に記載せる如く處分し、粗製の鹽基は鹽酸鹽(熔融點 265°)を経て精製せり。四水素鹽基の鹽酸鹽 33g を使用して精製鹽基約 11g を得たり。

2. 性質

a. 鹽基

斯くして製出せる遊離鹽基は常温に於ては無色の針狀結晶をなし、一般 Dekahydrochinolin 類に共通なる脂肪族アミン様の臭氣を有し、67° にて熔融し、213° (760mm) にて沸騰す。ハロゲン水素酸鹽、金屬複鹽共に皆よく結晶す。

分析

1. 物質 0.0942g CO_2 0.2708g H_2O 0.1050g C 78.40% H 12.49%
理論數 „ 78.34% „ 12.50%

2. 物質 0.1113g N 9cc(754.5mm, 9°) = 9.61% 理論数 9.14%

b. 鹽酸鹽 $C_{10}H_{19}N \cdot ClH$

鹽基を鹽酸にて中和するときは良く結晶す。水又はアルコールより再結晶し精製し得。水より析出せるものは無色六角板狀の結晶にして、アルコールより析出せるものは輻狀に集まる針狀結晶をなす。235° に於て熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1715g AgCl 0.1291g Cl 18.62% 理論数 18.68%

c. ブローム水素酸鹽 $C_{10}H_{19}N \cdot BrH$

鹽基をブローム水素酸にて中和するときは良く結晶す。水又はアルコールより再結晶し得べく、水より析出せしめたるものは無色長方形板狀の結晶にして、246° にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1522g BrAg 0.1220g Br 34.10% 理論数 34.13%

d. ヨード水素酸鹽 $C_{10}H_{19}N \cdot JH$

鹽基をヨード水素酸にて中和するときはよく結晶す。水又はアルコールより再結晶し得。無色長針狀の結晶にして、213° にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1223g AgJ 0.1030g J 45.07% 理論数 45.15%

e. 鹽化金複鹽 $C_{10}H_{19}N \cdot ClH \cdot AuCl_3$

鹽基の鹽酸鹽水溶液に鹽化金溶液を加ふるときは結晶性となり沈澱す。鹽酸々性の水より再結晶するときは黄色短柱狀の結晶となり、119° にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1651g Au 0.0657g = 39.79% 理論数 39.98%

f. 鹽化白金複鹽 $(C_{10}H_{19}N \cdot ClH)_2 \cdot PtCl_4 + 2H_2O$

鹽基の鹽酸鹽水溶液に鹽化白金溶液を加ふるときは結晶となり沈澱す。淡褐色長板狀の結晶にして、182° に於て分解す。本鹽は次の分析成績により 2 分子の結晶水を含む事を知る。

1. 物質 0.1323g Pt 0.0341g = 25.69% 理論数 25.89% (結晶水 2 分子を含むものとして)

2. 物質 0.1056g 100°, 減壓に於て 0.0050g を失ひ恒量を得たり。
H₂O 4.73% 理論数 4.79% (結晶水 2 分子として)

第三 7-Methyldecahydrochinolin $C_{10}H_{19}N$

1. 製法

前記四水素鹽基の鹽酸鹽 5.5g, ヨード水素酸(比重 1.96) 20g, 赤燐 2g をボン

ベン管に封入し、230-240° に於て 3-4 時間加温反應せしむ。冷後内容物は總論に記載せるが如き方法によりて處分し、粗製鹽基はヨード水素酸鹽(熔融點 195°)を経て精製せり。此還元反應に於て鹽酸鹽 33g を使用し、精製還元鹽基 10g 弱並に 7g 強の副生鹽基(ヘギザヒドロ鹽基を主成分となし、少量に反應に漏れたる四水素鹽基を含む)を得たり。

2. 性質

a. 鹽基 $C_{10}H_{19}N$

精製鹽基は無色油狀の液體にして、一般デカヒドロ鹽基に共通なる臭氣を有し、總論附表の如き物理的性質を有す。

本鹽基のハロゲン水素酸鹽は皆水に溶解し易く、金、白金複鹽も亦結晶し易からざる傾向を有す。

分析

1. 物質 0.1622g CO_2 0.4642g H_2O 0.1750g C 78.05% H 12.02%
理論數 „ 78.34% „ 12.50%

2. 物質 0.0813g N 6.5cc(765mm, 13°) = 9.46% 理論數 9.14%

b. 鹽酸鹽 $C_{10}H_{19}N \cdot ClH$

本鹽は甚だ水に溶解し易く、それがため水より結晶せしめて製出する事困難なり。製出法としては鹽基を鹽酸にて中和し、蒸發して完全に水分を去り、アルコールに溶解し、之れにエーテルを加へて析出せしむるときは放線狀に集まる無色の小針狀結晶として析出す。231° にて褐變熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.0918g AgCl 0.0684g Cl 18.43% 理論數 18.68%

c. ブローム水素酸鹽 $C_{10}H_{19}N \cdot BrH$

本鹽も亦前記鹽酸鹽と同じく水に溶解し易く、製出には鹽基をブローム水素酸にて中和し、蒸發して得たる結晶性殘渣をアルコールに溶解し、之れにエーテルを加へて析出せしむるときは無色の四角板狀の結晶となりて析出す。229-230° にて熔融す。

分析

物質 0.0843g AgBr 0.0674g Br 34.02% 理論數 34.13%

d. ヨード水素酸鹽 $C_{10}H_{19}N \cdot JH$

鹽基をヨード水素酸にて中和するときには結晶す。斯くして得たる結晶は前記ブローム水素酸鹽と同様な方法にて精製す。無色長針狀の結晶にして、195° にて熔融す。水に比較的溶解し易きも、前記鹽酸鹽、ブローム水素酸鹽に比すれば幾分結晶し易し。

分析

物質 0.1002g AgJ 0.0332g J 44.88% 理論數 45.15%

e. 鹽化金複鹽 $C_{10}H_{19}N.CIH.AuCl_3$

本複鹽は甚だ熔融し易く、それがため鹽基の鹽酸鹽溶液に鹽化金溶液を加ふるときは常に油狀となり析出し、容易に結晶し難く、稀に結晶する事あるも融解し易きがため結晶形を保ちつつ分離する事困難なり。

f. 鹽化白金複鹽 $(C_{10}H_{19}N.CIH)_2.PtCl_4$

鹽基の鹽酸鹽水溶液に鹽化白金溶液を加ふるに常に飴狀に析出し結晶せず。今飴狀物質の恒量を得たるものに就き分析を行ふに次の如し。

物質 0.1091g Pt 0.0295g = 27.03% 理論數 27.25%

第四 8-Methyldecahydrochinolin $C_{10}H_{19}N$

1. 製法

前項四水素鹽基の鹽酸鹽 5.5g, ヨード水素酸 (比重 1.96) 20g 及赤燐 2g をボンベン管中に封入し、230°-240° に於て3-4時間加熱反應せしむ。冷後内容物は外見前記 6-Methylchinolin と全く同じ。今之れを總論記載の方法に従つて處分し。粗製鹽基はヨード水素酸鹽 (熔融點 237.5°) を經て精製せり。四水素鹽基鹽酸鹽 33g を原料となし、精製鹽基 9g 餘を得たり。副産物として比較的多量 (約 5g) の低級加水素體を得たり。

2. 性質

a. 鹽基

精製鹽基は無色の油狀體にして、總論附表の如き物理的性質を有す。

本鹽基のハロゲン水素酸鹽は結晶するも、一般に甚だ溶解し易し。

分析

1. 物質 0.1421g CO_2 0.4076g H_2O 0.1570g C 78.22% H 12.30%
理論數 „ 78.34% „ 12.50%

2. 物質 0.1178g N 9.2cc(765mm, 11.5°) = 9.31% 理論數 9.14%

b. 鹽酸鹽 $C_{10}H_{19}N.CIH$

鹽基を鹽酸にて中和するときは結晶として析出するも、本鹽は甚だ水に溶解し易きを以て次の方法によりて製出するをよしとす。即ち鹽基を乾燥エーテルに溶解し、アルコール製鹽酸を加へて放置するときは結晶となり析出するを以て、集めてアルコールに溶解し、之れにエーテルを加へて再び析出せしむ。短き無色柱狀の結晶にして、249° にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1150g AgCl 0.0868% Cl 18.67% 理論數 18.68%

c. ブローム水素酸鹽 $C_{10}H_{19}N.BrH$

鹽基をブローム水素酸にて中和するときは針狀の結晶となり析出す。水に溶解

し易きを以て、精製の目的にはアルコールより再結晶するをよしす。此場合にも針狀結晶となりて析出す。280.5°にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1195g BrAg 0.0958g Br 34.11% 理論數 34.13%

d. ヨード水素酸鹽 $C_{10}H_{19}N \cdot JH$

鹽基をヨード水素酸にて中和するときは極めて小形なる針狀結晶となり析出す。水又はアルコールより再結晶し得。267.5°にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1147g AgI 0.0951g J 44.81% 理論數 45.15%

e. 鹽化金複鹽 $C_{10}H_{19}N \cdot ClH \cdot AuCl_3$

鹽基の鹽酸鹽水溶液に鹽化金溶液を加ふるときは初め油滴となりて析出し、後結晶す。鹽酸々性の水より再結晶を行ふときは黄色多面體顆粒狀の結晶となり析出す。143-144°にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1543g Pt 0.0617g = 39.98% 理論數 39.98%

f. 鹽化白金複鹽 $(C_{10}H_{19}N \cdot ClH)_2 \cdot PtCl_4$

鹽基の鹽酸鹽水溶液に鹽化白金溶液を加へて放置するときは長き淡褐色の柱形針狀となり析出す。187°にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1035g Pt 0.0231g = 27.15% 理論數 27.25%

第五 2,4-Dimethyldekahydrochinolin $C_{11}H_{21}N$

1. 製法

前項四水素鹽基の鹽酸鹽 5.9g, ヨード水素酸 (比重 1.96) 20g, 赤燐 2g をボンベン管中に封入し、230-240°にて3-4時間反應せしめ、内容は總論所載の如く處分し、粗製鹽基はブローム水素酸鹽 (熔融點 266°) を經て精製す。四水素鹽基の鹽酸鹽 36g を使用して精製鹽基約 9g 強を得たり。

2. 性質

a. 鹽基

鹽基は無色透明油狀の液にして、總論附表の如き物理的性質を有す。

分析

1. 物質 0.0999g CO_2 0.2903g H_2O 0.1105g C 79.38% H 12.31%
理論數 „ 79.04% „ 12.58%

2. 物質 0.1318g N 9.0cc (758mm, 13°) = 8.00% 數理論 8.7%

ハロゲン水素酸鹽並に金、白金複鹽共に良く結晶す。

b. 鹽酸鹽 $C_{11}H_{21}N \cdot ClH$

鹽基を鹽酸にて中和するときは甚だ良く結晶す。水又はアルコールより再結晶し得。水より結晶するときは放射状に集まる無色針状の結晶となり析出す。247°にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1099g AgCl 0.0773g Cl 17.40% 理論數 17.40%

c. ブローム水素酸鹽 $C_{11}H_{21}N.BrH$

鹽基をブローム水素酸にて中和するときは良く結晶す。水より再結晶し得べく、無色の長き六邊形板状となり析出す。266°にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1127g AgBr 0.0852g Br 32.16% 理論數 32.20%

d. ヨード水素酸鹽 $C_{11}H_{21}N.JH$

鹽基をヨード水素酸にて中和するときはよく結晶す。水より再結晶するときは無色の柱形針状をなし析出し、244°にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1110g AgJ 0.0882g J 42.94% 理論數 43.01%

e. 鹽化金複鹽 $C_{11}H_{21}N.ClH.AuCl_3$

鹽基の鹽酸鹽水溶液に鹽化金溶液を加ふるときは物め油状に析出し、放置するときは黄色六角板状の結晶となる。139-140°にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.0974g Au 0.0377g = 33.70% 理論數 33.87%

f. 鹽化白金複鹽 $(C_{11}H_{21}N.ClH)_2.PtCl_4 + 2H_2O$

鹽基の鹽酸水溶液に鹽化白金溶液を加ふるときは淡褐色多面體顆粒状の結晶となり沈澱す。2分子の結晶水を含み、229°にて分解す。

分析

物質 (風乾) 0.1295g 100°, 減壓に於て 0.0059g を失ひ恒量を得たり。

H_2O 4.55% 理論數 4.61% (結晶水2分子として)

Pt 0.0322g = 24.86% 理論數 25.01%

第六 2,6-Dimethyldekahydrochinolin $C_{11}H_{21}N$

1. 鹽基の製法

前項四水素鹽基の鹽酸鹽を沃変水素酸及赤燐と共に還元する事前記 2,4-Dimethyldekahydrochinolin の製出と全く同様に行ひ、鹽基はブローム水素酸鹽(熔融點 200°)を経て精製せり。四水素鹽基の鹽酸鹽 36g を原料となし精製鹽基 8g 強を得たるに過ぎず。Bz-テトラヒドロ鹽基を原料として行ふときは畧定量的に行はる。

2. 性質

a. 鹽基

精製鹽基は常溫に於て無色油狀をなせども、冬期は固結し、總論附表の如き物理的性質を有す。ハロゲン水素酸鹽は一般によく結晶す。

分析

1. 物質 0.0885g CO_2 0.2556g H_2O 0.0992g C 78.76% H 12.55%

理論數 „ 79.04% „ 12.58%

2. 物質 0.0999g N 7.3cc(762mm, 14°) = 8.57% 理論數 8.37%

b. 鹽酸鹽 $\text{C}_{11}\text{H}_{21}\text{N}.\text{ClH}$

鹽基を鹽酸にて中和するときは良く結晶す。水より再結晶せしめたるものは無色の菱形又は六邊形の板狀にして、278°にて褐變熔融す。

分析

物質 0.1056g AgCl 0.0732g Cl 17.15% 理論數 17.40%

c. ブローム水素酸鹽 $\text{C}_{11}\text{H}_{21}\text{N}.\text{FrH}$

鹽基をブローム水素酸にて中和するときは良く結晶す。水又はアルコールより再結晶し得。無色短柱狀の結晶にして、290°にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1304g AgBr 0.0985g Br 32.14% 理論數 32.20%

d. ヨード水素酸鹽 $\text{C}_{11}\text{H}_{21}\text{N}.\text{JH}$

鹽基をヨード水素酸にて中和するときは結晶す。水より再結晶し得べく、無色針狀の結晶にして、221°にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1466g AgJ 0.1165g J 42.95% 理論數 43.01%

e. 鹽化金複鹽 $\text{C}_{11}\text{H}_{21}\text{N}.\text{ClH}.\text{AuCl}_3$

常に油狀に析出し、永く放置するも結晶さして得難し。

f. 鹽化白金複鹽 $(\text{C}_{11}\text{H}_{21}\text{N}.\text{ClH})_2.\text{PtCl}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

鹽基の鹽酸鹽水溶液に鹽化白金溶液を加ふるときは八面體の結晶となり析出す。239°にて分解す。本鹽は2分子の結晶水を含ます。

分析

物質 0.0810g 100°, 減壓に於て 0.0037g を失ひ恒數を得たり。

H_2O 4.57% 理論數 4.61%(結晶水2分子として)

Pt 0.0201g = 24.81% 理論數 25.01%

第七 2,7-Dimethyldecahydrochinolin $\text{C}_{12}\text{H}_{21}\text{N}$

1. 製法

2,7-Dimethyl-Py-tetrahydrochinolin の鹽酸鹽 5.9g に對してヨード水素酸(比重 1.96) 20g、赤磷 2g を以て還元する事前記諸種の場合と同様に行ふか或は前節 Bz-

テトラヒドロ化合物をアルコール溶液にて金属ナトリウムを以て還元を行ひ製出し得。前者に於ては鹽酸鹽 36g を原料とし鹽基約 10g を得たり。粗製鹽基はヨード水素酸鹽を経て精製するを便す。

2. 性質

a. 鹽基

精製鹽基は常温にては無色透明の油狀をなせしも、冬期は固結し、總論附表の如き物理的性質を有す。ハロゲン水素酸鹽は皆よく結晶するも、金屬複鹽は結晶良好ならず。

分析

1. 物質 0.1335g CO_2 0.3358g H_2O 0.1496g C 78.81% H 12.56%

理論數 „ 79.04% „ 12.58%

2. 物質 0.0808g N 6.2cc(761mm, 15°) = 8.82% 理論數 8.37%

b. 鹽酸鹽 $\text{C}_{11}\text{H}_{21}\text{N} \cdot \text{ClH}$

鹽基を鹽酸にて中和するときは良く結晶す。比較的水に溶解し易きを以て再結晶にはアルコールよりするを便す。水より析出せしものは無色の菱形又は不正六邊形の板狀結晶にして、275° にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1121g AgCl 0.0779g Cl 17.19% 理論數 17.40%

c. ブローム水素酸鹽 $\text{C}_{11}\text{H}_{21}\text{N} \cdot \text{BrH}$

鹽基をブローム水素酸にて中和するときは無色の長形六角板狀の結晶となり析出す。水又はアルコールより再結晶し得。264° に於て熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.0990g AgBr 0.0742g Br 31.89% 理論數 32.20%

d. ヨード水素酸鹽 $\text{C}_{11}\text{H}_{21}\text{N} \cdot \text{JH}$

鹽基をヨード水素酸にて中和するときは無色針狀の結晶となりて析出す。水又はアルコールより再結晶し得。219° にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1163g AgJ 0.0873g J 42.76% 理論數 43.01%

e. 鹽化金複鹽 $\text{C}_{11}\text{H}_{21}\text{N} \cdot \text{ClH} \cdot \text{AuCl}_3$

鹽基の鹽酸鹽水溶液に鹽化金溶液を加ふるときは常に油滴となりて析出し、結晶し難し。

f. 鹽化白金複鹽 $(\text{C}_{11}\text{H}_{21}\text{N} \cdot \text{ClH})_2 \cdot \text{PtCl}_4$

鹽基の鹽酸鹽水溶液に鹽化白金を加ふるときは初め軟潤の塊となり析出し、放置するときは固結し結晶性粉末となる。再結晶を行ふに常に無晶形に析出し、結晶形明瞭ならず。183-184° にて熔融し、其後温度の上昇と共に漸時分解するも、

鋭敏なる分解點を示さず。2 分子の結晶水を含む。

分析

物質 0.1278g	100°, 減壓に於て 0.0056g を失ひ恒量を得たり
	H ₂ O 4.38% 理論數 4.61%
	Pt 0.0316g = 24.72% 理論數 25.01%

第八 2,8-Dimethyldekahydrochinolin C₁₁H₂₁N

1. 製法

前項 2,7-デメチール化合物の場合と全く同様に行ひ製出し得。Py-四水素鹽基のヨード水素酸鹽 51g を原料となし、之を還元して鹽基 11g 餘を得たり。粗製鹽基はヨード水素酸鹽（熔融點 236°）を経て精製するを便す。

2 性質

a. 鹽基

精製鹽基は無色透明油狀にして、總論附表の如き物理的性質を有す。ハロゲン水素酸鹽は一般によく結晶するも、水にさけ易し。

分析

1. 物質 0.1468g	CO ₂ 0.4233g	H ₂ O 0.1637g	C 78.64%	H 12.47%
			理論數	„ 79.04% „ 12.58%
2. 物質 0.1001g	N 7.6cc(761.5mm, 15°)			= 8.86% 理論數 8.37%

b. 鹽酸鹽 C₁₁H₂₁N·ClH

本鹽は水に溶解し易く、それがため製出には鹽基をエーテルに溶解し之れにアルコール製鹽酸を加ふるときは細小なる柱狀結晶となり析出す。282° に於て黒變熔融す。結晶水を含まず。

分析

物質 0.0964g	AgCl 0.0367g	Cl 17.09%	理論數 17.40%
------------	--------------	-----------	------------

c. ブローム水素酸鹽 C₁₁H₂₁N·BrH

鹽基をブローム水素酸にて中和するときは直に細小なる無色の紡錘形結晶となり析出す。水よりよく再結晶し得。252° にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.0787g	AgBr 0.0592g	Br 32.00%	理論數 32.21%
------------	--------------	-----------	------------

d. ヨード水素酸鹽 C₁₁H₂₁N·JH

鹽基をヨード水素酸にて中和し、析出する結晶を水又はアルコールより再結晶せしめて精製す。無色の細小柱狀結晶にして、236° にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1136g	AgJ 0.0904g	J 43.01%	理論數 43.01%
------------	-------------	----------	------------

e. 鹽化金複鹽 C₁₁H₂₁N·ClH·AuCl₃

鹽基の鹽酸鹽水溶液に鹽化金溶液を加ふるときは初め油狀に析出し、直に結晶す。黃色紡錘狀の結晶にして、 185° にて熔融し、結晶水を含みます。

分析

物質 0.1003g Au 0.0372g = 38.88% 理論數 38.87%

f. 鹽化白金複鹽 $(C_{11}H_{21}N, ClH)_2, PtCl_4$

Dekahydrochinolin 類を通覽するに其多くは白金複鹽が金複鹽に比して結晶し易き傾向を有するに拘はらず、本鹽基に於ては前記の如く金複鹽は甚だ良好に結晶析出するに反し、白金複鹽は甚だ水に溶解し易く、結晶して製出する事困難なり。

第九 2,4,6-Trimethyldekahydrochinolin $C_{12}H_{23}N$

1. 製法

2,4,6-Trimethyl-Py-tetrahydrochinolin (A) の鹽酸鹽(實驗の部第三節第二) 5.7gをヨード水素酸(比重 1.96) 20g, 赤燐 2g と共にボンベン管中に封入し、 230° - 240° にて3-4時間加熱反應せしむ。内容物は總論に記載せる如き方法にて處分したり。四水素鹽基鹽酸鹽 22.8g を使用し、粗製鹽基約 13g を得たり。

2. 性質

a. 鹽基

後段鹽酸鹽より遊離せる鹽基は無色透明油狀の液にして、總論附表の如き物理的性質を有す。

ハロゲン水素酸鹽中鹽酸鹽を除く外は結晶して製出する事困難なり。又白金複鹽は結晶するも、金複鹽は油狀に析出す。

分析

1. 物質 0.1523g CO_2 0.4428g H_2O 0.1706g C 79.29% H 12.55%
理論數 „ 79.47% „ 12.79%

2. 物質 0.0987g N 6.75cc(761.5mm, 15.5°) = 7.96% 理論數 7.73%

b. 鹽酸鹽 $C_{12}H_{23}N, ClH$

鹽基を鹽酸にて中和し、鹽酸及水分を完全に揮散せしめたる後、乾燥器中に放置するときは結晶性の塊となる。此物を水分を避けつつアルコールに溶解し、之れにエーテルを加ふるときは白色絮狀の沈澱となり析出す。 250° 附近にて褐變し初め、 263° にて熔融す。水に甚だ溶解し易し。

分析

物質 0.1012g AgCl 0.0659g Cl 16.09% 理論數 16.28%

c. ブローム水素酸鹽 $C_{12}H_{23}N, BrH$

鹽基をブローム水素酸にて中和し、過剰のブローム水素及水分を完全に揮散せしめたる後、永く硫酸乾燥器中に放置するに依然鉛様の状態を存し結晶さなし難し。水に甚だ溶解し易し。今此物質の恒量を得たるものにつきて分析を行ふに

次の如し。

物質 0.0968g AgBr 0.0992g Br 30.41% 理論数 30.48%

d. ヨード水素酸鹽 $C_{12}H_{23}N \cdot HI$

本鹽は水に難溶性なれども、甚だ融解し易く、それがため鹽基をヨード水素酸にて中和するときは油状となりて析出し、結晶となし難し。

e. 鹽化金複鹽 $C_{12}H_{23}N \cdot ClH \cdot AuCl_3$

鹽基の稀鹽酸溶液に鹽化金溶液を加ふるときは油滴となりて析出し、結晶し難し。

f. 鹽化白金複鹽 $(C_{12}H_{23}N \cdot ClH)_2 \cdot PtCl_4 + H_2O$

鹽基を稀鹽酸に溶解し、之れに鹽化白金溶液を加ふるときは時に微細なる結晶性沈澱として析出する事あるも、多くは淡褐色無晶形の塊となり析出す。風乾せるものは 85° 附近にて軟化し、結晶水の存在を思はしむ。 110° にて乾燥せるものは 192° – 193° にて液化す。

分析

物質 (風乾) 0.0937g 100° , 減壓にて 0.0020g を失ひ恒量を得たり。
 H_2O 2.13% 理論数 2.28% (結晶水 1 分子として)
 Pt 0.0231g = 25.19% 理論数 25.24%

第十 2,4,7-Trimethyldecahydrochinolin $C_{12}H_{23}N$

1. 製法

2,4,7-Trimethyl-Py-tetrahydrochinolin の鹽酸鹽(第3編 226頁)をヨード水素酸及赤磷にて還元する事前記 2,4,6-Trimethyldecahydrochinolin の製造の場合に於けるが如く行ひ、粗製鹽基はヨード水素酸鹽を経て精製せり。四水素鹽基の鹽酸鹽 28.5g を原料となし精製鹽基 9g 弱を得たり。

2. 性質

a. 鹽基

精製鹽基は無色油狀の液にして、總論附表の如き性質を有す。

ハロゲン水素酸鹽は一般に甚だ水に溶解し易きも、2,4,6-; 2,4,8-Trimethyldecahydrochinolin の夫れに比し幾分結晶し易き傾向を有す。

分析

1. 物質 0.0922g CO_2 0.2703g H_2O 0.1044g C 79.95% H 12.60%
 理論数 „ 79.47% „ 12.79%

2. 物質 0.0931g N 6.3cc (764.5mm, 13°) = 8.00% 理論数 7.73%

b. 鹽酸鹽 $C_{12}H_{23}N \cdot ClH$

水に甚だ溶解し易く、容易に結晶し難し。飴様物質の恒量を得たるものにつき分析を行ふに次の如し。

物質 0.0826g AgCl 0.0542g Cl 16.23% 理論数 16.28%

c. ブローム水素酸鹽 $C_{12}H_{23}N \cdot BrH$

鹽基をブローム水素酸にて中和し、蒸發して水分及過剰のブローム水素酸を揮散せしめたる後、乾燥器に放置するときは結晶せしめ得。今此結晶を濕氣を避けつつアルコールに溶解し、之れにエーテルを加ふるときは極めて細小なる無色針狀の結晶として析出せしめ得。175-176°にて熔融し、水に甚だ溶解し易し。

分析

物質 0.0846g AgBr 0.0607g Br 30.52% 理論數 30.48%

d. ヨード水素酸鹽 $C_{12}H_{23}N \cdot JH$

鹽基をヨード水素酸にて中和するときは初め油狀をなして沈澱し、暫時にして無色の槍狀の結晶となる。今此結晶をアルコールに溶解し、之れにエーテルを加ふるときは微小なる無色針狀の結晶となり析出。206°に於て熔融す。

分析

物質 0.0889g AgJ 0.0677g J 41.16% 理論數 41.05%

e. 鹽化金複鹽 $C_{12}H_{23}N \cdot ClH \cdot AuCl_3$

鹽基の稀鹽酸溶液に鹽化金溶液を加ふるときは油狀となりて析出し、容易に結晶し難し。

f. 鹽化白金複鹽 $(C_{12}H_{23}N \cdot ClH)_2 \cdot PtCl_4$

鹽基の稀鹽酸溶液に鹽化白金溶液を加ふるときは淡褐色多面體裸粒狀の結晶となり析出。225°にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1092g Pt 0.0276g = 25.23% 理論數 25.24%

第十一 2,4,8-Trimethyldecahydrochinolin $C_{12}H_{23}N$

1. 製法

2,4,8-Trimethyl-Py-tetrahydrochinolin の鹽酸鹽(實驗之部第三節第四)をヨード水素酸及赤磷にて還元する事前段 2,4,6-; 2,4,7-Trimethyldecahydrochinolin の製造に於けるが如く行ひたり。四水素鹽基の鹽酸鹽 22.8g を使用して粗製鹽基 12g 餘を得たり。本鹽基の各種鹽類は何れも結晶として製出し難し。只僅かに白金鹽のみ結晶するに過ぎず。それがため鹽基の精製に困難を來たせり。止むなく次記精製方法を行ひたり。然れども幸ひにも沸騰點甚だ恒一にして分析數も亦よく理論に一致するを以て純粹物質と見做して差支へなきものと思せらる。即ち精製法としては總論記載の如く先づ醋酸々性にて水蒸氣蒸溜を行ひて副生物たる六水素鹽基及變化せずして殘存せる四水素鹽基を驅逐し去り、然る後尚ほ夾雜物を完全に除かんため重クロム酸加里溶液の少量を加へ完全に分解し去りたる後(此際デカヒドロ化合物は變化なし)アルカリ性となし、水蒸氣蒸溜によりて鹽基を分離す。

2. 性質

a. 鹽基

上記の方法にて精製せる鹽基は無色透明油狀にして、總論附表の如き性質を有す。ハロゲン水素酸鹽は何れも結晶として得難し。

分析

1. 物質 0.0731g CO_2 0.2133g H_2O 0.0830g C 79.57% H 12.70%
理論數 „ 79.47% „ 12.79%

2. 物質 0.0903g N 6.3cc (764.3mm, 15°) = 8.13% 理論數 7.73%

b. 鹽酸鹽 $\text{C}_{12}\text{H}_{23}\text{N}\cdot\text{ClH}$

本鹽は甚だ水に溶解し易く、且つ結晶し易く、乾燥器中に永く放置するも飴狀として存し結晶し難し。今飴狀物質の恒量を得たるものに付き分析を行ふに次の如し。

物質 0.1022g AgCl 0.0681g Cl 16.48% 理論數 16.28%

c. ブローム水素酸鹽 $\text{C}_{12}\text{H}_{23}\text{N}\cdot\text{BrH}$

前記鹽酸鹽と同様に水に溶解し易く、且つ結晶し難し。飴狀物質の恒量を得たるものにつき分析を行ふに次の如し。

物質 0.2018g AgBr 0.1427g Br 30.68% 理論數 30.48%

d. ヨード水素酸鹽 $\text{C}_{12}\text{H}_{23}\text{N}\cdot\text{JH}$

鹽基をヨード水素酸にて中和するときは油滴となりて析出す。之れを放置するに前記 2,4,7-Trimethyldekahydrochinolin の場合の如く結晶するも、融解し易くして、結晶形を保ちつつ精製する事不可能に終はれり。

e. 鹽化金複鹽 $\text{C}_{12}\text{H}_{23}\text{N}\cdot\text{ClH}\cdot\text{AuCl}_3$

前記 2,4,6-; 2,4,7-Trimethyldekahydrochinolin の場合と同じく油狀に析出し、結晶し難し。

f. 鹽化白金複鹽 $(\text{C}_{12}\text{H}_{23}\text{N}\cdot\text{ClH})_2\cdot\text{PtCl}_4$

鹽基の稀鹽酸溶液に鹽化白金を加ふるときは羊齒葉狀に集まる淡褐色顆粒狀の結晶となり析出す。223°にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1077g Pt 0.0270g = 25.07% 理論數 25.24%

第五節 メチールヘキサヒドロヒノリン類

第一 7-Methylhexahydrochinolin $\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{N}$

1. 鹽基の分離

7-Methyldekahydrochinolin に際し得たる副生鹽基(前節第三)約 7g を鹽酸にて中和するときは長き稜柱形針狀の結晶となりて析出す。沸騰より再結晶せしめて精製し、之れより鹽基を遊離せり。約 3g の精製鹽基を得たり。

2. 性質

a. 鹽基

本鹽基は無色透明油狀の液にして、次の物理的性質を有す。

沸騰點: 235° (757.5mm)

比重 $d_4^{20} = 0.9506$

屈折率 $n_D = 1.54098$ (16°) 分子屈折 49.233 比通超 + 1.775

ハロゲン水素酸鹽は皆よく結晶し、鹽酸鹽、ブローム水素酸鹽は共に長針狀の結晶にして、ヨード水素酸鹽は稜柱狀の結晶なる事、他の六水素鹽基の場合と同じ。酸性硫酸鹽も亦よく長針狀の結晶として析出す。

分析

1. 物質 0.0957g CO_2 0.2811g H_2O 0.0847g C 80.10% H 9.90%

理論數 „ 80.47% „ 10.13%

2. 物質 0.1202g N 9.95cc (764mm, 18°) = 9.56% 理論數 9.39%

b. 鹽酸鹽 $\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{N}\cdot\text{ClH}$

水より甚だ良好に結晶する長さ稜柱形針狀の結晶にして、 220° にて熔融す。

分析

物質 0.1464g AgCl 0.1115g Cl 19.01% 理論數 19.09%

c. ブローム水素酸鹽 $\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{N}\cdot\text{PrH}$

鹽基をブローム水素酸にて中和するときは無色長針狀の結晶となり析出す。水より再結晶し精製し得。 209° にて熔融し、結晶水を含ます。

分析

物質 0.0822g AgBr 0.0664g Br 34.37% 理論數 34.72%

d. ヨード水素酸鹽 $\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{N}\cdot\text{JH}$

鹽基をヨード水素酸にて中和するときは無色短柱狀の結晶として析出す。水より再結晶し精製し得。 210° 附近より漸時褐變分解しつつ $214\text{--}217^{\circ}$ にて熔融す。

分析

物質 0.0965g AgJ 0.0817g J 45.86% 理論數 45.80%

e. 鹽化白金複鹽 $(\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{N}\cdot\text{ClH})_2\cdot\text{PtCl}_4$

鹽基の鹽酸鹽溶液に鹽化白金溶液を加ふるときは良く析出す。放線狀に集まる淡褐色槍狀の結晶にして、 188° にて分解し、結晶水を含ます。

分析

物質 0.1021g Pt 0.0279g = 27.32% 理論數 27.51%

第二 8-Methylhexahydrochinolin $\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{N}$

鹽基の性質

後段鹽酸鹽より遊離し得たる鹽基は甚だ少量なりしため詳細なる試験を行ふを得ざりしも、其沸騰點を著者の法¹⁾によりて檢し得たりし外、下記數種の實驗を行ふを得たり。

本鹽基は無色油狀の液體にして、 $237\text{--}238^{\circ}$ (760mm) にて沸騰し、臭氣は Py-四

¹⁾ 本誌、大正7年、第424號。

水素化合物の方に近く、ハロゲン水素酸鹽はよく結晶し、鹽酸鹽・臭化水素酸鹽は針狀にして、ヨード水素酸鹽は柱狀なる事前記 7-Methylhexahydrochinolin 及後段 2,7-Me hylhexahydrochinolin の夫れと同じ。

分析

物質	0.0929g	CO ₂	0.2748g	H ₂ O	0.0825g	C	80.30%	H	9.93%
						理論數	„ 80.47%	„	10.13%

b. 鹽酸鹽 C₁₀H₁₅N·ClH

8-Methyldekahydrochinolin の製造に際し原料たる 8-Methyl-Py-tetrahydrochinolin 鹽酸鹽 33g を使用して約 5g の副生鹽基を得たり。このものは反應に洩れたる四水素鹽基より成り、少量に六水素鹽基を含む。今之れを稀鹽酸に溶解するに六水素鹽基の鹽酸鹽は四水素鹽基の夫れに比し遙かに難溶性なるを以て先づ析出す。集めて沸湯より再結晶を行ひ精製す。無色長針狀の結晶にして、209-210° にて褐變熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質	0.1060g	AgCl	0.0808g	Cl	18.85%	理論數	19.05%
----	---------	------	---------	----	--------	-----	--------

c. ブローム水素酸鹽 C₁₀H₁₅N·BrH

鹽基をブローム水素酸にて中和するときは無色長針狀の結晶として析出す。水より再結晶し精製し得。208° にて熔融し、結晶水を含まず。

分析

物質	0.0952g	AgBr	0.0767g	Br	34.28%	理論數	34.72%
----	---------	------	---------	----	--------	-----	--------

d. 鹽化白金複鹽 (C₁₀H₁₅N·ClH)₂·PtCl₄

鹽基の鹽酸鹽水溶液に鹽化白金溶液を加ふるときはよく結晶す。淡褐色四角板狀の結晶にして、196° にて分解し、結晶水を含まず。

分析

物質	0.0882g	Pt	0.0243g = 27.65%	理論數	27.51%
----	---------	----	------------------	-----	--------

第三 2,7-Dimethylhexahydrochinolin C₁₁H₁₇N

a. 鹽酸鹽 C₁₁H₁₇N·ClH

2,7-Dimethyldekahydrochinolin の製造に際し、醋酸々性にて水蒸氣蒸溜によりて得たる部分(變化を受けざる四水素鹽基及副生物たる六水素鹽基を含む)大約 5g を得たるを以て、之れより六水素鹽基を分離せんがため、鹽酸にて中和するによく結晶す。此結晶は容積大なる輕き針狀結晶の外、短き六角狀の結晶の含まるるを見る。前者は六水素鹽基の鹽酸鹽にして、後者は結晶形及熔融點により 2,7-Dimethyl-Py-tetrahydrochinolin の鹽酸鹽なる事を知る。兩者の分離は最も簡單に行ひ得。即乾燥せる混合結晶をアルコールにて洗ふときは六水素鹽基の鹽酸鹽は甚だよく溶解し去るに反し、四水素鹽基の鹽酸鹽は難溶性にして殘存するを以て、アルコール洗液を蒸發し、殘滓を水より結晶せしむるときは難溶性の絹絲様針狀結

晶となる。本鹽は 183° にて熔融し、結晶水を含まず。 100° 、減壓に於てよく昇華す。

分析

物質 0.0804g AgCl 0.0573g Cl 17.63% 理論數 17.75%

b. ブローム水素酸鹽 $C_{11}H_{17}N \cdot BrH$

鹽酸鹽より遊離し得たる鹽基をブローム水素酸にて中和するときは難溶性の長針狀結晶となり固結す。水より再結晶し精製し得。 196° にて熔融し、熔融點附近にて幾分昇華し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.1146g BrAg 0.0874g Br 32.45% 理論數 32.73%

c. 鹽化白金複鹽 $(C_{11}H_{17}N \cdot ClH)_2 \cdot PtCl_4$

鹽基の鹽酸鹽水溶液に鹽化白金溶液を加ふるときは甚だ良く結晶す。長形六角板狀の結晶にして、 178° にて分解し、結晶水を含まず。

分析

物質 0.0943g Pt 0.0248g = 26.29% 理論數 26.51%

本研究は東大藥學教室に於て恩師近藤教授御指導の下に成りしものなり謹で謝意を表す。

正 誤

本誌第 533 號(大正 15 年 7 月號)所載朝比奈泰彦氏論文「地衣成分の研究(其二), 數種の邦產地衣成分に就て」の中

誤
Lecanolsäure

正
Lecanorsäure

[雜 錄]

空氣中遊離クロールの比色的定量法 (譯文)

藥學士 清水 辰 太

Lyman E. Porter: Ind. & Eng. Chem. **18**, No. 7, 730 (1926)

空氣中に含有する遊離クロールは之をしてヨードカリウム溶液中を通過せしめ茲に遊離し來るヨードを定規次亞硫酸ナトリウム液にて滴定し以てその含量を知り得べし。然れ共感冒其の他一般呼吸器疾患の治療法として今日盛に行はるゝ所謂クロール療法の場合の如くクロールの濃度極めて小なる場合に於てはこのヨードメトリーを應用せんか多量の空氣を要し且つ極めて稀薄なる次亞硫酸ナトリウ

direkt lähmend auf das centrale Nervensystem, sowie auf den Endigung der sensorischen and der motorischen Nerven wirkt. (T. K.)

S. Yamaguchi: *Beiträge zur Kenntnis der Methylhydrochinoline.*
II.

Zenjiro Kitasato: *Über die Alkaloide von Nandina domestica.*
III. *Die Konstitution des Domesticins.*¹⁾

J. F. Eykman hat zuerst aus der Wurzelrinde von *Nandina domestica* ein amorphes Alkaloid gewonnen, das er "Nandinin" genannt hatte. Der Verfasser hat kürzlich aus demselben ein kristallinisches Alkaloid isoliert, welches sich in seiner Konstitution nichts anders als *d*-Hydroberberrubin erwies,²⁾ und für welches der Eykmansche Name Nandinin beibehalten wurde. Weiterhin gelang es dem Verfasser, aus dem Rückstand, der nach der Extraktion des krist. Nandinins zurückblieb, ein zweites gut kristallisierendes Alkaloid abzuscheiden. Der Gehalt der Eykmanschen amorphen Base an diesem zweiten Alkaloid, das hier Domesticin benannt wird, scheint sogar etwas grösser als der des krist. Nandinins zu sein.

Um das Domesticin zu gewinnen, löst man den vom krist. Nandinin befreiten amorphen Rückstand, in Methylalkohol und lässt einige Zeit stehen; Domesticin scheidet sich dann als farblose Tafeln mit ein Mol. des Lösungsmittels ab. Es ist sehr leicht oxydierbar, färbt sich rotviolett mit konz. Schwefelsäure. Unreines Domesticin färbt sich grün an der Luft. Die Elementar-Analyse ergab, dass dem Domesticin dieselbe Molekular-Formel, $C_{19}H_{19}NO_4$, wie Nandinin zukommt. Es enthält ein Methoxyl und ein Phenolhydroxyl. Das Vorhandensein von Methylendioxygruppe wurde mit Phlorogluzin und Schwefelsäure nachgewiesen. Trotz dieser Übereinstimmung in den

1) Diese Zeitschrift, 653-662 (1926).

2) Diese Zeitschrift, 695 (1925).