YAKUGAKUZHASSHI

Journal of the Pharmaceutical Society of Japan

Editor: Y. Asahina

Subeditor: K. Hattori

H. Kondo u. E. Ochiai: *Ueber die Matrinidine. (VII Mitteilung ueber die Konstitution von Matrin.)*

Vor einiger Zeit haben die Verfasser¹⁾ gezeigt, dass Matrin bei der trocknen Destillation mit Natronkalk als Hauptprodukt α -Matrinidin $C_{12}H_{20}N_2$ und β -Matrinidin $C_{13}H_{20}N_2$ neben einigen Pyrrolderivaten liefert. Das α -Matrinidin ist eine zweisäurige, sekundär-tertiäre Base mit einem *N*-Methyl und geht durch $P+HJ$ (s. G. 2.0) in Dihydro- α -matrinidin über. Beim Destilliren von α -Matrinidinmethylhydroxyd unter 6mm Druck erhielten sie nun α -Matrinidinmethylemethin und eine kleine Menge von einem Pyrrolderivatgemisch. Dieses Methylemethin, ebenfalls eine sekundär-tertiäre Base, ist optisch inaktiv, weist nach Herzig-Meyer zwei *N*-Methyl auf. Unterwirft man dasselbe nochmals der Hofmannschen Methylierung, so erhält man α -Matrinidinoxymethylemethin, welches immer noch eine sekundär-tertiäre Base ist und daneben sehr wenig Trimethylamin und eine nonbasische Substanz. Erst durch dreimalige Methylierung und darauffolgende Destillation erhält man aus α -Matrinidinoxymethylemethin theoretische Menge Trimethylamin, ein styrolähnlich riechendes, nonbasisches Öl und eine bei 170–190° siedende Base.

¹⁾ Diese Zeitschrift, No. 522, s. 2–4 (Aug. 1925); Zentralbl. (1926), Bd. I, s. 410.

β -Matrinidin ist eine einsäurige, sekundär-tertiäre Base und besitzt nach seiner Molekularrefraktion zwei Doppelbindungen. Es ist sehr resistent gegen Reduktionsmitteln ($\text{Sn} + \text{HCl}$, Pt-coll. etc.) und erst durch $\text{P} + \text{HJ}$ (s. G. 2.0) in Dihydromatrinidin unter Abspaltung von einem C-Atom, übergeführt. Durch Einwirkung von Jod oder Bromcyan liefert das β -Matrinidin die Verbindung $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N}_2\text{J}$ resp. $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N}_2\text{Br}$, aus denen durch Austausch von Jod oder Brom durch Chlor ein und dasselbe Ammoniumchlorid $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N}_2\text{Cl}$ gebildet wird. Da das Ammoniumjodid beim Reducieren in Dihydro- α -matrinidin übergeht, so muss es angenommen werden, dass das Ammoniumjodid eine Übergangsform zwischen α - und β -Matrinidin bildet.

Auf Grund der Tatsache, dass α -Matrinidin erst nach dreimaliger Methylierung theoretische Menge Trimethylamin abspaltet und durch Einwirkung von Bromcyan niemals Verbindungen vom Typus mit >N-CN oder $\text{>N} < \begin{smallmatrix} \text{CH}_3 \\ \text{Br} \end{smallmatrix}$ geliefert hat, stellten die Verfasser das Vorhandensein von einem *N*-Methyl in α -Matrinidin in Abrede. Ebenso wenig enthält β -Matrinidin ein *N*-Methyl, indem es auf reduktivem Wege ($\text{P} + \text{HJ}$) in Dihydro- α -matrinidin übergeführt wird und durch Einwirkung von Jod oder Bromcyan ein Ammoniumhalogenid $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N}_2\text{X}$ liefert. Vielmehr muss es angenommen werden, dass die beiden Matrinidine solche Atomgruppen besitzen, die sich durch Einwirkung von HJ bei höherer Temperatur als Jodmethyl abspaltet.

Ferner scheint α -Matrinidin ein Pyrrolinderivat zu sein, indem die Iminogruppe basisch reagiert und durch Reduktion in eine Pyrrolidinbase (Dihydro- α -matrinidin) übergeht. β -Matrinidin ist dagegen ein Pyrrolderivat, seine Iminogruppe reagiert nicht basisch. Dass β -Matrinidin selbst keine Fichtenspanreaktion zeigt, ist darauf zurückzuführen, dass es ganz substituierten Pyrrolkern besitzt. Diese Iminogruppe bildet im Matrinmolekül den sehr festen Laktamring.

Um das Wesen des zweiten Stickstoffs im α -Matrinidin zu erläutern, haben die Verfasser den Kern (I) angenommen, mit dem man den Verlauf der Hofmannschen erschöpfenden Methylierung gut erklären kann :—

Die Bildung von einem Carbinol bei der Hofmannschen Abbaumethode hat schon J. v. Braun¹⁾ angegeben. Die Quelle des Trimethylamins, das sich bei der zweiten Methylierung gebildet hat, ist wohl das Produkt (III), das natürlich nicht isoliert wurde und sehr wahrscheinlich einer weiteren Umwandlung unterworfen wird.

Die Struktur und Umwandlung des β -Matrinidins (V) sind folgendes :

¹⁾ Ber. 49, 2637 u. 2640.

Was die Konstitution des Matrins anbetrifft haben die Verfasser provisorisch folgende Schemata angegeben :

Experimentelles.

α -Matrinidin : $\text{C}_{12}\text{H}_{20}\text{N}_2$, $\overline{1}$, Kp. 134° (7mm), $[\alpha]_D^{18} = -18.75^\circ$; $[\text{C}_{12}\text{H}_{20}\text{N}_2 \cdot 2\text{HCl}] \cdot \text{PtCl}_4$: Zp. 289° , amorph; Pikrat: Zp. 228° ; $[\text{C}_{12}\text{H}_{20}\text{N}_2 \cdot \text{CH}_3\text{Cl} \cdot \text{HCl}] \cdot \text{PtCl}_4$: Zp. 274° ; Dihydro- α -matrinidin : $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{N}_2$, Kp. $128-34^\circ$ (7mm), $n_D^{32} = 1.5119$; Styphnat: gelbe Nadeln, Zp. 163° ; Aurat: Zp. 220° ; α -Matrinidinmethylnmethin : $\text{C}_{13}\text{H}_{22}\text{N}_2$, Kp. 184° (4mm), $[\alpha]_D^{20} = \pm 0$; $[\text{C}_{13}\text{H}_{22}\text{N}_2 \cdot 2\text{HCl}] \cdot \text{PtCl}_4$: Zp. 277° , nach N-CH₃-Bestimmung-N(CH₃)₂; $[\text{C}_{13}\text{H}_{22}\text{N}_2 \cdot \text{CH}_3\text{Cl} \cdot \text{HCl}] \cdot \text{PtCl}_4$: Zp. $255-7^\circ$; α -Matrinidin-oxydimethylmethin : $\text{C}_{14}\text{H}_{26}\text{N}_2\text{O}$, Kp. $185-95^\circ$ (12mm); $[\text{C}_{14}\text{H}_{26}\text{N}_2\text{O} \cdot 2\text{HCl}] \cdot \text{PtCl}_4$, Zp. 219° ; $[\text{C}_{14}\text{H}_{26}\text{N}_2\text{O} \cdot \text{CH}_3\text{Cl} \cdot \text{HCl}] \cdot \text{PtCl}_4$: Zp. 224° ; β -Matrinidin : $\text{C}_{13}\text{H}_{20}\text{N}_2$,

$[\bar{\alpha}]_D^{20}$, Kp. 174–6° (6mm), $d_4^{20}=1.0836$, $n_D^{20}=1.56208$, $[\alpha]_D^{18}=+1.68^\circ$; $[C_{13}H_{20}N_2 \cdot HCl]_2 \cdot PtCl_4$: Zp. 214°; Pikrat: Zp. 184°; $[C_{13}H_{20}N_2 \cdot HCl] \cdot AuCl_3$: Fp. 106°; $[C_{13}H_{20}N_2 \cdot CH_3Cl]_2 \cdot PtCl_4$: Zp. 186°; das Hydrierungsproduct von β -Matrinidin durch HJ (d.=2.0) u. P (Dihydro- α -matrinidin): $C_{12}H_{22}N_2$, Kp. 128–31° (6mm), $d_4^{18}=1.017$, $n_D^{28}=1.51951$; Aurat: Zp. 202°; $C_{12}H_{17}N_2J$: Zp. 210–8°; $C_{12}H_{17}N_2Cl$: Zp. 263°; $[C_{12}H_{17}N_2Cl]_2 \cdot PtCl_4$: Zp. 210°; $[C_{12}H_{17}N_2Cl] \cdot AuCl_3$: Fp. 125–8°; $C_{12}H_{17}N_2Br$. Y. A.

J. Shinoda: Ueber die Konstitution des Gentisins.

Der Verfasser haben 2-Oxy-5-methoxybenzonitril (I) mit Phloroglucin nach der Hoeschschen Methode kondensirt und erhielt 1,3-Dioxy-7-methoxyxanthon (II). Das letztere gibt zwar beim Kochen mit HJ-säure Gentisein (III), aber sich als nicht identisch mit Gentisin erwies. Es bleibt also nur noch uebrig dem Gentisin die Struktur 3-Methoxy-1,7-dioxyxanthon (IV) zu erteilen:

2-Oxy-5-methoxybenzonitril wird dargestellt durch 3 stündigem Kochen von 2-Oxy-5-methoxybenzaldoxim mit Essigsäureanhydrid. Farblose Nadeln aus H_2O , F.P. 136°, gef. C% 64.5, H% 5.0, ber. C% 64.4, H% 4.7.

藥 學 雜 誌

第五百三十七號 大正十五年十一月發行

〔 原 報 〕

マトリンの構造研究 (第七報)

Über die Konstitution von Matrin

(7. Mitteilung)

藥學博士 近 藤 平 三 郎

藥 學 士 落 合 英 二

余等は本研究第五報(本誌 522, 701)に於てマトリン酸加里の曹達石灰乾溜成績體に就きて報告したりしが其後更に其研究を續行してマトリン構造の一部を明かならしむるを得たりと信するを以て此處に其結果を報告せむとす。

マトリンの曹達石灰乾溜に際し受器の先端に稀鹽酸を置き瓦斯狀鹽基を採集すれば主としてアンモニアよりなれる事を知れり。又鹽基性溜分中 18mm にて80-120°C に溜出する鹽基極めて少量存在する事を知る。本鹽基は其量少きため此處に記録し後日の研究に譲らむとす。

此等の事實を附加して乾溜成績體を表示すれば第1表の如し。

α -Matrinidin.

α -Matrinidin $C_{12}H_{20}N_2$ は 6mm にて 132-134°C に溜出する液體にして之を永く放置すれば分子内轉位を起して 7mm にて 150-170° に溜出する異性體に變化するが如し。 α -Matrinidin の研究は主として後者につきて行へり。

α -Matrinidin を其分子屈折率より推定すれば1個の二重結合を有するが如く之を沃度水素酸(比重=2)及赤磷にて還元すれば2水素加物 Dihydro- α -Matrinidin

となる。

Dihydro- α -Matrinidin $C_{12}H_{22}N_2$ は 7mm にて 128–134° に溜出する軽き特異の
アミン臭を有する無色透明の液体にして n_D^{25} 1.5119, 細き針狀の鹽酸鹽は 250° に
熱するも變化せず。黄色針狀の Styphnat は分解點 163°C, 黄色の金鹽は分解點
220° C, 橙黄色の白金鹽は 276° に熱するも分解せず。極めて鮮明なるリーベル
ルマン反應を呈する鹽基性 NO-Amin を生ず。

α -Matrinidin のホフマン氏脱窒のメチル化反應。

α -Matrinidinmethylhydroxyd $C_{12}H_{20}N_2 < \begin{smallmatrix} CH_3 \\ OH \end{smallmatrix}$ を減壓蒸溜すれば 強烈なる紫色の松
材反應を呈し夫々 115–150°, 150–185° に溜出するピロール性物質を 6mm にて
135–160° 及び 170°–185° に溜出する鹽基を得。

沸點 135–160° の鹽基を一週間放置の後再溜すれば悉く後者に變化せるを認む。
兩者を再溜すれば主として 4mm にて 184° に溜出する鹽基を得たり。本鹽基は
 $C_{13}H_{22}N_2$ なる組成を有し α -Matrinidinmethylmethin なる事を知る。

本鹽基は全く光學的非活性にして 277° に分解する比較的安定なる白金鹽 $[C_{13}H_{22}N_2 \cdot 2HCl]PtCl_4$ を生ず。H. Meyer 氏法により NCH_3 基を定量すれば 2 個の
 $N \cdot CH_3$ に相當する沃度メチルを發生す。本鹽基は α -Matrinidin と同様第二級第
三級アミンにして 1 個の沃度メチルを附加して Monojodmethylat $C_{13}H_{22}N_2CH_3J$ を
生ず。吸濕性強き針晶にして之を Chlormethylat に變ずれば 255–257° に分解す
る結晶性白金鹽 $[C_{13}H_{22}N_2 \cdot CH_3Cl \cdot HCl]PtCl_4$ を生ず。

α -Matrinidinmethylmethinmethylhydroxyd $C_{13}H_{22}N_2 < \begin{smallmatrix} CH_3 \\ OH \end{smallmatrix}$ を減壓にて蒸溜すれば
Trimethylamin を放ち、10mm にて 185–190° に溜出する松材反應なき非鹽基性
液体を 12mm にて 185–195° に溜出する鹽基性物質に分る。後者は $C_{14}H_{26}N_2O$
なる組成を有する第二級第三級アミンにして白金鹽は安定なれども吸濕性にして
僅にアルコールにて析出す。200° にて黒變し 219° にて分解す。之を α -Matrin-
idinoxidimethylmethin と命名す。

α -Matrinidinoxidimethylmethin は沃度メチルを附加して白色無晶形の Monojod-
methylat $C_{14}H_{26}N_2OCH_3J$ を生ず。之を Chlormethylat に變ずれば 234° に分解す
る橙黄色無晶形の白金鹽 $[C_{14}H_{26}N_2O \cdot CH_3Cl \cdot HCl]PtCl_4$ を生ず。

α -Matrinidinoxidimethylmethinmethylhydroxyd $C_{14}H_{26}N_2O < \begin{smallmatrix} CH_3 \\ OH \end{smallmatrix}$ を減壓蒸溜すれば
Trimethylamin を放ちつゝ Styrol に類する刺戟臭を有し空中にて比較的樹脂化
し易き非鹽基性油分(松材反應を呈せず)を 28mm にて 170–190°C に溜出する鹽

基を得たり。後者は其量精製に充分ならざるを以て之を保存して今後の研究を保留す。

上記の結果を綜合すれば第二表の如く書き表はすを得べし。

β -Matrinidin $C_{13}H_{20}N_2$ は 6mm にて $174-176^\circ C$ に溜出する淡黄色の液體にして $d_4^{30} = 1.0836$, $n_D^{20} = 1.56208$, 其分子屈折率より推論すれば 2 個の二重結合を有するが如し。

β -Matrinidin の最も注目すべきは其二個の窒素の鹽基性の相異なり。即 β -Matrinidin は Liebermann 反應を呈し且つニトロゾアミンは其鹽基性を保持す。又容易に沃度メチルを附加して極めて吸濕性白色無晶形の Monojodmethylat を生じ之を Chlormethylat に變すれば $186^\circ C$ に分解する白金鹽を生ず。即ち 1 個の窒素は第二級他の窒素は第三級に屬す。然るに其金鹽(熔融點 $106^\circ C$)、白金鹽(分解點 $217^\circ C$) は夫々 $[C_{13}H_{20}N_2 \cdot HCl] AuCl_3$, $[C_{13}H_{20}N_2 \cdot HCl]_2 PtCl_4$ なる組成を有し且又其 Chlormethylat の白金鹽が $[C_{13}H_{20}N_2 \cdot CH_3Cl]_2 PtCl_4$ なる組成を有するを見れば β -Matrinidin の Imid 基は全く鹽基性を失へるを見る。余等は之等の特性に關しては後に論ずる處あらんこす。

β -Matrinidin の亞鉛末乾溜。

β -Matrinidin は 2 個の二重結合を有するを以て之を適當に Dehydrieren すれば酸化に都合よき物質を得べきを豫想し先づ亞鉛末乾溜を行へり。

β -Matrinidin を亞鉛末に乾溜すれば 6mm にて主として 187° に蒸溜する Amin と強き松材反應を呈する Pyrrol とに分る。後者を分溜すれば 6mm にて 140° 迄に溜出する Pyrrol (Pyrrol B?) 及び $140-170^\circ$ に溜出する Pyrrol に分たれ其他冷却器中に少量の結晶を認む。本物質はアルコールよりパラフィン狀に結晶し、おそらくはマトリン酸加里の曹達石灰乾溜に際して得たる炭化水素と同一物ならむと推せらる。

6mm にて 187° に溜出する鹽基は $C_{13}H_{20}N_2$ なる組成を有し全く β -Matrinidin のそれに一致するも $d_4^{25} = 1.0848$, $n_D^{20} = 1.57963$ にして Pikrat は融點 193° 、白金鹽は分解點 216° 、金鹽は融點 126° を示し鹽酸鹽、ブローム水素酸鹽が共に結晶し易く何れも矢羽狀針狀結晶を生ずるを異にし、にはかに其異同を斷じ難し。

之を稀硫酸溶液中クローム酸を以て酸化すればヒノリン臭の鹽基少量と極めて結晶し難き 1 種のジアミノ酸を生ずるが如し。

詳細は今後の研究に保留す。

β -Matrinidin の還元。

β -Matrinidin は比較的還元に抵抗し之を鹽酸と錫にて還元するも變化せざるが如く(本誌 522, 704)醋酸溶液中白金コロイドにて接觸的還元をなすも全く變化

する事なし.

β -Matrinidin を沃度水素酸(比重2)及び赤燐を以て閉管中 250° に熱すれば $C_{12}H_{22}N_2$ なる鹽基を生ず.

本鹽基は 6mm にて $128-131^{\circ}$ に溜出する無色透明輕きアミン臭の液體にして $d_4^{18}=1.017$, $n_D^{25}=1.51951$, 其分子屈折率より推定すれば全く二重結合を有せざるが如し.

鹽酸鹽 $C_{12}H_{22}N_2 \cdot 2HCl$ は白色の小なる針晶にして 270° に熱するも變化せず. 白金鹽 $[C_{12}H_{22}N_2 \cdot 2HCl]PtCl_4$ も同様 270° に熱するも分解する事なし.

本鹽基は β -Matrinidin と同様第二級第三級アミンにして殊に其鹽酸鹽, 白金鹽の組成は其 Imid 基が還元により全く鹽基性を回復せる事を證す.

之を要するに本鹽基は其性質 Dihydro- α -Matrinidin に一致しおそらくは同一物ならむと推せらる. 試みに兩者の性質を比較すれば次の如し.

α : $C_{12}H_{22}N_2$	β : $C_{12}H_{22}N_2$
沸點(7mm) $128-134^{\circ}C$	沸點 7mm. $128-134^{\circ}C$.
$n_D^{18}=1.51951$	$n_D^{25}=1.5119$
Liebermann pos!	Liebermann pos!
鹽酸鹽 白色針晶 276° にて變化せず.	鹽酸鹽 白色針晶 276° にて變化せず.
白金鹽 276° にて分解せず.	白金鹽 276° にて分解せず.
金鹽 分解點 220°	金鹽 分解點 262°

β -Matrinidin に對する沃度の作用.

余等は先に(本誌 522, 704) β -Matrinidin を Wijs 氏法に従ひ沃度数を測定するに 1 個の沃度を消費し, 分解點 218° の沃度化合物を生ずるを認めたり.

余等は後に述ぶる理由により少しく之を詳細に調査する 必要に面し之れが研究を續行せり.

β -Matrinidin のアルコール溶液に沃度を作用せしむれば, 之を脱色し其溶液中より白色矢羽狀分解點 $210-218^{\circ}C$ の結晶を得.

本物質は $C_{12}H_{17}N_2$ なる組成を有し水, アルコール, クロ、フォルムに 易溶, エーテルに不溶, 其水溶液を鹽化銀にて 振れば クロール置換體を生じ, 又水溶液に硝酸銀を加ふれば定量的に沃度銀を生じ, 分子中の沃度は 其水溶液中全く解離するを示す. 即其性質全く 1 つの Ammoniumbase なる事明なり.

クロール置換體 $C_{12}H_{17}N_2Cl$ は水より針狀に析出する結晶にして分解點 263° , 210° に分解する白金鹽 $[C_{12}H_{17}N_2Cl]_2PtCl_4$, $125-128^{\circ}$ に熔融する金鹽 $[C_{12}H_{17}N_2Cl]AuCl_3$ を生じ, 且つ又其組成は 1 個の窒素が鹽基性を失ひ 第二の窒素が Ammoniumbase を形成する事を證す.

此沃度化合物は又 β -Matrinidin を沃度水素酸燐にて還元する 際加熱前閉管中

に認めらるるが如し。恐くは閉管に際して一部分の沃度水素酸の分解によりて生じたる沃度の反應に基くものならむ。

β -Matrinidin に對するブロームチアンの反應。

α -Matrinidin, β -Matrinidin, Matrin は何れも H. Meyer 法により NCH_3 基を定量すれば 1 個の $\text{N}\cdot\text{CH}_3$ 基に相當する沃度銀を析出するを認めたり。若し β -Matrinidin が眞に $\text{N}\cdot\text{CH}_3$ 基を有すれば之に BrCN を作用せしむれば

なる反應の下に Methylbromid を分離し之れが未だ反應せざる β -Matrinidin に作用して Methylammoniumbromid を生ずる事は可なりの程度に於て可能なる事なり。余等は之を確證し以て $>\text{N}\cdot\text{CH}_3$ 基の存在を決定せむこし頗る興味ある結果に到達するを得たり。

β -Matrinidin のエーテル溶液に BrCN のエーテル溶液を滴下すれば發熱しつゝ反應し針狀結晶を交ふる白色沈澱を生ず。此沈澱中より種々の副反應成績體の外主として水より矢羽狀に結晶するブローム化合物體を得。本結晶は $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N}_2\text{J}$ と全く同様に 1 種のアンモニウム鹽基にして水、アルコール、クロ、フォルムに易溶エーテルに溶解せず。前者と同様鹽化銀を以て處理し分解點 260-263° 矢羽狀に結晶する Ammoniumchlorid に變ずる事を得たり。

本物質は $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N}_2\text{Cl}$ なる組成を有し 210° に分解する白金鹽 $[\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N}_2\text{Cl}]_2$ Pt Cl_4 , 126-128° に熔融する金鹽 $[\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N}_2\text{Cl}]\text{AuCl}_3$ を生じ其性質全く嚮に β -Matrinidin に Jod を作用せしめて得たる $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N}_2\text{J}$ のクロール置換體に一致す。

今沃度及 BrCN を作用せしめて得たる兩鹽基のクロール置換體を比較すれば全く同一物なる事を知る。

Jod 化合物(Chlorid)	Br 化合物(Chlorid)
分解點 260-265°C	分解點 260-263°C
Ammoniumbase	Ammoniumbase
白金鹽 分解點 210°C	白金鹽 分解點 210°C
金鹽 融點 125-128°C	金鹽 融點 125-128°C

即ち β -Matrinidin は之に BrCN を作用するも沃度を作用するも何れも $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N}_2\text{X}$ なる形を有する Ammoniumhaloid を生ずる事を知る。而して此物質中 1 個の窒素は Ammoniumbase として又他の Imid 窒素は鹽基性を失ひて存在す。

又 β -Matrinidin の沃度水素酸磷還元 に際し加熱前閉管中に矢羽狀の結晶を認めらるゝ事實は中間に $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N}_2\text{J}$ を生じ更に還元せられて Dihydro- α -Matrinidin となる事を暗示するものにして $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N}_2\text{X}$ なる Haloide は α -Matrinidin と β -Matrinidin を連結する中間物と認むるを得る也。而して $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N}_2\text{J}$ の還元により Dihydro- α -Matrinidin を生ずるを見れば、沃度、 BrCN の反應は窒素核の開裂

を伴はざる事明かなり。

上記の事實に基き α -Matrinidin, β -Matrinidin 相互の關係を表示すれば第三表の如し。

第 一 表	
マ ト リ ン 酸 加里 → 曹達石灰	揮 發 性 鹽 基
	ア ン モ ニ ア
	鹽基 K.P. 80—120°C 18mm
	α -Matrinidin K.P. 132—134°C β -Matrinidin K.P. 174—176° Matrin K.P. 200°以上 } 6mm.
	—KH ₂ PO ₄ 可溶分—
	—KH ₂ PO ₄ 不溶分—
	Pyrrol A. K.P. 59—65°C Pyrrol B. K.P. 95—105°C Pyrrol C. K.P. 105—130°C Pyrrol D. K.P. 130—150°C } 3mm.
	炭 化 水 素

上記の事實を綜合して茲にマトリンの構造を論ぜんとす。

本研究第五報に於て余等は Matrin, α -Matrinidin, β -Matrinidin の NCH_3 基定量の結果其何れも 1 個の CH_3 基に相當する CH_3I を分離するの驚く可き事實に遭遇せり。余等は先づ此問題に關する斷案を下さざるべからず。

Matrinmethylhydroxyd, Methylmatrinsäuremethylestermethylhydroxyd を減壓蒸溜すれば夫々 Matrin, Methylmatrinsäuremethylester を復生し(本誌 532, 457) 核開裂を伴はず。

α Matrinidin の Hofmann 氏脱窒的メチル化研究の結果 3 段の階程の後 Trimethylamin を分離する事實, β -Matrinidin に BrCN を作用せしむるも Methylammoniumbromid, Nitril 化合物を生ぜず, 沃度を作用せしめたるごきに生ずる物質同型の Ammoniumbase を生ずる事實, 而して此の Ammoniumbase が還元によりて Dihydro- α -Matrinidin に變移する事實, 此等の性質は何れも $>\text{NCH}_3$ 基の存在せざることを示すものなり。唯分子中熱反應により比較的容易に HI と共に Jodmethyl として分離する基が第三級アミンに近接して存在するために因するに非ざるか。彼の H. Meyer 氏定量中共通の一種の炭化水素臭の油を發生しつゝ著しく銀液を還元するものあるは此分解起れるの證なり。又 α -Matrinidinmethylmethinmethylhydroxyd の蒸溜に際し Trimethylamin を傍生するは前述の分離し易き基が窒素に結合しをりて熱分解により Methyl 基に變化するご同時に既に固着せる 2 個の Methyl 基と共に Trimethylamin として分離するにあらざれば他に之を説明し能はざるなり。

之を要するに Matrin の第三級窒素は Methyl 基を結合せず。唯熱反應により容易に CH_3 に變化する傾向を有する 1 個の Methylen に結合するものの如し。

又 β -Matrinidin が 2 個の二重結合を有し比較的還元に抵抗するの事實, 又第二級アミン窒素が 2 個の二重結合の存在によりて其鹽基性を失ひ強烈なる還元により二重結合の消失するご同時にはじめて其鹽基性を回復するの事實は此 Imid-基が 2 個の二重結合と共に 1 個の Pyrrol 核を形成しをる事を示す。而して β -Matrinidin が松材反應を呈せざるはおそらく α, β の炭素に側鎖を有するためにして β -Matrinidin の蒸溜的反應によりて松材反應を呈する Pyrrol を生ずるは此側鎖の分離によるご推定し得べし。

α -Matrinidin が 1 個の二重結合を有し且つ 2 個の窒素が共に鹽基性を發揮するはおそらく α -Matrinidin の Imid 基が Pyrrolin 核を構成するものなるべく從て Dihydro- α -Matrinidin は 1 種の Pyrrolidin 誘導體に外ならず。

α -Matrinidin の Hofmann 氏脱窒的メチル化の第一階程に於て松材反應を呈する Pyrrol を副成するは間接に此等の事實を證明するものなり。

故に Matrin 酸加里の曹達石灰乾溜によりて得らるゝ數種の Pyrrol は pyrogene Reaktion による Pyrrol 核の新生によるものにあらず Pyrogene Spaltung に際して新生する二重結合が既に Matrin 中に存在する Pyrrolidin 核中に起りたる事に起因するは最早疑はざる處なり。

α, β -Matrinidin の第二級アミンはマトリン酸の Imid 基即ち Matrin の Lactam 核を形成する窒素にして Matrin は少なくとも 1 個の Pyrrolidin 核を有し此 Pyrrolidin の窒素は核外の $>CO$ 基と Lactam 核を形成しをる事をも斷定し得べし。

即ち Matrin 中

なる核の存在は疑はざる處なり。

更に α -Matrinidin の Hofmann 氏脱窒的研究の跡を吟味せん。

今構造上の論議を簡單にするため第三級アミンに結合する三個の炭素を(A), (B), (C)を以て表示せんに, α -Matrinidinmethylhydroxyd が一般の法則に従ひ Methin Base に變化したる事實は第一の炭素(A)がおそらく Methylen 基を構成しそれと同時に之れに隣結する β の炭素($\equiv N$ に對し)が之と容易に二重結合を形成し易き形に於て存在し且又 Methin-Base が全く光學的 Inactiv に變化したるをみれば不齋性は此 β の炭素に存在するものと考へらる。即ち β の炭素は第二級ならざるべからず。

又 Methin-Base と同時に Pyrrol を生ずる事實は第三級窒素が直接 Pyrrolin 核の α , 或は β に結合する事を示す。

即ち第二の炭素(B)は Pyrrolin 核の α 或は β の炭素なり。而して核開裂が N と(A)との間に起れば Methin-Base を生じ N と(B)との間に起れば此處に新生する二重結合は既に Pyrrolin 核中に存在する二重結合と Conjugieren して Pyrrol 核を構成する方向に起り同時に起る副反應により 第三級窒素を離れたるものならむ。而して此に生成する Pyrrol は α 或は β の側鎖 1 個を失ひたるを以て松材反應を呈するを得べきなり。

例へば

又第三の炭素 (C) は Methylene 基を構成し加熱により CH_3 基に變移する傾向を有し且又之れに連結する β の炭素は (C) に二重結合を作り得ざるもの即第三級ならざるべからず。

今 α -Matrinidinmethylmethinmethylhydroxyd を蒸溜すれば Trimethylamin を放ちつゝ非鹽基性物質 α -Matrinidinoxymethylmethin を生ずるを見たり。

即ち核開裂が N と (C) の間に起れば (C) は β の炭素に二重結合を形成し得ざるを以て遊離する Valenz は N に附着せる OH と結合して第一級アルコールとなり又此核開裂は比較的抵抗強かるべきを以て核開裂以前 (C) の Methylene 基は 1 部分 CH_3 基に變じ既に N に存在する 2 個の CH_3 基と共に Trimethylamin として分離し非鹽基性物質を副生せるものと見做さるべし。

此く Hofmann 氏脱窒のメチル化に際し第一級アルコールを生ずる事實は數次證明せられたる所にして v. Braun は (B. 49, 2640) Pyrrolidiniumpiperidiniumhydroxyd の蒸溜に際し半量は普通の法則に従ひ N-γ-Butenyl-piperidin に變化するも他の半量は N-(δ-Oxy-butyl)-piperidin 及び N-δ-Amylenylpyrrolidin に變移する事を示し

又同氏は (B. 49, 2637) Dihydroisindoliumpiperidiniumhydroxyd の蒸溜により悉く Pyrrolidin-Ring の開裂を來し Aminoalkohol に變化せる事を示せり。

又此第三の炭素(C)の構成する Methylene が CH_3 基に變化する傾向は α -Matrinidin, β -Matrinidin, Matrin の N- CH_3 測定に際して誤り易き結果を起す原因なるべし。

上記の結果を以て α -Matrinidin の第三級窒素をめぐる炭素の配列状態を示せば次の如し。

α -Matrinidin が Hofmann 氏脱窒的分解により核開裂を來たすに反し Matrin, Methylmatrinsäuremethylester が頑強に抵抗しかへつて Methylalkohol を分離する現象は極めて興味ある事實なり。

今, α -Matrinidin $C_{12}H_{20}N_2$, β -Matrinidin $C_{13}H_{20}N_2$ がマトリン酸加里 $C_{14}H_{15}N_2$ COOK の乾溜によりて生ずる機作を考ふるに CO_2K なる基が K_2CO_3 として分離するは勿論之と同時に 2 或は 1 個の炭素が夫々 1 或は 2 個の二重結合の新生と共に分離したるや明かなり。Matrin が極めて安全に蒸溜し得る事實に鑑み殘部の骨格には著しき變化を受けざる事を推し得べし。従つて Matrin の第三級窒素は此際何等核開裂を伴ふ事なく、夫々 α -Matrinidin, β -Matrinidin 中に保持せられ唯 α -Matrinidin は Matrin 中に於て Hofmann 氏分解に抵抗する要素を此際失ひたるものと考ふれば足れり。

即 α -Matrinidin は第三級窒素に近く二重結合を有し且又 Matrin 酸の乾溜によりて失はるゝ 3 個の炭素中少くも 1 個が第三級窒素に接近して存在する如く考へらるゝが故に余等はマトリンの構造中 α -Matrinidin の第三級窒素をめぐる 3 個の炭素中 Hofmann 氏 Abbau の第一段に於て開環する炭素(A)に 1 個の側鎖として其炭素の存在する事を推定せん。

斯くして最も開裂し易き炭素(A)は側鎖に二重結合の消失の影響により極めて抵抗を増加し左右相平均せる状態により第三級窒素は核開裂を來す事なく却て Methylalkohol を分離するものと見做すを得べし。

斯くの如く α の炭素に於ける側鎖が核開裂に抵抗を増加せしむるは既に知らるゝ處にして v. Braun(B. 49, 2613) は Dihydroindol 類の Emde 氏分解を研究の結果 Pyrrolin 核に於ける側鎖の存在が核開裂に影響するを知れり。

即ち 3 の位置に於ける CH_3 基の存在は可なり核開裂に抵抗し 2 の位置に於

ける CH_3 基の存在は著しく抵抗を増加す。

例へば Dihydroskatol, 2-Methyl-3-dimethyldihydroindol, Hexahydrocarbazol の N-Methyl-methylammoniumchlorid をナトリウムアマルガムにて還元すれば CH_3Cl を分離して夫々, 76%, 90%, 88% の原物質を復活するを認む。

余等は此假説の有力なる證據として β -Matrinidin の性質を吟味せんす。

β -Matrinidin と α -Matrinidin との差異は既に論證せし二重結合の差異を考へざれば 1 個の Methylene 基なり。此 Methylene 基はおそらく炭素 (A) に連結する側鎖の片割にして余等は β -Matrinidin を下の如く推定せんす。

炭素 (A) 及び之に隣れる第二級炭素は不齊性にして β -Matrinidin 中 α -Matrinidin に比し 1 個多くの不齊性炭素の存在は 其旋光性に於ける大なる 差異を豫想せしむ。實際に於て α -Matrinidin が $(\alpha)_D^{18} = -18.75$ を示すに反し β -Matrinidin は $(\alpha)_D^{18} = +1.68^\circ$ を示すを見る。

余等は既に β -Matrinidin が Jod 及び Bromcyan の作用により $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N}_2\text{X}$ なる型を有する Ammoniumhaloid に變化するを知れり。此珍らしき反應機作は炭素 (A) の側鎖 CH_3 基を假定する事によりはじめて都合よく説明せらるゝが如し。

$\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N}_2\text{X}$ が沃度水素酸の還元により Dihydro- α -Matrinidin $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{N}_2$ に變化するものせば沃度或は Bromcyan の反應は何等の核開裂を伴はず。又 $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N}_2\text{X}$ が 5 價の Ammoniumbase を形成する 事實を考ふれば $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{N}_2$ に對し 3 個の二重結合の存在する事明かなり。故に $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{N}_2\text{J}$ の第三級窒素は $\begin{array}{c} \text{—C—} \\ \text{—C—} \end{array} \text{N}$ なる形に於て存在せざるべからず。従て β -Matrinidin は CH_3 基を失ふと同時に窒素及び其 1 個の α 炭素間に二重結合を生じたりと考へざるべからず。即 Methyl 基

が窒素に對し α の炭素に結合せる事は疑なきが如く其位置は Hofmann 氏 Abbau の第一段に於て開裂せし炭素(A)ならざる可からず。

今 β -Matrinidin に J_2 , $BrCN$ の反應を圖示すれば次の如く考へらる。

而して此反應は決して Halogenwasserstoff には行はれざるが如く Halogen が強き陰性の基に結合せるときはじめて行はるゝが如し。

斯くの如く第三級窒素が Halogen の作用により Ammoniumbase となり或は Negativement の作用により二重結合を新生する際 Alkyl を分離するは其例なきにあらず。

Tetrahydroberberin に沃度を作用せしむれば Berberin に變じ (Ar. **232**, 149) Corydalin が沃度或は醋酸第二水銀の作用により Dehydrocorydalin に變じ (Soc. **91**, 657; Ar. **234**, 492; Ar. **253**, 274)

Abietin 酸が硫黄の作用により Reten を生ずる 際二重結合の 新生により CH_3 基を分離するが如し。[Helv. Chim. Acta 582(1922)]

之を要するに Matrin は少くも 1 個の Pyrrolidin 核を有し其の Imid 基は $>CO$ に Lactam 核を形成す。

Matrin の第三級アミンは NCH_3 を有せず。之に結合する 3 個の炭素中 1 個は Pyrrolidin 核の α 或は β の炭素なり。第二の炭素は Methylen にして之に隣れ

Prism Zeiss Id. $t=32^{\circ}\text{C}$ $i_D=36^{\circ}28'$ $n'=1.5115$ $n_D^{32}=1.5119$

鹽酸鹽。鹽基のアセトン溶液に鹽酸瓦斯を通じ之に少量のアルコールを滴下して放置す。細き白色の針晶 250° に熱するも分解せず。

α -Matrinidin のホフマン氏脱窒的メチル化反應。

α -Matrinidinjodmethylat を少量の水に溶かし新鮮なる水酸化銀にてふれば銀を多少遊離し(銀鏡を生ず)赤褐色の液體となり沃度を含有せず。之れを蒸發すれば赤褐色の舍利別を生ず。これ α -Matrinidinmethyldydroxyd にして之を 6mm にて蒸溜すれば 120-280° に溜出す。溜液を酸性磷酸加里溶液により鹽基性部分と非鹽基性部分に分つ。

非鹽基性部分を蒸溜すれば 6mm にて 110-150°, 150-185° の液體となる。共に強烈なる松材反應を呈す。

鹽基性部分を分溜すれば 6mm にて 135-160°, 170-185° の 2 つの部分に分れる(同量)。同時に 185-280° に少量の溜出物を認む。135-160° の溜分を 1 週間放置の後分溜すれば悉く 6mm にて 175-190° (184° が主溜點) に溜出し共に 277° に分解する白金鹽(比較的安定)を生ず。兩者共に偏光面を廻轉せず。

Liebermann 反應を呈し NO-Amin は鹽基性なり。

比旋光度

I (K.P. 135-160°C) 物質 0.1842g を 10cc の酒精に溶かす。1=1dm $\alpha_D^{20} = \pm 0^\circ$

II (K.P. 184°C) 物質 0.2155g を 10cc の酒精に溶かす。1=1dm $\alpha_D^{20} = \pm 0^\circ$

分析 白金鹽 Z.P. 277°

物質 0.1651g CO₂: 0.1534g H₂O: 0.0647g C: 25.34% H: 4.38%

物質 0.1338, Pt: 0.0418g Pt: 31.25%

(C₁₃H₂₂N₂ · 2HCl) PtCl₄ として

理論數 Pt: 31.68% C: 25.33% H: 3.93%

實驗數 Pt: 31.25% C: 25.34% H: 4.38%

N·CH₃ 基測定(ヘルツヒ、マイエル氏法)

物質 0.1511g AgJ: 0.3623g CH₃: 15.31%

C₁₃H₂₂N₂ として 理論數: 2 CH₃: 14.58%

α -Matrinidinmethylmethinjodmethylat C₁₃H₂₂N₂(CH₃J)

α -Matrinidinmethylmethin のエーテル溶液に Jodmethyl を加へ放置すれば極めて吸濕性強き針晶を生ず。1 部分をこり新鮮なる鹽化銀にてふり蒸發すれば淡褐色舍利別狀の Chlormethylat となる(Trimethylamin 臭を認む)。

α -Matrinidinmethylmethinchlormethylat は結晶性白金鹽を生じ白金鹽は還元性少なく 255-257°C に分解す。

物質 0.1201g CO₂: 0.1198g H₂O: 0.0493g C: 27.21% H: 4.59%

(C₁₃H₂₂N₂ < $\begin{smallmatrix} \text{CH}_3 \\ \text{Cl} \end{smallmatrix}$ · HCl)PtCl₄ として

理論數	G: 26.67%	H: 4.16%
實驗數	C: 27.21%	H: 4.59%

α -Matrinidinmethylnmethinjodmethylat を新鮮なる水酸化銀にてふり(多少黒變す)濾液を減壓蒸溜に附し發生する鹽基性瓦斯を稀鹽酸にて捕集す。

揮發性鹽基を有する鹽酸溶液を蒸發し更に少量の水にさかし獸炭にて脱色し再び蒸發すれば吸濕性强き柱狀の鹽酸鹽を生ず。Liebermann 反應を呈せず。250° に分解する羊齒葉狀金鹽を生ず。

分析 金鹽 Z.P. 250°C,

物質	0.1304g	Au: 0.0348g	Au: 49.69%
		$[(CH_3)_3N \cdot HCl]AuCl_3$ として理論數	Au: 49.42%

減壓蒸溜液を酸性磷酸加里にて分離すれば 10mm にて 135-190° に溜出する非鹽基性液體(松材反應なし)を 12mm にて 185-195° に溜出する鹽基に分たる。

185-195° に溜出する鹽基は Liebermann 反應を呈し NO-Amin は鹽基性を保持す。白金鹽は安定なれども吸濕性强くわづかに Alkohol により析出す。200° にて黒變し 219° に分解する無晶形粉末なり。

K.P. 185-195° の鹽基の分析

物質	0.1177g	CO ₂ : 0.3072g	H ₂ O: 0.1187g	C: 70.86%	H: 11.26%
質物	0.1523g	CO ₂ : 0.3973g	H ₂ O: 0.1515g	C: 71.16%	H: 11.13%
		平均		C: 71.01%	H: 11.19%
物質	0.1978g	N ₂ : 20.8cc	23°C.	752.8mm.	N: 11.7%
		C ₁₄ H ₂₆ N ₂ O として	理論數	C: 70.54%	H: 11.0%
			實驗數	C: 71.01%	H: 11.19%
				N: 11.75%	N: 11.7%

白金鹽 Z. P. 219°

物質	0.1169g	Pt: 0.0351g	Pt: 30.03%
		$[C_{14}H_{26}N_2O \cdot 2HCl]PtCl_4$	Pt: 29.66%

α -Matrinidinoxymethylmethinjodmethylat C₁₁H₆N₂OCH₃J

鹽基のエーテル溶液に Jodmethyl を加へ放置すれば白色の沈澱を生ず。之を水に溶かし新鮮なる鹽化銀にてふり Chlormethylat となし蒸發す。橙黃色無晶形の白金鹽を生ず。分解點 234°C.

分析 白金鹽 分解點 234°

物質	0.0544g	Pt: 0.0162g	Pt: 29.78%
		$[C_{10}H_{10}N_2OCl \cdot HCl]PtCl_4$ として	理論數
			Pt: 29.78%

α -Matrinidin oxy-dimethylmethinmethylijodid の水溶液に水酸化銀を加へ Jod を OH にて置換し沃度銀を濾過し水浴上に減壓蒸溜すれば Styrol に類似する刺戟臭を有し空中にて樹脂化し易き油を交へたる水を溜出す。非鹽基性にして松材反應

を呈せず。残留分を油浴中に蒸溜すれば 28mm にて 170-190° に溜出する液體を得たり。之を前の刺戟臭の油と合せエーテルにごかすも殆んど螢光を認めず。エーテル溶液を酸性磷酸加里溶液により鹽基性物質と非鹽基性物質に分つ。後者は松材反應を呈せず。鹽基性の物質は其量精製に充分ならず之を保存して今後の研究にのこせり。減壓蒸溜に際し發生する瓦斯狀鹽基を稀鹽酸に捕集し之を蒸発すれば針狀の鹽酸鹽を生ず。金屬は黃色羊齒葉狀にして分解點 250° を示す。

物質	0.1360g	Au: 0.0648g	Au: 49.12%
	$[(\text{CH}_3)_3\text{N} \cdot \text{HCl}] \text{AuCl}_3$	として理論數	Au: 49.42%

$$\beta\text{-Matrinidin} \quad \text{C}_{13}\text{H}_{23}\text{N}_2$$

比 重： 物質 0.8669g = 水 (30°C) 0.78815g

$$d_{30} = 1.100$$
$$d_4^{39} = \frac{0.8669}{0.7881}(Q-\lambda) + \lambda = 1.0836$$
$$Q = 0.99567 \quad \lambda = 0.11648$$

屈折率 Prism. Zeiss Id. t = 30°C

$$i_D = 25^\circ 38' \quad n' = 1.53205$$
$$n_0^{c0} = 1.56208$$

分子屈折率 (Lorenz—Lorenz 式)

$$\frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} \cdot \frac{M}{d} \dots\dots\dots 61.12$$
$$\text{C}_{13}\text{H}_{20}\equiv\text{N} > \text{N} \left| \frac{\quad}{2} \right| \text{として 理論数} \quad 61.40$$

實驗數 61.12

β -Matrinidinchlormethylat $C_{13}H_{20}N_2 \cdot CH_3Cl$.

β -Matrinidin のエーテル溶液に Jodmethyl を作用せしむれば白色の舍利別を析出す。水に極めてこけ易し。之を鹽化銀にてふり Methylchlorid をなし蒸發すれば鉛狀の Syrup を生ず。白金鹽を鹽酸より再結晶すれば 分解點 186°C のものなる。

物質 0.0586g Pt: 0.0189g Pt: 23.72%

$[\text{C}_{13}\text{H}_{20}\text{N}_2 \cdot \text{CH}_3\text{Cl}]_2 \text{PtCl}_4$ として 理論數 Pt: 23.06%

β -Matrinidin の亞鉛末乾溜.

β -Matrinidin 22g を亜鉛末にて捏ね粉末状となし (約 500g) 蒸溜す。約半量の油と揮發性鹽基を生ず。油を酸性磷酸加里にてふれば之に溶解する鹽基も非溶解性のものに分たる。鹽基は少量の 6mm にて 185°C 以下に溜出する部分の外主として 6mm にて 185-190°C に溜出す。後者を再溜すれば主として 187°C (6mm) に溜出す。193°C に熔融する Pikrat, 216° に分解する白金鹽, 120° に熔融する金鹽を生ず。又鹽酸鹽, 臭化水素酸鹽は共に矢羽狀の結晶にして β -Matrinidin と異にす。鹽酸鹽の分解點は 252°C。

分析

金鹽 (F. P. 120°)

物質	0.3140g	Au: 0.1148g	Au: 36.56%
	$[\text{C}_{13}\text{H}_{20}\text{N}_2 \cdot \text{HCl}] \text{ AuCl}_3$		Au: 36.23%

鹽基 (K. P. 187°C. 6mm)

物質	0.1611g	CO_2 : 0.4520g	H_2O : 0.1367g	C: 76.53%	H: 9.50%
物質	0.1200g	CO_2 : 0.3365g	H_2O : 0.1044g	C: 76.50%	H: 9.74%
$\text{C}_{13}\text{H}_{20}\text{N}_2$	として	理論數		C: 76.5 %	H: 9.8 %
		實驗數(平均)		C: 76.52%	H: 9.62%

比重

鹽基	0.3198g	=	H_2O (18°C) 0.2912g
d_{18}	=	1.0982	$d_4^{18} = 1.0982(0.9986 - 0.1213) + 0.1213$
			= 1.0843

屈折率

Prism Zeiss Id. T = 20°C

$$i_D = 21^\circ 53'$$

$$n_D^{20} = 1.57963$$

分子屈折率 (Lorenz-Lorenz)

$$\frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} \cdot \frac{M}{d} = 62.61$$

$$2 \text{ — として理論數 } 61.4$$

$$3 \text{ — として理論數 } 63.1$$

$$\text{實驗數 } 62.61$$

鹽基 K. P. 187°C (6mm) のクローム酸による酸化.

鹽基 5g を (硫酸 16g を水 100cc に溶解せる) 稀硫酸に溶解し之を 0°C に冷却しクローム酸 15g を水 50cc に溶解せるものを滴下す. 温度を 0-1°C に保ち激しく攪拌す. 液はクローム酸鹽を生じ樹脂狀なる. 此處に於て温度を次第に上げ 80-90° に至れば液は綠色に變ず. 2 時間にて全部のクローム酸を加へ終りたる後更にクローム酸 2g を水 10cc に溶解せるものを滴下す. 約 1 時間加熱の後冷却し多量のエーテルにて振る. エーテル残渣は少量にして乳酸に類する臭氣を放つ.

エーテルに來らざる部分をバリットにて中和すれば未だ酸性の中に盛に全くヒノリンの如き臭氣を放つ.

液を濾過し BaSO_4 を除き濾液に炭酸瓦斯を通じて Ba-Ion を除き蒸發すれば舍利別なる. 之を無水アルコールにて浸出し少量の鹽酸を除きアルコールを溜出し放置するも結晶せず. 之を 5% の硫酸に溶かし燐タングステン酸の 5% 硫酸溶液を加へ沈澱する鹽類を濾過し 5% 硫酸にて充分洗ふ.

此燐タングステン酸を乳鉢中にて水酸化バリウム の糊にてよく研磨し水を加へ濾過す。再三此操作を繰返へし濾液に炭酸瓦斯を通じ Ba を除き蒸發す。之を無水アルコールにて浸出し少量の鹽類を除き アルコールを蒸溜すれば淡褐色の舍利別を得たり。アセトンに殆ど溶解せず。銅鹽を結晶性に出す事を得ず。少量の醋酸エステルを加へ氷室内エキシカートルに放置すれば僅に芝草狀結晶を認むる事を得たり。

又之に Jodmethyl を作用するも Jodmethylat は極めて結晶し難し。

共に原料少きため之を保存して今後の研究にそなへたり。

乾溜による非鹽基性物質は著しき松材反應を呈し之を分溜すれば (6mm) 少量の 140° 迄に溜出する液と 140-170° に溜出する液とに分たる。後者は 1 部分冷却器中に芝草狀結晶性として附着す。此結晶はアルコールよりパラフィン様板狀に結晶し恐くは炭化水素ならんを推せらる。

β -Matrinidin の白金コロイドによる還元。

鹽基 1.5g を 50cc の氷醋に溶解し鹽化白金 0.5g, アラビアゴム 0.5g, 水 50cc, 白金コロイド 2cc を加へ水素中に振盪す。約 180cc の水素吸収の後全く還元停止す。

鹽基を遊離すれば 15mm にて 190-195° に溜出する無色の液體を得たり。ハロゲン水素酸鹽は結晶せず。白金鹽は分解點 217°, 金鹽は 106° に溶解す。

分析

金鹽 F.P. 106°C

物質	0.2181g	Au: 0.0798g	Au: 36.59%
----	---------	-------------	------------

$[\text{C}_{13}\text{H}_{20}\text{N}_2 \cdot \text{HCl}] \text{ AuCl}_3$ として	理論數	Au: 36.23%
--	-----	------------

白金鹽 Z. P. 217°C.

物質	0.1183g	Pt: 0.0291g	Pt: 24.49%
----	---------	-------------	------------

$[\text{C}_{13}\text{H}_{20}\text{N}_2 \cdot \text{HCl}]_2 \text{ PtCl}_4$ として	理論數	Pt: 23.85%
--	-----	------------

Pikrat は 184° に熔融し β -Matrinidin の Pikrat と混融するも變化せず。

β -Matrinidin の沃度水素酸燐による還元。

鹽基 5g を沃度水素酸 ($d=2.0$) 及赤燐にて閉管中 4 時間 250° にて反應せしむ。 α -Matrinidin の同じ還元の際と同様に處理して 128-131° (6mm) に溜出する鹽基を得たり。

Liebermann 反應を呈し NO-Amin は鹽基性なり。

分析

物質	0.1460g	CO_2 : 0.3943g	H_2O : 0.1545g	C: 73.70%	H: 11.84%
----	---------	-------------------------	--------------------------------	-----------	-----------

物質	0.1596g	CO_2 : 0.4326g	H_2O : 0.1646g	C: 73.95%	H: 11.54%
----	---------	-------------------------	--------------------------------	-----------	-----------

平均	C: 73.83%	H: 11.69%
----	-----------	-----------

物質	0.1612g	N_2 : 20.1cc	$t = 17.5^\circ\text{C}, 766\text{mm}$	N: 14.44%
----	---------	-----------------------	--	-----------

$C_{12}H_{22}N_2$ として 理論數 C: 74.18% H: 11.43% N: 14.42%

實驗數 C: 73.83% H: 11.69% N: 14.44%

鹽酸鹽. 鹽基のエーテル溶液に鹽酸瓦斯を通じて析出する沈澱を Aceton, Al-kohol 混液にて處理す. 白色細かき結晶にして 270° に熱するも變化する事なし.

物質 0.1458g AgCl: 0.1541g Cl: 26.15%

$C_{12}H_{22}N_2 \cdot 2HCl$ として 理論數 Cl: 26.54%

實驗數 Cl: 26.15%

白金鹽 270° にて變化なし.

物質 0.1438g Pt: 0.0450g Pt: 31.44%

$(C_{12}H_{22}N_2 \cdot 2HCl) PtCl_4$ として 理論數 Pt: 32.30%

β -Matrinidin に對する沃度の作用.

β -Matrinidin のアルコール溶液に Jod のアルコール溶液を滴下すれば脱色す. 過剰の沃度を加へ (Harz-Masse を沈澱す) 1 夜放置せる後アルコールを溜去し水を加へ振盪しつゝ $Na_2S_2O_3$ 溶液を滴下し沃度の反應なきに至りたる後濾過し濾液に炭酸加里を加へ析出せる鹽基をクロ、フォルムにこりクロ、フォルムを溜去す. 殘留物に再び水を加へ温浸し水溶液を獸炭にて脱色し蒸發すれば芝草狀針晶を得. 之をアセトンより再結晶すれば分解點 $210-218^\circ$ を示す.

分析 (Carius)

物質 0.0942g AgJ: 0.0701g J: 40.2%

$C_{12}H_{17}N_2J$ として 理論數 J: 40.4%

結晶を水に溶解し新鮮なる鹽化銀にて振るか或は水溶液に硝酸銀を加へ濾液に稀鹽酸を加へ過剰の銀を除き且つ $-NO_3$ を Cl にて置換し炭酸加里を加へて析出する鹽基をクロ、フォルムにて抽出しクロ、フォルム溜去後殘留物を水にて温浸し獸炭にて脱色し蒸發すれば針狀の結晶となる. 分解點 ca. 233° .

本物質は 1 種の Ammoniumchlorid にして白金鹽は分解點 210° , 金鹽は F. P. $125-128^\circ$ を示す.

分析

白金鹽 (Z. P. 210°)

物質 0.0657g Pt: 0.0162g Pt: 24.73%

物質 0.0930g Pt: 0.0234g Pt: 25.16%

物質 0.1240g CO_2 : 0.1679g H_2O : 0.0560g C: 36.92% H: 5.03%

$(C_{12}H_{17}N_2Cl)_2 PtCl_4$ として

理論數 Pt: 24.82% C: 36.65% H: 4.36%

實驗數 Pt: 24.94% C: 36.92% H: 5.03%

遊離の鹽基 分解點 263°

物質	0.0696g	CO ₂ : 0.1661g	H ₂ O: 0.0531g	C: 65.10%	H: 8.53%
	C ₁₂ H ₁₇ N ₂ Cl	として	理論數	C: 64.14%	H: 7.63%
			實驗數	C: 65.1 %	H: 8.53%

β -Matrinidin に對する Bromcyan の反應.

β -Matrinidin 數滴に直接少量の BrCN を加ふれば強く發熱し黑色の樹脂様物質に變ず.

β -Matrinidin 5g のエーテル溶液に BrCN 5g (2 Mol.) のエーテル溶液を加ふれば少しく熱を發し白色の沈澱を生ず. 中に針狀の結晶を交ふるを認む. 1 夜放置せる後エーテルを傾瀉し減壓エキシカートル中に 2 日放置すれば淡褐色の粉末となるも極めて吸濕性なり. 之に水を加ふれば盛に BrCN を發生しつゝ分解す. 少しく温を加へ空氣を通じ BrCN の臭氣なきに至り濾過す. 濾液に炭酸加里を加へ遊離し來る樹脂様物質をクロ、フォルムにこりその殘渣を再び水にて温浸し獸炭を加へて脱色し濾液を蒸發すれば芝草狀結晶となる. 之を再び水に溶解し新鮮なる鹽化銀を加へ充分振盪すれば液は濁りて Brom 銀の沈澱するを認む. 之を濾過し濾液を蒸發し 1 夜エキシカートル内に放置すれば前と同様の結晶を生ず. Cl を有し水、アルコールに易溶、エーテルに不溶、アセトンに稍、こけ難く再結晶するに適す.

アセトンより再結晶せるものは純白にして先に Jod を作用して得たる結晶と全く同一の形狀を示す. 分解點 260-263°

金鹽、白金鹽は夫々分解點 126-128°, 融點 210° を示す.

分析 物質 (Z. P. 260-263°) を水に溶解し硝酸銀を加へて生ずる AgCl を定量す.

物質	0.0926g	AgCl: 0.0611g	Cl: 16.32%
		Cl 1 個として	分子量 217.3

Cl を定量せる濾液に鹽酸を加へ過剰の AgCl を濾別し炭酸加里を加へて析出する鹽基をクロフォルムにこりクロ、フォルム蒸溜殘渣に少量のアセトンを滴下すれば始めと全く同一の分解點を有する結晶となる.

試みに白金鹽の窒素を定量すれば

物質	0.1499g	N ₂ : 10.6cc, 21°C, 766.4mm	N: 8.06%
----	---------	--	----------

分子量 217.3 の Ammoniumchlorid として (第二の窒素が依然鹽基性を失へるものとして)

$$\frac{N_4(2N_2)}{2 \times 217.3 + P.Cl_4} = 7.26\%$$

$$\frac{N_6(2(N_2 + CN))}{2 \times 217.3 + P.Cl_4} = 10.9\%$$

即ち CN 基を結合せず。先に 沃度の作用によりて得たりし Ammoniumjodid の Cl 置換體の性質に全く一致するを見る。念のため白金鹽を分析す。

白金鹽 分解點 210°C

物質	0.0560g	Pt: 0.0139g	Pt: 24.82%
物質	0.1518g	Pt: 0.0373g	Pt: 24.57%
物質	0.1343g	CO ₂ : 0.1785g H ₂ O: 0.0555g	C: 36.27% H: 4.62%
[C ₁₂ H ₁₇ N ₂ Cl] ₂ PtCl ₄ として			
	理論數	C: 36.65% H: 4.36% Pt: 24.82%	
	實驗數	C: 36.27% H: 4.62% Pt: 24.69%	
C ₁₂ H ₁₇ N ₂ Cl として			
	理論數	Cl: 15.79%	
	實驗數	Cl: 16.32%	

金鹽 F.P. 125-128°C.

物質	0.0970g	Au: 0.0358g	Au: 36.91%
[C ₁₂ H ₁₇ N ₂ Cl] AuCl ₃ として			
	理論數	Au: 37.4 %	

水に溶解せざる部分は Halogen を含有しクロ、フォルムによく溶解する赤褐色の樹脂様物質にして未だ之を都合よき形にする事を得ず。

(大正十五年九月八日 認む)

ゲンチジンの構造に就て

附 イソゲンチジンの合成

Über die Konstitution des Gentisins
Synthese des Isogentisins

藥學士 篠 田 淳 三

Gentiana lutea は山間に生長する植物にて就中瑞西國に多く産す(日本藥報第 3 號植物園参照)。其主成分は苦味質なり。之れに含有せらるる黄色々素を Gentisin と云ふ。其含有量僅少にて 0.04% に相當す(Baumert: Ann. **62**, 101)。本品を初めて抽出せし人を Henry u. Carenton (J. d. Pharm. 1821, 178) とす。Baumert (Ann. **62**, 106) は之れに C₁₄H₁₀O₅ なる分子式を與へたり。其後 Hlasiwetz u. Habermann (Ann. **175**, 63; **180**, 343) は Baumert の分子式を承認して二つの遊離 OH を有する事を確め、アルカリ熔融に依つてフロ、グルチンと Gentisin-säure (2:5-Dioxybenzoesäure) とに分解する事を明かにし尙 HCl の作用に依つて CH₃Cl を生ずる事に依り一つの CH₃O を含有する事を明かにせり。此 Gentisin