粗セミカルバツォンの分解點 186-192°, 得量 1.3g にして 醋酸エーテルより再結晶するに分解點 192-194.5° となりマンガンズルファートによりて得たるベンツォイルグリコールアルデヒドのセミカルバツォン (分解點 194-195°) と混融するに温度下降せず。

物質	0.1280g	N 20.4cc (766.5mm 13°)	N 18.91%
Ber.	$C_{10}H_{11}O_3N_3$		19.02%

(大正 15 年 12 月東京衛生試験所製薬部にて)

フルフルアルゴホルの二・三の生理的作用

大 久 保 昌 之

M.Okubo: Über einige physiologische Wirkungen
des Furfuralkohols.

Jons Hopkins 大學に於て Macht 氏⁽¹⁾ は Opium-Alkaloid の化學的構造と藥物學的作用との關係を研究して次の如き結論に到達せり。

阿片アルカロイドは藥物學的作用より之を二族に分つことを得。一は Morphin 族にして, Morphin, Thebain, Codein 等之に屬し是等は輸尿管 Ureter に對してその筋肉を刺戟し Tonus を高めて收縮作用を營む。他は Papaverin 族にして, Papaverin, Narcotin, Narcein 等之に屬しその藥物學的作用は Morphin 族と反對にして即抑制的に作用す。而して此兩族のアルカロイドはかく藥物學的に差異ある作用を有するのみならず之を化學構造上より考察する時は Morphin 族は共通的に Pyridin-phenanthren 骨格を有し Papaverin 族は何れも Benzyl-isochinolin 骨格を有し、此兩者が夫々兩族の生理的作用を代表するものなり。

更に此二つの共通なる骨格を解剖してその生理作用を検するに前者に於てはその興奮作用は Pyridin に存し後者に於てはその抑制作用は Benzyl 基に存す結論せり。

茲に於て Benzyl 基を有する簡單なる物質にして Papaverin の如き生理的作用を有ししかも Papaverin に比して毒性少くかつ麻醉性なき物質を求め遂に Benzylalkohol 及其 Ester 類がその目的に適する物質なる事を知り尙興味ある事實として Benzylalkohol が局所麻醉作用並に殺菌作用を有するものなる事を報告せり。⁽²⁾

余は今此 Benzylalkohol の Benzyl 基に代ゆるに Feryl 基を以つてしたる Furfuralalkohol が Benzylalkohol に近似の作用を有せずとの想像の下に Furfuralalkohol に就て二・三の生理的作用を検して次の結果を得たり。Furfuralalkohol の製法は

Erdmann 氏⁽³⁾に従ひ Furfurol に苛性アルカリを作用せしめて水加作用を営ましめ酸化還元を同時に行はしむる所の Cannizzaro 氏の反應を利用せるものに依れり。

かくして得たる Furfuralkohol を生理的食鹽水に溶解して實驗に供せり。

毒性（致死量）。

健康なるマウスにつき實驗藥物の 1-0.5% 溶液を背部皮下に注射してその毒性を検せり。體重 1g につき 0.01mg を注射したるものは殆んど認むべき症狀を呈せず。0.05mg に至て著明なる中毒症狀を呈し 0.1mg を注射したるものに於ては 3-5 時間の後に死せり。

中毒症狀としては呼吸困難、反射遲鈍、歩行迷蒙等にして頗る急性的に來り 4-5 時間の後には恢復す即吸收並に消失作用共に迅速なり。中毒症狀の重きものは全身麻痺の状態に陥り強度の呼吸困難によりて斃る。直に剖視するに心臓は僅に搏動しかつ暗黒色を呈せり。

呼吸及血壓に對する作用。

中等大の家兎の體重 1kg につき 2g の Urethan を徑口的に與へて麻酔せしめ兎臺に背位に固定して頸の如く頸動脈にカニウレを挿入し水銀マノメーターに連續し氣管のカニウレはマーレー氏タンブーに連結し兩者の運動を煤紙上に描かしめ耳殻靜脈より毒物を注射して呼吸並に血壓に及ぼす影響を見るに呼吸運動を抑制すると同時に血壓の降下するを見る。（第1圖甲）而して此呼吸抑制作用は兩側の迷走神經を切斷したる後にも表るるものにして（第1圖乙）即呼吸中樞に作用するものなりと言ひ得可し。

摘出蛙心に對する作用。

Fühner-Strau 氏法に則り Ringer 液中に榮養したる青蛙の摘出心臟に就てその作用を検するに極く稀薄なる溶液を以つてしてはその搏動數を減少するのみなるも（第2圖甲）少しく濃厚なる際には半收縮期に於て運動を靜止せしむ。（第2圖乙）即心臟毒たるを知る。

平滑筋肉に對する作用。

Fühner-Magnus 氏法に依りて體温に温められたる Ringer 液中に榮養せる家兎の摘出腸管（第3圖甲）及モルモットの摘出子宮（第3圖乙）に就てその作用を検するに全く抑制的に作用する事を知れり。

腎臟血管に對する作用。

Wohll-Gemuth 氏の裝置を用ひて家兎腎臟血管に對して Furfuralkohol を還流せしめたるも殆んど作用せざるを認めたり。（第4圖）

神經傳導麻酔作用。

Sontesson-尾崎氏法に準じ青蛙の頭部を切斷し小腦及延髓を破壊して所謂反射

蛙 Refrex Frosch を作り腹位に蛙板に固定して注意して両側の坐骨神経を露出し、一側は中樞に遠く切断して知覚神経用に供し他側は中樞に近く切断して運動神経用に供す。共に神経の切断端に近く電極子を置き、E. du Bois-Reymond 氏の Schlitteninductorium を利用して種々なる強度の感應電流の電撃を与えその神経に関連する筋肉に起る刺戟運動の有無によりて神経傳導力の有無を知り電極子に僅に離れて脱脂綿花に一定濃度の Furfuralkohol 溶液を浸したるものを神経上に作用せしめ電撃によりて筋肉に到達する刺戟の變化によりて毒物の神経に對する麻醉性の有無を知る。電流の強さは電氣機の感應コイルの距離（センチメートル）

に依りて知り得。

之に依りて次表の如き結果を得たり。

（備考）實線は運動神経、點線は知覚神経、F. A. は當該 % Furfuralkohol にして↓の所に於て綿花に含ませて神経束に作用せしめたる點、Ringer は Ringer 液を綿花に含ませて先の Furfuralkohol と交換したる點を示す。

上表に於て見るに 5% の際に於ては運動知覚兩神経を共に麻痺すれども 1% の際には撰擇的に知覚神経を麻酔し而もその型式は他の多くの局所麻醉藥の如くその作用の現るるや俄然としてその毒力を發揮するを見る。

結 論

以上簡單ながら Furfuralkohol が有する二・三の生理的作用に就て之を見るに何れの場合に於てもその作用は抑制的麻痺的にして、殊に稀薄溶液が知覚神経を麻酔せしむ

るは明に本品が局所麻醉作用を有するものなる事を知る。

而して是等の作用は Benzylalkohol の夫に近似せるものなる可く即有機化合物の生理的作用がその Seitenkette に負ふ所多く、必ずしも Mutterkern の如何に大なる關係を有せざる一例たり得可し。

第一圖 (時記 3 秒)

第二圖 (時記3秒・2cc Ringer 液) (甲)

(乙)

第三圖 (50cc Ringer液) (甲)

(乙)

第四圖 (時記 10 秒)

Oben Zeitmarke.

Unten Tropfenzahl.

本研究は満州醫科大學藥物學教授久保田晴光先生の御指導に依りたり、記して深く謝意を表す。

Literatur.

- (1) Maht: Jour. Pharm. and Exp. Thera., Oct. (1915).
- (2) „: Jour. Pharm. and Exp. Thera., Vol. **11**, 264. (1918).
- (3) Erdmann: Ber. **35**, 1855, (1902).

 β -ヨードエチルウレタンに就て

株式會社武田商店研究部

黒田 佐 十 郎

S. Kuroda: Über β -Jodäthylurethan.

ヨードカリウムが古來より變質藥として甚だ貴重なる藥品なることは、幾多の缺點を有するにも關らず、依然として今尙其聲價を保持するに見るも明かなり。

Ferner wurde aus Dioxymaleinsäure Glycolaldehyddimethylacetal bereitet und nach der Pyridinmethode in Benzoylglycolaldehyddimethylacetal (Oel. Sdp. 151–152° bei 11 mm) umgewandelt und der daraus durch Zersetzung mittels Salzsäure erhaltene freie Aldehyd sofort in Semicarbazon übergeführt und so Benzoylglycolaldehydsemicarbazon (kleine Nadeln. $C_{10}H_{11}O_3N_3$. Zersp. 192–194.5°) erhalten. Bei der Mischprobe des letzteren mit dem Semicarbazon des durch Oxydation mittels Mangansulfat erhaltenen Aldehyds erfährt der Schmelzpunkt keine Depression.

T. K.

M. Okubo: *Ueber einige physiologische Wirkungen des Furfuralkohols.*

Verfasser hat bei der Untersuchung der physiologischen Wirkung des Furfuralkohols gefunden, dass in allen Fällen seine Wirkung eine hemmende und lähmende ist. Dass seine verdünnte Lösung die sensiblen Nerven lähmt, deutet darauf hin, dass er anästhetische Wirkung besitzt. In diesen Wirkungen zeigt er sich im allgemeinen mit Benzylalkohol verwandt, was wieder ein Beweis ist, dass die Wirkungen der organischen Substanzen weniger von der Art des Kernes, als mehr von dessen Seitenketten abhängen.

T. K.

S. Kuroda: *Ueber β -Jodaethylurethan.*

Der Verfasser hat nach der unten schematisch angegebenen Methode β -Jodaethylurethan aus Äthylenchlorhydrin erhalten. Die Substanz stellt farblose Nadeln vom Schmp. 93° dar; sie ist in Wasser ziemlich leicht löslich. In ihren Eigenschaften zeigt sie Uebereinstimmung mit dem im D.R.P. 387963 beschriebenen Körper. Das nach der II. Methode gefasste Zwischenprodukt β -Chloräthyl-