ルコチンを分解して得たるものなり。同氏の御厚意を謝す。

本研究に使用せし費用の一部は大正 15 年度に 御下附願ひし文部省科學獎勵費の一部を之れに充てたり。

(昭和 2 年 8 月 16 日 徳島高等工業學校製藥教室)

3:4-デメトオキシ-6-エチール-安息香酸の合成

藥學博士 篠 田 淳 三
佐 藤 壯 吉

J. Shinoda und S. Sato: Synthese der 3,4-Dimethoxy-
6-äthylbenzoesäure.

著者の 1 人(篠田)はフクゲチンの構造研究中¹⁾ フクゲチンのメチールエーテルの酸化成績體として一種の酸を得たり(未發表)。之れが 3:4-デメトオキシ-6-エチール安息香酸ならずやと考へ之れと比較研究の必要上文献を調べたるに 6-メチールヴェラトラム酸の記載あれども 3:4-デメトオキシ-6-エチール安息香酸即ち 6-エチール-ヴェラトラム酸の記載なし。本品とフクゲチンメチールエーテルの酸化成績體とは同一物質ならざる事を確めたるも文献上の缺を補はんとして此處に報告せんとす。

3:4-デメトオキシアセトフェノン²⁾を出發材料として此のアセチール $\text{CH}_3\text{CO}-$ を還元してエチール C_2H_5- に變化せんとして金屬カルチウムを利用して完全に脱水したる無水酒精と金屬ナトリウムとにて還元を行ひたるも其目的を達せず、亜鉛アマルガムを用ひて其目的を達したり。即ち 3:4-デメトオキシ-エチールベンツォールを得たり。更に之れにアセチールクロリドを作用せしめて 3:4-デメトオキシ-6-エチール-アセトフェノンを得たり。此の際這入るアセチールの位置は 1,2 或は 5 の三つあれどもメトオキシに對してバラの位置に這入るを妥當とす。即ち 1 の位置に $\text{CH}_3\text{CO}-$ が這入りたるものと考ふ。之の事實は最後に得たる表題の酸を過マンガン酸加里にて酸化したるものを再び過酸化水素にて酸化して *m*-ヘミピン酸を得たる事に依つて確定する事を得。扱此 6-エチール-3:4-デメトオキシ-アセトフェノンを酸に變化するには次亞沃度酸普達³⁾の溶液にて處理して目的の 6-エチールヴェラトラム酸 (F.P. 142°)を得たり。

1) 本誌, 第 535 號, 737

2) Bouveault: Bl. (3) 17, 1021

實驗之部

I. ヴェラトロール($(\text{CH}_3\text{O})_2\text{C}_6\text{H}_4$)

グアヤコール 90g を計算量より稍過剰の 25% 苛性曹達溶液に加ふれば發熱と共に白色針狀の結晶を生じ遂に全部粥狀物質に變ず。冷後之れに 100g のジメチル硫酸を振盪しつゝ徐々に注加する時は温度は次第に上昇して結晶は漸次消失して澄明の液となる。然るにジメチル硫酸の約半量を消費したる頃より液は再び乳濁して油滴を生じ液は二層に分離す。最後にエーテルに之れを取り乾燥後エーテルを飛ばして残渣を蒸溜すれば全部 $204^{\circ}\text{--}205^{\circ}$ にて溜出する無色澄明の液を得。F.P. 15° 。得量 90g。

II. 3:4-ジメトオキシ-アセトフェノン

(アセトヴェラトロニジメチルエーテル)($(\text{CH}_3\text{O})_2\text{C}_6\text{H}_3\text{COCH}_3$)

Baugault¹⁾の方法を少しく變更して本品を得たり。即ちヴェラトロール 10g を乾燥二硫化炭素 50g に溶解し之れにアセチルクロリド 6g を加へ、振盪しつゝ昇華製鹽化鐵 16g を少しづつ加ふ。始め混合物は僅かに發熱して鹽酸瓦斯を發生す。FeCl₃の大約半量を加へたる頃より反應漸く旺盛となり鹽酸瓦斯の發生甚だしく二硫化炭素は沸騰す。二硫化炭素は初め紅色より深紅色を経て暗赤色に至り反應終れば無色透明となる。反應終了後大部分の二硫化炭素を水浴上に追出し最後に空氣を導入して乾燥せしむ。残渣に冷水を加へて FeCl₃を分解すれば黑色の油を析出す。之れをエーテルに取り苛性曹達にて洗ひ乾燥後エーテルを追出して残渣を蒸溜すれば $282^{\circ}\text{--}283^{\circ}$ にて大部分溜出する無色粘稠の油狀物質を得。放置すれば結晶す。F.P. $49^{\circ}\text{--}50^{\circ}$ (B.氏 $49^{\circ}\text{--}50^{\circ}$)。得量 7g。本品の $\text{CH}_3\text{CO-}$ の位置を念の爲め確むべく炭酸曹達水溶液中にて KMnO_4 の酸化を行ひヴェラトラム酸 (F.P. 180°) を得たり。本品はヴェラトラム酸 (F.P. 180°) と混融するも融點降下せず。即ち $\text{CH}_3\text{CO-}$ の位置は $\text{CH}_3\text{O-}$ に對してメタ及びパラの位置にある事確實なり。

1) Bl. [3] 17, 1021

III. 3:4-デメトオキシアセトフェノン-オキシム($\text{OCH}_3)_2\text{C}_6\text{H}_3\cdot\text{C}\cdot\text{NOH}\cdot\text{CH}_3$)

上記のデメトオキシアセトフェノンに常法にて鹽酸ヒドロキシルアミンを用せしめオキシムを得。之れを水より再結晶せしむる時は白色針狀晶を得。F.P. 144° .¹⁾

分析

Sub.	0.1610g	V=11.2cc	T=23°.	B=762.5mm	N%=7.1
$\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{O}_3\text{N}$ として理論數					N%=7.2

IV. 3:4-デメトオキシエチルベンツォール ($\text{OCH}_3)_2\text{C}_6\text{H}_3\text{C}_2\text{H}_5$)

(エチル-ヴェラトロール)

Ryan²⁾ 又は Clemmensen³⁾ 氏の行ひし方法を参考として次の如く行へり。花狀亞鉛 45g を 5% 冷昇汞液 50cc に浸して一夜放置し翌日上澄液を捨て残渣に濃鹽酸 45cc, 水 90cc, アセチル-ヴェラトロール 9g を加へ砂浴上に 7 時間靜に沸騰せしむ。反應終了後之れに水蒸氣を通すれば成績物は溜出すれども不變化の物質は溜出せず。溜液をエーテルにて振盪してアルカリにて充分洗ひ炭酸加里にて乾燥す。エーテルを飛ばしたる後残渣を蒸溜すれば全部 $228-230^\circ$ にて溜出する無色透明の油狀物質を得。得量 5.5g.

分析

Sub.	0.1004g	$\text{CO}_2=0.2658\text{g}$	$\text{H}_2\text{O}=0.0758\text{g}$	C%=72.21	H%=8.33
$\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}_2$ として理論數					C%=72.3 H%=8.4

V. 3:4-デメトオキシ-6-エチルアセトフェノン($(\text{CH}_3\text{O})_2\text{C}_6\text{H}_2\text{C}_2\text{H}_5(\text{COCH}_3)$)

二硫化炭素 50g にエチルヴェラトロール 12g, アセチルクロリド 7g を溶解し昇華製鹽化鐵 9g を使用して II の場合と同様に之れを行ふ。本品はエーテルより直ちに結晶す。之れを石油エーテルより再結晶すれば無色柱狀晶を得。得量 11g, F.P. 63°

此の際エチルヴェラトロールの代りに 3:4-デメトオキシアセトフェノン即ち C_2H_5 の代りに CH_3CO -の入りしものにアセチル化を行ふも反應生ぜず。アセチル基の這入りたるものには此際には第二のアセチル最早入る事不能。

分析

Sub.	0.1026g	$\text{CO}_2=0.2626\text{g}$	$\text{H}_2\text{O}=0.0738\text{g}$	C%=69.8	H%=8.0
"	0.1106,,	"=0.2834,,	"=0.0756,,	"=69.9	"=7.7
$\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}_3$ として理論數					"=69.2 " =7.7

VI. 3:4-デメトオキシ-6-エチル-アセトフェノン-オキシム

 $(\text{CH}_3\text{O})_2\text{C}_6\text{H}_2\text{C}_2\text{H}_5(\text{CNOHCH}_3)$

V のケトンに常法の如く行ひて針狀晶を得。水より再結晶すれば F.P. 111.5°

1) Ber. **43**, 196 又は C. (1910) I. 2115 に 140° . 2) Roy. Dublin Soc. **15**, No.11, 118 (1916) 3) Ber. **46**, 1828

分析

Sub. 0.1268g T. 18° B. 769mm Vol. 7.1cc N%=6.8

 $C_{12}H_{17}O_3N$ として理論數 „ 6.3VII. 3:4-ヂメトオキシ-6-エチール-安息香酸 $(CH_3O)_2C_6H_2C_2H_5COOH$

3:4-ヂメトオキシ-6-エチール-アセトフェノン 6g を水 2L に沸騰して溶解せしめ(一部不溶)之れに N-苛性曹達 300cc を加へ 40° に保ち粉末沃度 30g を徐々に加へつゝ振盪する時は直ちに沃度フォルムを析出す。り 全部加へたる 後濾液を濃縮してエーテルにて不變化の物質を除き水溶液に $HNaSO_3$ 及び硫酸を加へて酸性にする時は黄色結晶を析出す。本品を水より再三再結晶を行へば遂に無色針狀品を得。F.P. 142°, 得量不良。

分析

Sub. 0.1016g $CO_2=0.2346g$ $H_2O=0.0618g$ C%=65.0 H%=6.8 $C_{11}H_{14}O_4$ として理論數 C%=62.8 H%=6.7

本品を過マンガン酸加里にて酸化すれば一種の酸を得。本品には *m*-へミビン酸の反應²⁾ なし、之れを再びアルカリ性過酸化水素にて酸化すれば明かに *m*-へミビン酸の反應を認む。

(昭和2年7月22日 徳島高等工業學校製藥教室)

アチルアミノ酸の脱水成績體の研究

藥學士 宮 道 悦 男

E. Miyamichi: Ueber Anhydrierung von Palmitylglykokollester.

カルラー並に著者は曾つてアチルアミノ酸エステル Acylaminosäureester が脱水劑の作用に依り水1分子を失ひてオキサゾール閉環 Oxazolringschluss をなす場合アチル殘基 Acylrest が此脱水作用に如何なる影響を及ぼす可きかを研究するの目的を以て次に列記するが如き數種の アチルアミノ酸エステルを合成し是等の化合物にそれぞれ五酸化燐若しくは五鹽化燐を作用せしめて脱水を試みたり。³⁾

Palmityl-glykokoll-aethylester	$C_{15}H_{31}CO \cdot NH \cdot CH_2 \cdot COOC_2H_5$
Lauryl-glykokoll-aethylester	$C_{11}H_{23}CO \cdot NH \cdot CH_2 \cdot COOC_2H_5$
Capryl-glykokoll-aethylester	$C_7H_{15}CO \cdot NH \cdot CH_2 \cdot COOC_2H_5$
Capronyl-glykokoll-aethylester	$C_5H_{11}CO \cdot NH \cdot CH_2 \cdot COOC_2H_5$

1) Archiv, 591 (1925) 2) Goldschmidt: M. **380**, 1885 3) Helv. **7**, 763 (1924); **8**, 265 (1925)

J. Shinoda und S. Sato: *Synthese der 3,4-Dimethoxy-6-äthylbenzoesäure.*

Zur Darstellung von 3,4-Dimethoxy-6-äthylbenzoesäure wurde zunächst Acetoveratron (3,4-Dimethoxyacetophenon) (I) durch Reduktion nach Clemmensen in Äthylveratrol (II) übergeführt und durch Friedel-Craftsche Reaktion eine Acetylgruppe eingeführt und so Äthyl-3,4-dimethoxyacetophenon (III) bereitet.

Die Stellung der Acetylgruppe wurde hierbei durch Oxydation von III in Metahemipinsäure (V) klargestellt; auch wurde das Zwischenprodukt dieser Oxydation, nämlich 3,4-Dimethoxy-6-äthylbenzoesäure (IV), erhalten.

Zur Herstellung von 3,4-Dimethoxy-6-äthylacetophenon (III) wurden 12 g Äthylveratrol, 7 g Acetylchlorid in 50 g Schwefelkohlenstoff mit 9 g sublimiertem Ferrichlorid versetzt. Ausbeute: 11 g. Aus Petroläther wurde die Verbindung in farblosen Prismen vom F. P. 63° erhalten. Das Oxim stellt aus Wasser farblose Nadeln vom F. P. 111.5° dar.

3,4-Dimethoxy-6-äthylbenzoesäure wird derart bereitet, dass 3,4-Dimethoxy-6-äthylacetophenon in viel Wasser gelöst und dieser Lösung NaOH und Jod zugefügt werden. Die Ausbeute ist keine befriedigende. Farblose Nadeln aus Wasser vom F. P. 142°.

Gef. C% 63.00 H% 6.8; Ber. f. C₁₁H₁₄O₄ C% 62.8 H% 6.7.

Durch weitere Oxydation dieses Produkts mit Kaliumpermanganat

und alkalischem H_2O_2 wurde Metahemipinsäure erhalten.

T. K.

E. Miyamichi: *Ueber Anhydrierung von Palmitylglykokoll-ester.*

Karrer und seine Mitarbeiter¹⁾ haben durch Einwirkung wasser-entziehender Mittel auf Acylglykokolläthylester gefunden, dass die niedrigeren Homologen vom Capronsäurederivate unter Ringschluss in Oxazolderivate übergehen, während Capryl-, Lauryl- und Palmityl-derivate keinen Ringschluss eingehen.

Verf. hat indessen Palmitylglykokollester in chloroformischer Lösung mit Phosphorpentoxyd 8 Stunden lang zum Sieden erhitzt, wobei eine Krystallverbindung erhalten wurde. Aus Aether umkrystallisiert, liefert sie Krystalle vom F. P. 32° . Bei der Destillation in vacuo unter 5 mm destilliert sie unter Zersetzung bei $180-190^\circ$. Sie ist schwach alkalisch, besitzt einen dem Oxazol typischen üblen Geruch und ist in Chloroform, Alkohol und Aether löslich. Durch Säuren wird die ursprüngliche Verbindung regeneriert.

Gef. C% 74.46 H% 11.60 N% 4.42.

Ber. für $\text{C}_{20}\text{H}_{37}\text{O}_2\text{N}$ C% 74.23 H% 11.54 N% 4.33.

Pikrat bildet schön gelbe Krystalle vom F. P. 60° .

T. K.

E. Miyamichi: *Ueber Pyrimidinringschluss von acylierten Aminosäurederivaten.*

1) Helv. 7, 763; 8, 205.