分 析

物質	0.1939g	CO ₂	0.4367g	H ₂ O	0.1218g	} C 61.68 H 6.97 N 7.08
物質	0.1004g	N ₂	6.3cc (23°, 760mm)			
理論數	C ₁₀ H ₁₃ O ₃ N (195.1)					C 61.50 H 6.71 N 7.17

32. 1-Furyl-4-methyl-2-aminopentan-1-ol

粗製ニトロアルコール14gを還元して修酸鹽6.5gを得たり。稀酒精よりF.226°の針狀晶を結ぶ。遊離鹽基は微黃色濃稠の液をなしアルカリ性銅溶液により淡紫色沈澱を生じエーテルと振盪すれば溶解してエーテル層を紫染す。濃硫酸により黃褐色を経て鮮綠色を呈し終日持續して翌日青色に變ぜり。

K_{p,7} 124° (korr.)d₄²⁰ = 1.0293n_D²⁰ = 1.4889

M.R. 51.34

Ber. 51.83

EM. - 0.49

ES. - 0.27

分 析

物質	0.1503g	CO ₂	0.3589g	H ₂ O	0.1259g	} C 65.12 H 9.37 N 7.76
物質	0.1028g	N ₂	6.7cc (14°, 770mm)			
理論數	C ₁₀ H ₁₇ O ₂ N (183.14)					C 65.52 H 9.32 N 7.65

鹽酸鹽は少量のアルコール含有無水エーテルより針狀結晶として得、從つて水、酒精に甚だ溶解易し。水溶液にアムモニア水を加ふれば鹽基を遊離す。F.147-148.° 弱き舌上知覺鈍麻の作用を有す。

分 析

物 質	0.1482g	AgCl	0.0970g	Cl%	16.19
理論數	C ₁₀ H ₁₇ O ₂ N.HCl			Cl%	16.14

昭和 2 年 10 月

黃 蘗 の 成 分

藥學博士 村 山 義 温
高 田 仁 一

Y. Murayama u. N. Takata: Ueber die Bestandteile der Rinde

von *Phellodendron amurense* Rupr. I.

黃蘗のアルカロイドに就ては既に著者の一人及篠崎好三氏より之れを報告せり。黃蘗はベルベリン約1.6%(鹽酸鹽として)及少量のバルマチン(ビドロヨードと

*) 藥誌大正 15 年 4 月號。

して)を含む。引續き本著者等は爾餘の成分をも檢しつつありしが其エーテルに溶解する部分より恐らくはケトンなるべき一新物質と脂肪性粘稠物質を得後者を鹼化して多量のフィステリンとリノール酸及パルミチン酸類とを得たるが故に其経過を茲に記述すべし。

黄蘗末をエーテルにて數回浸出しエーテル浸液よりエーテルの大部分を溜取するときは結晶性物質を析出す。此物はアルコール・クロロフォルムの混液より再三結晶せしむるときは融點 $229-230^{\circ}$ の菱柱狀無色の結晶となる。窒素を含まず結晶水を有し其結晶水の測定、無水物の分析、分子量測定、誘導體の分析等を参照するに略ぼ $C_{27}H_{33}O_7 + 6H_2O$ 又は $C_{23}H_{35}O_7 + 6H_2O$ に當る事を知れり。但此式の確定は尙後日を期すべきものなり。此結晶體はクロロフォルム、氷醋酸に容易に溶解し、アルコール、エーテル、に難溶、水に不溶なり。其無水醋酸溶液に濃硫酸 1 滴を加ふるに藍色を呈す。通常の方法にて無水醋酸と脱水醋酸曹達を作用せしむるも何等アセチル誘導體を生ぜず之れに反してセミカルバツォン及オキシムは常法によりて容易に製することを得其融點は夫れ夫れ $224-225^{\circ}$ 及 275° なり。此物は目下の處他に其類例を見出さざるが故に假にオバクノン Obakunon と命名し置かん。

オバクノンを採取せる母液より尙エーテルを除くときは粘稠脂肪性の物質を残す。之をアルコール性苛性加里液を用ゐて鹼化するに酸としてリノール酸と不純パルミチン酸を得、アルコール類としてフィステリンのみを得たり。此フィステリンは $C_{23}H_{44}O + H_2O$ 又は $C_{27}H_{46}O + H_2O$ にして融點 $142^{\circ} (\alpha)_D^{10} = -28.86^{\circ}$ リーベルマン反應顯著にして其アセチル誘導體の融點は $135-137^{\circ}$ なり。

上記黄蘗の脂肪様物質はリノール酸(テトラブロミドの融點 $114-115^{\circ}$)及パルミチン酸とフィステリンのエステルと見做すことを得べくこれによつて此物は一種の蠟質として現今用ゐらるる鯨蠟又はラノリンと比較し得べきものなりとす。古來黄蘗末を火傷湯爛に用ゐる或は草鞋の食ひたるに使用したるは一種の膏藥としての用途にて脂肪酸のフィステリンエステルの以て其有効成分とすべく其理の當を得たるものなるを覺ゆ。

前報の方法にて製せる鹽酸ベルベリンを硫酸及醋酸の存在に於て亞鉛末還元を行ひテトラヒドロベルベリンを製したるに始めは文献所載の如く 167° 附近の融點を有すれども尙數回アルコール又はアルコール・クロロフォルムより再結晶を行ふときは遂に 173° となりて一定す。黄連より得たる鹽酸ベルベリンも亦其テトラヒドロベルベリンとなすときは融點 173° となる。此物の分析は純テトラヒドロベルベリンなることを示す。此等の實驗によりてテトラヒドロベルベリンの融點は 173° とすべきものとす。

実験の部

黄蘗の細末 3kg を適當の器に入れ全部の粉末を被覆するに足るエーテルを加へ浸出すること前後約 4-5 回エーテル可溶性物質を殆んど全く移行せしめエーテル浸液より大部分のエーテルを溜取し放置して結晶を析出せしむ。茲に得たる帶黄色結晶性物質(約 2.5g-0.3%)をクロロフォルム, アルコホルの混液より再結晶す。菱柱狀無色透明の結晶にして融點 229-230° なり。此物は窒素を含まず結晶水を有しクロロフォルム, 氷醋酸に易溶, アルコホル, エーテルに難溶, 水に不溶にして其無水醋酸溶液は濃硫酸一滴によりて藍色を呈す。此物をオバクノン Obakunon と命名す。

水分の檢定(100° に恒量を得るまで乾燥したる減量を示す)

物質	減量	H ₂ O%
0.3547	0.0720	20.32
0.1872	0.0335	17.89
0.1954	0.0388	19.85
C ₂₇ H ₃₃ O ₇ + 6H ₂ O		18.72
C ₂₈ H ₃₅ O ₇ + 6H ₂ O		18.27

無水物の分析

物質	CO ₂	H ₂ O	C%	H%
I 0.071	0.1694	0.0401	68.85	6.38
II 0.0712	0.1811	0.0452	69.37	7.10
計 算 C ₂₇ H ₃₃ O ₇			69.08	7.03
C ₂₈ H ₃₅ O ₇			69.56	7.25

分子量測定(無水物)

物質	樟 腦	融點降下	分子量
0.0094	0.1145	6.8	484
0.0133	0.1284	9.0	460
0.0118	0.1088	9.0	482
0.0120	0.1332	7.5	480
計 算 C ₂₇ H ₃₃ O ₇			469
C ₂₈ H ₃₅ O ₇			483

オバクノンのアセチル化

融點 229-230° の物質を常法に従て無水醋酸及脱水醋酸普達と緩和煮沸し冷後之れに水を加へて析出せしめたる物質をアルコホルより再結晶するに融點 229° を示し原物質と異ならず。

オバクノンのオキシム

物質 1g, 鹽酸ヒドロオキシルアミン 1g, 醋酸普達 1.5g を 50cc のアルコホル

混液となし水浴上に2時間温め之れに水を加へて析出したるものをアルコールより再結晶す。此物是一種多面體の結晶にして 275° に熔融す。 100° に乾燥せるものを分析す。

物質	CO ₂	H ₂ O	C %	H %
0.0645	0.1584	0.0465	66.98	8.07
0.0669	0.1643	0.0455	66.98	7.61
C ₂₇ H ₃₃ O ₆ : NOH			66.94	7.02
C ₂₈ H ₃₅ O ₆ : NOH			67.47	7.23

オバクノンのセミカルバゾン

物質 1g, 鹽酸セミカルバチド 1g, 醋酸曹達 1.5g をアルコール (50cc) 溶液として1時間 $70-90^{\circ}$ に温め後1-2日間放置し水を加へて析出せしめ素焼板上に乾燥しアルコールより再結晶したり。此物は白色微細の結晶末にして融點 $224-225^{\circ}$ なり。

分析 (100° に乾燥せるもの)

物質	CO ₂	H ₂ O	C %	H %
0.0620	0.1470	0.0401	64.66	7.23
計 算 C ₂₇ H ₃₃ O ₆ : NNHCONH ₂			63.88	6.84
C ₂₅ H ₃₅ O ₆ : NNHCONH ₂			64.44	7.04

フィステリン及脂肪酸類

エーテル浸液よりオバクノンを採取せる残液よりエーテルを可及的除くときは褐色粘稠の脂肪様物質を残す得量 140g (約 5%)。先づ此物の恒数を脂肪に準じて測定し後鹼化せり。

比重	0.9824
酸数	59.0
鹼化数	182
ヨード数	48

鹼 化

各 20g に 3% アルコホル性苛性加里液 250cc を加へ水浴上に 30 分間煮沸し後蒸發皿に移し蒸發してアルコールを除き残れる石鹼を適當の水に溶解しエーテルを加へて數回振盪す。

アルコール類の分離

前述の如くして得たるエーテル液より大部分のエーテルを溜取し放置するときは針狀の結晶を析出す。これを水アルコールにて再三結晶せしめ次で稀酒精より再結晶するときは鱗片狀の美しき或ある結晶となれり。其融點 142° なり。此物の無水醋酸溶液は 21.5 によりて紫藍色を呈す。

結晶水の 0.1 に乾燥恒量を得るに至る)

物質	0.9097			減量	0.0432
				H ₂ O %	4.75
C ₂₆ H ₄₄ O + H ₂ O					4.62
C ₂₇ H ₄₆ O + H ₂ O					4.46
無水物の分析					
物質	CO ₂	H ₂ O	C %	H %	
0.0876	0.2692	0.0961	83.81	12.18	
0.0822	0.2530	0.0892	83.94	12.05	
C ₂₆ H ₄₄ O			83.87	11.83	
C ₂₇ H ₄₆ O			83.94	11.92	
旋光度	[α] ¹⁰ = - 28.86°				

アセチルフィトステリン

フィトステリン 2g に 4 倍量の無水醋酸を加へ銅網上に約 2 時間緩やかなる沸騰を保ち後常法により處理しアルコールより再結晶したるものは融點 135-137° なり。

脂 肪 酸 類

鹼化物の水溶液をエーテルに振取したる場合の水溶液を稀硫酸を以て酸性となし浮遊し來れる酸をエーテルに振取しエーテル溶液よりエーテルを溜取し残れる酸類をアルコール溶液にて鉛鹽となし飽和及不飽和の酸類に二分したり。粗脂肪酸 3g につき 95 % アルコール適量を加へ温めて溶解せしめ之れに 2g の醋酸鉛を 95 % アルコール 100cc に溶解したる溶液を加へ水浴上に温め後放置するときは形成したる鉛鹽は一部溶解一部は沈澱として存在す。

飽 和 脂 肪 酸

鉛鹽のアルコールに溶解せざる部分を水と混和し稀硝酸にて酸性となし振盪し浮遊し來れる遊離脂肪酸をエーテルに振取しエーテル溶液よりエーテルを溜取し飽和脂肪酸混合物を得たり。之を常法に従てエステルとなし分溜せり。

飽和脂肪酸混合物 30g をアルコール 100cc にとかし乾燥鹽化水素瓦斯を通じ飽和せしめ減壓蒸溜してアルコールを除き次で 8mm の減壓にて區分せり。

1.	162-166°	2.5g
2.	190-201°	3.9g
3.	201-204°	2cc

1 及 2 の溜分を夫々鹼化し融點 56-59° 及 53-56° のものを得たり。

融點 56-59° のものよりは次の分析數を得たり。

物質	CO ₂	H ₂ O	C %	H %
0.0833	0.2442	0.0876	73.40	12.80
0.0662	0.1799	0.0739	74.11	12.86
計 算	C ₁₆ H ₃₂ O ₂		75.55	12.63

$C_{14}H_{28}O_2$	73.68	12.28
$C_{15}H_{30}O_2$	74.38	12.40

不飽和酸

鉛鹽のアルコールに溶解する部分よりアルコールを溜取したる後稀硝酸を以て酸を遊離せしめエーテルに振取しエーテル溶液より減壓にてエーテルを除きたる後真空除湿器中に乾燥す。此不飽和脂肪酸を確定せんが爲めブロームを作用せしめたり。

粗酸各 1-2cc を 40cc の無水エーテルに溶解し 5-6cc の氷醋酸を加へ外部を氷を以て冷却しつつ倍量のブロームを徐々に加へてブロームの吸収完きに及んで真空硫酸除湿器中に放置するときは時日を経るに従て漸次に小粒狀の結晶を析出せり。之を母液と分ちたる後石油エーテルに溶解し其溶解度によりて 6-7 の區分とし各部分より析出せる結晶の融點を測りしに何れも皆 114-115° にしてリノール酸 $C_{18}H_{32}O_2$ のテトラブロミドの融點に一致す。

ブロームの定量

物質	0.1796	AgBr	0.2253	Br	53.33%
計算	$C_{18}H_{32}O_2Br_4$				53.30

分析

物質	CO_2	H_2O	C %	H %
0.0817	0.1081	0.0427	36.09	5.84
計算	$C_{18}H_{32}O_2Br_4$		36.00	5.33

テトラヒドロベルベリン

エーテル可溶性部分を除ける黄蘗細末前報 (本誌大正 15 年 4 月號) に黄連の場合と同様の方法にて鹽酸ベルベリンを製し之れを硫酸及醋酸酸性にて亜鉛末を以て還元し文献記載の如くテトラヒドロベルベリンを製せり。之をアルコール、又はアルコール、クロロフォルム混液より再結晶するに 2-3 回にして融點 167° (成書の記載) を示せども尙更に 5-6 回再結晶を繰り返すときは遂に 173° に至りて一定す。黄連より製したる鹽酸ベルベリンを原料とするも同一の結果を得たり。念の爲め之れを分析するにテトラヒドロベルベリンの數に一致す。

物質	CO_2	H_2O	C %	H %
0.0839	0.2182	0.0476	70.93	6.38
0.0889	0.2309	0.0484	70.84	6.03
計算	$C_{20}H_{21}O_4N$		70.80	6.19

附記 本報に始め在原長蔵氏擔任しオバクノン及フィステリン脂肪酸の検出に關し試験を行へり。

(昭和 2 年 9 月 東京衛生試験所製薬部)

124° (korr) unter 7 mm. $d_4^{20} = 1.0293$; $n_D^{20} = 1.4889$.

Autoref.

Y. Murayama u. J. Takata: *Ueber die Bestandteile der Rinde von Phellodendron amurense Rupr. I.*

Im Anschluss an die Untersuchung der Coptiswurzel haben Murayama u. Shinozaki¹⁾ gezeigt, dass die Rinde von *Phellodendron amurense* Rupr., eine viel gebrauchte Droge in Japan, als basische Bestandteile Berberin (1.6%) und eine kleine Menge Palmatin.

Es hat sich nun gezeigt, dass das Tetrahydroberberin (F.P. 167°) bei 5 bis 6 maligen Umkrystallisieren aus Alkoholchloroformgemisch einen höheren Schmelzpunkt aufweist. Zur Auffindung der nicht basischen Bestandteilen verfahren die Verfasser wie folgendes. Beim Stehen des Aetherextraktes der Rinde entsteht eine krystallinische Ausscheidung, die abfiltriert und aus Alkohol-chloroformgemisch wiederholt umkrystallisiert wird. Ausb. 0.3%. Sie bildet farblose, rhombische Prismen, F.P. 229–230° und ihre Zusammensetzung entspricht entweder $C_{27}H_{33}O_7 + 6H_2O$ od. $C_{28}H_{35}O_7 + 6H_2O$, die sich zur Zeit noch nicht entscheiden lässt. Sie ist in Chloroform und Eisessig leicht, in Alkohol u. Aether schwerer, in Wasser nicht löslich. Eine Probe in Essigsäureanhydrid gelöst färbt sich durch Zusatz von einem Tropfen conc. H_2SO_4 schön blau. Sie liefert kein Acetylderivat, aber Semicarbazon (F.P. 224–225°) und Oxim (F.P. 275°) bilden sich leicht. Die Verfasser nannten die Substanz "Obakunon." In der Mutterlauge des Obakunons befindet sich ein zähflüssiges Wachs, d. 0.9824, S.Z. 59, V.Z. 182, J.Z. 48. Bei der Hydrolyse mit alkoholischem Kali wurden daraus ein Phytosterin $C_{26}H_{44}O + H_2O$ od. $C_{27}H_{46}O + H_2O$ (F.P. 142°, $[\alpha]_D^{20} - 28.86^\circ$, Liebermanns Farbenreaktion positiv, Acetylderivat F.P. 135–137°), etwas unreine Palmitinsäure (F.P. 56–59°)

1) Dieses Zeitschrift, No. 530 (April, 1926).

und Linolsäure (Tetrabromid F.P. 114—115°) erhalten. Die Gegenwart dieses lanolinartigen Waxes ermöglicht das Rindenpulver sich mit Wasser salbenartig kneten zu lassen und als beliebtes Umschlagmittel anzuwenden.

Y. A.

S. Sugasawa: *Synthese der Glutaminsäure. (V). (Synthese der N-Alkylglutaminsäuren).*

Ich habe früher die N-Alkylierung der Glutaminsäure versucht, konnte aber auf direktem Wege zum erwarteten Produkte nicht gelangen. Daher habe ich mit der in der I. und II. Mitteilung dieser Arbeit erwähnten Methode aus Succinaldehydsäure oder deren Ester mit Cyankalium und Alkylamin in alkoholischer Lösung oder seinem Chlorhydrat in wässrig-alkoholischer Lösung die Synthese der N-alkylierten Säure unternommen und habe das Ziel erreicht. Bisher habe ich allerdings nur drei N-Alkylprodukte durch diese Synthese erhalten, bin aber der Meinung, dass man beliebige N-Alkylglutaminsäuren einfach durch Verwendung verschiedener Alkylamine herstellen kann, wobei freilich zu bedenken ist, dass die Reaktionsgeschwindigkeit umso träger wird, je kohlenstoffreicher das betreffende Amin ist.

		F.P.	K.P.
N-Methyl-glutaminsäure	rhombisch	156—158°	
N-Methyl-glutaminsäure-diäthylester	farblose Flüssigkeit, mit Wasser mischbar		103—109°(2 mm)
N-Methyl-glutaminsäure Chlorhydrat	weisse Krystalle	159—160°	
N-Dimethyl-glutaminsäure	lange Prismen	155—156°	
N-Dimethyl-glutaminsäure-diäthylester	farblose Flüssigkeit, nicht mischbar mit Wasser		101—103°(0.5 mm)
N-Aethyl-glutaminsäure	gruppierte Nadeln	159—160°	
N-Aethyl-glutaminsäure-diäthylester	farblose Flüssigkeit, nicht mischbar mit Wasser.		109—110°(2 mm)

T. K.