YAKUGAKUZASSHI

Journal of the Pharmaceutical Society of Japan

Editor: Y. Asahina

Subeditor: K. Hattori

H. Kondo und K. Yano: *Ueber die Alkaloide von Stephania tetrandra*, S. Moore. I. (XIX. Mitteilung über die Alkaloide von Sinomenium- und Cocculusarten von **H. Kondo**).

Stephania tetrandra ist eine in ganz Formosa, besonders in den Bergen des Südens, wild wachsende volkstümliche Arzneipflanze. Verf. haben aus ihren Wurzeln die folgenden drei Alkaloide isoliert.

A) eine in Aether lösliche Base; B) eine in Aether schwer lösliche Base;

C) eine phenolische Base.

Die A-Base wurde *Tetrandrin* genannt. In dieser Untersuchung wurde hauptsächlich diese Base studiert. Die B- und C-Basen gehören zu den sog. Nebenalkaloiden und ihr Gehalt in der Wurzel ist ausserordentlich gering.

Tetrandrin hat die Zusammensetzung $C_{19}H_{23}NO_3$ und krystallisiert aus Aether und Aceton in hübschen Nadeln. F. P. 217° . Diese Substanz ist leicht löslich in organischen Solventien ausser Petroläther. $[\alpha]_D^{25} = +263.1^{\circ}$ (in Chloroform Lösung). - *Tetrandrinjodmethylat* krystallisiert aus Aceton in Nadeln und hat die Zusammensetzung $C_{19}H_{23}NO_3 \cdot CH_3J \cdot H_2O$. Z. P. 269° .

Tetrandrin besitzt eine N-Methyl- und zwei Methoxylgruppen, der dritte Sauerstoff stellt einen Brückensauerstoff dar, so dass diese Base in Alkalilaugen unlöslich ist, ferner die Gaebelsche Methylendioxyreaktion nicht zeigt und Oxim und Semicarbazon nicht bildet.

Es wurde nach Wijs eine $\overline{1}$ festgestellt, jedoch setzte dieselbe der sauren Reduktion von Clemmensen sowie der alkalischen Reduktion mit Natrium-amalgam, ferner der katalytischen Reduktion mit Palladium oder Palladium-

16

Kohle ausserordentlich starken Widerstand entgegen, sodass sie auf diesem Wege überhaupt nicht reduziert werden konnte.

In den folgenden Tabellen sind die Reaktionen gegen Essigsäureanhydrid, Bromwasserstoffsäure sowie die Resultate der Kalischmelze von Desmethyln-tetrandrinol und Tetrandrin, die der Zinkstaubdestillation des Tetrandrins und die der erschöpfenden Methylierung des Tetrandrinjodmethylats verzeichnet.

1) Einwirkung von Essigsäureanhydrid auf Tetrandrin.

2) Einwirkung von Bromwasserstoffsäure auf Tetrandrin.

3) Zinkstaubdestillation des Tetrandrins.

4) Erschöpfende Methylierung des Tetrandrins.

5) Kalischmelze von Desmethyltetrandrinol und Tetrandrin.

Nach obigen Resultaten scheint dem Tetrandrin die Formel

zuzukommen.

Die Tatsache, dass Tetrandrin durch Essigsäureanhydrid ein nicht basisches N-Acetylderivat unter gleichzeitiger Ringsprengung bildet, dass es ferner durch erschöpfende Methylierung leicht eine nicht stickstoffhaltige Substanz entstehen lässt, kann als ein Beweis des Vorhandenseins eines Tetrahydroisochinolinrings gedeutet werden. Die Tatsachen, dass bei der Alkalischemelze von den beiden Methoxylgruppen die eine verloren geht, wobei die Substanz von neuem Phenolcharakter erhält, dass ferner bei der Zinkstaubdestillation Kreosol gebildet wird und bei der Kalischemelze von Desmethyltetrandrinol Protocatechusäure entsteht, beweisen alle, dass im Molekül des Tetrandrins ein Homoveratrolkern vorhanden ist, sodass Tetrandrin zu den Alkaloiden vom Typus des Benzyltetrahydroisochinolin zu gehören scheint.

T. K.

T. Tsukamoto: *Ueber die trockne Destillation von Cholesterin mit aktiver Kohle.*

Bei der Destillation eines Gemisches von 50 g Cholesterin mit 20 g aktiver Kohle werden analog den Versuchen von Otto Diels¹⁾ unter Gasbildung ein Oel und schliesslich Krystalle erhalten.

Durch Reinigung dieser rohen Krystalle mit verschiedenen organischen Solventien werden in grösseren Mengen solche vom F. P. 240° und durch Umkrystallisieren der ersteren aus Benzol solche vom F. P. 245° in geringen Mengen erhalten. Ein Gemisch der letzteren mit reinem Chrysen erlitt keine Schmelzpunktsdepression.

Die Krystalle vom F. P. 240° in Eisessig gehen durch Oxydation mit Chromsäure in Chrysochinon (F. P. 225°) über. Behandlung mit Salpetersäure in ihrer Eisessiglösung liefert Nitrochrysen (F. P. 207°).

1) Ber. 58, 1231 (1925); Ber. 60, 140 (1927); Ann. 459, 1 (1927).

藥 學 雜 誌

第四十八卷 第二號 (第五百五十二號)

昭和三年二月發行

〔 報 文 〕

Sinomenium 及び Cocculus 屬アルカロイド に関する研究 (第十九報)

藥學博士 近 藤 平 三 郎

H. Kondo: XIX. Mitteilung über die Alkaloide von
Sinomenium- und Cocculus-arten.

シマハスノハカヅラ (倒地拱) の アルカロイドに就て (其一)

藥學博士 近 藤 平 三 郎

藥 學 士 矢 野 潔

H. Kondo u. K. Yano: Ueber die Alkaloide von
Stephania tetrandra, S. Moore. (I.)

シマハスノハカヅラ 一名 カンバウイ *Stephania tetrandra*, S. Moore¹⁾ は臺灣本島人の間に『倒地拱』として知らるる防己科に屬する民間藥草なり。本植物は臺灣全土に分布するが如きも特に南部山地に盛に野生するを見る。Diels によれば²⁾ 南支那 (Chekiang, Kiukiang) 地方にも分布するが如し。一見ハスノハカヅラに類似するも根莖が蔓狀ならず塊狀なる事、花序が複繖形ならず軸出擬總狀を呈する事、葉の裏面に毛を密生する事により容易に區別することを得。

¹⁾ Hayata: Icon. pl. Formos. I, 37; Yamamoto: Suppl. Icon. pl. Formos. III, 35.

²⁾ Diels: Engl. Pflanzenreich, IV, 94, 282.

本島人は根塊を腹痛に用ひ又殊に蛇毒咬傷に卓效ありとして山地の旅行には好んで之を携帯すと云ふ。

本研究に使用せる原料は高雄州、潮州郡管下の蕃界にて採集せるものにかかり生蕃は之をラッパシュ(クワルス社、カビヤン社)或はジャバシュ(ライ社)と稱し有毒なりとせらる。豚誤りて食すれば死に至ると云ふ。

余等は本植物の根より常法により

A. エーテルに易溶, B. エーテルに難溶, C. フェノール性

なる3種の鹽基を抽出し, A. を Tetrandrin と名付け先づ主としてその構造を研究せり。

Tetrandrin はエーテル, アセトン等より美しき針狀に結晶し, 融點 217° を示す。石油エーテル以外の有機溶媒に易溶なり。分子量測定及原素分析の結果 $C_{19}H_{23}NO_3$ に相當し, そのヨードメチラートはアセトンより針狀に結晶し分析の結果 $C_{19}H_{23}NO_3 \cdot CH_3J \cdot H_2O$ に一致す。本鹽基の旋光度はクロロフォルム溶液にて $[\alpha]_D^{24} = + 263.1^{\circ}$ なり。ツァイゼル・マイエル氏法により2個の $(-OCH_3)$ 基及1個の $(>N-CH_3)$ 基を有するを知る。又リーベルマン氏ニトロゾ反應を呈せざるを以て第三級アミンに屬し, 苛性アルカリに溶解せざるが故にフェノール性水酸基を有せざるを知る。Gaebel 氏反應が陰性にしてメチレンヂオキシの存在を示さず。アムモニア性銀液を還元するもフェーリング氏液を還元せず, 又オキシム及セミカルバツォンを作らざるを以てケトン及アルデヒド基の存在を想像するに難し。

無水安息香酸及無水醋酸と共に水浴上にて作用せしめたるも反應せず。Wijs 氏法により1個の不飽和二重結合の存在を示すも Clemmensen 氏の還元, Natrium-amalgam の還元及 Pd-Kohle による接觸還元を受けず。本鹽基を無水醋酸と共に $140-160^{\circ}$ にて6時間反應せしめたるに稀醋酸及稀鹽酸に溶解せずエーテルに易溶なる無晶形物質, 融點 145° を得。原素分析及 CH_3CO 基測定の結果 $(CH_3CO)-O-C_{19}H_{23}O_3-N-COCH_3$ に一致す。その旋光度はクロロフォルム溶液にて $[\alpha]_D^{16} = - 14.34^{\circ}$ なり。これを酒精性加里にて鹼化する時は微黃色, 無晶形, エーテルに難溶, クロロフォルム, アルコホルに易溶なる融點 150° の物質を得, その旋光度はクロロフォルム溶液にて $[\alpha]_D^{18.5} = + 55.31^{\circ}$ なり。即ち以上の事實により Tetrandrin は恐らくは四水素加イソヒノリン核を有するものの如く無水醋酸により窒素を有する核は開裂して $N-COCH_3$ 誘導體を生じ且つ窒素に隣れる炭素は不整齊なること明瞭なり。

次に Tetrandrin にブローム水素酸を作用せしめたるにエーテルに難溶にして微黄色, 223° に熔融する針狀の結晶を得たり. そのブローム水素酸鹽は冷水に難溶にして白色, 針狀の結晶となりて析出す. 分解點 276° を示す. この兩者は元素分析及ブローム定量の結果 $(\text{OH})_4\text{C}_{17}\text{H}_{17}\text{N}$ 及そのブローム水素酸鹽に一致しツェイゼル・マイエル氏法により $(-\text{OCH}_3)$ 基の存在せざるを知る. 且つ強きフェノール性を有し過クロール鐵により綠色を呈し, Diazo 反應も亦顯著なり, Zerewitinoff 氏法により 4 個の水酸基を證明す. 以上の事實により Tetrandrin はブローム水素酸により $(-\text{OCH}_3)$ 基を失ふと同時に 1 個の橋狀酸素は開裂して 2 個の水酸基を新生せること明かにして Tetrandrin は 1 個の橋狀酸素を有すること確實なり. 次に $(\text{OH})_4\text{C}_{17}\text{H}_{17}\text{N}$ (Desmethylnetetrandrinol) に 4 個の $(-\text{COCH}_3)$ 基を附加する目的にて無水醋酸と水浴上に反應せしめたるにエーテルに易溶性, 微黄色, 無晶形の物質, 融點 18° を得たり. フェノール性を有せず, Zerewitinoff 氏法により水酸基を有せざるを知る. 元素分析及 (CH_3CO) 基測定の結果 $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{C}_{17}\text{H}_{17}\text{NO}$ に一致す. 即ち新生せる水酸基の一組は無水醋酸により脱水作用を受け再び橋狀となりたるものの如し. かく容易に開裂し且つ再び脱水劑にて閉環する事實は 2 個の水酸基が少くも γ 或は δ 位に互に位するものと考へらる. 次に斯くして生じたる橋狀酸素を再び開く目的にて上記 $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{C}_{17}\text{H}_{17}\text{NO}$ にブローム水素酸を作用せしめたるに酸素の開橋と同時に (CH_3CO) 基を失ひ元の Desmethylnetetrandrinol を生ぜり.

次に Desmethyldetrandrinol の加里熔融を行ふに融點 183° の Phenolcarbon-säure を得たり。Protocatechusäure と混融するに融點の降下を見ず。過クロール鐵により blau にして少量のアムモニアにて Purpurrot を呈する等全く Protocatechusäure に一致す。又 Tetrandrin の緩漫なる加里熔融をなすに 185° にて熔融するフェノール鹽基を得たり。(CH₃O) 基測定の結果 1 個の (CH₃) 基を失ひたるを知る。これをデメチル硫酸にてメチル化し生じたるメトスルファートをヨード加里にて取扱ひ Tetrandrinjodmethyldat, 分解點 263° を得。尙そのクロールメチラートの金鹽は Tetrandrinchloromethyldat の金鹽, 分解點 185° に一致するを知る。即ち上記緩漫なる加里熔融により 2 個の (OCH₃) 基中 1 個の (CH₃) 基を失ひフェノール性水酸基を生じたること明瞭なり。

次に Tetrandrin の亞鉛末乾溜を行ひ 4 種の物質を捕捉するを得たり。1.) エーテルより葉狀に結晶する中性物質：融點 $180-5^\circ$ にして偶、近藤龍氏のコクラウリンを乾溜して得たる中性物質¹⁾ と混融するに僅かに融點の降下を示すも恐くは同一物質ならんか。物質少量にして Rast 氏法により分子量を測定し 200.8 なる數値を得たるのみ。2.) フェノール性物質：クレオソート様の臭氣を有する油にして、過クロール鐵と少量のアルコールを加ふることにより綠色を呈す。その Pikrat は稀アルコール溶液より針狀に結晶し、融點 102° にして Kreosolpikrat (融點 105°) と混融するに降下を見ず。即ちフェノール性物質は Kreosol なることを知る。3.) 揮發性アミン：金鹽によりて Trimethylamin なるを知る。4.) 不揮發性アミン：リーベルマン氏ニトロゾ反應を呈する第二級のアミンにして、常溫にて無色の油狀をなす。その白金鹽は 203° にて分解し、ピクラーは黃色針狀の結晶にして融點 200° を示す。元素分析の結果 β -Methylaminoinden (C₁₀H₁₁N-C₆H₃N₃O₂) に一致するも未だ文獻に記載なきを以て確定し得ず。

Tetrandrin 亞鉛末乾溜			
中性物質	フェノール性物質	揮發性アミン	不揮發性アミン
Blättchen	Öl	Chloraurat	Sekundäre Amin
Smp. = $180-5^\circ$	FeCl ₃ : grün	Zp. = 245°	Platinat: Zp. = 203°
Mol. Gew. = 200.8	Pikrat: Nadeln, Smp. = 102°		Pikrat: Nadeln, Smp. = 200°
	※	※ ※	※ ※ ※

1) 本誌, 第 538 號(大正 15 年, 12月)。

次に Tetrandrin の Hofmann 氏分解を試みたるに第一次分解に於て何れも結晶性 α -Methin, Smp. = 196–201°, 及 β -Methin, Smp. = 115° を得. そのヨードメチラートも共に結晶にして, α -Methinjodmethylat, Zp. = 230–5° 及 β -Methinjodmethylat, Zp. = 250° を得. これ等より第二次の分解を経て同一の無窒素性物質 $\text{C}_{18}\text{H}_{18}\text{O}_3$ を得たり. このものはベンツォール, クロロフォルム, エーテル等より何れも美しき Prism 状に結晶し, 融點 220–1°, その旋光度はクロロフォルム溶液にて $[\alpha]_D^{20} = +11.69^\circ$ なり. Wijs 氏法により $|\bar{\tau}| = 1.11$ 個なるを知る.

以上の結果により Tetrandrin の構造は次の如く表示することを得べし.

而して無水醋酸によりて鹽基性を失ひたる Acyl 誘導體を生ずる點及容易に Hofmann 氏分解を受け無窒素性物質を生ずる點より四水素加イソヒノリン核の存在は眞なるが如し.

又 2 個の (OCH_3) 基の内 1 個は緩慢なる加里熔融により (CH_3) 基を失ひてフェノール性水酸基を生ずる點, Clemmensen 氏還元にて何等の變化を受けざる點, 等により兩者共 フェノールエーテルのそれにして粉末亜鉛乾溜の反應に照しメチルクレオソール核を形成せるものに外ならず.

残りの 1 個の酸素はブローム水素酸にて開橋する點により Brückensauerstoff なること明白にして, 尙 Desmethyltetrandrinol が無水醋酸により Acetyl 化せらるると同時に 2 個の水酸基は脱水作用を受け再び元の橋狀酸素に歸る點等より考ふる時は其橋脚は互に γ 或は δ 位にあるものの如し.

最後に加里熔融の結果 Protocatechusäure を得又亜鉛末乾溜により Kreosol を得たる事により Tetrandrin 中に I. なる核の存在を想像するに難からず. 従つて CH_2^+

は ヴェラトリル核と四水素加イソヒノリン核との連絡點なるべし.

同様亜鉛末乾溜により曩に近藤龍氏の得たると殆んど同一の中性物質を得たるは兩者構造決定の上に於て甚だ興味深き所なり.

終に臨み原料採集上多大の便宜を與へられたる潮州郡役所、西田警察課長、加治佐、金田、栗林、塚田 各巡査諸氏 及中央研究所林業部佐々木技手、臺北衛戍病院宇田藥劑正の厚意を謹謝す。

實 驗 之 部

1.) Tetrandrin の製造及其の精製

カンバウイの溫浸酒精製エキスを2%の鹽酸にて浸出し、濾過して不溶性の Harz 狀物質を除きたる後、アムモニアアルカリ性となしクロロフォルムにて振り、再び鹽酸に轉溶せしめ、更に之を苛性ソーダアルカリ性となしエーテルにて振盪し、エーテルに不溶の鹽基(B+C)を分ちたる後、水層を分離し之に炭酸ガスを通じてフェノール性鹽基(C)を析出せしむ。一方エーテル溶液は無水炭酸加里にて乾燥後エーテルを蒸溜する時は針狀の結晶析出す。これをアセトンにて溫浸し、水を加へつつ微に溫むるときは美しき針狀の結晶析出す。原料エキ스에對し收得量約7%強なり。

2.) Tetrandrin

上記アセトンより再結晶せるものは融點 217° を示し、石油エーテル以外の一級有機溶媒に可溶なり。又甚だしき苦味を有す。

(イ.) 呈色反應

	冷 時	溫 時
濃硫酸	微黃色	微黃色
硝 酸	褐 色	黃 色
Fröde'sche Reag.	藍青色	青 色
Marquis'sche Reag.	紅褐色	褐 色
過クロール鐵	不 變	不 變

(ロ.) 鹽 類

ヨード水素酸鹽	微黃色針狀結晶	分解點 251°
金 鹽	微黃色無晶形	„ 184°
ビクラー	黃色針狀結晶	„ 245°
ヨードメチラート	針狀又は板狀結晶	„ $263-9^{\circ}$
クロールメチラート金鹽	黃色、無晶形	„ 185°

(ハ.) 諸定性的反應

アムモニア性銀を還元するもフェーリング氏液を還元せず。

Gaebel 氏反應を呈せず。

Liebermann 氏ニトロゾ反應を呈せず。

(a.) Tetrandrin の原素分析. 110° にて乾燥、恆量を得せしむ。

物 質: 0.1732g CO_2 : 0.4611g H_2O : 0.1161g C: 72.64% H: 7.50%

物 質: 0.1740g CO_2 : 0.4633g H_2O : 0.1160g C: 72.73% H: 7.46%

平均数 C: 72.69% H: 7.48%

$C_{19}H_{23}NO_3$ としての理論数

C: 72.84% H: 7.34%

物質: 0.1658g N_2 : 6.9cc (761mm, 25°)

N: 4.55%

$C_{19}H_{23}NO_3$ としての理論数

N: 4.47%

(b.) 分子量の測定. ランツベルガー-池田氏の装置を用ひベンツォール(恒数 33.34)を溶媒となす.

物質: 0.1738g 液の容積: 25.0cc 上昇温度: 0.075° 分子量: 309.0

物質: 0.3328g „ 31.0cc „ 0.120° „ 298.2

平均数 „ 303.6

$C_{19}H_{23}NO_3$ としての理論数

„ 313.2

(c.) $(-OCH_3)$ 基及 $(N-CH_3)$ 基の測定. ツァイゼル, マイエル氏法に據る.

物質: 0.2220g AgI: 0.3057g $-OCH_3$: 18.18%

$C_{17}H_{17}O$: $[OCH_3]_2$ としての理論数 $-OCH_3$: 19.81%

物質: 0.2220g AgI: 0.1116g $-CH_3$: 3.21%

$C_{18}H_{23}O_3$: $N-CH_3$ としての理論数 $-CH_3$: 4.79%

(d.) 比旋光度

物質: 0.2877g クロ、フォルム: 20cc 管長: 2dm $\alpha_D^{24} = +7.57^\circ$ $[\alpha]_D^{24} = +263.1^\circ$

(e.) Wijs 氏法による不飽和二重結合の測定

(イ.) 物質: 0.2007g クロ、フォルム: 2cc Wijs 氏液: 20cc, 48 時間後 10% ヨー

ード加里液 10cc を加へ $N/10$ $Na_2S_2O_3$ 溶液 ($F = \log^{-1} 1.9934$) にて滴定す.

盲験の結果 $N/10$ $Na_2S_2O_3$ 溶液の消費量 37.70cc

物質を加へたる液の同様消費量 30.60cc

$$\text{ヨード数} = \frac{0.012692 \times 7.10 \times F \times 100}{0.2007} = 44.23$$

$$\bar{F} \text{ としての理論ヨード数} = \frac{I_2 \times 100}{C_{19}H_{23}NO_3} = 81.10$$

$$\text{二重結合の数} = \frac{44.23}{81.10} = 0.545 \text{ 個.}$$

(ロ.) 物質: 0.1510g クロ、フォルム: 20cc Wijs 氏液: 10cc, 48 時間放置後 10% ヨー

ード加里液 10cc を加へ $N/10$ $Na_2S_2O_3$ 溶液 ($F = \log^{-1} 1.9851$) にて滴定す.

盲験の結果 $N/10$ $Na_2S_2O_3$ 溶液の消費量 18.90cc

物質を加へたる液の同様消費量 13.40cc

ヨード数 = 44.67 二重結合の数 = 0.551 個.

3.) Tetrandrin の Clemmensen 氏法による還元

粉末亜鉛 6g を昇汞の 5% 溶液 100cc に加へ水浴上にて 2 時間熱したる後, これに鹽基 2g を 30% 鹽酸 30g に溶解せるものを加へ時々鹽酸を追加し水浴上にて 5 時間熱したる後, アムモニアルカリ性となしエーテルに採る. 無水炭酸加

里にて乾燥後、エーテルを蒸溜すれば針狀の結晶析出す。融點 217° にして元の鹽基と混融するも變化なし。

4.) Tetrandrin の接觸還元

(a) バラヂウムコロイド： 鹽基 1g を稀醋酸溶液となし約その 20% に相當するバラヂウムコロイドと共に水素氣流中にて 48 時間振盪するも水素を吸収せず。

(b) バラヂウムコロイド・動物炭： 前記同様稀醋酸溶液或は稀鹽酸溶液にて動物炭を加へたるバラヂウムコロイドを觸媒となし常溫にて或は $50-60^{\circ}$ に熱しつつ振盪するも全く水素を吸収せず。

5.) Tetrandrin のナトリウムアマルガムによる還元

鹽基 1g を 50cc のエチルアルコールに溶解せしめ、2% ナトリウムアマルガム 25g を加へ水浴上にて反應せしむること 24 時間の後、水銀を分離し弱鹽酸酸性となし減壓にてアルコールを蒸溜し、再び苛性アルカリ性となしてエーテルに採る。これを乾燥、蒸溜する時は針狀の結晶析出す。融點 217° 。元の鹽基と混融するも變化なし。

6.) Tetrandrin のラーデンプルグ氏法による還元

鹽基 1g を 50cc のエチルアルコールに溶解し、微に沸騰せしめつつ約 5g のナトリウムを少量づつ投下して還元す。反應終了後、弱鹽酸酸性となし水浴上減壓にてアルコールを除去したる後、再び苛性アルカリ性となし析出する鹽基をエーテルにて抽出、乾燥、蒸溜して得たる針狀結晶は融點 217° 。元の鹽基と混融するに變化を認めず。

(7.) ヒドロオキシルアミンとの作用

酸性の場合： 鹽基 0.5g を 20cc のエチルアルコールに溶解し、これに少量の鹽酸を加へて酸性を保たしめ、次にヒドロオキシルアミン鹽酸鹽 1g、醋酸ソーダ 5g、水 10cc を加へ 70° にて 3 時間温めたる後、多量の水を加へ炭酸アルカリ性となしエーテルにて振盪し、エーテルを乾燥、蒸溜後、アセトンより再結晶せるものは融點 217° の針狀結晶にして Tetrandrin と混融するも變化なし。

アルカリ性の場合： 鹽基 0.5g を 20cc のエチルアルコールに溶解せしめこれに苛性加里 0.5g、水 20cc を加へてアルカリ性となす。次にヒドロオキシルアミン鹽酸鹽 1g、水 10cc を加へ 70° にて 3 時間温めたる後、多量の水を加へエーテルにて振る。前記同様處理したるものは融點 217° の針狀結晶にして Tetrandrin と混融するも變化を認めず。

8.) セミカルバチットとの作用

ヒドロオキシルアミンと全く同様に反應せしめたるも元の鹽基を同收せるのみ。

9.) 無水醋酸との作用

水浴上に於ける場合: 鹽基 1g を無水醋酸 5g と共に水浴上に於て熱すること 30 分の後, 水を加へて無水醋酸を分解し, 炭酸アルカリ性となしエーテルにて振盪す. エーテル層を乾燥, 蒸溜するに針狀の結晶析出す. その融點 217° にして Tetrandrin と混融するも變化なし.

$150-160^{\circ}$ に於ける場合: 鹽基 5g を無水醋酸 20g と共に $150-160^{\circ}$ に於て 6 時間熱するに微に褐色を呈する飴狀物質となる. これに多量の水を加へ無水醋酸を分解したる後, 弱醋酸酸性の儘エーテルにて振盪し, エーテルを水洗, 乾燥, 蒸溜の後, 減壓にて膨起乾燥せるものは白色, 無晶形の粉末にして稀醋酸, 稀鹽酸には溶解せず. 120° 附近にて濕潤し 145° に於て融解す.

(a) 元素分析. 110° に於て乾燥, 恒量を得せしむ.

物質: 0.1646g CO_2 : 0.3994g H_2O : 0.1038g C: 66.18% H: 7.06%

$\text{CH}_3\text{COO}\cdot\text{C}_{19}\text{H}_{23}\text{O}_3\cdot\text{N}\cdot\text{COCH}_3$ としての理論數 C: 66.48% H: 7.04%

(b) アセチル基の定量

物質 0.2486g を $\text{N}/2$ 酒精性加里液 15cc に溶解し水浴上に於て 3 時間熱したる後フェノールフタレインを加へ $\text{N}/2$ 鹽酸 ($F = 0.9933$) にて還測するに 13.65cc を要したり. 別に同様物質を加へざるものにつき盲驗をなすに上記 $\text{N}/2$ 鹽酸 14.85cc を要したり. よつて (CH_3CO) 基の%は次の式にて與へらる.

$$\text{CH}_3\text{CO} = \frac{43.02 \times (14.85 - 13.65) \times F \times 100}{0.2486 \times 2000} = 10.31\%$$

$$\text{理論: CH}_3\text{CO} = \frac{\text{CH}_3\text{CO} \times 100}{\text{CH}_3\text{COO}\cdot\text{C}_{19}\text{H}_{23}\text{O}_3\cdot\text{N}\cdot\text{COCH}_3} = 10.33\%$$

(c) 不飽和二重結合の測定 (Wijs 氏法)

物質: 0.2140g クロロフォルム: 20cc Wijs 氏液: 10cc, 48 時間後 10% ヨード加里液 10cc を加へ $\text{N}/10$ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液 ($F = \log^{-1} \bar{I} \cdot 9851$) にて滴定す.

盲驗の結果 $\text{N}/10$ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液の消費量 18.90cc

物質を加へたるものの同様消費量 11.70cc

$$\text{ヨード數} = \frac{0.012692 \times (18.90 - 11.70) \times F \times 100}{0.2140} = 41.26$$

$$\bar{I} \text{ としての理論ヨード數} = \frac{\bar{I}_2 \times 100}{\text{CH}_3\text{COO}\cdot\text{C}_{19}\text{H}_{23}\text{O}_3\cdot\text{N}\cdot\text{COCH}_3} = 61.13$$

$$\text{二重結合の數} = \frac{41.26}{61.13} = 0.6748 \text{ 個.}$$

(d) 比旋光度

物質: 0.1255g, クロロフォルム: 10cc, 管長: 1dm, $\alpha_D^{26} = -0.18^{\circ}$ (α) $_D^{16}$
 $= -14.34^{\circ}$.

10.) $\text{CH}_3\text{COO}\cdot\text{C}_{19}\text{H}_{23}\text{O}_3\cdot\text{N}\cdot\text{COCH}_3$ の鹼化

物質 0.5g を n-酒精性加里液 10cc に於て水浴上に熱すること 1 時間の後, 減壓

にてアルコールを除き、一度濃鹽酸に溶解せしめ、再びアムモニアアルカリ性となしクロロフォルムに採る、クロロフォルム溶液を稀鹽酸にて洗滌後、乾燥、蒸溜せるものは微黄色、無晶形の粉末にして、エーテルに難溶、アルコールに易溶、融點 150° 附近を示す。

比旋光度

物質：0.0669g, クロロフォルム：10cc, 管長：1dm, $\alpha_D^{18.5} = +0.37^{\circ}$, $[\alpha]_D^{18.5} = +55.31^{\circ}$ 。

11.) Desmethylnortetrandrinol $(HO)_4C_{17}H_{17}N$

鹽基 5g をブローム水素酸 (比重 1.78) 25g と共に 100° にて 3 時間熱したる後、水を加へ冷却すれば冷水に難溶性のブローム水素酸鹽は針狀の結晶となりて析出す。分解點 276° を示す。このブローム水素酸鹽は比較的アセトンに易溶なるを利用しアセトンの濃溶液にアムモニア水を徐々に加へアルカリ性となし微に温むる時は遊離の鹽基は針狀の結晶となりて析出す。これをアセトンより再結晶せるものは微黄色、融點 228° にして加熱すれば黄赤色に變ずるも融點の變化なし。かくして得たる Desmethylnortetrandrinol は苛性アルカリに溶解し、過クロール鐵にて綠色を呈す。強きフェノール性を有し、濃アムモニア及濃炭酸アルカリに溶解す。そのハロゲン水素酸鹽は比較的冷水に難溶なるも硫酸鹽は溶解し易し。遊離のものはエーテル、クロロフォルムには難溶にして、エチルアルコール、アセトン、ベンツールには可溶なり。

(a) ブローム水素酸鹽の元素分析。 110° にて乾燥、恒量を得せしむ。

物質：0.1667g CO_2 ：0.3258g H_2O ：0.0911g C：53.33% H：6.12%
 $[HO]_4C_{17}H_{17}N \cdot HBr$ としての理論數 C：53.11% H：5.78%

(b) ブローム水素酸鹽のブロームの定量 (カリウス法)。

物質：0.2622g AgBr：0.1304g Br：21.16%
 $[HO]_4C_{17}H_{17}N \cdot HBr$ としての理論數 Br：20.81%

(c) 遊離鹽基の元素分析。常溫眞空乾燥器中にて恒量を得せしむ。

物質：0.1529g CO_2 ：0.3793g H_2O ：0.0993g C：67.69% H：7.27%
 $[HO]_4C_{17}H_{17}N$ としての理論數 C：67.28% H：6.98%

(d) 遊離鹽基の $(-OCH_3)$ 基測定 (ツァイゼル・マイエル氏法)

物質 0.1629g をフェノール 2cc に溶解しヨード水素酸と共に 1 時間餘熱するときヨード銀の沈澱を生ぜず。即ち本物質は $(-OCH_3)$ 基を有せず。試みに Tetrandrin をブローム水素酸と共にツァイゼル氏の装置を用ひて熱するにブローム銀の沈澱を生ずるを認む。依つてブローム水素酸により反應中 $(-OCH_3)$ 基を失ひたることを確實なり。

(e) 比旋光度

遊離の鹽基：0.1287g, アセトン：20cc, 管長：1dm, $\alpha_D^{21} = +1.08^{\circ}$, $[\alpha]_D^{21} = +167.9^{\circ}$

(f) 水酸基の定量 (Tschugaeff-Zerewitinoff 氏法)

溶媒として Pyridin の酸化バリウム上にて乾燥せるものを用ふ。

盲験: Pyridin 15cc メチルマグネシウム ヨザドのアミルエーテル 溶液 5cc CH₄-Gas 4'.80cc; T. = 29° Atm. D. = 753 mm.

物質: 0.0545g CH₄-Gas: 66.40cc

物質附加により生じたる CH₄-Gas V (29°, 753 mm) = 19.80cc

CH₄-Gas V (0°, 760 mm) = 17.73cc

$$\therefore \text{OH: } \frac{0.0764 (\text{Konst}) \times 17.73}{0.0545} = 24.86\%$$

[OH]₄ C₁₇H₁₇N としての理論数 22.44%

12.) Desmethyltetrandrinol と無水醋酸との作用

物質を約5倍量の無水醋酸と共に 65° にて 30 分間熱したる後、水を加へ無水醋酸を分解し、アムモニアアルカリ 性となしエーテルにて振盪し、苛性加里液を以てエーテル層を洗ひたる後、乾燥、蒸溜、減壓にて膨起せしめたるものは微黄色の粉末にして、融點 180° 附近、過クロール鐵にて呈色せず、エーテル、クロロフォルム、アセトン、エチルアルコールに易溶なり。本物質は Diacetyl-desmethyltetrandrin なり。

(a) 元素分析. 110° にて乾燥、恒量を得せしむ。

物質: 0.1523g CO₂: 0.3783g H₂O: 0.0864g C: 67.78% H: 6.35%

(CH₃CO)₂: C₁₇H₁₇NO₃ としての理論数 C: 68.26% H: 6.28%

(b) アセチル基の定量

物質 0.2081g を N/5 酒精性加里液 20cc と共に水浴上にて熱すること 1 時間の後、フェノールフタレインを加へ N/10 鹽酸にて還測するに N/10 鹽酸 (F = 1.0019) 28cc を要したり。別に同様盲験をなすに N/10 鹽酸 38.60cc を要せり。

$$\therefore \text{CH}_3\text{CO} = \frac{43.02 \times (38.60 - 28.00) \times F}{0.2081 \times 100} = 21.95\%$$

$$\text{理論: CH}_3\text{CO} = \frac{(\text{CH}_3\text{CO})_2 \times 100}{(\text{CH}_3\text{CO})_2: \text{C}_{17}\text{H}_{17}\text{NO}_3} = 23.30\%$$

(c) 比旋光度

物質: 0.1230g, クロロフォルム: 20cc, 管長: 1dm, $\alpha_D^{27} = + 1.13^\circ$, $[\alpha]_D^{27} = + 183.8^\circ$.

(d) 不飽和二重結合の測定 (Wijs 氏法)

物質: 0.1494g クロロフォルム: 20cc Wijs 氏液: 20cc, 48 時間後 10% ヨード加里液 10cc を加へ N/10 Na₂S₂O₃ 溶液 (F = 0.9850) にて滴定するに 28.40cc を要したり。全て同條件にて盲験をなすに 36.00cc を要せり。

$$\text{ヨード数} = \frac{0.012692 \times (36.00 - 28.40) \times F \times 100}{0.1494} = 63.57$$

$$\text{I} として の理論ヨード数 = \frac{J_2 \times 100}{(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{C}_{17}\text{H}_{17}\text{NO}_3} = 68.77$$

$$\text{二重結合の数} = \frac{63.57}{68.77} = 0.9245 \text{ 個.}$$

(c) 水酸基の測定 (Tschugaeff-Zerewitinoff 氏法)

溶媒として乾燥せる Pyridin を用ふ.

盲験: Pyridin 15cc, メチル マグネ シウム ヨヂド の アミルエーテル 溶液 5cc, CH₄-Gas 46.6cc, T = 29°, Atm. D. = 753mm.

物質: 0.0601g

CH₄-Gas 47.00cc

物質増加によつて生じたる CH₄-Gas

0.6cc

即ち本物質は水酸基を有せず.

13.) Diacetyl-desmethylnetrandrin とブローム水素酸との作用

物質をその5倍量のブローム水素酸(比重 1.78)と共に 100° にて2時間加熱後、水を加へ温時溶解せしめたる後放冷せしむる時はブローム水素酸鹽の針狀結晶、分解點 278° を得. アムモニアにて遊離せしめアセトンより再結晶せしむるに融點 223° の黃色針狀結晶を得たり. エーテル、クロロフォルムに難溶にして、アセトン、アルコールに易溶なり. そのハロゲン水素酸鹽は冷水に難溶なるも、硫酸鹽は易溶なり. 熱により黃赤色に變じ過クロール鐵により綠色を呈し、濃アムモニア水、濃炭酸アルカリ及苛性アルカリに可溶なること等全く Desmethyl-netrandrinol と同様なり. よつて混融を試むるに融點の變化なし.

14.) Desmethylnetrandrinol の加里熔融

物質 2g を 20g の熔融せる 苛性加里中へ少量づつ加へよく攪拌しつつ反應せしむるに盛んにアミンを放出す. 反應後水を加へエーテルにて振り中性物質を除き、水層に炭酸瓦斯を通じ再びエーテルにて振盪し フェノール性物質を分つ. 最後の水層を硫酸酸性となし、酸性物質をエーテルにて抽出、芒硝にて脱水後、蒸溜濃厚となし放置するに針狀の結晶析出す. これを少量のエーテルに溶解せしめ石油エーテルを加へて生ずる Harz 狀物質を除きたる濾液を同様に處理して最後に稍、褐色を呈する針狀結晶を得たり. 183° にて熔融すると同時に炭酸瓦斯の分解して泡起するを認む. 過クロール鐵にて青色を呈し、2%アムモニア水を滴加するに紫色を呈す. 試みに Protocatechusäure と混融するに 188° にて熔融し降下を認めず. その他中性物質及過クロール鐵にて青色を呈する フェノール性物質(恐くはブレンツカテヒン)を得たるも物質少量にして精査し得ず.

15.) Tetrandrin の加里熔融

Tetrandrin をその10倍量の苛性加里と共に緩慢なる熔融をなす. 反應終了後、水を加へエーテルにて振り水層(A)を分ち、エーテル層を硫酸にて振り鹽基性物質を硫酸に轉溶せしむ. エーテル層を乾燥、蒸溜するに少量の無晶形物質を得. 之をエチルアルコールに溶かしピクリン酸を加へエーテルを以て沈澱せしむるに、

灰黄色, 無晶形のピクラートを得たり. 140° にて濕潤し 200° 附近にて熔融す. 物質少量にして精査し得ず.

硫酸に轉溶せる鹽基性物質は苛性アルカリ性となしエーテルに採り, 微黄色, 無晶形の物質を得たり. 融點 180° 附近. そのヨードメチラートは分解點 263° を示し, クロールメチラートの金鹽は分解點 185° を示す. 即ち本物質は未反應の Tetrandrin なるを知る. 一方苛性アルカリ性の水層 (A) に炭酸ガスを通するにフェノール性物質は多量に沈澱す. 濾過して水層 (B) を分つ. フェノール性物質は 80° にて乾燥後エーテルにて溫浸し不溶性物質 (C) を分つ. エーテル層は之を稀硫酸と共に振盪し鹽基性物質 (D) を分ちたる後, 蒸溜するに過クロール鐵にて綠色を呈する中性のフェノール少量を得たるも精査し得ず. 鹽基性物質 (D) は炭酸アルカリ性となしエーテルに採り精製せるものは白色, 無晶形の粉末にして融點 185° を示し $(-\text{OCH}_3)$ 基測定の結果 Des-monomethyl-tetrandrin $\text{C}_{17}\text{H}_{17}\text{NO} \cdot [\text{OH}] - [\text{OCH}_3]$ なることを知る.

Des-monomethyl-tetrandrin (D) の $(-\text{OCH}_3)$ 基測定 (ツェイゼル法)

物質: 0.1271g	AgJ: 0.0981g	$-\text{OCH}_3$: 10.19%
$\text{C}_{17}\text{H}_{17}\text{NO} \cdot [\text{OH}] - [\text{OCH}_3]$ としての理論數		$-\text{OCH}_3$: 10.36%

本鹽基は苛性アルカリに溶解し, 過クロール鐵によりて殆んど呈色せず. エーテル, クロロフォルム, ベンツォール, アセトン, アルコホルに易溶にして石油エーテルに不溶なり. 稀鹽酸には稀硫酸よりも溶け難し. 本物質を苛性加里液に溶解しジメチル硫酸にてメチル化し, 反應終了後, ヨード加里を加へて生じたる沈澱を水より再結晶せるものは分解點 263° を示し, そのクロールメチラートの金鹽は分解點 185° を示し兩者共全く Tetrandrin のそれと一致す. 即ち本鹽基は加里熔融の結果 Tetrandrin より 1 個の $(-\text{OCH}_3)$ 基を失ひたるものなること明瞭なり.

エーテルに不溶性物質 (C) は尙窒素を含有するを以て更に加里熔融を行ひ少量の酸を得たるも僅少にして精査し得ず.

又一方水層 (B) を硫酸酸性となしエーテルにて振り過クロール鐵にて綠色を呈する酸少量を得たり. アムモニアの少量を加ふるも紫色とならず. 恐らく Vanillinsäure ならんと思はるるも物質少量にて確定せず.

16.) Tetrandrin の亞鉛末乾溜

Tetrandrin 30g をその 15 倍量の粉末亞鉛とよく研磨し數回に分ち水素氣流中にて乾溜を行ふ. 揮發性アミンは 10% の鹽酸に吸収せしむ, 乾溜終了冷却後管口に鱗片狀の結晶析出す. 酸, アルカリに溶けず, 融點 $180-5^{\circ}$ を示す中性物質なり. 溜液はこれをエーテルに溶かし, 鹽酸にて振り鹽基性物質 (A) を分つ. エーテル層は更に 5% 苛性加里液を以て處理しフェノール性物質 (B) を分離し, エーテル層を乾燥, 蒸溜するに褐色の油を得. これを水蒸氣蒸溜に附し精製するに殆んど無色

の油を得たり。之をエーテルにて稀釋し無水炭酸加里にて乾燥後、蒸溜し眞空乾燥器中に放置するに鱗片狀の結晶析出。170° 附近にて濕潤し180° にて熔融す。前記管口に析出せる中性物質と同一物なり。曩に近藤龍氏の Coclaurin より得たる中性物質、融點 183° と混融するに 173° にて熔融す。Rast 氏法により分子量の測定をなすに 200.8 なる數値を得たり。

中性物質の分子量測定 (Rast 氏法)

物質：0.0047g 樟腦：0.0535g 融點降下 17.5° 分子量 200.8

次に苛性加里液に轉溶せる フェノール性物質 (B) は硫酸酸性となして再びエーテルに採り、乾燥後蒸溜するに微黄色の油を得。著しくクレオソート類似の臭氣を放つ。長時間眞空乾燥器中に放置するも結晶せず。過クロール鐵によりアルコールの存在に於て始めて綠色を呈す。Schotten-Baumann 氏法によりベンツォイル化を行ひたる後、エーテルに採り、苛性アルカリにて洗ひ、蒸溜するに稍、粘稠なる油を得。フェノール性を失ひたるが故に Acyl 化せられたること確實なり。長時眞空乾燥器中に放置するも結晶せず。試みにクレオソート油より再三割温蒸溜を行ひ精製せる Kreosol, Kp. = 221° を同様ベンツォイル化するに全く同様稍、粘稠なる油を得、長時放置するも結晶せず。次に Kreosol をピクリン酸の飽和溶液に加へ溶解する程度にアルコールを加へ熱して全溶せしめたる後アルコールを追ひ出し放冷せしむる時は黄色針狀の結晶を得。稀アルコールより再結晶せしめたるものは 95° より濕潤し 105° にて熔融す。よつて前記ベンツォイル化せるフェノール性物質を n-酒精性加里にて鹼化、同收せるものを同様ピクリン酸にて處理し 85° にて濕潤し 102° にて熔融する黄色、針狀結晶を得たり。上記 Kreosol のビクラートと混融するに 103° にて熔融し融點の降下を認めず。即ち フェノール性物質は Kreosol なることを知る。

次に鹽酸にて抽出せる鹽基性物質 (A) は炭酸アルカリ性となしエーテルにて抽出、乾燥、蒸溜後、水蒸氣蒸溜をなすに殆んど無色の油となる。エーテルに採り精製せる物質を長時間眞空乾燥器中に放置するも結晶せず。フェノール性を有せず、リーベルマン氏ニトロゾ反應を呈し第二級のアミンなり。その白金鹽は分解點 203° にしてビクラートは融點 200° を示す黄色、針狀の結晶なり。分析の結果 β -Methylamino-inden のビクラートに相當するも本物質は未だ文獻に記載なきを以て確定し得ず。

不揮發性アミン (A) ビクラートの原素分析。110° にて乾燥。

物質：0.1521g CO₂：0.2871g H₂O：0.0497g C：51.48% H：3.66%

C₁₀H₁₁N·C₆H₅N₃O₇ としての理論數 C：51.33% H：3.77%

又鹽酸に吸收せる揮發性アミンは一旦蒸發乾涸し、エチルアルコールにて抽出し、蒸溜乾涸後苛性アルカリの過剰を加へて再び遊離せしめたるアミンを更に

濃鹽酸に吸収せしめ金鹽となす。水より再結晶せるものは黄色、針狀の結晶にして分解點 245° 、金定量の結果 Trimethylamin なることを知る。

揮發性アミンの金の定量

物質: 0.2005g	Au: 0.0990g	Au: 49.38%
(CH ₃) ₃ N·HCl·AuCl ₃ としての理論數		Au: 49.41%

17.) Tetrandrin のホフマン氏分解

(I) Tetrandrinjodmethylat

Tetrandrin をアセトンに溶解し、ヨードメチルを加へて放置するときはヨードメチラートの針狀の結晶析出す。アセトンより再結晶せるものは分解點 269° を示し、分析の結果 C₁₉H₂₃NO₃·CH₃I·H₂O に相當す。

(a) 元素分析・真空乾燥器中にて恒量を得せしむ。

物質: 0.1754g	CO ₂ : 0.3262g	H ₂ O: 0.0950g	C: 50.75%	H: 6.06%
C ₁₉ H ₂₃ NO ₃ ·CH ₃ I·H ₂ O としての理論數			C: 50.70%	H: 5.96%

(b) 結晶水の定量・ 110° にて乾燥す。

物質: 0.5033g	減量: 0.0204g	結晶水: 3.96%
C ₁₉ H ₂₃ NO ₃ ·CH ₃ I·H ₂ O としての理論數		結晶水: 3.80%

(II) 第一次ホフマン氏分解

Tetrandrinjodmethylat 25g を 280cc のメチルアルコールに溶解し 70g の苛性加里を加へ水浴上にて熱し溶解せる後、徐々にメチルアルコールを蒸溜し全く乾燥せしめたる後、少量の水を加へ苛性加里を溶解せしめ、ベンツォールを加へて生じたる Methin-Base を抽出す。この際ベンツォールに溶解せざる物質約 2.5g あり。ヨードを含み、分解點 263° を示す。即ち未反應のヨードメチラートなり。ベンツォール溶液は炭酸加里にて乾燥後、蒸溜乾涸したる後、エーテルにて溫浸し不溶性の β -Methin と分つ。エーテル溶液は乾燥後蒸溜するに α -Methin は針狀の結晶となりて析出す。融點 $196-201^{\circ}$ 。鹽酸に溶解し、アセトン、アルコール、メチルアルコールには比較的難溶なるも、クロロフォルム、ベンツォールには易溶なり。これをベンツォールに溶解しヨードメチルを加へて放置する時はヨードメチラートは難溶なる故全部沈澱す。アセトン或はメチルアルコールより再結晶する時は針狀の結晶となりて析出す。約 25g あり。このものは元の Tetrandrinjodmethylat に比し水には難溶なるもメチルアルコールには溶解し易し。分解點 235° を示す。

一方エーテルに不溶の β -Methin はメチルアルコール・ベンツォールの混液より再結晶せしむるときは微黄色を帯びたる Prism 狀の結晶析出す。 115° にて熔融と同時に泡起す。そのヨードメチラートはメチルアルコールより同様 Prism 狀に結晶し、分解點 250° を示す。 α -Methinjodmethylat に比し著しく水に溶解し易し。

約 2.0g あり.

(a) α -Methin の比旋光度

物質 : 0.1077g, クロロフォルム : 10cc, 管長 : 1dm, $\alpha_D^{18.5} = + 2.56^\circ$,
 $[\alpha]_D^{18.5} = + 237.6^\circ$

(b) α -Methinjodmethylat のヨードの定量(カリウス法)

物質 : 0.1931g AgJ : 0.0941g J : 26.34%
 $C_{20}H_{25}NO_3-CH_3J-H_2O$ としての理論数 J : 26.05%

(c) β -Methin の比旋光度

物質 : 0.0990g, クロロフォルム : 10cc, 管長 : 1dm, $\alpha_D^{18.5} = + 1.81^\circ$,
 $[\alpha]_D^{18.5} = + 182.8^\circ$

(d) β -Methinjodmethylat のヨードの定量(カリウス法)

物質 : 0.2077g AgJ : 0.0975g J : 25.37%
 $C_{20}H_{25}NO_3-CH_3J-CH_3OH$ としての理論数 J : 25.32%

(III) 第二次ホフマン氏分解

α -Methinjodmethylat 14g をメチルアルコール 500cc に溶解し, 苛性加里 100g を加へ, 10%鹽酸を滿したる瓦斯吸收装置を連結し, 水浴上に溶解せしめたる後, その 2/3 を徐々に蒸溜し, 次で減壓にてメチルアルコールを溜去し, 乾涸せる後, 水を加へ苛性加里を溶解せしめ, ベンツォールにて抽出す. ベンツォール層は稀硫酸にて洗ひその際生成せる不溶性褐色の沈澱(約 2.7g)を分ち, ベンツォール溶液を乾燥, 蒸溜するに Prism 狀の結晶析出す. 母液より再結晶せるものを合し約 4.0g あり. 最後の母液は減壓にて膨起せしむるに無晶形, 褐色の粉末約 0.8g を得たり.

Prism 狀の結晶は融點 $220-1^\circ$ にして窒素を有せず. エーテル, アセトンに難溶にして, ベンツォール, クロロフォルムに易溶なり.

β -Methinjodmethylat を水酸化銀と共にメチルヒドロオキシドとなし約 20% となる様苛性加里を加へ熱して生じたる分解成績體を同様に處理し 220° にて熔融する Prism 狀の結晶を得たり. α -Methinjodmethylat より來れるものと混融するに融點の降下を認めず.

(a) α -Methin より來れる無窒素性物質の比旋光度

物質 : 0.1026g, クロロフォルム : 10cc, 管長 : 1dm, $\alpha_D^{16} = + 0.12^\circ$, $[\alpha]_D^{16} = + 11.69^\circ$

(b) β -Methin より來れる無窒素性物質の比旋光度

物質 : 0.0842g, クロロフォルム : 10cc, 管長 : 1dm, $\alpha_D^{18} = + 0.10^\circ$, $[\alpha]_D^{18} = + 11.88^\circ$

(c) 無窒素性物質の元素分析. 110° にて乾燥, 恒量を得せしむ.

物質 : 0.1450g CO_2 : 0.4058g H_2O : 0.0804g : C : 76.33% H : 6.20%

$C_{18}H_{18}O_3$ としての理論数

C: 76.58% H: 6.43%

(d) 無窒素性物質の不飽和二重結合の測定 (Wijs 氏法)

物質 0.1649g, クロロフォルム 20cc, Wijs氏液10cc, 48時間放置後 $N/10$ - $Na_2S_2O_3$ 溶液($F=0.9663$)にて滴定するに 5.80cc を要せり.別に全く同条件にて盲験をなすに $N/10$ - $Na_2S_2O_3$ 溶液 19.20cc を要したり.

依つて

$$\text{ヨード数} = \frac{0.012692 \times (19.20 - 5.80) \times F \times 100}{0.1649} = 99.65$$

$$\text{1分子としての理論ヨード数} = \frac{J_2 \times 100}{C_{18}H_{18}O_3} = 89.97$$

$$\text{二重結合の数} = \frac{99.65}{89.97} = 1.108 \text{個}$$

一方 10 %鹽酸に吸収せる揮發性アミンは金鹽となし、水より再結晶せしむるに 245° にて熔融と同時に分解する黄色針狀の結晶を得たり. 金定量の結果 Trime-thylamin なることを知る.

揮發性アミンの金鹽の金の定量

物質: 0.1962g

Au: 0.0973g

Au: 49.60%

 $(CH_3)_3N.HCl.AuCl_3$ としての理論数

Au: 49.41%

(昭和2年12月14日 乙卯研究所に於て認む)

コレステリンの活性炭素乾溜

藥學士 塚 本 赴 夫

T. Tsukamoto: Ueber die trockne Destillation von
Cholesterin mit aktiver Kohle.

著者は朝比奈, 中西兩氏がケッシーアルコホルの研究第四報¹⁾中に發表せるケッシーアルコホル Kessylalkohol をバラヂウム・コーレ Palladium-Kohle と熱してアズレン Azulen を製造する事に携はれる時其脫水素反應がバラヂウムによるか活性炭素によるかに疑問を生ぜる故次の如き豫備試験を行へり.

先づ Palladium, Palladium-baryumsulfat, Palladiumoxyd 及 Palladiumoxydur の混合物, Platinoxid, Platin schwarz, Platinasbest 等とケッシーアルコホルを小試験管中に小火にて熱するに 何等アズレンらしき色を表はさざるにケッシーアルコホルと活性炭素又は硫黄華と共に熱するに直ちに藍青色の油(アズレン)となり 又ア

¹⁾ 本誌, 第48卷, 第1號, 1 (昭和3年, 1月)