Eine Lösung von 10 g N-Methyltetrahydrochinolinjodmethylat in Amylalkohol wurde nach Zusatz von 5 g verkupferten Zinkpulver 2 Stunden unter Rückfluss gekocht. Als das Zink vollständig in Lösung ging, wurde die Reaktionsflüssigkeit mit Sodalösung geschüttelt und die Amylalkoholschicht abgehoben und mit verd. Salzsäure durchgeschüttelt. Die salzsaure Lösung wurde abermals alkalisch gemacht und ausgeäthert. Nach dem Verdampfen des Aethers wurde ein flüssiges tertiäres Amin vom K.P. 219° und von folgender Zusammensetzung erhalten:

Gef. C% 80.53 H% 10.3. Ber. für $C_{11}H_{17}N$ C% 80.91 H% 10.4

Pikrat hat den F.P. 99° und Jodmethylat F.P. 177°.

T. K.

M. Kubota und Y. Matsushima: *Ueber Saponin der Gleditschia horrida, Makino.*

Gleditschia horrida, Makino wird von alters her in Japan als Sternumentum, Ptarmica etc. oder als Seifenersatz verwendet. Verf. hat nach folgender Methode eine Art Saponin isoliert, welchem er den Namen Gleditschiasaponin gegeben hat.

Die Droge wird mit Wasser oder verd. Alkohol warm extrahiert; der Extrakt wird nach Zusatz von etwa 3% HCl 3—5 Minuten gekocht. Der hierbei in grösseren Mengen entstehende braune Niederschlag wird mit Wasser und Aether gewaschen und aus Alkohol gereinigt.

Diese Substanz ist unlöslich in Wasser, Aether, Chloroform und löslich in Alkohol, Eisessig und Alkalien. Sie stellt hell bräunliches amorphes feines Pulver vom F.P. 216—218° (bei ungefähr 205° sintert sie zusammen) dar. Sie reduziert zwar direkt die alkalische Kupferlösung nicht, aber nach längerem Kochen mit Säuren vermag sie dieselbe auch zu reduzieren. Diesem Saponin kommt der Analyse zufolge die Zusammensetzung $C_{59}H_{100}O_{20} \cdot 3\frac{1}{2}H_2O$ zu.

Gef. C% 62.44 H% 9.29 Ber. für $C_{59}H_{100}O_{20}$ C% 62.72 H% 8.93.

Molekulargewichtsbestimmung: Gef. durch Titration 1098; Gef. nach Siedepunkterhöhung 1214; Ber. für $C_{59}H_{100}O_{20}$ 1129.

M. Nakao¹⁾ hat ebenfalls aus einer Pflanze ein hygroskopisches Saponin von klebriger Beschaffenheit und vom F.P. etwa 135° isoliert. Seine Hydrolyse ergab Arabinose und Sapogenin vom F.P. 270—275°.

Verf. hat Gleditschiasaponin mit Salzsäure oder Schwefelsäure hydrolysiert und Arabinose nebst ein Sapogenin (Gleditschiasapogenin) vom F.P. 276—278° erhalten. Dieses Sapogenin ist in Aether, Alkohol und Alkalien löslich und stellt ein weisses feines Pulver von der Zusammensetzung $C_{27}H_{46}O_8 \cdot \frac{1}{2}H_2O$ dar.

Gef. C% 65.09 H% 9.07, Ber. für $C_{27}H_{46}O_8$ C% 65.03 H% 9.29.

Molekulargewichtsbestimmung: Gef. durch Titration 509.4; Gef. nach Siedepunkterhöhung 479.6; Ber. für $C_{27}H_{46}O_8$ 507.4.

Nach obigen Resultaten geht die Hydrolyse des Gleditschiasaponins durch Säuren nach folgender Reaktionsgleichung vor sich:

Nach pharmakologischer Untersuchung hat Gleditschiasaponin eine 75'000 fache hämolytische Wirkung (rote Blutkörperchen der Ziegen). Eine intravenöse Injektion von Kaninchen ergab als toxische Dose 40—47 mg Saponin pro kg Körpergewicht des Kaninchens.

T. K.

S. Aoyama: *Ueber die flüchtige Base, die sich bei der Hyoscyaminbestimmung des Scopoliaextraktes bemerkbar macht.*

Dass die Bestimmung von Hyoscyamin von Extraktum Scopolae (Pharm. Jap. IV) durch eine flüchtige Base beeinflusst wird, ist von Kawachi²⁾ mitgeteilt worden.

In dem Wunsche die Natur dieser Substanz festzustellen, hat der Verf. diese Untersuchung angestellt. Beim Verdampfen der aetherischchloroformischen Lösung dieses Alkaloids wurde beobachtet, dass eine Base mit überdestillierte.

1) Vergl. diese Zeitschr. Nr. 334, 1219.

2) Vergl. diese Zeitschr. Nr. 540, 152.

N-メチルテトラヒドロヒノリンヨードメチラート 53g をアルコール 200cc に溶解し、沸騰せしめつゝ之にナトリウム 42g を少許宛投入し終に 1.5 時間にて反應を終了す。後水蒸氣蒸溜に依りて生成せる鹽基を溜出せしめ、鹽酸々性とする後蒸發濃縮しアルカリ性として後エーテルにて抽出し、エーテルの蒸發殘渣を減壓下分溜をなすに 6mm にて 91-95°C 迄に溜出する部分と、95-112°C 迄の部分とに分つ、但し大部分は低温度の部分に來り、112°C 附近にては分解を惹起せり。91-95°C の部分を再溜するに 92-94°C の部分大部分にして約 10g あり。此鹽基は強く光線を屈折する無色の液にして、水に難溶解性なれ共其溶液は強きアルカリ性を呈す。甚だ揮發性にして味は赫くが如し。常溫に於ける沸點 218°C (山口式測定器)、ピクラート融點 99°C、ヨードメチラートの融點 177.5°C を示すが故に此鹽基はフェニルプロピルデメチルアミンなり。

ヒノリンヨードメチラートの還元

ヒノリンヨードメチラートを酒精中ナトリウムを以て還元すれば分解を起し刺戟臭ある沸點低き物質と暗赤色不揮發性物質とを生じ、フェニルプロピルメチルアミンの如き第二級アミンを検出せず。

また同物質をアミルアルコールに溶解し、沸騰トルオール中に於ける金屬ナトリウムに作用せしむるに暗赤色不揮發性物質を生ずるのみにして前同様第二級アミンを検出せず。

本研究に際し恩師近藤教授の懇切なる御指導を謝す。

(東京帝國大學藥學教室に於て)

「さいかち」のサポニンに就きて (第一報)

松 島 義 一
醫學博士 久 保 田 實

M. Kubota u. Y. Matsushima: Ueber Saponin der
Gleditschia horrida, Makino.

第一章 緒 論

「さいかち」は決明科に屬する學名 *Gleditschia horrida*, Makino なる植物にして其莢、刺及び種子は古來藥用に供せられし事は人の知る所なり。東北地方に於ては特に多く之を産し民間に於て其莢を石鹼の代用となすと云ふ。和漢藥考⁽¹⁾に依れば莢は衝動、殺蟲又は噴嚏藥として中風、偏頭痛、麻痺等に用る尙ほ其他痰及び粘

液を驅除する效有りとし、刺は莢と同効なれども尙ほ諸瘡を治するに用ひ、種子は主として瘡毒諸瘡に用ひらるるものなれども果して斯の如き藥理作用を有するやは疑問なり。只之を以て皂莢中にはサポニン Saponin の含有せらるべき事は何人も想起する所にして既に中尾萬三氏⁽²⁾は本誌上に於て皂莢のサポニンに就て報告せり。氏の製造せるサポニンは褐色飴狀の甚しき引濕性物質にて融點 135° 附近のものなり。而して之が加水分解によりてペントーゼと融點 270-275° のサボゲニンとを得たり。著者は皂莢よりサポニンの製造を研究し融點 216-218° (205° 附近にて收縮) にして空氣中に於て全く引濕せざる無晶形物質を得たり。本物質は元素分析其他の試験の結果 $C_{50}H_{100}O_{20} \cdot 3\frac{1}{2} H_2O$ に適合す。著者は本物質に Gleditschiasaponin グレドシヤサポニンなる名稱を與へんとす。而して之が化學的並に藥理學的試験を施行したるを以て此處に報告せんとす。

第二章 グレドシヤサポニンの製造

「さいかち」の莢即ち皂莢、木皮、刺及び種子を水及び酒精を以て浸出し其浸出液に就て常法に依り溶血力の比較を試みしに 莢は其作用甚強く木皮等は作用弱きを以て従つてサポニンの含量少きを豫想し主として莢に就きて實驗せり。

先づ皂莢を細切し、水又は稀釋アルコールを以て溫浸し、濾過し、殘渣は更に數回浸出し、浸出液を合して水浴上に蒸發濃縮し原料の大約 5 倍の水製溶液となし (著者は浸液に鉛法を施したる後以下の操作を行ひしも 殆ど同一の結果を得たり) 之に約 3% に相當する鹽酸を加ふる時は少量の沈澱を析出するを以て之を濾去したる後直火を以て急速に加熱す。沸騰 3-5 分にして多量の褐色沈澱の析出するを見れば直ちに火を去り 常溫に於て一夜放置し、上清液を除去し沈澱は水を以て數回傾斜洗滌し、濾取して素燒板上に乾燥し粉末となす。之乾燥粉末をエーテルを以て色素及び少量のサボゲニン等を溶解除去する時は粗製サポニンを得。其得量原料皂莢の 10-15% なり。

第三章 グレドシヤサポニンの化學的試験

グレドシヤサポニンの一般性狀

上記の製法に依りて得たる物質は吸濕性を有せず。該物質を純アルコールに溶解し之に水を加へてアルコールの濃度約 70% となし溫を加へて析出せる物質を溶解し、濾過し、濾液を冷却し析出する物質を數回如斯方法により精製する時は淡褐色無晶形の微細なる粉末を得。該物質は融點 216-218° にして水、エーテル、クロロホルム等に溶解せず純アルコール、氷醋酸に溶解し是等の溶液に多量の水を加ふる時は其の大部分を析出す。又酸性の反應を呈し、アルカリ類に容易に溶解す。是等の溶液は水を以て稀釋する時は 50000 倍溶液に於てもよく持續性泡沫を發す。硫酸には帶紅橙色を呈して溶解し水を以て稀釋すれば赤紫色に變じて混

濁す。鹽酸には赤橙色を呈す。無水醋酸に溶解し之に硫酸を加ふれば赤紫色を呈し水を以て稀釋すれば淡褐色に變ず。フェーリング氏液を還元せず。溶血作用を有し、1% 氷醋酸溶液は旋光度を認めず。

結晶水

數日間硫酸上に乾燥せる物質をアブデルハルデン氏装置を用ひトルオルの沸點に於て眞空乾燥をなすに減量次の如し。

物質	0.7950g	減量	0.0433g	水%	5.45
理論數	$C_{59}H_{100}O_{20} + 3\frac{1}{2}H_2O$				5.33

原素分析

物質	0.0677g	炭酸	0.1540g	水	0.0562g	C%	62.44	H%	9.29
理論數	$C_{59}H_{100}O_{20}$						62.72		8.93

分子量測定

(a) 滴定法

物質	0.3513g	中和に要する	$N_{/10}$ KOH	3.2cc	Mol.	1098
----	---------	--------	---------------	-------	------	------

(b) 沸點上昇法

物質	0.2943g	アルコール	4.2cc.	沸點上昇	0.009	1214
理論數	$C_{59}H_{100}O_{20}$					1128.8

グレドシヤサポニンの加水分解

グレドシヤサポニンを 50% アルコホルに溶解し之に硫酸を約 5% に加へ水浴中に 5 時間沸騰せしめたる後水を以て稀釋するに原物質と外觀を異にする析出物を生ず之を濾過し、洗滌したる後エーテルに溶解しエーテル蒸發殘渣を稀アルコホルより精製して微細なる白色粉末を得。本物質の融點は $276-278^{\circ}$ にして中尾氏⁽²⁾の製造せるサボゲニン融點 $270-275^{\circ}$ より稍々高し。本物質は水に不溶にしてアルコール、エーテル、醋酸エチル、アルカリ類に溶解し酸性反應を呈す。本物質のアルコール溶液を水を以て稀釋したるもの又はアルカリ溶液は振盪によりてサポニンの如く泡沫を發するも溶血作用を有せず。本物質は硫酸に橙色に溶解し稀釋すれば藍紫色となり、無水醋酸、硫酸によりて濃藍色を呈し鹽酸には無色なり。本物質のアルコール溶液 (3%) は旋光度無し。著者は本物質をグレドシヤサボゲニン Gleditschiasapogenin と命名せんとす。

グレドシヤサボゲニンの原素分析其他試験成績次の如し。

結晶水

數日間硫酸上に乾燥せる物質を 110° に於て眞空乾燥す。

物質	0.4918g	減量	0.0095g	水%	1.93
理論數	$C_{27}H_{46}O_3 + \frac{1}{2}H_2O$				1.78

原素分析

物質	0.0691g	炭酸	0.1649g	水	0.0560g	C%	65.09	H%	9.07
----	---------	----	---------	---	---------	----	-------	----	------

理論数	$C_{27}H_{46}O_8$	65.03	9.29
分子量測定			
(a) 滴定法			
物質	0.2242g	中和に要する $N/10$ KOH 4.4cc	Mol. 509.4
(b) 沸點上昇法			
物質	0.4058g	アルコール 3.3cc 沸點上昇 0.04°	Mol 479.6
理論数	$C_{27}H_{46}O_8$		507.4

糖の證明

グレドシヤサポニンを硫酸を以て加水分解しサボゲニンを分離せる母液は炭酸バリウムを以て硫酸を中和し濾過し濾液を蒸發乾涸しアルコールを以て浸出し浸液を蒸發してアルコールを除去し残渣を二分して常法により Phenylsazon 並にか-Bromphenylsazon を製造するに前者の融點は 160° - 162° にして中尾氏⁽²⁾の夫と全く一致し後者の融點は 171° にして又 *L*-Arabinose- α -bromphenylsazon の夫と一致するを以て該サポニンの加水分解によりて生ずる糖はアラビノーゼ Arabinose なるべし。

以上試験の結果に依れば グレドシヤサポニンの加水分解方程式は次の如くなるべし。

Gleditschiasaponin Gleditschiasapogenin Arabinose

グレドシヤサポニン及び其サボゲニンは醋化によりて夫々融點 148 - 151° (143° 附近にて收縮) 及び 102 - 105° (99° にて收縮) の醋化物を得たるも分析、鹼化其の他の試験成績未だ一致せざるを以て精査後更に報告することあるべし。

第四章 グレドシヤサポニンの藥理作用

グレドシヤサポニンの溶血作用。

グレドシヤサポニンを生理的食鹽水に混和し之に計算量の $N/100$ NaOH を注加して溶解せしめ之を食鹽水を以て種々に稀釋し常法に依り溶血作用を試験するに牛赤血球に對し1時間の觀察に於て5000倍迄完全に溶崩作用を呈せり。又ナトリウム鹽として食鹽水に溶解せしめ更に之を計算量の $N/100$ HCl を滴加して遊離せしめたる溶液即ち遊離サポニンの血球溶崩作用を試験せるに75000倍(山羊血球)の溶崩作用を呈す。ゼネギン Senegin は12000倍迄の溶崩作用なるを以て之に比すればグレドシヤサポニンの溶崩作用は遙に強力なり。該サポニンはコレステリン Cholesterin と混合する時は溶血作用を全く失ふ。之を以てグレドシヤサポニンは真正なるサポニンなる事を知る。

グレドシヤサポニンの毒力

南京鼠に對して皮下適用にて體重 1g に對し 0.9-1.0mg を以て動物を 24 時間

以内に致死しめ得、又家兎の靜脈内注射に於ては體重 1Kg に對し 40-47mg の間にて動物を致死せしめ、而して其中毒症狀は一般サボニン中毒症狀に全く一致す。體重 1Kg に對し 47mg にては痙攣を起し直ちに斃れ 40mg にては赤痢様の下痢を起し重篤なる症狀を呈したるも恢復生存せり。此毒性はキラヤサボトキシン Quillajasapotoxin の約 $\frac{1}{100}$ 、ゼネギンの約 $\frac{1}{10}$ に相當し著しく毒性弱し。即ち溶血作用はゼネギンより遙に強けれども毒性は之より遙に弱し。

第五章 結 論

さいかちは多量のサボニン（グレドシヤサボニン）を含有し、原料の 10-15% を製造し得らる。該サボニンは $C_{59}H_{100}O_{20}$ なる組成を有する一鹽基性酸にして加水分解に依り 2 分子のサボゲニン $C_{27}H_{46}O_8$ と 1 分子のアラビノーゼとを生ず。此サボニンは山羊赤血球に對し 1 時間の觀察に於て 75000 倍の溶血作用を有す。其毒性は比較的少くして靜脈内注射に於て家兎の體重 1Kg に對し 40-47mg の間にて動物を致死せしむ。

既知サボニンの應用を見るに或は強心藥 (Helleboren) とし或は利尿藥 (Strophantinsäure) とす者等の特異の作用を有する者有れども其刺激性祛痰劑として用ふるもの甚だ多し。「さいかち」も既に古より祛痰劑として使用せられ居たるは其中に含有せるサボニン即ちグレドシヤサボニンに依るものなる可く從つてグレドシヤサボニンも祛痰劑として醫用に供し得らるるものと信ず。

文 獻

- (1) 小泉榮次郎氏編纂 和漢藥考
- (2) 本誌 第 334 號 1291 頁

(昭和 2 年 5 月 内務省東京衛生試驗所に於て)

ロートエキス中の鹽基性揮發物質

青山 新 次 郎

S. Aoyama : Ueber die flüchtige Base, die sich bei der Hyoscyaminbestimmung des Scopoliaextraktes bemerkbar macht.

ロートエキス中アルカロイド定量法に關し揮發性の鹽基性物質の存在に就きて先きに河内善一郎氏により論議せられたるが、當時著者はロートエキスの調査に従事しつつありし際なりしかば此點に關し精査の必要を認め自製のエキスにつき

1) 藥誌 540, 152.