Chlorhydrat vom F. P. 247° zersetzt sich unter Aufschäumen, sehr hygroskopisch, farblose Nadeln oder Säulen.

Sublimatdoppelsalz F. P. 252° weisse Krystalle.

Pikrat Z. P. 265° gelbe Krystallnadeln

Golddoppelsalz F. P. 265° gelbe blättrige Krystalle; enthält 44,43 % Au.

Platindoppelsalz F. P. 234° pomeranzengelbe flache Krystallnadeln oder Säulen.

S. Kuwata und **M. Harima**: *Studien über die gegen Diabetes verwendeten Volksdrogen (III. Mitteilung). Über die Bestandteile der Rinde der Aralia chinensis L. var. grabrescens. (II. Mitteilung). Wirkung der Protocatechusaure.*

10 mg oder 20 mg protocatechusaures Natrium werden pro kg körperrgewicht den Kaninchen subcutan injiziert und die Aenderung des Blutzuckergehalts in 7 Stunden untersucht. Die Zunahme ist im allgemeinen sehr schwach, doch ist der Blutzuckergehalt bei normalen Kaninchen etwas vermehrt. Bei der Injektion der durch Adrenalin (Epinephrin) Hyperglykämie zeigenden Kaninchen wird die hemmende Wirkung nicht beobachtet, sondern im Gegenteil eine fördernde. Auf die durch Glucose in alimentäre Hyperglykämie geratenen Kaninchen übt es keine Hemmung. Bei der durch Ammoniumchlorid in sog. nervöse Hyperglykämie geratenen Tiere zeigt sich eher eine fördernde Tendenz. Injiziert man 40 mg pro Kg Körpergewicht normaler Kaninchen, so kann man innerhalb 5 Stunden keine Zuckerreaktion im Harn feststellen.

S. Aoyama: *Über das Saponin des Panax repens, Maxim. (III. Mitteilung.) Über die Zusammensetzung der Panaxsaponins und des Panaxprosapogenins.*

(Aus der Fabrikationsabteilung des Hygienischen Instituts im Ministerium des Inneren zu Tokyo).

In der ersten und zweiten Mitteilung (Y. Murayama und T. Itagaki, diese Zeitschr. Nr. 501, 783; Y. Murayama und S. Tanaka, ibid. Nr. 544, 526) hat Y. Murayama hauptsächlich über Sapogenin berichtet und die Aufklärung des Saponins einer späteren Mitteilung vorbehalten. Auf Wunsch dieses Forschers.

habe ich diese Studien und zwar die Erforschung von Saponin und Prosapogenin fortgesetzt.

Diesmal wurde die Darstellung des Saponins mit gutem Erfolge in unten angegebener Weise modifiziert. Das durch Mazerieren in Methylalkohol erhaltene Extrakt wurde in wässriger Lösung mit saurem weissen Ton behandelt und hiervon abfiltriert. Durch Ansäuern mit Salzsäure fiel das rohe Saponin mit weisser Farbe in einer Ausbeute von 5 % aus. Dasselbe wurde in Methylalkohol der fraktionierten Fällung mit Aether unterworfen. Der zuerst ausfallende Anteil stellt amorphes Saponin, der zuletzt ausfallende aber kristallisiertes Prosapogenin dar. Da die beiden aschehaltigen Anteile durch Umkristallisieren nicht aschefrei erhalten werden konnten, wurde dies durch Elektrodialyse bewirkt.

Der charakterische Unterschied der beiden Substanzen besteht darin, dass Saponin in Wasser leicht löslich, während Prosapogenin darin unlöslich ist. Bei 37° üben beide Substanzen in 2 Stunden eine hämolytische Wirkung von 1: 200000 aus, doch entwickelt Prosapogenin diese Wirkung etwas langsamer.

$[\alpha]_D^{25} = +18, 49^\circ$ (Methylalkohol). Das aschehaltige Produkt hat den Z. P. 222–224°, die aschefreie Substanz aber den Z. P. 220–221 (aus 80 % igem Methylalkohol). Die Substanz stellt ein farb- und geruchloses Krystallpulver mit charakteristischer Liebermannscher Reaktion dar. Es ist löslich in Methylalkohol, Aethylalkohol und Eisessig, unlöslich in Aether und Aceton. Aus methylalkoholischer Lösung wurde durch Bleizucker das Bleisalz $C_{40}H_{64}O_8(CO_2O)_2Pb$ gefällt. Letzteres bildet durch Schwefelwasserstoff das ursprüngliche Prosapogenin zurück. Durch Hydrolyse bildet sich Panaxsapogenin $C_{36}H_{58}O_4$ vom F. P. 304–305°. Die Tollens-Neuberg-Saneyoshische Zuckerreaktion ist stark positiv. Durch das p-Bromphenylosazon (F. P. 210°) des Baryumglucuronats wurde die Anwesenheit der Glukuronsäure bestätigt und der Glucuron-Gehalt wurde nach der Methode von Krüger-Tollens-Lefevre und von Lefevre quantitativ bestimmt und auf Grund der Sapogenin-Bestimmung wurde definitiv festgestellt, dass Prosapogenin aus je 1 Mol. Sapogenin und Glucuronsäure besteht. Darnach der Siedepunktserhöhungsmethode festgestellte Molekulargewicht stimmt mit dem auf Grund der Bleibestimmung des Bleisalzes berechneten fast überein. Nach obigem Ergebnis scheint die Zersetzungsgleichung des Prosapogenins die folgende zu sein:

Dasselbe lässt sich selbst bei 150 nicht entwässern. Das amorphe aschehaltige Produkt zersetzt sich bei 199°, während das aschefreie Produkt den Z. P. 195° aufweist. Die Substanz ist in Wasser, Methylkohol, Äthylalkohol leicht löslich, aber unlöslich in Äther und Aceton. Sie zeigt die charakteristische Liebermann'sche Reaktion. $[\alpha]_D^{25} = -3,6^\circ$ (Methylalkohol).

Beim Erwärmen mit Säuren auf 40–50° bildet sich Prosapogenin, doch zersetzt es sich nicht bei gewöhnlicher Temperatur. Schon durch Kochen mit Alkohol zersetzt sich die Substanz. In methylalkoholischer Lösung entsteht durch Zusatz von Bleizucker eine Fällung von $\text{C}_{101}\text{H}_{156}\text{O}_{31}\text{Pb}_2$. Dieses Salz bildet durch Behandlung mit Schwefelwasserstoff Prosapogenin zurück.

Geht die Hydrolyse bei 40–50° vor sich, so entsteht nur Prosapogenin, bei starker, aber kurzer Hydrolyse auf kochendem Wasserbade entsteht gleichzeitig Sapogenin. Man kann hierbei Prosapogenin in methylalkoholischer Lösung über das Bleisalz isolieren. Was den Zuckeranteil anbetrifft, so zeigt er starke Bial'sche Reaktion, während er aber die Glucuronsäure-Reaktion kaum aufweist. Glucose wurde durch Darstellung von Phenylsazon (Z. P. 201°), von p-Nitrophenylhydrazon (Z. P. 179°), 1-Arabinose aber durch deren Phenylsazon (F. P. 158°), Diphenylhydrazon (Z. P. 197°) nachgewiesen.

$[\alpha]_D^{20} = +25, 18^\circ$ (Pyridin-Alkohol). Andere Zuckerarten sind nicht vorhanden.

Ferner wurden nach der Krüger-Tollens-Kröberschen Methode Glucuron und Arabinose quantitativ bestimmt. Unter Berücksichtigung dieser Daten und der Tatsache, dass Sapogenin nach der Analyse aus je 1 Mol Prosapogenin und Glucose besteht, so muss $\frac{1}{2}$ Mol Arabinose enthalten sein. Die Feststellung des Molekulargewichts nach der Titriermethode und Gefrierpunktniedrigungsmethode (Eisessig) führte zu keinen übereinstimmenden Resultaten. Bei der Siedepunkterhöhungsmethode (Alkohol) zersetzt sich das Saponin, sodass der Zweck nicht erreicht wird. Da aber das Saponin in Wasser leicht löslich ist, ein Bleisalz bildet, bei gewöhnlicher Temperatur durch Säure nicht zersetzt und erst durch Erhitzen gespalten wird, so ist die Schlussfolgerung wohl gerechtfertigt, dass Saponin kein Gemisch, sondern eine chemische Verbindung ist und aus je 2 Mol Prosapogenin und Glucose, 1 Mol 1-Arabinose besteht. Das bei 76° und unter vermindertem Druck getrocknete Saponin besitzt die Formel $\text{C}_{101}\text{H}_{160}\text{O}_{34} \cdot 5\text{H}_2\text{O} \cdot (\text{C}_{101}\text{H}_{170}\text{O}_{39})$. Die Hydrolyse scheint nach folgender Gleichung zu verlaufen:

H. Kondo und Z. Narita: *Über Dauricin. XXVI. Mitteilung über die Alkaloide von Sinomenium u. Cocculus-arten von H. Kondo.*

In der 14-ten Mitteilung dieser Arbeit¹⁾ hatten die Verfaesser aus der Wurzel von *Menispermum dauricum*, ein Alkaloid Dauricin isoliert und schrieben sie ihm die Formel

zu.

Es ist ganz indifferent gegen so viele Reductionsmitteln wie Palladiumkolloid und Wasserstoff, Zinkamalgam und konz. Salzsäure, oder Natriumamalgam.

Dauricin bildet ein farbloses Nadel förmiges Monojodmethylat $C_{19}H_{23}NO_3 \cdot CH_3J \cdot \frac{1}{2}H_2O$ vom Smp. 130–40°, welches bei 100° sein Krystallwasser verliert und bei 204° schmilzt.

Methylauricinjodmethylat $(CH_3O)_3 \cdot C_{16}H_{13}N(CH_3)_2J$ stellt farblose hexagonale Prismen vom Z. P. 152°, welches beim Behandeln der Base mit Dimethylsulfat dar.

Der Hoffmann'sche Abbau des Dauricins wurde diesmal mit reicherm Material wiederholt, um es genauer und noch weiter zu erforschen.

α -Methylauricimetin krystallisiert aus Benzol als farblose Nadeln vom Smp. 108°. Es ist optisch inactiv, bildet sandförmiges Jodmethylat $C_{22}H_{30}NO_3J \cdot \frac{1}{2}H_2O$ vom Z. P. 206–207°.

Das stickstofffreie Zersetzungsproduct besteht aus drei Substanzen; A, B, und C.

A ist in Aether leichter löslich, bildet blätterige Krystallen vom Smp. 86°. Es hat eine Zusammensetzung $C_{16}H_{11}(OCH_3)_3$.

B ist schwer löslich in Aether, leichter in Alkohol. Es bildet sandförmige Krystallen vom Smp. ca. 71° und besitzt eine Zusammensetzung $C_{16}H_{13}(OCH_3)_3$.

C ist amorph und unlöslich in allen Lösungsmitteln.

Oxydiert man A oder B mit Kaliumpermanganat in Acetonlösung, so erhält zwei Säuren vom Smp. 194° und Smp. 312°. Die letztere ist schwerer löslich in Aceton, beim Zufügen von Chloroform scheidet sich der erstere als prismatisch.

1) Diese Ztschr. 542.

5) 尿についての試験

試験動物としては健康なる雄性の家兎を撰び、動物を過度に刺戟することを避くるため、充分グリセリンにて濡したる細きカテーテルを膀胱に挿入し滴下する尿を試験管にとりて定性試験を行ふ。數例につきて試験せる結果プロトカテキュー酸ソーダを 1kg につき 40mg まで與ふるも尿中糖の反應を見ず。50mg なるときは 1,2 時間目に僅かに糖の反應現るるを見たり。(但し、それ以上は未だ検査せず)。試に上記實驗に用ひたる家兎の 1 をとりフロリデンを苛性ソーダにて中和、水に溶解したる 1% 液を 1kg に對し 1cc の割合として皮下に注射し注射後 15 分, 30 分, 1 時間…5 時間各々採尿して糖の反應を検したるが 30 分にして反應現れ 4 時間持續し 5 時間目には殆んど全く消失せり。即ちプロトカテキュー酸ソーダはフロリデンの 40 倍を用ふるも尿中に糖を排泄することなしと言ひ得べし。

昭和 4 年 4 月 5 日 倉敷中央病院研究室化學部にて稿

竹節人參のサポニンに就て (第三報)

パナックスサポニン及パナックスプロサポゲニンの組成

青山新次郎

S. Aoyama ; Ueber das Saponin des *Panax repens* maxim. (III Mitteilung)
 Ueber die Zusammensetzung des Panaxsaponins und des Panaxprosapogenins.

第一報〔村山義溫、板垣武喜：藥誌 506, 783〕及第二報〔田中振爾共著、藥誌 544, 526〕に於て村山義溫氏は主としてサポゲニンに就きて報告しサポニンの組成は後報に譲れり、余は同氏の諒解の下に研究を續行しサポニン及プロサポゲニンの組成に關し得たる結果を第三報として報告せんとす。

既に F. Wentrup 氏はサポニンは $C_{24}H_{40}O_{10} \cdot H_2O$ に相當するとしたれども信を置き難き事は第一報に明らかなり。

サポニンの製造には前回迄は 90% アルコホルにて溫浸しこれに少量の鉛糖を加へ沈澱を去り濾液を硫化水素にて脱鉛して精製したりしが今回はメタノール、冷浸に改め一旦濃縮してエキスとしこれに水を加へ更に酸性白土を加へ靜置して濾過し不純物を去り濾液に鹽酸を加へて容易に類白色の粗製サポニンを得たり。酸性白土を用ひざる時は黒褐色の物質を得べし。得量は 5% にして前報告と同様なり。かくして得たる粗製サポニンをメタノールとエーテルより分割沈澱したるに初め

の部分に無晶形の物質、最後の部分に結晶性の物質を得たり。精査の結果無晶形のはサボニン、結晶性のはプロサボゲニンなり。共に灰分を含み再結晶法によりては 0.1% 以下とすることを得ず、これをコロヂウム膜を用ひ電気透析して無灰のものを得たり。

サボニンとプロサボゲニンとの最も特異なる相違は水に対する溶解度なり。即サボニンは可溶なるにも拘はらずプロサボゲニンは不溶なり。其他サボニンは Zp. 195° にして無晶形、プロサボゲニンは Zp. 221° にして結晶性なり。

東京衛生試験所伊東醫學士の調査によるときはサボニン、プロサボゲニンの溶血作用は殆ど同等にして即兩者の食鹽水溶液は 37°, 時間にて 20 萬倍の溶血作用ありと云ふ。但しプロサボゲニンの作用の發現はサボニンよりも幾分遲しと云ふ。

プロサボゲニン

プロサボゲニンは分析の結果 $C_{42}H_{66}O_{10}$ に適し $[\alpha]_D^{11} = +18.49^\circ$ 灰分含有品の Zp 222-224°, 無灰品の Zp. 220-221° なり。無色、無臭の堅き結晶粉にし著明のリーベルマン反應あり、過クロール鐵によりて反應なく、メタノール溶液は鉛糖によりて無色の鉛鹽を沈澱し二鹽基性酸として大略 $C_{40}H_{64}O_6 <\begin{smallmatrix} COO \\ COO \end{smallmatrix}>Pb$ (實驗 Pb 21.00% 計算 22.14%) に一致す。酸と加水分解する時はアグリコンとして Fp. 304-305° のバナックスサボゲニン ($C_{36}H_{58}O_4$) を生じ、糖液の部分はナフトレゾルチンによりてエーテル液は著明の紫紅色を呈しグルクロン酸の存在を示し又これを Ba 鹽とし α -ブロムフェニルオサブーン (Zp. 210°) として證明せり。但このものは Zp. 210° にて一定し 216° のものを得る能はざりしも Haar 氏 [v. d. Haar, monosaccharide u. Aldehydsäuren 23.] の結果に一致するを見、且分析によりてこれを確めたり。他に糖類は存在せず。

故にグルクロン酸を Krüger-T. llens-Lefèvre 法 [Haar, monosaccharide usw. 71] (フロログルチッド法) 及 Lefèvre 法 [Haar, monosaccharide u. s. w. 72] (CO_2 法) にて定量したるに 1 分子のグルクロンを含み、サボゲニン定量の結果も亦 1 分子を含有することを知れり。次に分子量測定の結果は沸點上昇法のもの最も近く (實驗 553.99 計算 730.52) 又鉛鹽中 pb 含量より計算したるもの最もよき數値 (781.70) を與へたり。以上の結果に就きて見るにプロサボゲニンの加水分解式は次の如くなるべし。

サボニンは無晶形にして灰分含有のものは Zp. 199°, 無灰のものは 195° にして水に易溶なり。著明のリーベルマン反應あり $[\alpha]_D^{8.5} = -3.6^\circ$ にして非常に分解し易く 40% アルコホル中酸と 40-50° に熱する時は分解してプロサボゲニンを

生成す。特に熱に對して弱くアルコールと煮沸することによりて已に分解せらる。然るに常溫に於ては酸によりて24時間以内に分解せらるることなし。メタノール液は鉛糖によりて鉛鹽を沈澱するもこれを硫化水素にて取扱ふときはプロサボゲニンを生成し又貯藏中水分の存在する時は分解せらる。サボニンを40-50°にて分解する時はプロサボゲニンのみを得るも得量少なく且時間を要す。然するにこれを3時間水浴上に強く熱する時はプロサボゲニンとサボゲニンとの混合物を得。サボゲニンは稀薄メタノール液中鉛糖によりて鉛鹽を沈澱せざるによりメタノールに溶かし鉛鹽として兩者を分離精製してよき結果を得たり。

40-50°にて分解して得たる糖液はグルクロン酸の反應弱く、ビアル反應強く又ヘキソーゼのオサゾーン(Zp. 201°)を得たり。即グルクロン酸は存在せず。ペントーゼ及ヘキソーゼの存在を豫想せしむ。次に3時間強く水浴上に分解したるに糖液はビアル反應強く且ペントーゼに特異のスペクトル吸収反應あり、Widtsch-Tollens 反應, Rosenthaler 反應, Bertrand 法及 Kent-Tollens 法の結果も陰性に終れるが故にメチルペントーゼ, キシローゼ, ガラクトーゼ存在せざるべし。この故にサボニン中の糖はプロサボゲニン中のグルクロン酸以外ヘキソーゼ及ペントーゼより成ることを知りたるが故に次には各の誘導體を作り且標本と混融によりてこれを決定したり。即ビール酵母を用ひてヘキソーゼを醗酵し去りたるものよりオサゾーン(Fp. 158°)及デフエニルヒドラツオン(Zp. 197°; $[\alpha]_D^{18} = +25.18^\circ$)を得ペントーゼは μ -アラビノーゼなることを確定せり。アラビノーゼ抜き糖液よりは μ -ニトロフニルヒドラツオン(Zp. 179°)を得ヘキソーゼはグルコーゼなることを確定せり。

以上の結果によりてサボニンはプロサボゲニン, グルコーゼ, アラビノーゼの3成分より成るが故にこれをLefèvre法によりてグルクロンを定量し次にKrüger-Tolleus-Kröber法によりてグルクロンとアラビノーゼとを定量し其結果よりグルクロンの計算量を差引きたるにアラビノーゼは7.91%にしてプロサボゲニン及グルコーゼが各1分子宛よりなるものとせばアラビノーゼは $\frac{1}{2}$ 分子量となる(計算7.84%), 故にアラビノーゼの量が $\frac{1}{2}$ 分子なるか1分子なるかを分子量測定によりて決定せんとしたるに滴定法(4209)結氷點降下法(244.)の結果一致せず、しかも沸點上昇法によりて測定せんとしたるにサボニンの分解を生起し目的を達すること能はざりき。然るにサボニンが混合物に非ることは水によく溶解すること(プロサボゲニンは溶けず), 鉛鹽を與ふること, 常溫にて酸にて分解せられず加熱して初めて分解する事等よりして考ふるに決定的にして従つて $\frac{1}{2}$ 分子量のアラビノーゼは考へ得られず。又無晶形なることも分子量の大なることを示す。即サボニンは2分子のプロサボゲニン及グルコーゼ, 1分子の μ -アラビノーゼよりなるとする方が適當なり。

尙余は今ここに適當の醗酵管を有せざるを以てグルコースの定量を行ひ得ざりしも他の糖類の定量結果より推論してグルコース 2 分子量の存在は誤なからんと信ず。又サポニンは 150° に熱するも水を放出せず。

以上の事實によりて考ふるに 76° に減壓乾燥したるサポニンは $C_{101}H_{160}O_{34} \cdot 5H_2O$ (即 $C_{101}H_{170}O_{39}$) に適し其本體は $C_{101}H_{160}O_{34}$ にしてプロサボゲニン及グルコース各 2 分子、アラビノーゼ 1 分子より成り加水分解式は次の如くなるべし。

本研究に對し厚教を得よる西崎村山兩博士及熱心に助力せられたる森田一貫君に厚き感謝の意を表す。(詳細は昭和 5 年 3 月に發行せらるべき衛生試験所集報を参照せられたし)

實 驗 之 部

總粗製サポニンの製造

竹節人參粗末 1Kg をエーテルにて脱脂し殘渣にメタノールを加え冷浸せること 3 回の後減壓にてメタノールを去り殘渣に水を加へて 4L としこれに酸性白土 1Kg を加へ 1 夜間放置後濾過洗滌し濾液及洗液を合併しこれに鹽酸を加へて 3% とし析出する沈澱を靜置したる後濾過洗滌しメタノールにとかし更に減壓にてメタノールを去り次に水浴上に速かに乾涸して粉末となす。類白色、無晶形の粉末にして得量 50g。

プロサボゲニンの製造

粗製サポニン 100g を少量のメタノールにとかしエーテルを加へて 6 部分に分割したるに第五回の母液はエーテルを加ふるも沈澱を析出せざるにより溶劑を去り得たる殘渣 (33g) をメタノールにとかし骨炭精製後水を加へたるに嵩高の沈澱を析出せり。これを絹を置きたる素焼板上に置き KOH 上に乾燥したるに嵩を減じて顆粒狀の堅き結晶塊となれり。得量 4.5g。更に反覆精製し Zp. $222-224^{\circ}$ のプロサボゲニンを得たり。灰分 0.1% を有し數回再結晶するも無灰とするを得ず。試みに其鹽酸溶液に就きて試験したるに灰分は主としてマグネシウムより成る。これを次の如く電氣透析法によりて無灰とせり。

プロサボゲニンの電氣透析

コロヂウムにて袋を作りこの中にプロサボゲニンの微粉 0.5g を 0.5% の鹽酸 50cc 中に懸垂し置き更に此中に細長きコロヂウムの鞘を入れ 0.5% 鹽酸を盛り白金線を挿入し陽極とす。全體を水中に漬け其袋の下部より少しく離れて輪形の白金線を裝置し陰極とし 0.5% 鹽酸少量を如へ電流を調節せり。これに 25 ボルト。

0.1 アムペアの電流を通じ3時間後濾過水洗し 80% メタノールより再結晶せり。得たるプロサポゲニンは Zp. 220-221° にして無灰なり灰分含有のものと混融するに融點の降下なし。

プロサポゲニンは無臭にして微苦味あり、水、エーテル、クロロフォルム、アセトンに殆ど溶解せず、アルコール、メタノール (8:1) 氷醋酸、醋酸エーテルに溶解し、メタノール飽和液に水を加ふる時は直に沈澱を析出し來り且液を振盪する時は泡沫を生ず、又エーテル、メタノール、水の混液には溶解す。メタノール液は鉛糖によりて無色の鉛鹽を析出し硫化水素によりて又プロサポゲニンとなる。著明のリーベルマン反應あり。稀酸にて加水分解したるものはフェリング氏液を著明に還元し Tollens-Neuberg-Sancoschi 法によりてナフトレゾルチンと熱するとき得たるエーテル液は著明の紫色を呈しグルクロン酸の存在を示す。

無灰のプロサポゲニンの分析 (100° 減壓乾燥)

物質	0.0576g	CO ₂	1.1454g	H ₂ O	0.0486g	C%	68.85	H%	9.44
	0.0557		0.1416		0.0481		6.933		9.63
	0.0530		0.1344		0.0473		69.16		9.99
平均						C%	69.11	H%	9.69
計算	グルクロン酸分子含有のもの C ₂₄ H ₆₆ O ₁₀					C%	68.99	H%	9.11
	グルクロン酸葡萄糖各分子含有 C ₄₈ H ₇₆ O ₁₅					C%	64.53	H%	8.58

(サポゲニンは C₁₆H₃₈O₄ として計算す)

分子量測定 (乾燥品)

滴定法, アルコールにとかし行ふ

物質	0.0642g	1/10-KOH	1.09cc	分子量一鹽基性酸として	588.8
				二鹽基性酸として	1177.6

結晶點降下法

物質	0.0754g	氷 醋	28.3195g	降下	0.095°	分子量	1093.
„	0.1058	石炭酸	32.2692		0.1°		236.1

沸點上昇法

物質	0.0728g	アルコール	20.5cc	上昇	0.01°		553.99
計算	C ₂₄ H ₆₆ O ₁₀						730.52

鉛鹽 無灰のプロサポゲニン 0.2g をメタノール 3cc にとかしこれに醋酸鉛のメタノール溶液を加へ析出せる沈澱をよくメタノールにて洗ひ乾燥す。無色の粉末なり。

物質	0.0540g	PbSO ₄	0.0166	Pb.	21.00%
計算	C ₄₀ H ₆₄ O ₆ <COO>Pb				22.14%

これより算出したる分子量は實驗數 781.7 計算數 730.52

比旋光度 物質 0.3949g をメタノールにとかし 20cc とす。管長 2dm にて α_D = +0.73° (1%) 故に [α]_D²⁵ = +18.49°

プロサボゲニンの加水分解

プロサボゲニン (Zp. 224°) 5g をアルコール 80cc にとかしこれに水 100cc を加ふるに全體泥狀となる更にこれに 30 % 鹽酸 20cc を加へ水浴上に強く加熱するに約 10 時間にして内容は顆粒狀となり 20 時間にして沈澱は結晶狀を呈し來る。茲に得たるサボゲニンは 3.5g にしてメタノールと骨炭にて精製したるに Fp. 300-305° となりこれを第一報にて報告したるサボゲニン (Fp. 304°) と混融するも融點降下せず。

サボゲニンの濾液は炭酸バリウムにて中和し濾液を減壓にて乾涸し初め 90 % アルコール次に 95 % アルコールにて溫浸するに少量の Syrup を残す。この部分はフェーリング氏液を還元するも強からず鹽酸フェニルヒドラチンによりてオサゾーンの析出なし。

グルクロン酸の證明

90 % アルコール不溶分は水にとかし醋酸鉛を加へ沈澱物を去りこれに鉛酸液を析出せる沈澱を水洗後直に脱鉛し減壓にて濃縮しバリット水にて中和しこれに *α*-ブROOMフェニルヒドラチン 5g を加へ 1 分間煮沸し速かに濾過して濾液に氷醋 3cc を加へて 30 分間煮沸し得たる樹脂様の物質を初め水次に多量の純アルコール、エーテルにて洗滌し鮮黄色の粉末 0.15g を得たり。Zp. 210° にして數回精製するも Zp. を上ぐる事能はざりしもグルクロン酸バリウム-*α*-ブROOMフェニルオサゾーンなることは次の分析によりて明らかなり。

物質	0.0571g	BaSO ₄	0.0110g	Ba	11.37%
計算	C ₃₆ H ₃₄ N ₈ O ₁₀ Br ₄ Ba				11.50%

以上の事實によりてバナックスプロサボゲニンはサボゲニンとグルクロン酸とより成るが故に次の如く定量したり。

グルクロンの定量

フロログルチッド法。餾出液はフロログルチッドによりて黒青色の沈澱を生じ他の糖類の存在を認めず。

物質	0.3086g	フロ、グルチッド	0.0286g	グルクロン	0.0858g	27.80%
計算	C ₆ H ₈ O ₆ /C ₄₂ H ₆₆ O ₁₀					24.10%
	C ₆ H ₈ O ₆ /C ₄₈ H ₇₆ O ₁₅					20.17%

炭酸法。但し加熱は 5 時間を要したり。サボゲニンは同様に處理するも炭酸の發生なし。

物質	0.2022g	CO ₂	0.0116g	グルクロン	0.0464g	22.95%
----	---------	-----------------	---------	-------	---------	--------

サポゲニン定量

物質	0.0574g を 10 % H_2SO_4 20cc と 2 時間煮沸したり.	
実験	サポゲニン 0.0436g	75.96%
計算	$C_{36}H_{58}O_4/C_{42}H_{66}O_{10}$	75.84%
	$C_{36}H_{58}O_4/C_{48}H_{76}O_{13}$	62.07%
即プロサポゲニンは $C_{42}H_{66}O_{10}$ なり.		

総粗製サポニン中よりサポニンの製造

プロサポゲニン製造の際分割沈澱して得たる第一の部分 95g を又メタノールとエーテルより先づ 3 部分に分け更にこれを細分し Zp. 199° のもの 13.8g を第一区分より得たり. このものは灰分 0.1 % を含有するにより 24 ボルト 0.07 アムペア, 0.1 % 鹽酸にて電気透析を行ひ更にメタノールとエーテルより精製し Zp. 191-195° (乾燥品) の無灰のサポニンを得たり. 原物質と混融するに融點降下せず.

サポニンは無臭にして微苦味あり. 無色, 無晶形の粉末にして酒精, メタノール, 水に可溶にしてメタノールより再結晶することを得ず. エーテル, クロロフォルム, アセトンに不溶. メタノール, 水の混液中に鹽酸 1 滴を加ふるに直に沈澱を析出し来る. 水溶液は振盪する時は泡沫を出し粉末は少しく鼻腔を刺激す. 著明のリーベルマン反應及ビアル反應あり. 稀酸と加水分解したるものはフェーリング氏液を著明に還元し, グルクロン酸の反應あり.

比旋光度 物質 0.5003g をメタノールにとかし 20cc とす管長 2dm. 8.5° にて $\alpha_D = -0.18^\circ$ 故に $[\alpha]_D^{25} = -3.6^\circ$ なり.

サポニンの加水分解

サポニンよりプロサポゲニンのみの製出及ヘキソーゼの證明

サポニン (Zp. 199°) 10g をアルコール 75cc にとかしこれに水と鹽酸とを加へて 3 % 鹽酸含有の 40 % アルコール溶液とし室温に放置したるに澄清の液は 24 時間後に至るも沈澱を析出せざるにより 40-50° に加温したり. 3.5 時間にして沈澱の析出あり漸次増量し 10 時間にして軟粥狀を呈す. これを濾取し 40 % アルコールにて洗ひ KOH 上に乾燥せり. 得量 0.7g. これを 2 回 80 % メタノールより再結晶したるに Zp. 220-224° にしてこれを先きに得たるプロサポゲニンと混融して同一物なることを確めたり. プロサポゲニンを去りたる濾液は更に 40-50° に 30 時間温め得たる沈澱は同様にして精製したるに Zp. 222.5° を示し明らかにプロサポゲニンなり. 得量 0.9g.

糖の部分は $BaCO_3$ にて中和し乾涸し常法に従ひ處理せり. 90 % アルコロール不

溶分は殆どグルクロン酸の呈色反應なく、95 %アルコール可溶部は Syrup にして 1.7 g あり ビアル反應極めて強くペントーゼの存在を示すも其確定は次法に譲れり。Syrup 全部の水溶液に鹽酸フェニルヒドラチン 3.4g 醋酸曹達 3.4g を加へ水浴上に 1 時間加熱し得たる沈澱を初めアルコール次にアセトンにて洗ひたるに鮮黄色のオサズーン (Zp. 170-178°) 0.6g を得たり。このものを多量の純アルコールより再結晶したるに Zp. 190-201° となり標本 (グルコサズフェニルオサズーン Zp. 204°) と混融するに融點の降下なくヘキソーゼなり。

プロサボゲニン、サボゲニンの混合物を製造しこれより 分離精製によりてプロサボゲニンの製造及糖の檢索

前法による時は極めて長時間を要し且得量悪しく又サポニン中にはプロサボゲニンの外にヘキソーゼを證明しグルクロン酸の存在せざることを證明し得たるが故に短時間にてよき得量を得る方法を案出したり。但此場合にはプロサボゲニンの一部は更に分解せられてサボゲニンを生成するが故にこの分離を行はざるべからず。然るにプロサボゲニンは稀薄メタノール溶液中醋酸鉛によりて沈澱しサボゲニンは沈澱せざるにより此差異を兩者の分離に應用したり。サポニン 10g を 3 %鹽酸含有の 40 %アルコール溶液にて 3 時間水浴上に強く分解し得たる沈澱 (8.5g) を一回 80 %メタノールより再結晶したるに Zp. 150-283° (4.5g) にして明かにサボゲニンの混合物なり。これをメタノールにとかし鉛糖のメタノール液を加へ析出せる多量の沈澱をメタノールにて洗ひメタノール中にて脱鉛し精製し Zp. 220° のプロサボゲニン 1.1g を得たり。混融によりて同一物なる事を知る。

糖 の 檢 索

プロサボゲニンを去りたる濾液は更に 多量の水を加へて靜置し析出せる少量の沈澱を濾去し濾液は BaCO₃ 中和後常法に従ひ 95 %アルコール可溶分を作る。これをビール酵母にてヘキソーゼを醗酵し去り〔青山、本誌 560, 968 参照〕次の試験を行ひたり。

1). ペントーゼの試験. ビアル反應によりて得たる青綠色のアミルアルコール溶液は可視スペクトル中赤色の部位に大なる吸收線と赤色と黄色の中間に細き吸收線を示しペントーゼの存在を確證す。

2). メチルペントーゼの試験.

Widtsch-Tollens 反應, Roseenthaler 反應共に陰性。

3). キシローゼの試験(Bertrand 反應) 陰性。

4). ガラクトーゼの試験(Kaut-Tollens 反應) 陰性。

アラビノーゼフェニルオサズーン

グルコース拔きの Syrup 3.5g を水にとかし鹽酸フェニルヒドラチス 7g 醋酸曹達 7g を加へ 1 時間加熱し 1 夜放置後析出せるオサゾーンを水洗しアセトンに溶解して少量の不溶分を去りアセトンの蒸發殘渣は初め稀アルコール次にベンツオールにて數回再結晶したるに Fp 155-158° にて一定し 0.05g を得たり。これをアラビノーゼ(メルク製)のフェニルオサゾーン (Fp. 158°) と混融するに融點の降下なし。

アラビノーゼヂフェニルヒドラツオン

グルコース拔きの Syrup 0.3g を水 2cc にとかしこれにヂフェニルヒドラチン 0.3g アルコール 8cc を加へて澄明の液とし少時加温後時々研磨しつつ室温に放置したるに 2 日後少量の析出物あり。96 %アルコールより再結晶したるに Zp. 193-197° にしてアラビノーゼヂフェニルヒドラツオン(Zp. 193-196°) と混融するに同一物なり。但し得量は非常に少なく僅かに 2 回の混融量のみなり。これを次の如く Syrup を再分解に附して得量を増すことを得たり。グルコース拔きの Syrup 0.5g を更に 3 % H_2SO_4 含有の 40 %アルコール 20cc にて 6 時間加水分解し常法によりてアルコール可溶分を製し得たる Syrup 0.47g を 2cc の水にとかし少量の不溶分を去り水 1cc にて洗ひヂフェニルヒドラチン 0.4g アルコール 13cc にて同様に處理す。18時間後に到りて沈澱を析出し來る故に研磨して析出を促進し 96%アルコールより精製したるものは Zp. 193-197° にして得量は 0.01g なり。この母液はフォルマリンにてヂフェニルヒドラチンを去り (Ruff-Ollendorff-Browne 法) たるに Syrup を得たり。このものは著明のビアル反應を呈す。

アラビノーゼヂフェニルヒドラツオンの比旋光度 ピリヂン, アルコール混液 (4:16) に溶解し 5cc 中 0.0139g のヒドラツオンを含むもの (即 $d=0.278$) は 1dm の管にて $\alpha_D=+0.07^\circ$ 。故に $\alpha_D=+25.18^\circ$ にして L-アラビノーゼなり。

ヘキソースの決定(グルコース- ρ -ニトロフェニルヒドラツオン)

サポニン 10g より新に得たる 95 %アルコール可溶鹽分を再分解に附し骨炭精製後ヂフェニルヒドラツオンとにアラビノーゼを去り。更にフォルマリンにて處理して回収したる糖分 0.5g を 96 %アルコール 6cc に熱してとかし ρ -ニトロフェニルヒドラチン 0.4g を加へ溶解し放冷せるに 2 日後少量の析出物あり。これを素焼版上に初め 96 %アルコール次にセアトンにて搓捏したる橙黃色 Zp. 160-179° の物質を得、これをグルコースの ρ -ニトロフェニルヒドラツオン Zp. 182° と混融するに融點の降下なし、即グルコースなり。

以上の結果によりてサポニンはプロサボゲニン, グルコース, L-アラビノーゼより成れるが故に次の如く分析したり。

分析 76° に減壓乾燥せり。

物質	0.0527g	CO ₂	0.1152g	H ₂	0.0416g	C%	59.62	H%	8.83
	0.0510		0.1112		0.0417		59.47		9.15
	0.0507		0.1124		0.0423		60.46		9.34
	0.0499		0.1089		0.0379		59.52		8.25
	0.0506		0.1122		0.0373		60.47		7.77
	0.0501		0.1111		0.0348		60.48		8.64
平均							60.00		8.64
計算	C ₁₀₁ H ₁₇₀ O ₃₉						60.38		8.54

150° に減壓乾燥したるものも同様の結果を與ふ。

物質	0.0270g	CO ₂	0.0595g	H ₂ O	0.0226g	C%	60.10	H%	9.37
----	---------	-----------------	---------	------------------	---------	----	-------	----	------

サボニゲン定量

物質 0.0702g を 10% H₂SO₄ 20cc にて 2 時間分解す。初め澄明に溶解し暫時にして沈澱を析出し來る。

實驗	サボゲニン	0.0394g	56.13%
計算	2C ₃₆ H ₅₈ O ₄ /C ₁₀₁ H ₁₇₀ O ₃₉		55.20%

グルクロン定量(CO₂ 法) 加熱は 7 時間を要したり。

物質	0.1172g	CO ₂	0.0048g	グルクロン	16.38%
計算	2C ₆ H ₈ O ₆ /C ₁₀₁ H ₁₇₀ O ₃₉				17.54%

アラビノーゼ定量(フロログルチッド法)

(第一回) 物質 0.3064 より得たるフロ、グルチッドは 0.0402。この中にはグルクロンによるフロ、グルチッドを含有するにより Krüger-Tolleus-Lefevre により計算量即物質 0.3064 の 17.54 % に相當する 0.0537 の 1/3 即 0.0179 (グルクロンに相當するフロ、グルチッドの量) を差引きたる 0.0223 のフロ、グルチッドに相當するアラビノーゼの量は 0.0250 即 8.16 %。

(第二回) 物質 0.2950g フロ、グルチッド 0.0372g グルクロンに對するフロ、グルチッドの量 0.0172g 即アラビノーゼに相當するフロ、グルチッドは 0.0200g 即アラビノーゼは 0.0229g にして 7.66 % なり。2 回平均

計算	C ₅ H ₁₀ O ₅ /C ₁₀₁ H ₁₇₀ O ₃₉		アラビノーゼ	7.91%
				7.48%

サボニンの鉛鹽

サボニン 0.3g のメタノール溶液に醋酸鉛のメタノール溶液を加へ析出せる沈澱を多量のメタノールにて洗ひ乾燥したるものは無色の結晶性粉末にして 0.12g あり次の分析數を與へたり。

物質	0.0526g	PbSO ₄	0.0152g	Pb	19.77%
	0.0585		0.0132		15.42%
平均					17.60%
計算	C ₁₀₁ H ₁₅₆ O ₃₄ Pb ₂				17.79%

然るに上の鉛鹽をメタノール中に懸垂し置き硫化水素にて脱鉛し得たるメタノール溶液を乾涸し更に少量のメタノールにて溶解しエーテルを加へて得たるものは $Zp. 220-221^{\circ}$ にしてプロサボゲニンと混融するに同一物なり。母液は乾涸し水にて振りたる水溶液はフェーリング氏液を直ちに還元す。サボニンは長時間後に非れば還元せず。

分子量測定

滴定法

物質	0.0575g	$N/10$ -KOH	0.273cc	二鹽基性酸として	4209.
				一鹽基性酸として	2104.5

結水點降下法

物質	0.3381g	氷醋	27.0123	降下	0.2°	分子量	244.07
----	---------	----	---------	----	------	-----	--------

沸點上昇法

物質	0.1548g	アルコール	18cc	上昇	0.01°	1341.6
計算	$C_{101}H_{170}O_{36}$					2007.4

測定結果は區々にして一定せず。試みに沸點上昇法によりて分子量を測定したるアルコール溶液を KOH 上に濃縮し水を加へたるに強く濁濁せり。サボニンは然らず。サボニンは本操作中加熱によりて分解せられたるものなり。従つて沸點上昇法の結果も正確なりとは云ひ難し。

以上の事實によりて考ふるに 76° にて減壓乾燥したるサボニンは $C_{101}H_{160}O_{34} \cdot 5H_2O$ (即 $C_{101}H_{170}O_{39}$) にしてプロサボゲニン、グルコゼ各 2 分子、アラビノーゼ 1 分子よりなる。

昭和 4 年 6 月 内務省東京衛生試験所製薬部に於て

Sinomenium 及 *Cocculus* 屬アルカロイド

に關する研究 (第二十六報)

藥學博士 近 藤 平 三 郎

H. Kondo; XXVI mitteilung über die alkaloide von

Sinomenium- u. *Cocculus*-arten

Dauricin の研究 (其二)

藥學博士 近 藤 平 三 郎

成 田 象 一

H. Kondo u. Z. Narita; Ueber Dauricin (II).

前回〔藥誌 542〕余等の供用したる原料は内地に散在せる原植物を採集して僅