Gef:	C %	73.39	H %	10.25
Ber. für $C_{17}H_{28}O_3$:	C %	72.86	H %	10.00

Beide Substanzen sind farblose Öle und geben mit Eisenchloridlösung die Claisensche β -Ketrocarbonsäure Farbenreaktion. (Ber. der Bayer. Akademie **20**, 456).

Wen man diese Ester den nach der Straubschen Methode extirpierten Herzen der *Rana nigromaculata* (Wasserfrosch) injiziert, so bemerkt man, dass der Propylester unter diesen drei Estern, nämlich Methyl Athyl- und Propylester, deren Löslichkeit in gesättigter Ringerlösung fast dieselbe ist, die stärkste Giftwirkung ausübt, während der n-Propylester, dessen Löslichkeit bei weitem geringer ist, entsprechend eine bedeutende Abnahme der Giftwirkung zeigt. In gleich starker Ringerlösung (Prozentgehalt) nimmt die Giftigkeit dieser Ester mit der Zunahme der Anzahl Kohlenstoffatome zu, indem der n-Butylester am stärksten, der Isoamylester etwas schwächer und der n-Hexylester fast kaum giftig wirkt.

Bei den mit Chloralhydrat oder Chloroform gelähmten Froschherzen konnte keine Reizwirkung festgestellt werden.

Aus dem Dargelegten geht hervor, dass die Giftwirkung der Camphercarbonsäureester in der gesättigten Ringerlösung ihrer Löslichkeit fast proportional ist, aber in der gleich starken Ringerlösung der n-Butylester am stärksten wirkt, während die durch Chemikalien gelähmten Froschherzen dadurch keinerlei Reizwirkungen zeigen.

Y. Kinugasa, Y. Hattori, S. Hayatsu, K. Akiyama: *Studies on the determination of sulphurous acid in foods.*

After surveying the various methods proposed for the determination of sulphur dioxide in food stuffs, especially on comparison of those described by Haas¹⁾, Järvinen²⁾, Schmidt³⁾, Froboese⁴⁾, and Williams⁵⁾, the following method is suggested by the authors to be suitable and practicable for the estimation of sulphurous acid in dried apricots, wine, beer, sugar, gelatine and other foods:

A round-bottomed flask of 750 ccm. capacity, provided with two tubes, is

- 1) B. Haas, Ber.Dtsch. Chem. Ges. **15**, 154, (1882.)
- 2) K. K. Järvinen, Ztschr. f. Lebensm. **40** 283, (1925.)
- 3) H. Schmidt, Arb. a. d. Kaiserl. Gesundheitsamt. **21**, 233, (1904.)
- 4) V. Froboese, Arb. a. d. Reichsgesundheitsamt. **52**, 657, (1920.)
- 5) G. W. Monier-Williams, Brit. Food J. **29**, 51, (1927.)

connected by the exit tube with a Liebig's condenser. The lower end of the condenser is connected by an adapter about 5 mm. internal diameter in its lower end, to a Peligot tube which has two vertical globes of 200 ccm. capacity respectively and a horizontal globe of 50 ccm. Through another tube of the flask reaching to its bottom, a current of carbon dioxide, purified by means of potassium permanganate, is introduced into the flask, at the rate of about 150 bubbles per minute. After the air in the apparatus is displaced completely by CO_2 , 10 ccm. of a starch solution are introduced into the Peligot tube together with 1 g. of potassium iodide, and filled up to about 50 ccm. with recently boiled water, and then added 3 drops of N/50 iodine solution from a burette. The current of CO_2 being continued further, 25 g. of the sample are introduced by momentarily removing the stopper into the flask, rinsing the vessel of the sample with 180 ccm. of recently boiled water, then added 0.2 g of tannic acid and 25 ccm. of a 25 per cent solution of phosphoric acid. The mixture is allowed to stand for 15 minutes in the current of CO_2 . The contents of the flask are then carefully heated, so that 40-50 drops distil over per minute in the current of CO_2 . The distillation is continued just for one hour, adding N/50 iodine solution from the burette into the Peligot tube from time to time, so as to keep the solution not decolorized. The amount of sulphur dioxide per kg. of the sample is calculated from ccm. of N/50 iodine solution here used, and it may be controlled by the gravimetric method as follows if necessary. After the distillation is completed, the contents of the Peligot tube are poured into a beaker and sulphuric acid formed by oxidation of the SO_2 precipitated and weighed as barium sulphate. In the case of dried fruits, the sample is at first mixed thoroughly with 30 ccm. of a 6 percent solution of sodium hydroxide and after standing for 30 minutes it is introduced into the distillation flask.

Y. Kinugasa, M. Komori and M. Tanno : *On the determination of benzoic acid in fruit juices and sirups.*

In the new method proposed by the authors for determination of benzoic acid in fruit juices and sirups, extraction with a mixture of ether and petroleum spirit from a salt solution is combined with separation of benzoic acid by quantitative sublimation. The procedure of the method is as follows :

Introduce 100 g. of the sample into a beaker and saturate with pulverized

第 六 圖

第 七 圖

IV. 結 論

1. Camphercarbonsäure Ester 類は飽和溶液に於て其の心臓麻痺作用は大體に於て溶解度に比例す。
 2. 同一%の溶液に於ては *n*-Butylester 最強なれども 低級の エステルより高級 エステルが毒作用強し。
 3. 藥物に依りて麻痺せしめられたる心臓に對しては興奮作用を認むるを得ず。
- 以上は昭和 4 年日本藥學會總會に於て發表せしものなり。

(昭和 4. 7. 17 日金澤藥專教室にて認む)

飲食物中亜硫酸の試験法研究成績報告

衣 笠 豊
服 部 安 藏
早 津 清 二
秋 山 勝 治

Y. Kinugasa, Y. Hottori, K. Hayatsu u. K. Akiyama:

Studies on the determination of Sulphurous acid in foods.

[本研究の詳細は衛生試験所彙報第 33 號 1-39 頁(昭和 4 年)を参照せられたし]

亞硫酸は飲食物の防腐剤として、又は漂白剤として廣く使用せらるるところにして、硫黄の燃化等によりて容易に得られ、瓦斯狀に於て容器或は器具の殺菌に、又はブランクット $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 等の漂白剤として、飲食物の漂白、精製の目的に屢々應用せらる。

從來各國に於ては各々法規に従ひ、之が使用を嚴禁せしと雖も、歐州大戰以後歐米諸國に於ては孰れも漸次各食品につき、製造行程上又は其貯藏上必要とする極限量を限定し、以て其使用を許可せんとするに到れり、即ち次の如し。

檢體 100 萬分中の亞硫酸 (SO_2) 認容量

品 種	乾杏	砂 糖	ゲラチン	糖 蜜	葡萄酒	水 飴 類 (コーンシ ロップ)	麥 酒	果汁 類	果實 シロ ップ	シロ ップ
英 國	2000	70	1600	—	450	450	70	350	果實及砂糖 より當然に 加す可數量	シロ ップ
獨 逸	1250	—	—	—	{總 200 遊 50	常成分量	{總 100 遊 25	—		
米 國	制限なし	原則 遊 350	原則 遊 350	{制限なきを 原則とす	? 200	{制限なきを 原則とす	—	—	—	—
佛 國	—	—	—	—	總 350	—	—	—	—	—
奧 國	—	—	—	—	{結 200 遊 16	—	16	—	—	—
瑞 西	1250	—	—	—	{總 200 遊 20	400	20	—	—	—
カ ナ ダ	2500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
オーストラ リヤ	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デンマーク	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ウルグアイ	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブラジル	—	—	—	—	—	—	總 350	—	—	—

備考 總は總量、遊は遊離亞硫酸量を示す。

本邦に於ては法規により之等防腐剤の使用は嚴禁せらるるところなりと雖も、世界の大勢に順應し許可制を採用せんとするに當り、まづ之が簡單なる試験法の必要に迫られたるを以て、從來の内外文獻に徴し最も適當なりと思考せるものを選び、各種檢體に就き比較研究せり。以下順次其成績を報告すべし。

I. 亞硫酸の定性的試験法の研究

或特種の飲食物に對し一定量の亞硫酸含有を許容せんとする場合、其限界量を超過するや否やに就き、簡單なる豫備的定性試験を施行するを得ば、飲食物の衛生警察的取締上最も便利とするところなるを以て、先づ初めに其定性的試験法を研究せり。而して亞硫酸の定性的鑑識法として行はるるものは、ヨード酸カリウム澱粉紙法、フクシン紙法、赤血鹽鹽化鐵紙法、鉛鹽紙法等あり、是等の試験法中フクシン紙法はフクシン溶液を以て濾紙片を染色し、之を檢體の酸性水溶液上に懸垂し亞硫酸による褪色を以て鑑識する方法にして、之を試験するに、本法はフクシンに依る一定標準の著色紙を得ること難く、又其褪色の程度を鑑識すること困難にして、實用に

堪えざることを知れり。次に赤血鹽鹽化鐵紙法にありては、赤血鹽の 0.1 % 水溶液を以て濾紙片を潤ほし、之に鹽化鐵溶液を以て褐色の斑點を生ぜしめ、之を亞硫酸瓦斯中に懸垂するときは著しく藍變するにあるも、本法は極めて新鮮なる赤血鹽を使用するに非ざれば、既に鹽化鐵溶液との接觸に於て藍變乃至綠變し、普通市販の赤血鹽にては實用に堪えざるの懸念ありて、本法も亦適當ならず、故に専ら其他の二方法に就きて試験せり。

(イ) 鉛糖紙を以て鑑識する方法

本法は亞鉛及び鹽酸を以て亞硫酸を還元し、生成せる硫化水素を鉛糖紙を以て検する方法にして、余等の施行せる試験方法次の如し。

長さ約 18cm, 直径約 2.5cm の試験管に、亞硫酸ソーダ溶液並其他の檢液一定量を取り、水 25ccm 亞鉛約 0.2g 及局方鹽酸 2ccm を加へ、試験管の中央部に綿栓を寬く施し、アムモニア水にて濕せる鉛糖紙を懸垂せる木栓にて試験管を寬く栓塞し、室溫に 30 分間放置し、次に沸騰重湯煎上に 2 分間加溫し、更に 30 分間放冷して鉛糖紙の黑變するや否やを検す。

(ロ) ヨード酸カリウム澱粉紙を以て鑑識する方法

本法は亞硫酸の定性的試験法として、最も廣く應用せらるる方法にして、余等は次の方法に依りて之を施行せり。

内容約 200 又は 100cc のエルレンマイエルコルベンに檢體一定量を容れ、水 50 又は 25cc 及種々の濃度の磷酸適量を加へ、下端を水にて潤せるヨード酸カリウム澱粉紙を懸垂せる木栓にて栓塞し、直に又は一定時間放置後、重湯煎上に 5 分或は 10 分間加溫し、次に之を放冷し、其際試験紙の藍變によつて之を鑑識せり。今之等の試験法に就きて實驗するに檢體の種類及亞硫酸の結合狀態等によりて、其反應の鋭敏度著しく差異を生じ、砂糖、ビール、葡萄酒及乾杏に在りては餘りに鋭敏に過ぎ、ゲラチン及糖蜜も亦微量の供試量に於ては同様にして、供試量多き時は却つて不鋭敏となると雖も、而かも之によりて或一定限界量を定めて其存否の豫測に資すべくもあらず。更に水飴に至りては甚しく不鋭敏に失する嫌あり。故に本法も亦飲食物中亞硫酸の試験に對し或は一定の限界量を設定し、以て之によりて亞硫酸存否の豫試験となすには、到底不適當なりと判定せざるを得ず。

II. 亞硫酸定量法の研究

前上に於ける試験の結果亞硫酸の鑑識法として、最も鋭敏なる硫化水素化生法及ヨード酸カリウム澱粉紙法は、共に亞硫酸の一定限界量設定の下に之が存否を鑑識する豫備試験として不適當なるを認めたるを以て、檢體に就き直ちに定量法を行ひて判定せざるを得ざるに至れり。

亞硫酸の定量法として、從來最も廣く應用せらるるものは、1882 年ハース氏⁹⁾によりて創案せられたる重量法にして、檢體の水性液に炭酸瓦斯を通じつつ亞硫酸を蒸餾し之をヨード液中に導入して硫酸に酸化したる後、鹽酸酸性となし、過剰のヨードを驅逐し、硫酸をクロールバリウムにて沈降せしめ、硫酸バリウムとして定量するにあり。本法は比較的正確なる方法なりと雖も、其實施に長時間を要する爲、多數の檢體の處理に際しては適當ならず、且つ微量の亞硫酸含有の場合には、硫酸バリウムの沈澱を完全に析出せしむるには、甚しく長時間を要し而かも正確なる成績を得難し。

イェルヴィネン氏⁹⁾は此不便を除却せんが爲め、蒸餾コルベン内に於て鹽酸及大理石によりて炭酸瓦斯を發生せしめて蒸餾を行ふときは、キールダール蒸餾架臺或はライヘルトマイスル 數測定用裝置を應用し得べく、斯くして同時に多數の檢體につき試験し得べしと報ぜり。余等は後に述ぶるが如く本試験法に就き反復追試せるも終に良法と認むるを得ざりき。

1904 年獨逸國衛生局試験所に於て、シュミット氏⁹⁾は簡易なる亞硫酸の容量分析法に就きて報告せり。本法は前記重量法に於けると同様の蒸餾裝置に於て、3 個の受器を連結し、第 1 受器には亞硫酸ソーダ溶液にて滴定せる一定の力價を有するヨード溶液を容れ、第 2 及第 3 の受器にはヨードカリウム溶液及び澱粉糊液の混合液を容れて連結し、蒸餾後之等受器中の溶液を合し、酸化に消費せられたるヨード量を滴定し、以て亞硫酸量を算定す。

本法は臨西國飲食物試験書記載の葡萄酒試験法の項に於ては次の如く改良せられたり。即ち蒸餾壺に炭酸瓦斯を通じつつ檢液 50cc を容れ、之に磷酸 15cc を加へて蒸餾す。受器はベリゴー管を用ひ所要量の水及び澱粉糊液を充たし、別にビウレットに 50 分定規ヨード液を用意し、蒸餾し始めてより 0.5cc を滴下し、藍色の消失する間滴下し、以て 1L 中の亞硫酸 (SO_2) の mg 含量を測定す。

前記の諸法は何れもヨードを以て酸化する方法なり。然るに 1920 年フロベゼ氏⁹⁾は過酸化水素を以て酸化し、容量法によりて測定する方法に就き報告せり。本法は内容 750cc の蒸餾コルベンに、長さ 40cm のキールダール蒸餾用管を附し、之にリービッヒ氏冷却器を連結し、更に球管を有する硝子管を附し、其末端を 10 分定規重炭酸ナトリウム液 40cc を容れたるエルレンマイエル壺中に没入せしめ、蒸餾壺中に炭酸瓦斯を通じつつ檢液 400cc を入れ、次に 25 % 磷酸 50cc を以て酸性となし、約 75 分間に於て 200cc を定規重曹溶液中に蒸餾し、之を約 3 分間加熱しつつ 30 % 過酸化水素水にて酸化す。酸化の完了は振盪によつて炭酸及び酸素の氣泡を生ぜざるに到るを以て徴とす。次に之を冷却し、メチールオレンジを標示薬とし、10 分定規鹽酸を以て滴定し、消費せる重曹溶液より亞硫酸量を算出す。余等は本法を追試せしに、30 % 過酸化水素水は之を市場に求め難く普通の 10 % のものにては

酸化不充分にして、満足なる成績を得る能はざりき。

ウィリアムス氏⁹⁾は、前記フロベゼ氏の試験方法を次の如く改善せり。即ち内容 1500cc の圓底コルベンに、2 孔を有するゴム栓を附し、之に直角に曲けたる硝子管 2 個を挿入し、1 は其末端を殆んど壺底に達せしめて炭酸瓦斯の通入に供し、他の 1 は餾出用に供す、即ち之を傾斜せる冷却管に接続し、其下端を直角管に接続せしめ、之を内容 200cc のエルレンマイエル壺の底部に達せしめ、更に之に 2 個のペリゴー管を連結す、各接続部はゴム栓を以て緊密ならしむべし、エルレンマイエル壺中には純粋なる 10 容量%の硫酸を含まざる過酸化水素水 16cc を容れ、第 1 ペリゴー管には 16cc の過酸化水素水、第 2 ペリゴー管には 5cc の過酸化水素水及び 5cc の鹽酸酸性クロールバリウム溶液の混液を容れ、約 1 時間蒸餾の後、エルレンマイエル壺及び第 1 ペリゴー管中の溶液を合し、よく水洗し、之をメチールオレンジ又はブロームフェノールブラウを標示薬として 10 分定規ナトロン液にて滴定す。尚ほ本法の實施法に關しては後に之を詳述すべし。

其他シュマッヘル及フェテル兩氏¹⁰⁾は、蒸餾せる亞硫酸をヨード酸カリウムの定規溶液を以て滴定する方法を案出せり。尚ほ獨逸及瑞西等に於ては白葡萄酒中亞硫酸の試験に對し、重量法と共にヨード定規液を以てする直接滴定法を採用せり。

余等は前記諸種の亞硫酸定量法を比較研究し、之を改善し以て比較的短時間内に於て施行し得べく且つ簡易にして正確なる試験法の案出に努力せり。次に其成績を敘述すべし。

(甲) ヨード溶液を以て酸化する定量法の研究

(1) イェルヴィネン氏亞硫酸定量法

イェルヴィネン氏はパイチーン及びボーリッシュ兩氏¹¹⁾の亞硫酸定量法を改良し次の如き方法を提稱せり。即ち内容 500cc のコルベンに切截せる果實 25g を容れ、水 30cc 大理石小片 5g 及び濃鹽酸 25cc を加へ、次に之を垂直に立てたる冷却器に連結し、受器には内容 250cc のエルレンマイエルコルベンを用ひ、之に水 25cc 及 10 分定規ヨード液 25cc を容る。斯くして蒸餾コルベン中炭酸の發生止み大理石殆んど全部消費せられたる後(約 1 時間後)、小火焰を以て徐々に熱し、2—3 時間にして蒸餾コルベンの内容約 100cc を残留するに至り、餾液を取り常法に従ひ過剰のヨードを驅逐し、溶液を濃縮して化生せる硫酸を、鹽化バリウムを以て沈降せしめて定量す。

余等は大理石中に夾雜する硫化物の影響を慮り、大理石に代ふるに日本藥局方沈降炭酸カルチウムを以てせる外、全く上記方法に従ひ精製糖蜜に就きて試験し、之を次の重量法と比較せり。即ち内容約 750cc のコルベンに檢體 25g を取り、之に水を 150cc 濃磷酸 5g を加へ、炭酸瓦斯を通じつつ蒸餾し、10 分定規ヨード液 50cc

を容れたるペリゴー管中に餾取し、蒸餾コルベンの内容約 3 分の 1 となるに至りて蒸餾を止め、餾液は常法に従ひ過剰のヨードを驅逐し、濃縮して鹽化バリウム液を加へ、化生せる硫酸バリウムを定量するに、兩者の成績は略々一致するを以て、本法は果實等の如き完全分解の困難なる檢體の場合に適用して可なるが如きも、蒸餾開始後は炭酸の發生なく、且つ小火焰を以て加熱する爲め、蒸餾コルベン内の減壓と共に受器中のヨード液は冷却器中に逆流し來り、屢々蒸餾コルベン中に至らんとする傾向あるを以て、余等は受器としてペリゴー管を代用せるも、然るときは蒸餾コルベン中に空氣逆流する傾向あり、更に蒸餾コルベン中に炭酸カルシウム及鹽酸を追加する方法をも考案せるも、共に完全なる能はず、殊に蒸餾コルベンに炭酸瓦斯を通じて亞硫酸を驅逐すること無きが故に、2—3 時間の長時間を要する事等を考慮するときは、イェルヴィネン氏法は安全至便なりとは稱し難きが如し。

(2) 蒸餾滴定法

瑞西國飲食物試験法記載の方法に準據し次の如く施行せり。即ち内容約 750cc の圓底硝子壺を取り、之に 2 孔を有する栓を施し、其 1 孔には殆んど壺底に達する硝子管(甲)、他の 1 孔には壺頸に終る硝子管(乙)を挿入し、乙管をリービッヒ冷却器に連結し、冷却器には有孔栓及受接管(下端の内徑約 5mm を有するもの)により球附 U 字管(兩側の球約 200cc 底部の球約 50cc の内容を有するペリゴー管)を附し、甲管より炭酸瓦斯を通じて装置内の空氣を全く驅除したる後、ペリゴー管に澱粉糊液 10cc を容れ、ヨードカリウム 1g を添加し、一旦煮沸したる水を以て約 50cc となし、ビュレットより 50 分定規ヨード液 3 滴を加へたる後、炭酸瓦斯を通じつつ僅かに開栓し、檢體 25g を容れ、一旦煮沸したる水 200cc を以て之を洗入し、磷酸 5g を加へ再び栓塞し、絶えず炭酸瓦斯を通じつつ蒸餾し、ペリゴー管中の溶液脱色せんとするときは、ビュレットより 50 分規定ヨード液を滴加し、絶えず淡藍色を呈せしめ、茲に消費したる 50 分定規ヨード液の cc 數より、檢體 1kg 又は 1L 中亞硫酸の總量を算定す。50 分定規ヨード液 1cc は無水亞硫酸 0.64mg に相當す。

(3) 蒸餾滴定液重量法

前記蒸餾滴定法を施行せるペリゴー管中の溶液を取り、鹽酸々性となし、蒸發して過剰のヨードを驅除したる後、化生せる硫酸を常法に従ひ鹽化バリウムを以て沈澱せしめ、硫酸バリウムを定量し、之より亞硫酸を算定す。

(4) 重量法

蒸餾、秤量等の諸操作は前項と全く同一なり。但しペリゴー管中にはヨード溶液 50cc を充たす。

ヨード溶液は純ヨード 5g 及ヨードカリウム 7.5g を水に溶解して 1L となし
て製す。

(5) 直接滴定法

檢體の水性液を直接澱粉粥液を標示薬とし 50 分定規ヨード液を以て滴定し其
消費量より前項の如く亞硫酸を算定す。

上記 4 種の試験法を基礎とし、各種檢體に就き之を試験し、其優劣を比較對照せ
り。

(6) 蒸餾滴定法に關する緊要事項に就て

本法は蒸餾法によりて檢體中より亞硫酸を分離し、澱粉粥液を標示薬とし、50 分
定規ヨード液を以て滴定するものなるが故に、先づ第 1 には檢體中より完全に亞硫
酸の分離を行ふこと。次には呈色を最も鋭敏明瞭ならしむることを要す。就中最
も重要なるは亞硫酸の完全なる餾出にして、亞硫酸は檢體中種々なる物質との結合
の狀況によりて餾出に難易あり。故に此點に關し種々實驗を重ね最も適當なる餾
出法を驗知し、又滴定數に障礙を附與する原因を探究し之を除外せり。次に之等試
驗成績に就き述ぶべし。

(イ) 炭酸瓦斯の精製に就て

亞硫酸は空氣との接觸酸化によりて容易に硫酸に變化するを以て、蒸餾操作中は
絶えず炭酸瓦斯を通じて蒸餾コルベン中の酸化作用を防止せざるべからず。従つ
て多量の炭酸瓦斯の通入を必要とするを以て、若し該瓦斯中に硫黄化合物を含有す
るときは檢出亞硫酸量を増大すべきは勿論なり。

此の點に關し種々試験の結果を炭酸瓦斯はカメレオン溶液又は硫酸銅溶液を以
て洗滌精製するを要することを證明し得たり。

(ロ) 蒸餾装置中空氣混入による影響及び炭酸瓦斯の 通入速度に就て

蒸餾コルベン中に空氣を混入すれば、加熱により亞硫酸は容易に酸化されて硫酸
となり、コルベン中に留るべきを以て當然檢出せらるる亞硫酸量は低下すべきな
り。此影響を検せんとして精製糖蜜に就きて種々實驗の結果蒸餾コルベン中の空
氣は之を絶対に排除したる後加熱を開始すべく、蒸餾中は餘りに急激なる炭酸瓦斯
の速度は之を避くべきことを認めたり。

(ハ) 稀釋水量、蒸餾時間竝に其速度に就て

水に易溶性の檢體にありては、亞硫酸の分解餾出容易にして、比較的蒸餾の初期

に於て蒸餾せらると雖も, 乾杏の如き水に難溶性の檢體にありては, 其餾出徐々にして比較的長時間連續す. 而して其餾出亞硫酸の總量は, 勿論稀釋水量及蒸餾速度によりて異なるべし. 從來一般に施行せられたる試験法に於ては, 是等の點に關し極めて寛大にして, 蒸餾殘渣原容積の2分の1又は3分の1となるに及び蒸餾を中止すべし等の規定によるときは, 檢體の種類によりては檢出亞硫酸總量に著るしき差異を來すべし. 此の點に就き正確ならしむべきを必要を感じたるを以て, 次の試験を施行せり.

乾杏 25g を取り前記蒸餾滴定法に従ひて試験を行ひ, 混加水量, 蒸餾速度及時間の檢出亞硫酸量に及ぼす影響に就き試験せり. 其成績次の如し.

第 1 表

試験 番號	混加 水量	蒸餾速度 (滴)	檢 出 せ る 亞 硫 酸(SO_2) 量 (mg/kg)									滴定 液重 量法
			10分	20分	30分	40分	50分	60分	70分	80分	90分	
1	100	18—20	307	379	389	402	412	422	—	—	—	423
2	100	20	289	361	387	402	415	422	—	—	—	—
3	100	22—24	320	379	399	415	428	438	—	—	—	—
4	150	18—20	307	369	397	410	425	438	443	445	448	457
5	150	40—50	320	376	399	410	422	435	—	—	—	442
6	200	50—60	282	358	387	399	415	425	440	—	—	459
7	200	50—60	353	381	410	428	440	448	458	—	—	—
8	200	50—60	333	387	410	412	420	435	456	—	—	—
9	200	70	283	369	389	404	417	428	433	—	—	—
10	300	70	351	392	404	417	425	435	443	451	456	448
11	300	70—90	343	387	410	420	430	449	451	461	—	—
12	300	80—90	335	384	407	420	433	443	451	461	—	—
13	300	70	330	374	384	404	417	428	438	445	456	—

備考 蒸餾速度は1分間に於ける滴數を示す

前表に示すが如く固形の檢體にありては, 之を細割して可及的均等ならしめたりと雖も, 液體に於けるが如くなる能はず. 同一條件に於て施行せる試験に於ても同一の成績を得ること困難にして, 概して蒸餾1時間を以て大部分の亞硫酸は蒸餾し得られたるものと認め得べきも, 微量の亞硫酸は尙ほ數時間の蒸餾によりて持續するものなることは次の實驗によりて明かなり.

乾杏 25g を取り最初に水 150cc を加へ, カリ分解(後文参照)を行ひたるものに就き, 常法に従ひ蒸餾液重量法を施行し, 前餾1時間毎に加熱を中止し, 蒸餾コルベンの稍々冷却するに至りて受器を交換し, 蒸餾コルベンには更に炭酸瓦斯を通じつつ速に水 150cc を加へ蒸餾を繼續し, 毎餾液に就きて検するに次の如し.

第 2 表
検 出 せ る 亞 硫 酸 (SO_2) 量 (mg/kg)

第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回
44.9	35	15.3	16.4

前記の如く 4 時間に互る蒸餾に於ても、尙ほ且つ微量の亞硫酸の餾出は免れざるものなるが故に、乾杏中の亞硫酸の絶対量を検出することは困難なるべきも、最も適當なる稀釋水量即ち 200cc の水を加へ、1 分間 50-60 滴の蒸餾速度に於て、蒸餾し始めてより 1 時間の蒸餾をを以て満足せざるべからざるものと思ふ。而して亞硫酸の餾出量は蒸餾速度に關係するものなるを以て、一定の蒸餾速度を保ち一定時間蒸餾する方法は、從來の蒸餾残渣の目測に依つて蒸餾を中止する方法に比して遙かに正確なるべく、餾出最も困難なる乾杏の蒸餾時間を以て基礎とするときは、其他の檢體に於ては何等の支障なかるべし。蒸餾時間に對する規定は最近の文獻に徴するに、フロベゼ氏は 75 分を以てしウィリアムス氏は 1 時間、但し乾果類にありては少しく延長するを要すと定めらる。而して之等は加熱直後よりの時間を示せるものなるが故に、余第の蒸餾液滴下し始めてより 1 時間の規定に略準すべきものと思ふべし。

(ニ) 蒸餾水のヨード定規液消費に就て

蒸餾水中に稀薄ヨード定規液を滴下するときは、亞硫酸の存在せざる場合に於ても、之を消費するものなることは、既にトレドウェル氏によりて實驗せられたる所にして、同氏は蒸餾水中に 豫め 1g のヨードカリウムを添加するときは、其消費量を著るしく少からしめ得たり依て余等は 50 分定規ヨード液を以て試験せしに、ヨードカリウム 1g を加ふるときは、全く此障礙を除去し得るものなることを知り得たり、故に其實施に當りては、豫めペリゴー管中に澱粉糊液と共に 1g のヨードカリウムを添加するを可とす。但し酒精含有檢體にありては蒸餾液は澱粉糊液を藍色より紫色に變ぜしむるも、其觀測上何等の支障を來すことなし。

(ホ) 檢體のアルカリ處理に就て

乾杏類中の亞硫酸は其餾出比較的困難なるを以て、豫め之をアルカリ濾液にて處理し亞硫酸をアルカリ鹽となしたる後、磷酸を加へて之を分解するときは、其餾出を比較的良好ならしめ得べし。即ち次の如し。

(a) アルカリ處理を行へるもの

乾杏 25g を取り水 200cc を加へ、次に 6% カリ濾液 30cc を加へ、細刻して可及的糜爛狀となし、30 分間放置の後蒸餾壺に容れ炭酸瓦斯を通じつつ磷酸 8g を

添加し、蒸餾速度 1 分間 50-60 滴に於て 1 時間蒸餾し、前述の方法に従ひ滴定し、次いで其滴定液に就き重量法によりて定量し、別に前記の如くアルカリ処理法を行ひたるものを重量法によりて定量せるものと比較せり。

第 3 表

試験 番號	検 出 せ る 亜 硫 酸 (SO_2) 量(mg/kg)						滴定液 重量法	重量法
	10 分	20 分	30 分	40 分	50 分	60 分		
1	{ 甲 16.9 乙 432	甲 18.8 乙 481	甲 19.6 乙 502	甲 20.0 乙 512	甲 20.2 乙 517	甲 20.4 乙 522	513	512
2	{ 甲 15.6 乙 399	甲 18.0 乙 460	甲 19.1 乙 489	甲 19.6 乙 502	甲 20.0 乙 512	甲 20.2 乙 517	514	520

備考 表中甲は 50 分定規ヨード液の消費 cc 数、乙は無水亜硫酸の mg 量なり以下之に準ず

(b) アルカリ処理を行はざるもの

乾杏 25g に水 200cc 燐酸 5g を加へ、前記蒸餾滴定法に依りて之を定量せり。

第 4 表

試 験 番 號	検 出 せ る 亜 硫 酸 (SO_2) 量 (mg/kg)						滴 定 液 重 量 法
	10 分	20 分	30 分	40 分	50 分	60 分	
1	{ 甲 12.0 乙 307	甲 16.2 乙 415	甲 17.5 乙 448	甲 18.4 乙 471	甲 18.9 乙 484	甲 19.2 乙 491	490
2	{ 甲 13.0 乙 333	甲 17.5 乙 448	甲 18.0 乙 464	甲 18.6 乙 476	甲 18.7 乙 479	甲 19.0 乙 486	489

前記の試験成績は何れも米國産乾杏を試料とし、可及的均等となし、同一状態に於て施行せるものにして、アルカリ分解を行ひたるものと然らざるものとを比較す

第 5 表

検 體	處 理 法	試 験 方 法	檢體 1 kg 中亜硫酸 (SO_2) の m. 量		
			第 1 回	第 2 回	平 均
ゲラチン	アルカリ処理せず	重 量 法	559	550	559
同	同	蒸 餾 滴 定 法	566	571	569
同	同	滴 定 液 重 量 法	562	560	561
同	アルカリ処理す	蒸 餾 滴 定 法	535	547	541
赤 糖 蜜	アルカリ処理せず	重 量 法	251	261	256
同	同	蒸 餾 滴 定 法	265	280	283
同	同	滴 定 液 重 量 法	278	252	265
同	アルカリ処理す	蒸 餾 滴 定 法	247	250	249
同	同	滴 定 液 重 量 法	216	215	216

るに、後者は検出亞硫酸量少なし。故に乾果類にありてはアルカリ処理法を行ふべきものとす。乾果類以外の水に可溶性檢體にありては、アルカリ処理法を行へるものは、行はざるものに比して却つて其數値を減少す。蓋し其理由は水に可溶性檢體をアルカリにて處理し蒸餾法を行ふときは、其分解作用急激に過ぎ、爲に微量の亞硫酸逃散するに因るに非ずやを思はしむ。次にゲラチン及び赤糖蜜を以て施行せる成績を示すべし。

(へ) 分解酸類に就て

從來飲食物に含有せらるる亞硫酸化合物の分解に使用せらるる酸類は、鹽酸及磷酸なり。余等も亦此兩種に就きて蒸餾滴定法を以て其適否を検したり。

(1) 鹽 酸

乾杏に就き 30 %鹽酸 16cc (6 %カリ滷液 30cc の中和に要する約 4cc を控除せば、實際杏果に作用するものは約 12cc なり) を以て試験し、之を對應する磷酸 (25 % 25cc) と比較せしに鹽酸の場合は磷酸の夫れに比し稍々高き數値を示せり。然れども前者にありては加熱後短時間にして、蒸餾 コルベンの内容物黒變し、著しく炭化せるを認めたり、依て鹽酸量を半減し、杏果に作用する鹽酸量を 4cc として試験せしに、亞硫酸檢出量稍々減ぜるに反し、黒變の度依然として著しく、更に 5cc (杏果に作用する實際の鹽酸量約 1cc) を以てせるも、25 %磷酸 25cc を使用せるものに比し、乾杏の色稍々悪しく、亞硫酸檢出量稍々低し。即ち鹽酸は磷酸に比し炭化を促進すること強く、可及的炭化を避くべきヨード液滴定法には適當ならざるが如し。

(2) 磷 酸

25 %磷酸 15cc 25cc 35cc 及 50cc の各量を以て乾杏に就きて試験せり。而して磷酸は 3 鹽基性酸にして其鹽類の中性を呈する點不明なるを以て、6 %カリ滷液 30cc を中和して酸性を呈するに至る量を檢するに、25 %磷酸約 12cc を要したり。故に 6 %カリ滷液 30cc を含む檢體を中和したる過剰の磷酸及び其水素 1 箇をカリウムと交換したる酸性磷酸カリ (此のものも亞硫酸鹽を分解す) の混合物の量は上記各磷酸より 12cc を除したる 3cc 13cc 23cc 及 38cc なりとす。亞硫酸の檢出量及其餾出狀況を檢せるに磷酸 50cc を加へたる場合は稍炭化を來たし過量なりしも、其他は杏果の色調に殆ど變化なく、而して 25 及 35cc の場合は檢出量餾出狀況殆んど等しく、15cc を用ひたるものは成績稍々劣れるを認む。依て更に糖蜜に就き之を檢するに、乾杏に比し各場合の差異少なりと雖も、磷酸 5 及 10cc の場合は餾出狀況及檢出量共に稍々劣り、50cc の場合は炭化を來せるを以て磷酸過量と言ふべく、15cc 25cc 及 35cc 量に於ては餾出狀況及檢出量殆んど相等し即ち乾杏に於ては 25cc 及 35cc 糖蜜に於ては 15cc 25cc 及 35cc の各場合餾出狀況、檢出

總量共に何れも大差なく, 50cc (乾杏にありては作用量 38cc) に至れば少々炭化を來すが故に, 可及的炭化を避くるを要するヨード液滴定法にありては, 35cc よりも寧ろ 25cc を以て適當とすべし. 而して乾杏の場合にありては, 糖蜜及其他の水に可溶性なる檢體に比し, 炭化を來し易きが故に, 比較的燐酸の少量なるを可とすべく, 添加せるカリ滲液に關せず, 總ての場合を通じて 25% 燐酸 25cc を使用するを以て, 最も安全且つ適當なるものと思ふ.

(ト) 酒精性飲料の蒸餾滴定に就て

酒精性飲料中亜硫酸を含有するものは, 葡萄酒及麥酒にして, 前者は主として容器の燻蒸により, 後者は亜硫酸にて處理せるホップの使用に起因するものとす. 之等に就き次の試験を施行せり.

(1) 葡萄酒

衛生試験所封緘の赤葡萄酒に適當のプランキットを加へ, 均等なる試料を調製し, 次の試験を行へり.

(a) 檢體を水にて稀釋せざるもの

檢體 100cc を取り燐酸 5g を加へ, 徐々に注意して蒸餾するに, 約 1 時間に於て殘渣約 20cc となり, 炭化の虞あるを以て, 加熱を中止せり, 斯くして餾出亜硫酸を前記の如くして, 50 分定規ヨード液を以て滴定し, 該滴定液より更に燐酸バリウムとして定量し, 別に前記の如く約 1 時間蒸餾せるものを重量法に依りて定量せるものと比較せり. 次に此等試験成績を總括して比較對照すれば次の如し.

第 6 表

檢 體 處 理 法	試 驗 回 數	檢體量 (cc)	檢出せる亞硫酸(SO_2)量(mg/kg)		
			蒸餾滴定法	滴定液重量法	重 量 法
檢體を水にて稀釋せざるもの	1	100	239	222	240
	2	同	254	217	239
	平 均		247	220	240
檢體を水にて稀釋せるもの	1	25	241	226	247
	2	同	238	244	238
	平 均		240	235	243

前表に示すが如く, 水にて稀釋せる場合と然らざるものとは, 其數値は殆んどよく一致するも, 蒸餾滴定法に於て水にて稀釋せるものは, 蒸餾容易にして且つ反應の終末比較的鮮明なり. 次に從來の試験法による蒸餾法, 即ち炭酸瓦斯を通じつつ注意して熱し, 蒸餾して半容となすべしの方法に従へるものと, 可及的少量に到る迄蒸餾せるものとの兩成績を比較するに, 前者は亜硫酸の餾出不完全なるを思は

しむべしと雖も、葡萄酒の如き檢體にありては、之を稀釋することなくして半容以上の蒸餾を繼續するときは、残渣濃稠エキスを呈し、泡起して往々蒸餾困難に陥るか又は器壁に附着せる部分に於て炭化の虞あり、斯る檢體に於ては豫め水を以て5倍乃至10倍に稀釋しタンニン液1刀尖を附加するときは、容易に之等の支障を除去し得べし。

(2) 麥 酒

檢液 200cc を取り之にタンニン酸1刀尖及び燐酸 5g を加へ、常法に従ひ蒸餾滴定す其試験成績次の如し。

第 7 表

檢 體	50 分定規ヨード液消費量 (cc)						檢出亜硫酸(SO ₂)量(mg/kg)	
	10分	20分	30分	40分	50分	60分	蒸餾滴定法	滴定液重量法
キリンビール	4.1	4.8	4.9	5.0	5.0	5.0	16.0	17.1
同	4.1	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	15.6	14.4
エビスビール	2.3	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	9.0	10.3
同	2.3	2.4	2.6	2.6	2.7	2.8	8.8	13.4
サッポロ黒ビール	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	5.12	2.4
同	0.7	0.8	1.0	1.2	1.3	1.5	4.8	3.8

前記檢體中キリンビール並にエビスビールの2種に就き、前法と同一蒸餾法により處理してヨード溶液中に蒸餾し、重量法によりて之を定量せり。其成績次の如し。

第 8 表

檢 體	檢 出 せ る 亜 硫 酸 (SO ₂) 量 (mg/kg)		
	第 1 回	第 2 回	平 均
キリンビール	14.1	11.4	13.3
エビスビール	9.3	15.8	12.5

前記試験成績に示すが如く、ビールの如き酒精含量少く又エキス分も比較的少ないものにありては、檢體 200cc を以て蒸餾するも特に困難を來すことなく、終末反應も鮮明に識別し得べし。

(チ) 揮發性物質の影響に就て

檢體中に亜硫酸と共に揮發性物質を含有するときは、其の酸化作用の妨害せらるるものなることは、既にウィリアム氏等によりて報告せられたる所にして、此事實に關し余等は揮發性物質としてアセトアルデヒドを用ひ、赤砂糖、水飴等に就き 1kg 中 1000mg 又は 100mg の割合にアセトアルデヒドを混じ、常法に従ひ蒸餾滴定

法に依り定量し、次の成績を得たり、

第 9 表

検 体	検出せる亜硫酸 (SO ₂) 量 (mg/kg)		
	第 1 回	第 2 回	平 均
水 飴(亜硫酸を含有せるもの)	59.3	58.0	58.7
同 (検體 1kg 中 1000mg のアセトアルデヒドを含有せしむ)	27.0	28.5	28.0
同 (検體 1kg 中 100mg のアセトアルデヒドを含有せしむ)	52.9	52.8	52.9
同 (亜硫酸を添加せるもの)	450.9	444.6	447.8
同 (検體 1kg 中 1000mg のアセトアルデヒドを含有せしむ)	299.3	317.0	308.2
同 (検體 1kg 中 100mg のアセトアルデヒドを含有せしむ)	443.8	413.0	428.4
赤砂糖(亜硫酸を含有せるもの)	116.1	116.2	116.2
同 (検體 1kg 中 1000mg のアセトアルデヒドを含有せしむ)	114.7	114.7	114.7

前記試験成績を看るに、水飴中亜硫酸の含量比較的小なきものにありては、検體 1kg 中 1000mg のアセトアルデヒドを含有せしめたるものに於ては、検出亜硫酸量はもとの約 2 分の 1 に減少すれ共、検體 1kg 中 100mg を加へたるものに於ては、其影響極めて僅かなり、又亜硫酸の含量比較的大なるものにありては、小なきものに比して其影響少し、次に赤砂糖に於ては殆んど硫酸の影響を認め得ざりき。斯の如く検體 1kg 中アセトアルデヒド 1000mg の存在に於ては、此影響極めて僅少にして、可検食品中アセトアルデヒド等の揮發性物質は其最大なる場合に於ても、検體 1kg 中 100mg を超過すること稀なるべきを以て、本試験法に於ては其實施に當り揮發性物質の影響は顧慮するに足らざるべし。

食品中芥子、葱類等の如く天然に揮發性硫黄化合物を含有するものは、前記蒸餾操作によりて之等の物質を餾出すべく、從つて亜硫酸の試験上之が影響を驗知する必要があるを以て、余等は次の數種検體即ち亜硫酸を全く含有せざる調製品又は其製造上亜硫酸を使用せずと認めたるものに就き、前上の蒸餾滴定法によりて 50 分定規ヨード液の消費量を検定せり。

供 試 材 料

1. 葡 萄 汁 葡萄果に等量の酒精を混じ搗碎壓搾せる汁液
2. ネーブル果汁 ネーブル果を搗碎壓搾せる汁液
3. 林 檎 果 汁 同上調製
4. 乾 柿 市 販 品
5. 日本産乾杏 同 上

第 10 表

検 體	検 體 量	50分定規ヨード液消費量	検體 1kg 中亜硫酸(SO_2)の mg 量
1. 葡 萄 汁	100ccm	0.45ccm	2.8
2. ネーブル果汁	100ccm	0.7 ccm	4.4
3. 林 檎 果 汁	100ccm	0.45c m	2.8
4. 乾 柿	25g	0.2 ccm	5.1
5. 日本産乾杏	25g	0.25ccm	6.4

前表の如く果實製品等の芳香性揮発成分を含有せる食品は、何れも 50 分定規ヨード液を消費するも、其量は検體 1 kg 中 10 mg に充たざるべきを信ず。

(リ) 澱粉糊液に就て

ヨード液を以て滴定するに當り必要な澱粉糊液は、トレッドウェレ氏に従へば其製法極めて嚴格にして複雑なるも、余等の實驗に徴するに、後に述ぶるが如き簡單なる方法により製したるものを以て、充分其用に堪へ得べきを認めたり。

(7) 直接滴定法に關する緊要事項に就て

白葡萄酒、水飴、糖蜜の如き淡色の液狀物質竝に砂糖類の如き 其水溶液淡色にして、ヨードと急速に化合する有機性物質を含有すること僅微なる檢體に在りては、直接滴定法を應用するときは極めて簡便に定量し得べしと雖も、其水溶液の稠度等によりて反應の終末點明瞭ならざることあり、此點に關し先づ適當なる稀釋法に就き試験せり。

(イ) 稀釋法に就て

水飴(重量法に依る亜硫酸含量平均 597mg を含有せるもの) 10g を取り、之に直接或は水にて稀釋せる後、6% カリ鹼液 30cc を加へ、30 分間放置せる後、澱粉糊液 2cc 及び 25% 硫酸 10cc を加へ、可及的速に 50 分定規ヨード溶液を以て滴定し其成績を比較するに稀釋水を使用せず。直接アルカリ鹼液に溶解して滴定せるものは其反應の終末點は比較的明瞭なるも水 20cc を以て稀釋したる後、アルカリ分解を行ひ酸性となし滴定せるものは終末反應明瞭にして 其數値は重量法に依り得たるものに比して少しく大なり。前記の方法と同じく、ただ水の添加量を 50cc とせるものは其數値稍々低下し又豫めアルカリにて直接分解せしめたる後、水 100cc にて稀釋せるものはアルカリ濃度の影響比較的少く稀釋水を使用せず直接アルカリ鹼液に溶解し滴定せるものに比して稍々高き數値を示せるは、稀釋水量の多きため過剰の定規液消費せられたるものと思ふべく、豫め檢體を 50cc の水にて稀釋せるものの一般に 稍々低き數値を示せるは、アルカリの濃度を豫め、其分

解力の衰へたるに歸因すべし、斯くして諸種稀釋法中 20cc の水にて稀釋する方法は最も適當なりと雖も、尙一般に蒸餾滴定法及び重量法に依つて得たる成績に比して稍々高き數値を示せり。

(ロ) カリ鹼液の濃度に依る影響に就て

前項稀釋法中に述べたるが如く、其試験成績は稀釋水量と、苛性カリ溶液の添加量との關係、即ちアルカリの強度に依りて影響せられ前記試験に於ては檢體 10g に對して稀釋水量 20ccm, 30 分時間放置を以て最も適當と認めたり。更に本項に於ては亞硫酸含有白糖蜜(重量法により平均 372mg 含有品)に就き、アルカリ濃度による影響を試験せるに、次の成績を得たり。

第 11 表

試験 番號	稀釋水量 (cc)	アルカリ 濃 度	カリ 鹼 液 添加量 (cc)	25% 硫 酸 添加量 (cc)	50分定規ヨード 液消費量 (cc)	檢體 1kg 中 亞硫酸の mg 量
1	100	6%	30	10	6.4	411
2	"	"	"	"	6.3	403
3	"	"	"	"	6.5	416
4	"	"	"	"	5.6	357
5	"	"	"	"	5.7	366
6	"	"	"	"	5.7	366
7	"	10%	20	"	6.3	403
8	"	"	"	"	6.1	392
9	"	"	"	"	6.5	416
10	"	20%	10	"	6.1	392
11	"	"	"	"	6.9	444
12	"	"	"	"	5.3	342
13	20	6%	30	"	6.2	396
14	"	"	"	"	6.2	396
15	"	"	"	"	6.2	396
16	50	"	"	"	6.1	392
17	"	"	"	"	6.2	396
18	"	"	"	"	6.1	392

前記試験に於ては檢體秤取量は何れも 10g にして、カリ鹼液との接觸時間は之を 30 分となし、各種檢體中アルカリの絶對量を同一ならしめ、その濃度を種々變化せるものなり。即ち其 1—3 は 6% カリ鹼液 30cc を加へて 30 分後に水にて 100cc に稀釋せるもの、其 4—6 は同じく水 100cc にて稀釋せる後、6% カリ鹼液 30cc を加へて 30 分間放置せるものにして、前者の檢體 1kg 中の亞硫酸含量平均 410mg なるに對し、後者は 363mg にして著しく低下せり、即ちアルカリ鹼液の濃度の亞硫酸檢出數値に著るしく影響するものなることを知り得べし。尙ほ其 7—9 は 10%

カリ滷液 20cc 添加 30 分後水 100cc にて稀釋せるもの,其 10—12 は 20% カリ滷液 10cc 添加 30 分後水 100cc にて稀釋せるものにして,何れも其カリの絶對量に於ては前記 6% カリ滷液の場合と同一にして,其濃度を異にせるのみなるも,前表に於けるが如く,アルカリ濃度の上昇につれて,其數値に著るしき差違を生ずることを認めたり。

斯くして 6% カリ滷液を以て處理することの,最も適當なることを知り得たるを以て,其 13—15 に於ては檢體を 20cc の水に溶解し,6% カリ滷液 30cc を加へ,又其 16—18 にては檢體を 50cc の水に溶解し,6% カリ滷液 30cc を加へて試験したるに,兩者殆んど相等しき成績を示せり。故に前項稀釋法に於けるが如く,稀釋水 20cc を加へ,6% カリ滷液 30cc を以て處理するを最も適當と認めたり。

(ハ) カリ滷液の分解時間に依る影響に就て

前記試験により滷液の濃度及び稀釋水量等に就き,其最も適當なる方法を知り得たりと雖も,更にカリ滷液との接觸時間に就き研究すべき必要を認めたるを以て,次の試験を施行せり。即ち檢體 10g を水 20cc に溶解し,6% カリ滷液 30cc を加へ,種々異りたる時間放置せる後 25% 硫酸 10cc を加へ,50 分定規ヨード液にて滴定す。前記と同一種の糖蜜を以て試験し各種の分解時間に依る亞硫酸の檢出量を比較するに,5 分より 30 分に到るに従ひ順次其數値を増大し,それより時間の延長に伴ひて却つて其數値を減少す。故にアルカリを以てする分解時間は 30 分を以て最も適當なるを認めたり。

(ニ) グラチン及びビール中亞硫酸の直接滴定に就て

グラチンの如く水に溶解して強き粘稠性を有する物質にありては,之を直接滴定し得ざることは既に文獻に示すところなるも,之を適當に稀釋するときは或は満足すべき成績を得べきやを思考せしめたるを以て次の試験を施行せり。

グラチン 5—25g を取り,之に種々の割合に水を加へ,微溫を與へて之を溶解し,冷後 6% カリ滷液 30cc を添加し,30 分放置し,25% 硫酸 10cc を加へて酸性となし,常法の如く 50 分定規ヨード液にて滴定せるにグラチンは其稀釋に多量の水を用ふるにも係はらず,反應の終末點不明瞭にして亞硫酸の許容限界點の認定困難なり。故に本品は直接滴定法に依りては定量し能はざるものとす。

其他ビールにありては,蒸餾滴定法又は重量法に依りて得たる數値に比し,約 10 倍量に相當するが如き極めて多量の 50 分定規ヨード液を消費す。この現象は亞硫酸以外の還元性有機物質の存在に歸因するものなるが故に,ビールも亦直接滴定法に依りて,之を定量すること不可能なり。

(8) 蒸餾及び直接滴定試験法案 附 試験成績

前段數項に分ち蒸餾竝に直接滴定の兩者に就きて比較研究の結果、次の如き試験法を案出せり。

(イ) 蒸餾滴定試験法 附 滴定重量法

内容約 750cc の圓底硝子壺を取り、之に 2 孔を有する栓を施し、其 1 孔には殆んど壺底に達する硝子管(甲)、他の 1 孔には壺頸に終る硝子管(乙)を挿入し、乙管をリービッヒ氏冷却器に連結し、冷却器には有孔栓及受接管(下端の内徑約 5mm を有するもの)により球附 U 字管(兩側の球約 200cc、底部の球約 50cc の内容を有するペリゴー管)を附し、甲管よりカメレオン溶液竝に水にて洗滌せる炭酸瓦斯を通じて装置内の空氣を全く驅除したる後、ペリゴー管に澱粉糊液 10cc を容れ、ヨードカリウム 1g を添加し、一旦煮沸したる水を以て約 50cc となし、ビウレットより 50 分定規沃度液 3 滴を加へたる後、炭酸瓦斯を通じつつ緩かに開栓し、檢體 25g (液狀の檢體にありては 25cc) を容れ、一旦煮沸して水 180cc を以て洗入し、タンニン酸 0.2g 及び 25% 磷酸 25cc を加へ、再び栓塞し絶へず炭酸瓦斯を通じつつ 15 分間經過したる後、注意して加熱し、1 分時間 40—50 滴の餾出速度に於て蒸餾し、ペリゴー管中の溶液脱色せんとするときは更にビウレットより ヨード液を滴加し、絶へず淡藍色を呈せしめ、蒸餾液餾出し始めてより正確に 1 時間蒸餾の後、茲に消費したる 50 分定規ヨード液の cc 數(ヨード液 1 滴によるヨード澱粉の藍色 1 分時間以上を持続するを要す)より、檢體 1kg 中の亞硫酸 (SO_2) 總量を算定す、(50 分定規ヨード液 1cc は亞硫酸 (SO_2) 0.64mg に相當す)。

前記可檢液を更に重量法によりて定量せんとするときは、ペリゴー管中の溶液を内容約 500cc のベツヘル硝子に移し、ペリゴー管は水を以て善く洗滌し、少量の鹽酸を加へ蒸發して約 150cc とし、必要あらば之を濾過し、濾紙は善く洗滌し、液量多きときは再蒸發して約 150cc となし、加熱し沸騰するに到り、之に熱クロールバリウム溶液を注加し、沈澱の生ぜざるに至りて放置し、其上澄液にクロールバリウム溶液 1 滴を加へて全く硫酸の沈澱せしや否やを檢し、尙 1 回煮沸し温處に 6 時間放置し、其上澄液を灰分既知の小濾紙上に注ぎ、ベツヘルガラスの沈澱には數回熱湯を以て洗滌し、其濾液硝酸銀溶液に由つて濁濁せざるに至れば沈澱を濾紙と共に乾燥し、豫め秤量せる白金坩堝内に於て灰化熾灼し其殘留物を少量の硫酸を以て濡し、次に遊離硫酸を蒸發したる後、微に熾灼し除濕器内に放冷して秤量し、茲に得たる硫酸バリウムの量より亞硫酸を算定すべし。但し硫酸バリウム 1g は亞硫酸 (SO_2) 0.2744g に相當す。

前記試験法中乾燥果實類にありては、檢體の細截せるもの 25g を乳鉢内に取り、6% のナトロン鹼液 30cc を加へ、善く研和して糜粥狀となし、30 分時間放置したる後之を蒸餾壺に容れ試験すべし。

砂糖,水飴類に在りては,檢體 25-50g 又麥酒に在りては 200cc を取りて試験すべし. 但し麥酒の場合には水を以て稀釋するを要せず. 尙ほ澱粉糊液中にヨードカリウムを添加すべからず.

澱粉糊液の製法 澱粉 0.2g を少量の水中に混攪し,之を沸湯200cc 中に注加し,攪拌しつつ 1-2 分間加熱したる後,茲に得たる糊液を乾燥濾紙を用ひ 溫に乗じて濾過し,冷後之を用ふべし. 本液は用に臨みて之を製すべし.

本蒸餾滴定法實施に當り注意すべき要項を擧ぐれば次の如し.

1. ヨード稀薄定規液は力價を減じ易きを以て注意を要す, 而して流動パラフィンを用ひて其液面を覆ふときは大ひに之を防ぎ得べきも,尙ほ1ヶ月間に約2%の減力は免れ難きを認めたり.
2. 各檢體は試験直前に其容器を開封して秤取するを可とす. 開封後時日の経過に従ひ,亞硫酸含量に著しき變化を來たすもの少からず.
3. 炭酸瓦斯を通ずる速度は,1分間 150 泡前後を可とす.
4. 多量の亞硫酸存在するときは,加熱以前に若干のヨードを消費すべし.
5. 蒸餾中澱粉糊液は常に淡藍色,若くは淡藍紫色を呈せしむべし.
6. 澱粉糊液のヨードによる色調著しく類赤色(アルコール含有檢體の場合特に甚しを帶ぶることあるも,成績上特に影響なし.
7. 1時間蒸餾後ヨード液滴によるヨード澱粉の藍色乃至藍紫色1分間以上持續するを要す. 若し1分間以内に消失する場合は,加熱強きに過ぎ蒸餾壺の内容物稍々炭化を來すか,又は檢體中の亞硫酸含量異常に大なる起因するものなるを以て此點に注意すを要す.

(ロ) 直接滴定試験法

檢體 10g を約 200cc のベッヘルグラスに取り,水 20cc (難溶性の檢體にありては適宜少量の水を加へ,或は水溶上に加温溶解し冷却すべし)及 6% カリ鹼液 30cc を加へて溶解し, 30 分間放置の後に之澱粉糊液 2-3cc 及 25% 硫酸 10cc を加へ直に 50 分定規ヨード液を滴加し, ヨード澱粉の藍色 1-2 分間持續するに至らしめ,茲に消費せる 50 分定規ヨード液の量より亞硫酸量を算定すべし. 但し麥酒及びゲラチンの類にありては本方法を以て定量するを得ず.

(ハ) 各種檢體に就き施行せる蒸餾滴定法, 滴定液重量法及重量法の比較試験成績

前記試験方法及び重量法を以て各種檢體に就き施行せる試験成績を總括して表示すれば次の如し.

第 12 表

検 體	試 験 方 法	検出せる亜硫酸(SO_2) 量 (mg/kg)		
		第 1 回	第 2 回	平 均
水 飴(亜硫酸添加)	重蒸餾量滴定法	594	600	597
	重蒸餾液重量法	599	599	599
	直接滴定量法	576	585	581
	直接滴定量法	611	605	608
白 糖 蜜(亜硫酸添加)	重蒸餾量滴定法	373	370	372
	重蒸餾液重量法	382	380	381
	直接滴定量法	371	370	371
	直接滴定量法	403	403	403
赤 糖 蜜(亜硫酸添加)	重蒸餾量滴定法	251	261	256
	重蒸餾液重量法	285	280	283
	直接滴定量法	278	252	265
赤葡萄酒(亜硫酸添加)	重蒸餾量滴定法	121	118	120
	重蒸餾液重量法	128	131	130
	直接滴定量法	115	117	116
白葡萄酒(亜硫酸添加)	重蒸餾量滴定法	133	135	134
	重蒸餾液重量法	131	133	132
	直接滴定量法	125	131	128
	直接滴定量法	131	131	131
ゲ ラ チ ン	重蒸餾量滴定法	559	559	559
	重蒸餾液重量法	566	571	569
	直接滴定量法	562	560	561
	直接滴定量法	終末反應點不明瞭にして判定不能		
乾 杏	重蒸餾量滴定法	512	520	516
	重蒸餾液重量法	522	517	520
	直接滴定量法	513	514	514
キ リ ン ビ ー ル	重蒸餾量滴定法	14.1	11.4	13.3
	重蒸餾液重量法	16.0	15.6	15.8
	直接滴定量法	17.1	14.4	15.6
エ ビ ス ビ ー ル	重蒸餾量滴定法	9.3	8.3	8.8
	重蒸餾液重量法	9.0	8.8	8.9
	直接滴定量法	10.3	13.4	11.8
サ ッ ポ ロ ビ ー ル	重蒸餾量滴定法	5.12	4.8	5.0
	重蒸餾液重量法	2.4	3.8	3.1
	直接滴定量法	2.56	2.56	2.56
白 ざ ら め	重蒸餾量滴定法	18.1	18.1	18.1
	重蒸餾液重量法	21.4	20.0	20.7
	直接滴定量法	15.8	20.2	18.0
黄 ざ ら め	直接滴定量法	5.12	5.12	5.12
	直接滴定量法	5.12	5.12	5.12
米 糖	重蒸餾量滴定法	12.8	11.5	12.2
	重蒸餾液重量法	12.8	11.5	12.2
	直接滴定量法	16.0	19.2	17.6
赤 砂 糖(上等品)	重蒸餾量滴定法	15.4	17.6	16.5
	重蒸餾液重量法	15.8	15.8	15.8
	直接滴定量法	15.1	15.0	15.1
赤 砂 糖(中等品)	重蒸餾量滴定法	160	160	160
	重蒸餾液重量法	169	160	165
	直接滴定量法	164	157	160
赤 砂 糖(下等品)	重蒸餾量滴定法	終末反應不明瞭にして判定不能		
	重蒸餾液重量法	133	133	133
	直接滴定量法	132	137	135

(二) 結 論

上記試験成績を通覧するに重量法, 蒸餾滴定法, 直接滴定法及び滴定液重量法の各成績は共に略一致すれども, 一般に重量法は比較的最も數値低く, 蒸餾滴定法は之に次ぎ, 直接滴定法最も高きが如し, 之を按ずるに重量法にありては, 硫酸バリウムの沈澱が洗滌用熱湯に微に溶解する損失及び蒸餾の際避け難き微量の亞硫酸の酸化に依りて僅に減量し, 蒸餾滴定法にありては檢體に含有せらるる僅微の揮發性還元物質, 加熱によりて生ずる痕跡の分解物質のヨードに及ぼす影響及び流通炭酸瓦斯による微量のヨード逃竄等の總合的原因に依りて増量を來し, 又一方に於ては重量法に於けると等しく蒸餾中僅微の亞硫酸の酸化に依りて減量し, 爲めに増減相殺して中程度を保つものなり, 又直接滴定法の一般に最も高き數値を示すは滴定液中の全亞硫酸が反應に參與し更に滴定液にはヨードカリウムを添加すること能はざるを以て, 水量のみによる消費によりて影響せられ(水 70cc は 50 分定規ヨード液約 0.05cc を費消す)又滴定液中に含有する有機物質の幾分もヨードを費すべき恐ある等之が原因たるべきか, 然れども此等成績の差異僅少にして, 而も共に長短全くなしとせざるを以て, 8 方法の操作の繁簡便否を参考として考察すれば重量法は比較的長時間を要するを以て, 飲食物試験等に於て多數の檢體を處理するに不便にして, 直接滴定法も亦限られたる檢體にのみ應用し得らるるものなれば, 一般的總ての檢體に應用せられ重量法に比し遙に短時間に施行し得べく, 且つ數次の試験成績又良く一致し, 尙ほ必要に際しては滴定液重量法をも併施し得べき蒸餾滴定法を以て, 最も卓越せる方法と認め得べし, 然れ共直接滴定法も亦地の 2 方法との差違甚しからず, 操作頗る單簡にして良く一致せる成績を得べきを以て, 飴類, 白糖蜜, 白葡萄酒, 砂糖等の試験に當りては, 好適の方法たるものと信ず。

今歐米各國に於ける亞硫酸の許容限度を標準とし, 假りに各其 1 kg 中の亞硫酸(SO_2)量, 乾杏果 1000mg, ゲラチン 500mg, 糖蜜 300mg, 葡萄酒 200mg, 水飴類 30mg, 麥酒 20mg, 及砂糖 20mg を以て許容限度と見做すときは, 容量法と重量法とに於て次の數字的關係を有すべし。

第 13 表

檢 體 種 類	檢體 1kg 又は 1L 中許容 SO_2 mg 量	供 試 量	供 試 量 中 SO_2 の mg 量	供試量中の SO_2 に對應するヨード液量 (ccm)	供試量中の SO_2 に對應する硫酸バリウム mg 量
乾 杏	1000	25g	25	33.1	91.1
ゲ ラ チ ン	500	25g	12.5	19.5	45.5
糖 蜜	300	25g	7.5	11.7	27.3
葡 萄 酒	200	25ccm	5.0	7.8	18.2

水	飴	類	30	50g	1.5	2.34	5.46
	"		30	25g	0.75	1.17	2.73
砂		糖	20	50g	1.0	1.56	3.64
	"		20	25g	0.5	0.78	1.82
麥		酒	20	200cc	4.0	6.25	14.6
	"		20	50cc	1.0	1.56	3.64
	"		20	25cc	0.5	0.78	1.82

前表の示すが如く水飴, 砂糖及ビール類は 檢體の供試量 25-50g 又は 25-50cc に於ては重量法に依りて定量すること極めて難事にして, 到底満足すべき成績を得難きに對し, 蒸餾滴定法にありては檢體 25g 或は 25cc の場合に 於ても 容易に且つ比較的精密に測定し得るの特徴あり, 是等の關係よりするも飲食物中亞硫酸の檢定に對しては本蒸餾滴定法最も適當するものと認めざるを得ざるべし。

次に前記蒸餾滴定法により, 各種檢體中の亞硫酸檢出に際し, 餾出し始めてより 1 時間終了に至る迄の間に於ける, 亞硫酸の餾出狀況を示せば次の如し。

第 14 表

檢 體	1kg 中亞硫酸 (SO ₂)のmg量	亞硫酸の餾出割合(1時間後に於けるものに對する%)						
		10分後	20分後	30分後	40分後	50分後	60分後	
水	餡	46.1	—	64	75	86	94	100
	”	3.30	42	65	81	92	98	100
砂	糖	20.8	75	80	—	88	94	100
	”	25.6	70	75	80	88	—	100
	”	40.3	70	77	84	87	94	100
ゲ ラ チ ン		32.8	71	81	91	95	98	100
	”	25.6	75	85	90	95	—	100
白 葡 萄 酒		28.2	73	86	91	95	—	100
飴 菓 子(赤色)		32.0	40	56	72	84	92	100
” (綠色)		23.2	56	67	70	78	89	100
乾 杏		522	83	92	96	98	99	100
	”	517	77	89	95	97	99	100
麥 酒		16.0	82	96	98	100	100	100
	”	9.0	82	89	91	93	96	100
糖 蜜		382	92	95	96	98	99	100
”		379	91	94	91	98	99	100

前記成績に徴するに, 亞硫酸餾出の狀況は, 各檢體の種類によりて一様ならず, 故に蒸餾 1 時間以内殊に 30 分間以内に於ける餾出亞硫酸量に, 或る係数を乗じし以て可及的短時間に檢體中の亞硫酸量を概測せんとするか如き事は, 寧ろ過誤に陷る

虞あるを以て,上記の方法に従ひ正確に1時間蒸餾するを可とすべし.

(ホ) 蒸餾滴定法に依る菓子類の試験成績

市販菓子類に就きて蒸餾滴定法を試むるに成績の次の如し.

第 15 表

検 體 の 種 類	50分定規ヨード 液消費量(ccm)	亜硫酸(mg/kg)	硫酸バリウム沈澱
森永ミルクキャラメル	0.6	15.3	(+)
水 無 飴	0.65	16.6	(+)
飴 菓 子(赤色品)	1.25	32.0	(+)
同 (綠色品)	0.9	23.2	(+)
砂糖包 翁 飴(赤色品)	1.2	30.3	(+)
同 (青色品)	0.15	4.0	(+)
オブラート包 翁 飴(黄色品)	1.05	27.0	(+)
同 (白色品)	10.5	27.0	(+)
同 (赤色品)	0.3	7.3	?
バナ、ゼリー(白色品)	0.3	7.3	?
同 (青色品)	0.2	4.9	?
同 (赤色品)	0.25	6.4	?
ア ル ヘ イ	0.2	5.0	—
同 (黒色品)	0.4	10.2	(+)
同 (南京豆入淡黒色品)	0.45	11.5	(+)
梅 干(小形赤色品)	10.55	270.0	亜硫酸として 220mg/kg
同 (大形飴色品)	0.4	10.2	(+)
同 (大形黒色品)	0.85	21.8	(+)
同 (大形赤色品)	0.5	12.8	(+)

(乙) 過酸化水素を以て酸化する容量分析法

余等は先づ前記ウィリアムス氏の試験法に準據し,種々試験を施行し次の成績を得たり.

(イ) 過酸化水素溶液に就て

本法に使用する過酸化水素は,可及的鹽酸を含有せざるものたるべし. 若し之を含有するときは,豫め之を滴定し使用せる 過酸化水素溶液 20cc に相當する 10 分定規ナトロン液消の費量を控除せざるべからず. 又滴定後更に重量法を施行する必要あるときは,豫め其含有硫酸量を定量し之を控除するを要す.

今市販過酸化水素に就き定量せる鹽酸量を示せば次の如し.

第 16 表

検 液	検液 20cc に對する 10 分 定規ナトロソ液消費量cc	検液 20cc に對する硫酸バ リウムの mg 量
メルク製過酸化水素	0.4 (SO ₂ として 1.28)	4.46(SO ₂ として 1.22)
三共製オキシフル	0.4 (SO ₂ として 1.28)	2.88(SO ₂ として 0.79)
⑩會社製過酸化水素液	0.81(SO ₂ として 2.692)	6.86(SO ₂ として 1.87)
第一製藥會社ペルゾーン	0.1 (SO ₂ として 0.32)	1.5 (SO ₂ として 0.41)

(ロ) 試験方法の研究

前記ウィリアムス氏法に據り、検體 100g を取り、内容 1500cc の圓底蒸餾コルベンに水 500cc 及び燐酸 20cc を加へ、1 時間炭酸瓦斯を通じつつ蒸餾し、又別に内容 750cc の蒸餾コルベンを取り、之に検體 25g 水、180cc 及び 25% 燐酸 25cc を加へ、1 時間蒸餾し、兩者の成績を比較するに、兩者殆ど同一にして又ウィリアムス氏に従ひて燐酸に代ふるに濃鹽酸 20cc を使用するに注意して加熱するときは、其成績燐酸と同一なるも加熱急激に過ぐるときは、稍々高き數値を示せり。次に水飴糖蜜等に就き施行せる成績を示すべし。

第 17 表

検 體	検 體 量 (g)	添 加 水 量 (cc)	10分定規ナトロ ソ消費量(cc)	検體1kg 中の亞硫 酸の mg 量
亞硫酸含有水飴	100	500	1.6	51.2
”	100	500	1.6	51.2
”	25	180	0.4	51.2
”	25	180	0.4	51.2
亞硫酸含有精製糖蜜	100	500	11.2	358.4
”	100	500	11.1	355.2
”	25	180	2.8	358.4
”	25	180	2.8	358.4

前表に於けるが如く本試験法はウィリアムス氏の原法と之を改良したるもの即ち蒸餾コルベン並に檢體採取量を小ならしめたるものとに於て、何等其成績に差異なく前記水飴の場合に於けるが如く、檢體 1kg 中の亞硫酸含量 51.0mg の小量に於てよく定量し得たり。故に本改良法はウィリアムス氏原法に比し寧ろ遙に優れるを認めしめたり。以下該改良法に稍詳細に之を説述すべし。

(ハ) ウィリアムス氏法の改良試験法案

内容約 750cc の圓底硝子壺を取り、之に 2 孔を有する栓を施し、其 1 孔には殆ど壺底に達する硝子管(甲)地の一孔には壺頸に終る硝子管(乙)を挿入し、乙管をリービッヒ氏冷却器に連結し、冷却器には接續管により内容 200cc のエルレンマイエ

ル壘に接続し、接続管の下端は殆ど壘底に達せしめ、この受器に底部の球約 10cc を有するペリゴー管 2 個を連結し、まづ受器竝に第 1 ペリゴー管に 3% 過酸化水素液 10cc を宛を容れ第 2 ペリゴー管に過酸化水素溶液及び鹽酸酸性クロールバリウム混合液を 10cc (1L 中クロールバリウム 20g, 濃鹽酸 4cc 及び 10 容量%過酸化水素液 400cc を含有するもの)を容る。

前記蒸餾コルベンの甲管より炭酸瓦斯 (過マンガン酸カリウム溶液を以て洗滌せるもの)を通じし装置内の空氣を全く驅除したる後、炭酸瓦斯を通じつつ硝子壘を緩かに開栓し、固形の檢體に在りては、細割せるもの 25g (乾果類に在りては之を乳鉢内に取り 6% ナトロン滷液 30cc を加へ善く研和して糜粥狀となし 30 分間放置したる後) 液狀の檢體に在りては 25cc を蒸餾壘内に容れ、一旦煮沸したる水 180cc を以て之を洗入し、25% 磷酸 25cc を加へ再び栓を施し、絶へず炭酸瓦斯を通じつつ 15 分時間經過したる後、注意して加熱し、1 分時間約 40-50 滴の餾出速度に於て蒸餾し、蒸餾し初めてより 1 時間の後蒸餾を中止し第 1 ペリゴー管の内容液を受器中に合し、善く洗滌し、メチールオレンジ又はブロームフェノールプラウを標示藥として滴定し、之より豫め測定せる使用過酸化水素液 20cc の消費する 10 分定規ナトロン液量を控除し、之れより檢體 1kg 又は 1L 中の亞硫酸 (SO_2) 量を算出す。(10 分定規ナトロン液 1cc は亞硫酸 3.2g に相當す)。

第 2 ペリゴー管は受器竝に第 1 ペリゴー管にて捕捉し得ざりし亞硫酸の逸出を検知する装置なるも、多數の實驗の結果斯の如き必要は殆ど認めざりき、又ウィリアムス氏原法に於けるが如く蒸餾を止むる直前に冷却器中の水流を止め、亞硫酸の餾取を完全ならしむるが如きは、實驗上殆ど其必要無きものの如し。

(二) ウィリアムス氏の改良法とヨード法との比較試験

次に諸種檢體に就きて前記改良法を試み、更に 10 分定規ナトロン滷液を以て滴定したる餾液を蒸發濃縮し、鹽酸酸性となしクロールバリウム溶液を滴加して硫酸バリウムを沈降せしめて定量し、別に過酸化水素水に含有せらるる硫酸を定量して得たる數値減し茲に得たる重量法の成績を滴定に依りて得たるものと比較せり、尙ほ同一檢體に就きヨード液に依る蒸餾滴定法及び滴定液重量法を併施し、以て彼我對照に資せり。

第 18 表

檢體の種類	檢體 1kg 中 亞硫酸 (SO_2) の mg 量					
	過酸化水素法		ヨード法			
	滴定法	重量法	蒸餾滴定法	滴定液重量法	重量法	
水	51.6	52.8	51.5	—	5.5	
„	51.6	54.3	—	—	—	

赤	砂	糖	83.2	—	84.0	82.0	32.7
	”		83.2	—	—	—	81.6
白	葡	萄 酒	173	166	—	—	—
	”		179	163	—	—	—
精	製	糖 蜜	347	374	340	343	—
	”		346	374	—	—	—
	”		345	388	—	—	—
乾		杏	300	306	314	315	—
	”		307	299	—	—	—
	”		391	399	405	401	404
	”		371	376	—	—	—

(ホ) 結 論

上表に見るが如く、過酸化水素法に於ける 滴定數値は 略々ヨード法の 夫れと一致し、重量法も亦略類似すれども、精製糖蜜にありては、重量法によりて得たる 數値は 滴定法に依りて得たるものに比し、稍高き傾向を示せり、概して 過酸化水素酸化法は 滴定法の正確なるに比し、其重量法は稍々劣れるやの感あり、且つ過酸化水素液中の 硫酸含量は必ずしも 豫め滴定による 10 分定規ナトロン液の 消費量より算出せる 硫酸バリウムの計算量に一致することなく、同一種類のものにありても 其容器の異なるに従ひて 検出する硫酸バリウムの含量多少異り、各試験實施に先立ちて 毎回の 量が 定量を行ふは煩雜に堪えざるべく、且つ實驗上誤謬に陥り易きが故に 過酸化水素滴定液を更に 重量法に依りて 定量する方法は到底實用に堪えざるべし。

以上の如くヨードを以てする 蒸餾滴定法と 過酸化水素による 容量分析法は、其 正確度に於て殆ど優劣なく、兩者共に良好なる試験法と稱し得べし、殊に 過酸化水素法は 檢體中の揮發性還元物質によりて影響を受くること極めて少なく、且つ 硫化物及び揮發性硫黄含有々機物質存在に於ても、過酸化水素は之を硫酸に變化することなきを以て好都合なり。

總 括

以上各項に於て得たる實驗成績に基き總括すること次の如し。

1. 先づ亞硫酸の定性的豫備試験法に就きて考究したるに、從來最も廣く應用せらるる 硫化水素化生法及 ヨード酸カリウム澱粉紙法は、共に餘りに鋭敏に過ぎ、微量の亞硫酸によりては反應せず一定の限界量以上に於て始めて 検出し得べき試験法としては適合せず、爾他の諸法も亦種々の點より用に堪えず、要するに 定性的鑑識法によりて豫備試験を行ふを得ざるを認めたり。

2. 定量的試験法に於てはヨードを以て酸化する方法中重量法、蒸餾滴定法、滴定液重量法及び直接滴定法を比較研究したるに、蒸餾滴定法最も卓越せるを認め、之

が實施上須要なる條件につき精査し、以て優良と認むべき新定量法を案出せり。

3. ウィリアムス氏の過酸化水素應用による蒸餾滴定法を追試して之が改良試験法を考案し、次で之を前記コード法と比較精査し、以て兩者共に實用上價值ある良好の定量法なることを確定せり。

終りに臨み伊藤秀隆一、方井昇兩君の實驗上助力を得たるを深謝す。

(於内務省東京衛生試驗所調査部)

引用文獻

- 1) B. Haas, Ber. Dtsch. chem. Ges. **15**, 154, 1882. 2) K. K. Järvinen, Ztschr. f. Lebensm. **40**, 283, 1925. 3) H. Schmidt, Arb. a. d. Kaiserl. Gesundheitsamt. **21**, 233, 1904. 4) V. Froboese, Arb. a. d. Reichsgesundheitsamt. **52**, 657, 1920. 5) G. W. Monier-Williams, Brit. Food. J. **29**, 51, 1927. 6) Th. Schumacher u. U. Feder, Ztschr. f. Nahr.-u. Genussm. **10**, 642, 1905. 7) A. Beytien. u. P. Bohrisch, Ztschr. f. Nahr.-u. Genussm. **5**, 401, 1902.

昭和三年五月

果汁及果實シロップ中安息香酸の定量法 研究成績報告

衣 笠 豊
小 毛 利 毛 利 三
丹 野 政 治

Y. Kinugasa, M. Komori u. M. Tanno: On the determination of benzoic acid in fruit juices and Sirups.

〔本研究の詳細は衛生試験所彙報第33號41—52頁(昭和4年)を参照せられたし〕

安息香酸及其ナトリウム鹽は飲食物防腐の爲め最も屢々使用せらるるものの一なるも、從來米國を除きては世界各國共に各法規を設け之が使用を嚴禁せり。米國に於ては 1908 年安息香酸ナトリウムの人體に及ぼす影響に對し、ロング、ヘーター及チッテンデンリの三博士夫々主任となり、半ケ年に互りて多數の人體に就き詳細なる試験の結果、(1)安息香酸ナトリウムは日々 0.5g 以下の少量を食料と共に體內に攝取するも有害作用を呈せず、健康上何等の支障を認めず、(2)日々 4g に至る多量の安息香酸ソーダを食料と共に服用せしむるも、一般健康上特に有害の影響を認めず、又試験期間中毒物的作用を呈せし事なかりき、(3)安息香酸を少量又は多量飲食物中に混和するも、之が爲當該飲食物の品質又は營養價值を損傷するものと認