7. Unter diesen beständigen Molekularverbindungen gibt es solche, die zur Identifikation der ursprünglichen Substanz verwendet werden können.

M. Ishidate: *Über die Darstellung des Emulsin.*

Die süßen bitteren Mandeln eignen sich am besten als Ausgangsmaterial zur Isolierung des Emulsin. Nach den neusten Arbeiten von Willstätter und Csanyi [Zeitsche. f. physiolog. Chemie 117, (1921)] kann man 2,5—3,5 g besonders wirksames Emulsin aus 100 g entöhlten und zerriebenen süßen Mandeln erhalten.

Bei der Anwendung der Willstätterschen Methode auf die Samen Pruni Persicae (Tönin) konnten aus 100 g ölfreiem Pulver dieser jap. Droge 3,0—3,8 g rohes Emulsin dargestellt werden. In ihren Eigenschaften sind keine besonderen Unterschiede zwischen beiden Emulsinpräparaten nachweisbar. Daher können Samen Pruni persicae auch als Ausgangsmaterial zur Emulsindarstellung in Betracht gezogen werden.

Ferner wurde bei der Emulsindarstellung an Stelle des Aethylalkohol Aceton und Methylalkohol als Extraktionsmittel verwendet, um die Ausbeuteverhältnisse zu studieren.

Bei süßen Mandeln und Tonin wurde gefunden, dass sich Aethylalkohol am besten zur Darstellung des reinen Präparats eignet, während bei Verwendung von Aceton ein etwas angefärbtes, unreines Produkt in allerdings etwa doppelt so grosser Ausbeute erzielt wird. Das Präparat, welches durch Extraktion mit Methylalkohol erhalten wird, ist im Aussehen und in Ausbeute wie das, welches durch Extraktion durch Aethylalkohol gewonnen wird; nur ist seine Wirkung schwach.

		Ausbeute aus 100 g entöhl.	Zeitwert f. Amygdalin	Zeitwert f. Salicin	Zeitwert f. β-Methyl- glucosid
I Stöße mandeln	mit C ₂ H ₅ OH (1)	6.4 g	110	400	83500
	mit (CH ₃) ₂ CO (2)	13 g	185	700	163000
	mit CH ₃ OH (3)	6.3 g	165	570	122000

II Tonin (S. Pruni persicae)	mit C_2H_5OH (1)	3.1 g	51	230	22480
	mit $(CH_3)_2CO$ (2)	6.4 g	96	234	38480
	mit CH_3OH (3)	3.2 g	95	340	35600
III Aprikosenkern mit $(CH_3)_2CO$		2 g	53.6	162	28600

- I. (1) Amygdalin 0.1 g in 20 c.c. PH = 6 t = 30° 1 mg Emulsin nach 60 Min. Spaltung 32.7 % Zeitwert 110.
 Salicin 0.1119 g in 20 c.c. PH = 4.4 t = 30° 2 mg Emulsin nach 60 Min. Spaltung 14.3 % Zeitwert 400.
 β -Methylglucosid 0.0759 g (wasserfrei) in 20 c.c. PH = 44 t = 30° 100 mg Emulsin nach 20 Std. Spaltung 71.8 % Zeitwert 83500.
- (2) Amygdalin; 1 mg Emulsin 60 Min. Spaltung 22.6 % Z.W. 185
 Salicin; 2 mg „ 60 „ „ 8.5 % Z.W. 720
 β -Methylglucosid; 100 mg „ 20 Std. „ 36.9 % Z.W. 163000
- (3) Amygdalin; 1 mg Emulsin 60 Min. Spaltung 24.4 % Z.W. 165
 Salicin; 2 mg „ 60 „ „ 10.5 % Z.W. 570
 β -Methylglucosid; 100 mg „ 20 Std. „ 54 % Z.W. 122000
- II. (1) Amygdalin; 1 mg Emulsin 60 Min. Spaltung 55.4 % Z.W. 51
 Salicin; 2 mg „ 60 „ „ 26 % Z.W. 230
 β -Methylglucosid; 100 mg „ 4 Std. „ 53.4 % Z.W. 22480
- (2) Amygdalin; 1 mg Emulsin 60 Min. Spaltung 36.9 % Z.W. 96
 Salicin; 2 mg „ 60 „ „ 25.6 % Z.W. 234
 β -Methylglucosid; 100 mg „ 4 Std. „ 31.2 % Z.W. 38480
- (3) Amygdalin; 1 mg Emulsin 60 Min. Spaltung 37 % Z.W. 95
 Salicin; 2 mg „ 60 „ „ 17.6 % Z.W. 340
 β -Methylglucosid; 100 mg „ 4 Std. „ 34.3 % Z.W. 35600
- III. Amygdalin; 1 mg Emulsin 60 Min. Spaltung 54 % Z.W. 53.6
 Salicin; 2 mg „ 60 „ „ 36.9 % Z.W. 162
 β -Methylglucosid; 100 mg „ 4 Std. „ 42 % Z.W. 28600

S. Kanao: *Ueber die Bildung des sekundären Aminoalkohols aus dem Aldoxim, IV Mitteilung (Studien über die Alkamine V).*

In der letzten Mitteilung sind die Aldoxime und sek. Basen der 3,4-Dioxy-

(I の 1) 即最も溶解し易きものと、1 度は Methylalkohol に溶解したものの中で最も溶解し難い部として取つて III から得た残渣 III' とを次の條件で $[\alpha]_D$ を測定する。

(I の 1) 物質	K_2CO_3	溶液の量	管の長さ	α_D	$[\alpha]_D$
0.505g	1g	50cc	20c.m.	+0.10°	+5.00
III'	0.507g	”	”	+0.09°	+4.44

尙この溶液と條件を同じくする事は不可能であるが此の物質 0.5g 中に存在する Weinsäure の計算量 0.132g を取り K_2CO_3 1g を加へて他の條件は同様にして α_D を見ると +0.25° で大差ない故 Oxymercuri-tartarat と結合して他の部分には旋光性はないと見て差支へない。

(東京帝國大學醫學部藥學科生藥學教室にて)

エムルジンの製法に就て

藥學士 石 館 守 三

M. Ishidate: Über die Darstellung des Emulsin.

β -Glukosidase なる酵素エムルジンは植物界殊に Prunus 屬の種子中に多く存在するは周知のところなり。之を製造するに際しては現今専ら原料として甘扁桃 süße Mandeln 並に苦扁桃 bittere Mandeln を選用せり。Willstätter u. Csányi [Zeitschr. f. physiol. Chem. 117(1921)] の最近の研究によれば從來の製法を改良し甘扁桃脂肪粉末 100g より極めて有力なるエムルジン 2.5g-3.5g を得る事を報ぜり。

而してエムルジンの原料を本邦産の生藥に求んと欲すれば先づ杏仁 Semen Pruni armeniacae 及び桃仁 Semen Pruni persicae に注目せざるべからず。

杏仁に關しては既に Willstätter u. Oppenheimer [Zeitschr. f. physiol. Chem. 122, (1922)] の報告するところあり。余の後述するアセトン沈澱法による時は脱脂粉末より 2% の得量を以て相當有力なるエムルジンを得たり。

桃仁に就きては未だ何等知らるるところなし。余は先づ市販桃仁を原料となし、Willstätter u. Csányi [l. c.] の製法に従ひ、酒精沈澱法による時は脱脂粉末 100g より 2.5—3.5g のエムルジンを得たり。この桃仁エムルジンを Amygdalin, Salicin 及び β -Methylglucosid の三種の配糖體につき其の分解能力を検するに、甘扁桃エムルジンと其の性状を殆ど近似し、之亦エムルジンの好材料なる事を知りたり。

次にエムルジンの製造に際し、酒精を以て沈澱析出せしむる Willstätter u. Csányi [l. c.] の方法に代るにアセトン及木精を以てしたる場合其の得失の如何を検せり。

エムルジンの得量並に其の力價は材料の異なる毎に一定せざる故に同一の材料

の水性浸出液を三分し、(i) は酒精 (ii) はアセトン (iii) は木精を以て粗エムルジンを析出せしむ。甘扁桃及桃仁に就きて行へる結果によるに (i) 及 (iii) は其の析出の状態及び得量も殆ど同一なれどもエムルジンの作用能力は酒精に比して概して劣れるを見たり。

(ii) のアセトンの場合は製品は稍着色し、得量は他の二者の場合の約二倍を算せり。分解能力は酒精製品と比すれば明に劣れりと雖も其の得量の比を顧慮する時は大いに有利なるを知る。

次にエムルジンに是等の溶剤を長く接觸せしむる時如何なる影響を生ずるやを見んと欲し、桃仁の粗エムルジンを取り之れを水に溶解し不純物を取り濾液を三分して酒精、アセトン及木精にて沈澱せしめ三日間放置の後、其等のエムルジン製品を得るに、得量は各約 80 %、精製せらるゝに拘らず其の力價一般に弱められ、相互に於ては酒精、アセトンには見る可き差異なけれども、木精に於ては他に比して力價少となれり(第四表参照)。

之を要するにエムルジンの製造に際し、桃仁は甘扁桃に完全に代用せらる可く、杏仁も亦材料たり得る。酒精を以て沈澱せしむるは純品を得るに便なるも、アセトンは亦其の得量を増加するの利あり、推奨に値す。

エムルジンは是等の溶剤に長く接觸する時は其の效力を減する傾きあり、余の経験によるに常に粗エムルジンの方却つて效力強し。

本研究に關し御指導を賜りし恩師朝比奈教授に對し謹みて謝意を表す。

(昭和四年十二月、東大生藥教室に於て)

實 驗 之 部

1. 桃仁よりエムルジンの製法

市販桃仁 200g を取り、60-70°C の湯浴中に 5-10 分間溫め、直ちに布を用ひて表皮を除去し、之を摺鉢にてよく粉粹し、一度高壓の下に壓搾して析出する油分を除去するか或は直ちに約三容量のエーテルにて振盪脱脂し、この第一回脱脂粉末を更に乾燥後、摺鉢を以てよく粉末となし、再び二乃至三容量のエーテルを用ひてよく脱脂す。かくして乾燥脱脂粉末約 100g を得。

この脱脂粉末 100g に N_{10} アンモニア水 250cc 及び水 150cc を和して粥状となし終日振盪器に附す。稀アンモニア浸出液を吸引濾過し、殘渣を一度水にて洗ひ、再び N_{10} アンモニアの少量と水 150cc を以て數時間振盪浸出せしむ。斯くして得たる稀アンモニア浸出液全量約 500cc に稀醋酸(N_{12} 60cc)を以て酸性となし、蛋白質を沈澱せしめ、濾過し、この透明の水溶液にエチールアルコール(93%) 200cc を加ひて、少量の蛋白及びゴム質を靜置の後除去し之に約四倍容量の酒精を注加す。茲に粗エムルジンが白色紫狀の沈澱として析出す。一夜靜置の後透明の上層液を去り、沈澱物を遠心器を用ひて沈着せしむ。之を純アルコール次にエーテルにて洗滌

し速に真空乾燥器中に乾燥せしむ。大氣に接觸せしむれば吸濕し且つ次第に着色し來り大いに外觀を害ふ。茲に帶黃色粗エムルジン約 3.2g を得。材料により得量必ずしも一定せざるも大抵 2.5g—3.5g を得。この粗品の 5% 水溶液は尙蛋白白濁を生ずれども、之を濾過し、この透明の水溶液を再び酒精を以て沈澱せしめたる精製品は水溶液となして殆ど混濁せず。

該粗エムルジンに就き Willstätter u. Csányi [Zeit. f. physiol. Chem. 117 (1921)] の方法に従ひ Amygdalin, Salicin, 及び β -Methylglucosid の三種の配糖體に對する分解能力を檢するに第一表の如し。

第 1 表

		Emulsin m.g.	Zeit min.	Cu m γ	Spaltung	Zeitwert
桃仁よりの 粗エムルジン	1. Amygdalin	1	60	74.5	54.7	51.5
	2. Salicin	2	60	31.8	26.0	230
	3. β -Methylglucosid	100	24)	73.1	53.3	22500

註. 1. Amygdalin 0.1 (含水物) を 20cc. の水にとかし、PH=6. $t=30^{\circ}$ に於て Emulsin 1mg 60分作用せしむ。水蒸氣蒸溜の後 Bertrand 氏法にて葡萄糖を定量し、54.7%を分解せるを知る。Willstätter u. Csányi [l. c.] に従ひ Zeitwert 51.5.

2. Salicin 0.1119g を水 20cc. に溶かし PH=4.4 $t=30^{\circ}$ とし、Emulsin 2mg 60分作用せしむ。23%を分解せり。従つて Zeitwert 230.

3. β -Methylglucosid 0.0759g (脱水物), を 20cc. の水に溶かし、PH=4.4 $t=30^{\circ}$ にて Emulsin 100mg 四時間作用せしむる時 53.4%分解。従つて Zeitwert 約 22500.

以下の表は皆之に準ず。

2. 甘扁桃につき酒精・アセトン及び木精を以て沈澱せしめたる 場合の比較

甘扁桃を原料とし、前項の製法と全く同様にして得たるエムルジン浸出水溶液を三部に分ち (i) は酒精 (ii) はアセトン (iii) は木精を以てエムルジンの製法を試むるに、

(i) の場合は白色細微の粉末として沈澱し來り乾燥エムルジンは外觀灰白色水に溶かして僅かに白濁を生ず。100g の脱脂粉末より換算して、得量 6.4g なり。

(ii) のアセトンの場合は淡黄色の絮狀の沈澱として析出し、其の乾燥品は外觀帶綠色にして、其の水溶液は混濁し、多少の沈澱物を残す。得量は前者の約二倍にして 13g を算す。

(iii) の場合は其の狀態酒精の場合と毫も變りなく、得量亦約 6.3g を算す。

是等三者の製品につき其の分解能力を比較すれば第二表の如し。

第 2 表

甘 扁 桃	脱脂粉末100g よりの得量		Emulsin mg	Zeit min	Cu mg	Spaltung %	Zeitwert
(I) 酒精によ るエマルジン	6.4g	Amygdalin	1	60	45.9	32.7	110
		Salicin	2	60	21.0	14.9	400
		β -Methylglucosid	100	20std.	96.2	71.8	83500
(II) アセトン によるエマル ジン	13g	Amygdalin	1	60	32.0	22.6	185
		Salicin	2	60	11.9	8.5	720
		β -Methylglucosid	100	20std.	51.6	36.9	163000
(III) 木精に よるエマルジ ン	6.3g	Amygdalin	1	60	35	24.4	165
		Salicin	2	60	13.9	10.5	570
		β -Methylglucosid	100	20std.	74.1	54	122000

3. 桃仁につき酒精・アセトン・及び木精を以て沈澱せしめたる

場合の比較

桃仁を原料とし、前述と全く同一の方法を以てエマルジン浸出液を製し、これを (i) 酒製を以て沈澱せしめたるエマルジン製品と (ii) アセトンを以てしたるものと (iii) 木精を以てなしたる製品につき前表と同様に對比せしむれば第三表の如し。

アセトンにて処理したる (ii) の場合沈澱は稍、大なる絮状のものとなりて沈降す。乾燥品も他の兩者に比して着色する傾あり。

第 3 表

桃 仁	脱脂粉末100g よりの得量		Emulsin mg	Zeit min.	Cu mg.	Spaltung %	Zeitwert
(I) 酒精によ るエマルジン	3.1g	Amygdalin	1	60	75.5	55.4	51
		Salicin	2	60	36.8	26	230
		β -Methylglucosid	100	4std.	73.1	53.4	22400
(II) アセトン によるエマル ジン	6.4g	Amygdalin	1	60	51	36.9	96
		Salicin	2	60	36.3	25.6	234
		β -Methylglucosid	100	4std.	41	31.2	38430
(III) 木精に よるエマルジ ン	3.2g	Amygdalin	1	60	51.5	37	95
		Salicin	2	60	35.3	17.6	340
		β -Methylglucosid	100	4std.	38.4	34.3	35600

4. エマルジンに對し酒精アセトン及び木精の影響

粗製桃仁エマルジン 2g (第3表 (ii) なるアセトンに由るエマルジン) を取り、之を蒸餾水 150cc に溶解し、不溶物質を濾過し、之を三等分し、各につき (i) は酒精 250cc (93%) を以て、(ii) はアセトン 25 cc (93%) (iii) は木精 250cc (93%)

を以てエムルジンを沈澱せしめ、三晝夜放置す。酒精及木精の場合は白色細微の粉末となりて速に沈降し來り、遠心器を以て集めて乾燥せしものは純白色の輕鬆の粉末なり。アセトンの場合は乳白濁をなし沈降困難なれども遠心器を以て沈澱せしめ乾燥せしもの淡黄色を帶ぶ。何れも其の水溶液は僅に蛋白白濁を呈す。

是等の三者に就き其の得量は能力を對比すれば第四表の如し。

第 4 表

桃 仁 粗 エムルジン	1g. より の得量		Emulsin mg.	Zeit min.	Cu mg.	Spaltung %	Zeitwert
(i) 酒精にて 精製	0.8g.	Amygdalin	1	60	47.8	34.1	107
		Salicin	2	60	23.9	16.8	360
		β -Methylglucosid	100	4std.	43.7	30.3	39600
(ii) アセトン にて精製	0.8g.	Amygdalin	1	60	44.9	32.0	116
		Salicin	2	60	22.95	16.2	370
		β -Methylglucosid	100	4 td.	43.0	30.3	39600
(iii) 木精にて 精製	0.8g	Amygdalin	1	60	39.2	27.7	140
		Salicin	2	60	19.1	13.5	440
		β -Methylglucosid	100	4std	40.1	28.2	42500

5. 杏仁エムルジン

市販杏仁を材料とし、前述の製法に従ひ、アセトンを用ひてエムルジンを沈澱せしむ。帶淡褐色絮狀の沈澱として析出す、之をアセトン並にエーテルにて洗ひ、眞空乾燥せしものは褐色の塊にして、脱脂粉末 100g より約 2g の得量あり。

この粗エムルジンに就き效力を検すれば下の如し。

外觀他の製品に比し粗惡なれども比較的強力なり

	Emulsin mg.	Zeit min.	Cu mg.	Spaltung %	Zeitwert
Amygdalin	1	60	74.1	54.0	53.6
Salicin	2	60	51.6	36.9	162
β -Methylglucosid	100	4std.	58.3	42	28600