ungsprodukt ausser den Hydroxylgruppen im Zuckerrest scheinbar noch ein freies Hydroxyl hat. In der Annahme, dass dasselbe auch beim Methylierungsprodukt des Malvin der Fall ist (von Malvin wird nämlich angenommen, dass es eine dem Althaein verwandte Konstitution besitzt), wurde dieseibe Methylierungsmethode auf Malvin angewandt. Das durch Hydrolyse des auf obigem Wege erhaltenen Methylmalvin mit 20% ig. Salzsäure entstehende Methylmalvidin hat nach der Methoxylbestimmung 4 Methoxylgruppen, sodass diese Substanz ohne Zweifel Dimethylmalvidin (Tetramethyldelphinidin) darstellen muss. Ausser der mit dem Zucker gebundenen Hydroxylgruppe hat Malvidin noch 3 freie Hydroxylgruppen. Da aber bei dem vom Verf. dargestellten Methylmalvidin 2 Hydroxylgruppen besetzt sind, so ist noch ein freie Hydroxyl vorhanden, wie dies vom Verf. vorausgesehen worden ist.

Verf. nimmt an, dass diese Reaktion nicht nur beim Althaein und Malvin, sondern auch bei anderen Arten von Anthocyanen vor sich gehen kann.

S. Aoyama: *Über das Saponin von Camellia Sasanqua, Thunb.*

Es ist wohl bekannt, dass die Früchte von *Camellia Sasanqua Thunb.* ein Saponin enthalten [H. Mc Collum, Pharm. Jour (3) 14, 21 (1833), Holmes, Just bot. Jahrb. II 3 Eo (1895)], aber seine Natur ist noch nicht auf geklärt worden. Zur Gewinnung des Saponin habe ich die Früchte mit 60% ig. Alkohol extrahiert, das Extrakt mit Wasser und Bolus alba versetzt und abfiltriert. Das Saponin wurde im Filtrate durch Zusatz von Salzsäure und Aether gefällt. (Ausbeute: 10%). Das Rohsaponin wurde mit Aceton ausgewaschen, nochmals in 80% igem Alkohol gelöst, mit Tierkohle versetzt, abfiltriert und das Filtrat nach dem Konzentrieren mit Aether versetzt. Der Niederschlag wurde mit Benzol, Chloroform warm extrahiert und das Extrakt durch Lösen in 80% ig. Alkohol und Fällen mit Aether nochmals gereinigt.

Farblose, nicht aschehaltige Granula. Zp. 222.° Fast geschmacklos und reizt die Nase. Es ist in Wasser, auch in Alkali löslich, aber die Lösung bleibt farblos. Unlöslich in Aether, Aceton etc. und reduziert nicht die Fehlingsche Lösung. Mit Bial gibt es eine Farbreaktion. Durch Bleizucker entsteht ein

Niederchlag. $[\alpha]_D^{20} = +30.54^\circ$ (in 80 % ig. Alkohol). Der Titration nach ist die Substanz eine Dilactonmonocarbonsäure. Die Hydrolyse gibt Prosapogenin, Galaktose und Pentose. Die Galaktose konnte als Schleimsäure und Phenylsazon charakterisiert werden. Ob die Pentose Arabinose oder Xylose darstellt, ist noch nicht festgestellt. Dieses Saponin besteht aus je 1 Mol Pentose (Gef: 12,87 %; Ber: 9,52 %), Glucuron (Gef: 11,16 %; Ber: 11,16 %), Prosapogenin (Gef: 56,74; Ber: 57,35) und 3 Mol Galaktose [Gef: 33,68; Ber: 34,26. Festgestellt nach van der Haarschen Schleimsäure Methode].

	Gef: C% 55,54	H% 8,71
Ber.	„ 55,56	„ 7,93
Mol-Gew: titrimetrisch bestimmt.	Gef: 1523,8	
	Ber: 1577,4.	

Die Molekularformel stimmt auf $C_{73}H_{124}O_{36}$ ($=C_{37}H_{118}O_{33} \cdot 3H_2O$), wasserfreie Substanz also $C_{73}H_{118}O_{33}$.

Die Hydrolyse derselben verläuft in folgender Weise:

Sasanqua Prosapogenin $C_{50}H_{80}O_{14}$.

Eine Lösung des Prosapogenin in 40 % ig. Alkohol wird mit 4 % ig. Schwefelsäure 5 Stunden lang erhitzt; das entstandene Produkt mit Methylalkohol und Wasser fraktionniert gefällt. Das Prosapogenin bildet farbloses Kristallpulver vom Zp 208,° unlöslich in Wasser und Alkali, aber löslich in viel Aceton. Unter Druck spaltet es erst bei 150° Endsapogenin ab. Der Zucker gibt die Naphthoresorcin Reaktion. Da sich durch Salpetersäure keine Schleimsäure bildet, so wird die Substanz Glucuronsäure sein. Nach der Titration ist das Prosapogenin eine Dilactonmonocarbonsäure und besteht aus je 1 Mol Glucuron (Krüger-Tollens, Lefevre: Gef: 14, 53; Ber: 19, 47), Endsapogenin.

Mol-Gew. (nach Rast):	Gef: 951,2
	Ber: 904,6

Zusammensetzung	Gef: C% 66,61	H% 9,23
Ber. für $C_{50}H_{80}O_{14}$	„ 66,33	„ 8,91

Sasanqua Endsapogenin $C_{44}H_{72}O_8$.

Man erhält es durch Lösen des rohen Endsapogenin in Aceton und wiederholtes umkristallisieren aus Wasser oder durch fraktionnierte Fällung Zp. 201°

Hellbraunes leicht in Aceton, Methylalkohol löslicher, aber in Wasser unlösliches Kristallpulver.

Gef:	C% 72,34	H% 9,4
Ber:	„ 72,48	„ 9,96
Mol-Gew. (nach Rast)	Gef: 711,5	
	Ber: 728,5	

Mol. Zusammensetzung: $C_{44}H_{72}O_8$ nach Titration ein Laktone.

Es ist dem Camellia Saponin ähnlich (vergl Aoyama, Jour. Pharm Jap. 560, 964).

Die. Hydrolyse des Prosapogenin verläuft in folgender Weise.

J. Halberkamm [Biochem. Ztschr 19, 310–367 (1909)] hat aus den Früchten von Thea chinensis Sims und Thea assamica Mast enthaltenen Saponin „Assamin“ das Sapogenin $C_{33}H_{52}O_{61}$ Galaktose und Pentose erhalten; er hat vermutet, dass noch Fettsäuren enthalten seien. Der Analyse nach stimmt dieses Sapogenin (Gef, C% 72, 69, H% 9, 48) mit Sasanqua Endsapogenin fast überein. Da auch derselbe Zucker enthalten ist, so darf man vermuten, dass Assamin und Sasanqua Saponin identisch sind. Halberkamms Assamin enthält jedoch 6% Asche, sodass man damit keinen Vergleich anstellen kann.

Sasanqua Saponin führt bei 37° in 2 Stunden Haemolyse des 2% ig. Kaninchenblutes in einer Konzentration von 1:2'000.000 herbei, während Halberkamms Assamin erst bei einer Konzentration 1:10'000 haemolytisch wirkt. Auch ist die haemolytische Wirkung des Saponin viel grösser als die des Camellia Saponin. Die letale Minimaldosis (intravenös) beträgt für Kaninchen 7 mg pro Kg Körpergewicht, für Maus pro Kg Körpergewicht 0,05 mg; (subkutan) 0,2 mg pro Kg Körpergewicht, ist also gleich wie beim Camellia Saponin. Sasanqua Prosapogenin wirkt haemolytisch schon bei einer Konzentration von 1.200'000.

物質	3.414mg. AgJ.	8.372mg.	CH ₃ O%	32.40
理論數	C ₂₇ H ₂₃ O ₉ (OCH ₃) ₈ Cl として		CH ₃ O%	32.03

茲に得たる Methylmalvin は金屬光澤を有する無晶形の粉末にして苛性アルカリには全く不溶にして稀鹽酸には極めて難溶なり。

Methylmalvin の加水分解

Methylmalvin 1g を 20% 鹽酸 40-50cc 中に温めて溶解し硝子綿にて濾過し其濾液を砂浴上にて 2½ 分間煮沸せしめ其後直に冷却して析出し來る Methylmalvidin を分離し稀薄鹽酸にて急速に洗滌し硫酸エキスカートル内にて乾燥せり。

メトキシ基測定

物質	2.389mg. AgJ.	6.611mg.	CH ₃ O%	30.24
„	2.800mg. AgJ.	6.505mg.	CH ₃ O%	30.70

論數理 C₁₅H₅OCl (OH)₂(OCH₃)₄ として CH₃O% 31.45

本研究を行ふに當り Malvin の抽出に於て瀬川久雄君の熱心なる助力を厚く感謝す。
(昭和5年3月 富山藥學專門學校)

茶梅(さどんくわ)サポニンに就て

青山 新次郎

S. Aoyama: Ueber das Saponin von
Camellia Sasanqua Thunb.

著者は先年山茶サポニン (Camellia Saponin) に就きて研究しサポニンは C₉₇H₉₀·O₂₈·2H₂O にしてサボゲニン C₂₉H₄₄O₅ とグルコーゼ及アラビノーゼより成るとせり〔第一報、本誌 560; 957; 第二報、本誌 578, 278〕

然るに山茶と植物學上近縁なる茶梅 *Camellia Sasanqua* Thunb. の實中にサポニンの含有せらるる事は已に古く H. Mac Callum [Pharm. Journ. (3). 14, 21(1883)] Holmes [Just. bot. Jahresber., II. 390 (1895)] 氏等の報告せる所にして氏等は2%のサポニンを得たりとせるも成書等に其存在のみの記載せらるるを見れば恐らくは其本體を明にせざるものならん。而又 Kofler 氏は其著 Die Saponine に於て前記2氏のサポニンを Camellin と命名せるもこのものの本體も明かならざることは後述する如くなり。何れにしても其本體は不明なりと云ふべく山茶サポニンとの關係を明かにするは興味ありとす。

余は宮崎縣より茶梅の種子を得、穀實絞法にて茶梅油を製し(精製油得量 14.88%)更にエーテル浸出によりて充分に油分(得量 4.28%)を去りたる粕につき試

驗したり。粕は山茶絞粕に比し濃褐色なり。

サザンクワサポニン Sasanqua Saponin

粕の 80% アルコホル温浸エキスを水にとかし酸性白土を加へて不純物を去り濾液を鹽酸とエーテルと振り析出物をアセトンにて洗滌し粗製品 10% を得、是れを更に精製して $C_{73}H_{124}O_{36}$ Zp. 222° (實驗 C 55.54 H 8.71 計算 C 55.56 H 7.93) なる無灰の無色顆粒狀のサポニンを得たり。これをサザンクワサポニン Sasauqua Saponin と命名す。

このものは水及 80% アルコホルに可溶にして特にアルカリには無色に溶解しフエーリング液を變色せず、リーベルマン試薬にて紫紅色となる。強きビアル反應あり、水溶液は強く發泡し鉛糖にては沈澱せざれども鉛醋には沈澱す。 $[\alpha]_D^{20} = +30.54^\circ$ (80% アルコホル) にして滴定法にて分子量を測定するに鹼化後のアルカリ消費量は冷時のそれに大略 2 倍しデラクトンモノカルボン酸として分子量 1529.8 (計算 1577.4) を得たり。

このものを 40% アルコホル製の 3% 硫酸にて加水分解する時はプロサボゲニン $C_{50}H_{80}O_{14}$ を得、糖分は硝酸々化によりて粘液酸 Zp. 215°, フェニルヒドラチンによりてオサズーン Zp. 185° を得、混融によりてガラクトーゼなることを確定せり。次に糖液のビアル反應強き事及其アミルアルコホル溶液の吸収スペクトルによりてペントーゼの存在を確證したるもキシローゼなるかアラビノーゼなるかは決定するに至らざりしも Krüger-Tollens-Kröber 法にて 1 分子のペントーゼを検出せり (計算 9.52% 實驗 12.87%)。メチルペントーゼは存在せず。而糖液はナフトレゾルチンの反應なくプロサボゲニンは 56.74% あり計算量 57.35% と一致せり。次に其母液につき Van der Haar 氏の方法 (Monosaccharide u. Aldehyd-Säuren, 123) によりガラクトーゼを定量したるに 3 分子の計算量 34.26% (實驗 33.68%) に一致せり。

故に 140° に減壓乾燥せるサザンクワサポニンは $C_{73}H_{118}O_{33} \cdot 3H_2O$ に適し其本體は $C_{73}H_{118}O_{33}$ にして其加水分解式は次の如くなるべし。

サザンクワプロサボゲニン Sasauqua Prosapogenin

無色の結晶性粉末にして Zp. 208°, アルコホルに可溶なるも水、アルカリには不溶なり。ビアル反應なし。このものは常壓にて少時間の加水分解にては分解せられず加壓下 150° にて初めてエンドサボゲニン (Endsapogenin) を分離す。ここに得たる糖分は殆ど酸性にして且ナフトレゾルチンにて著明の反應あり且硝酸にて粘液酸を生成せず Krüger-Tollens-Lefèvre 法にてグルクロン 1 分子として計算量 19.47% (實驗 14.53%) に略一致せり。即グルクロン酸の存在は明かなり。ラスト法にて分子量 951.2 (計算量 904.6) を得てプロサボゲニンは $C_{50}H_{80}O_{14}$ (計算

C.66.33 H8.91 實驗 C.66.61. H.923) に適すとせり。少しく粗製の物質につき滴定して得たる分子量もデラクトンモノカルボン酸として大略一致せり(實驗 1022.7)。エンドサボゲニンはアセトンと水とより數回精製したるも遂に無色品とするを得ざりしも分解點 201° にして一定せるが故に現在の所にては此程度の物質にて分析することとしたり。このものは帶淡褐色結晶性の粉末にしてアセトン、メタノールに易溶にして水に不溶なり。リーベルマン試薬にて帶紫紅色を呈す。分析の結果 $C_{44}H_{72}O_8$ (實驗 C 72.34 H 9.40 計算 C. 72.48 H 9.96) (分子量ラスト法實驗 711.5 計算 728.5) に適したり。プロサボゲニンの加水分解式は次の如くなるべし。

而エンドサボゲニンはラクトンの性質を有し滴定によりデラクトンとして計算量(實驗 831.8)と大略一致せり。この分子量は山茶サボゲニン $C_{29}H_{44}O_5$ [本誌 **560** 964] に比し可なり大なれども山茶サボゲニンの累積する性質ある如く或は $(C_{25}H_{36}O_4)_2$ の如きモノラクトンの累積したるものに非るか。

何れにしてもラクトンにして遊離の酸を含まざることは山茶サボゲニンに類似せり。物質僅少のため更に進んで誘導體を製しこれ等の事を確かめ得ざりしもこれは他日材料を得ての研究に待たんとす。

以上の事實によりて見るにサザンクワサポニンは山茶サポニンと大に其性質及組成を異にし只サボゲニンが同一系統のものに非るやの疑あるのみなり。

翻つて山茶科 (*Ternstroemiaceae*) 植物中現今迄に知られたるサポニン又は配糖體に就きて見るに先づ山茶中には配糖體 Camellin ありとせらるるもこのものの分子式は區々にして一定せず $C_{53}H_{84}O_{19}$ [G. Martin u. J. Katzujama. Arch. d. Pharm. **213**, 334 (1878)], $C_{33}H_{56}O_{15}$ [勝山忠雄東醫事新 **23**, 8 (明治 11 年)]; 其他 Mac Callum (1883 年); Holmes (1895 年); Greshoff (1893 年), Czapck., Biochemie III. 535) 及 $C_{15}H_{32}O_7$ にしてラムノーゼを有す(北村良一, Iouru. Pharm. Chim. [7], **3**, 128 [1911]; 本誌 **344**, 702 [明治 43 年]) とせらる。然るに松山芳彦氏 [日農化, **3**, 297 (昭和 2 年)] 及余は主として結晶性サポニンを抽出し $C_{57}H_{90}O_{23} \cdot 2H_2O$ (青山) とし糖としてはグルコーゼ及アラビノーゼにしてラムノーゼを發見せず。この故に山茶中に Camellin なるものの存在は疑なきを得ず。

次に *Schima Noronhae* 中にサポニン及サポニン酸あり (Weil. Czapck, Biochemie III. 535) とせらるるも其本體は不明なり。

更に茶 (*Thea chinensis* Sims.) 及 *Thea assamica* mast. 中に Assamin なるサポニン及 Assam(in)-Säure なる配糖體様物質ありとせらる。

このものの分子式は Boorsma 氏 (Wehmer, Pflanzenstoffe) による時は $C_{18}H_{25}O_{10}$ にしてガラクトーゼとペントーゼとを含有すとせられ又最も詳細に研究せられた

る J. Halberkann 氏〔Biochem. Zeitschr. 19.310-67 (1909)〕は其最單式を $C_{27}H_{52}O_{10}$ としたれ共分子式を決定するに至らず加水分解によりてサポゲンin $C_{33}H_{52}O_6$ とガラクトーゼ及アラビノーゼを得たりとし其外に脂肪酸の存在を豫想せり。然るに兩氏の得たるサポニンは共に灰分約 6% の物質にして且又諸種の點に於て不純物と認むべきものにして従つて其決定には信を置き難し。

しかも尙 H 氏の得たる Assamin のサポゲンin (所謂第三サポゲンin) $C_{31}H_{52}O_6$ が C 72.69 H 9.48 にしてサザンクワエンドサポゲンin [C. 72.24 H. 9.4] と同様な點又サポニンを常法にて加水分解して中間體 (所謂第二サポゲンin C. 65.71 H. 7.89) を得たる點次にこのものを更に酒精製鹽酸にて煮沸して初めて第三サポゲンinを得たる點と前記糖合との關係より考察するに余の得たるサポニンと Assamin との同一物にあらざるかを思はしむ。この點は藥の實より Assamin を得て決定せんとす。

東京衛生試驗所伊東醫學士の調査による時はサザンクワサポニンの溶血作用は家兎血球 2% 浮遊液に對し 37°, 2 時間にて 200 萬倍、室温 24 時間にて 500 萬倍を示し非常に強力なり而其最少致死量は廿日鼠に對し皮下注射にて體重 1g 當り 0.2mg. 靜脈内注射にて 0.05mg. 家兎に對し靜脈内注射にて體重 1kg 當り 7mg なりと云ふ。Camellia Saponin に比し溶血作用は大に強く毒力は殆同等なり。而プロサポゲンinの溶血作用は 37°, 2 時間にて 20 萬倍なりと云ふ。

因に H 氏の Assamin の溶血作用は室温にて家兎 2% 血球液に對し 6.5 時間にて 1 萬倍、其致死量は靜脈内注射にて家兎 1kg 當り 30mg にしてサザンクワサポニンに比して非常に弱し。

本研究に際し厚教を得たる西崎博士、村山博士、材料の集收及動物試験につき御厚意を得たる刈米博士、伊東學士及熱心に助力せられたる野崎三郎君に對し厚き感謝の意を表す。

實 驗 の 部

サザンクワサポニンの製造

絞粕 500g に炭酸石灰 250g を混じ 80% アルコホルにて溫浸すること 3 回、溫浸濾液は減壓濃縮してエキス狀とし 4L の水を加へ更に酸性白土 500g を加へて 1 夜間放置したる後濾過し濾液に鹽酸を加へて 3% 溶液となし (此際析出物なし) エーテル多量を加へ析出せる沈澱を 1 日間放置後濾過しエーテル次に水にて洗滌し濃褐色の粗製サポニン平均 10g を得たり。

酸性白土の沈澱は乾燥後同様にして處理するに極めて少量 (1 例 0.4g) の析出物を得たり。

又 80% アルコホルにて溫浸後の粕はメタノールにて浸出し後同様に處理するに約 0.07g の析出物を得たるのみなり。

即實中のサポニンは大部分酸性白土の濾液に移行す。

粗製サポニンは乳鉢中にアセトンを加へてよく研磨後濾過し充分にアセトンにて洗滌後 80% アルコホルに溶解し一旦骨炭精製後強く濃縮しエーテルを加へ析出物を濾過しアセトンにて洗滌するに殆無色の結晶性粉末平均 5g を得たり。このものは已に フェーリング液を還元せざるも稀酸と 1 時間水浴中に熱するに多量の析出物あり其濾液はフェーリング液を熱時著明に元還す。

これを更に 1 回同様にして精製したる後ベンツォールにて温浸しベンツォールの無色となるに到りクロロフォルムにて同様に處理し次に残渣を 80% アルコホルにとかし一旦乾涸したる後更に 80% アルコホルにとかし濃縮しエーテルを加へて析出せしめたり。

1.2g より僅かに 0.21g (17.5%) を得たり。殆無味、無臭、無色顆粒狀の塊にして其粉末は鼻腔を刺激す。苛性カリ上に乾燥したるものは Zp , 200-14° にして 140° に減壓乾燥したるものは 217-22° (202° Sintern) にて分解し、無灰にして熱時にても フェーリング液を還元せず。強きビアル反應あり。多量のメタノール、アルコホル及水に溶解しアルカリには無色に溶解す。アセトン、エーテル、二硫化炭素、ベンツォール、醋酸エーテル等にはとけ難し。リーベルマン試薬にて紫紅色より暗色となる。水溶液は強く泡沫を出し鉛糖には沈澱なけれども鉛醋、バリット水には沈澱を析出す。

$[\alpha]_D$ の測定 物質 0.2004 (苛性カリ上乾燥) を 80% アルコホルにて 12cc とす $\alpha_D = +0.51^\circ$ 故に $[\alpha]_D^0 = +30.54^\circ$

分析 140° に減壓乾燥したり。

物質	0.0421	CO ₂	0.0358	H ₂ O	0.0335	C	55.58	H	8.90
	0.0455		0.0326		0.0346		55.50		8.51
平均							55.54		8.71
計算	C ₇₃ H ₁₂₄ O ₃₆						55.56		7.93

滴定 80% アルコホル溶液にて行ひたり。

物質 0.0513 冷時 N/10-KOH 0.395cc 30 分鹼化後更に 0.611cc 計 1.006cc これをデラクトンモノカルボン酸とする時は分子量 1529.8 (計算 C₇₃H₁₂₄O₃₆ にて 1577.4)

ペントーゼ及グルクロン定量

物質 0.1504 餾出液 300cc フロログルチッド (黒綠色) 0.0243g 其中計算量 (1 分子として 11.16%) のグルクロン 0.0168g に相當するフロログルチッドは 0.016813 = 0.0056g 故にペントーゼに相當するフロログルチッドは 0.0243-0.0056 = 0.0187g 即ペントーゼとして 0.01936g にして 12.87% に當る。ペントーゼ 1 分子として計算量 9.52%

プロサボゲン定量

物質 0.2002g を 4% 硫酸含有の 40% アルコホル 18cc と 5 時間水浴上に煮沸し内容を蒸發皿中にメタノールにて洗滌し苛性カリ上に乾涸し後水を加へてよく攪拌し少時放置後重量已知の坩堝にて濾過洗滌し 100° に乾燥せり。プロサボゲン 0.1136g 即 56.74% 計算量 $C_{50}H_{80}O_{14}/C_{73}H_{124}O_{36}$ として 57.35%。

ガラクトーゼ定量。

初め Haar 氏の定量法を純ガラクトーゼにつきて追試し大略近似數を與ふる事を確め大體同氏の方法に準據し本試験を行ひたり。即プロサボゲンの濾液を苛性曹達にて中和し更に濃縮して 20cc 以下として放置し析出物を濾過洗滌し全濾液を 30cc とす。これを底面の直徑 6cm 高さ 9cm のペーヘル中にて 50% 硝酸 30cc 及白糖 0.9134g を加へて水浴中に濃縮し冷後内容を正確に 20g とし純粘液酸 0.5g を加へ 48 時間室温に放置後 3 時間 15° に放置し重量已知の坩堝にて濾過し沈澱は 15° に於ける純粘液酸の飽和溶液 5cc にて 4 回洗滌し更に 1 回 5cc の水にて洗ひ 100° に恒量としたり。總粘液酸 0.5342g 即實際發見量 0.0342g 即ガラクトーゼ 0.0600g

別に純ガラクトーゼ 0.1g につき同様に硫酸にて熱した後白糖 0.9g を加へ酸化したるに粘液酸發見量 0.0549 即ガラクトーゼ 0.089g にして此際 11% を損失せり。故にこれを本檢體に補正する時は真正のガラクトーゼは 0.06742g にしてサボニン中 33.68% となる。3 分子のガラクトーゼとして計算量 34.26%

粗製サボニンをアセトン處理後無水メタノールにとかし無水エーテルを加へて析出せしめ 1 夜氷冷後上清を傾瀉し器壁に附著せる沈澱を更に 2 回同様にして精製したるものは得量多く 58% に達し且精製品と同様の分析數を與ふるもフェーリング液を冷時に黄變す。幾分遊離の糖を夾雜するものなるべし。乾燥品の Zp は 165-95° なり。

サボニンの加水分解

サボニン 5g を 4% 硫酸含有の 40% アルコホル 200cc にて水浴上に 5 時間分解し多量の水を加へたるに類白色の沈澱 8g を得たり。これを多量のアセトンにとかし骨炭脱色後濾液を濃縮し水を加へて析出する沈澱 (0.5g) を去り濾液を一旦乾涸したる後メタノールに溶解し水を加へて 3 部分に分ち其各を更にメタノールと水とより再結晶し第二の分割部分よりプロサボゲン 0.46g を得たり。

サザンクワプロサボゲン

プロサボゲンは無色の結晶性粉末にして Zp. 190-208°, 純アルコホル、メタノールに可溶、多量のアセトン及 80% アルコホルに溶解し、水、アルカリ (熱時にも)、エーテルには不溶なり。然し水とアルコホルの存在する時はエーテルに溶解す。リーベルマン反應は紫紅色より暗色となり、ビアル試薬にて少しく暗色となるも青

緑色とならず。メタノール溶液は水によりて発泡す。短時間の加水分解にてはフェーリング液を還元すず。

分析 100° に減壓乾燥したり。

物質	0.0449	CO ₂ 0.10 3	H ₂ O 0.0373	C 66.38	H 9.30
	0.0485	0.1213	0.0405	66.83	9.16
平均				66.61	9.23
計算	C ₅₀ H ₈₀ O ₁₄			66.33	8.91

分子量測定

ラスト (100° 減壓乾燥以下同じ)

物質	0.0085	樟腦 0.0887	降下 4.03°	m.G. 951.2
計算	C ₅₀ H ₈₀ O ₁₄			904.6

滴定。アルコール溶液にて行ひたり。但し検體は少しく不純品 (C.6491. H. 9.28) を用ひたり。

物質 0.0554 冷時 N/10-KOH 0.68cc 30 分鹼化後更に 0.945cc 計 1.625cc これをデラクトンモノカルボン酸として分子量 1022.7 エンドサボゲニン定量 検體は滴定と同様の物質を用ひたり。

物質	0.0511	3% 硫酸 15cc, 150°, 3 時間	サボゲニン 0.0380	74.36%
計算	C ₄₄ H ₇₂ O ₈ /C ₅ H ₈₀ O ₁₄ 80.53%			

グルクロン定量。

物質 0.1507 フロログルチッド 0.0073 即グルクロン 0.0219 14.53% 計算グルクロン 1 分子として 19.47%

プロサボゲニンの加水分解。

プロサボゲニン 1g を 3% 硫酸 30cc と管中 150° に 3 時間加熱し生成したる褐色のエンドサボゲニン 0.77g をアセトンにとかし骨炭と長く煮沸し濾液を濃縮し水を加へ析出せる油状の物質を一旦素焼板上に粉末とし更にアセトンと水とより精製すること數回無色とすることを得ざりしも Zp. 201° にて一定せるエンドサボゲニン 0.58g を得たり。

帶淡褐色結晶性の粉末にしてアセトン、メタノールに易溶、水に不溶なり。リーベルマン試薬にて紫紅色より暗色となる。このものを更に同様に處理して加水分解せしむるも變化なし。

分析, 100° に減壓乾燥せり。

物質	0.0484	CO ₂ 0.1283	H ₂ O 0.0416	C 72.29	H. 9.62
	0.0493	0.1229	0.0380	72.89	9.18
平均				72.34	9.40
計算	C ₄₄ H ₇₂ O ₈			72.48	9.96

又アセトンと水とより分割沈澱せしめたるものも初めの部分に Rp. 201° のも

のを析出し分析数も同様なり。

物質 0.0437 CO₂ 0.1157 H₂O 0.0388 C 72.23 H.9.94

分子量測定(乾燥品)

ラスト.	物質 0.0080	樟腦 0.0833	降下 5.5°	M.G. 698.5
	0.0083	0.0841	5.45°	724.4
平均				711.5
計算	C ₄₁ H ₇₂ O ₈			728.5

滴定 アルコホル溶液にて行ひたり。物質 0.0524 冷寺 N/10=KOH 0.27cc
30分 鹼化後 1.26cc デラクトンとして分子量 831.8

サボニン中の糖

プロサボゲニン濾過後の濾液は常法により中和後分割したるにアルコホル不溶分は殆なく且此部分はナフトレゾルチンによりてグルクロン酸の存在を示さず。

アルコホル可溶性の部分は 4.16g あり。

ビアル反應強くペントーゼの存在を示す。先づこれをビール酵母にて 35° に放置するも炭酸を發生せず。Syrup 0.2g を硝酸にて酸化せるに難溶性の沈澱あり稀アルカリに溶解し再び酸性として得たるものは Zp. 215° にして粘液酸特有の結晶形を示し純ガラクトーゼ(Merck)より製造したる粘液酸 Rp. 215° と混融せるに温度下降せず。又 Syrup 1g を鹽酸フェニルヒドラチン 2g. 醋酸曹達 3g と 1 時間加熱し冷後析出物をアセトンにて洗ひ不溶性の部分をメタノールより再結晶し黄色のオサザーン 0.3g を得たり。Zp. 185° にして標本と混融によりて確かめたり。

次に Widtsoe 及 Rosenthaler 反應によりてメチルペントーゼの存在を示さず又 38% 鹽酸と蒸餾するに 餾出液はフロ、グルチンによりて黒綠色を呈し其アミルアルコホル溶液はペントーゼ特有の吸収線を現はす故に其一部につき Bethrand 法によりて試験するにキシローゼの存在を示さず。次にデフェニルヒドラツオンを製せんとしたるに目的を達せず。更に Syrup を 3% 硫酸含有の 40% アルコホルにて 5 時間再分解に附しデフェニルヒドラチンを反應せしめたるも 目的を達せず。

プロサボゲニン中の糖

エンドサボゲニンを濾去したる水溶液は常法に従ひて處理したるにアルコホル可溶分は殆なく不溶分は 0.13g あり、ナフトレゾルチンによりてエーテル液は紫紅色を呈し且これより得たる遊離酸は硝酸々化によりて粘液酸を得ず。恐らくはグルクロン酸なるべし。

(昭和 5 年 3 月 東京衛生試験所製薬部にて)