Journal of the Pharmaceutical Society of Japan

Editor: Y. ASAHINA

[YAKUGAKUZASSHI]

Subeditor: K. HATTORI

S. Keimatsu und K. Yokota: *Ueber Organoselenverbindungen* (I Mitteilung).

Vor kurzem haben E. Hilbert und dessen Mitarbeiter publiziert (Americ. Soc 51, 1526), dass es ihnen durch Verbesserung der bisherigen Methode gelungen ist, o-, m- und p- Oxydiphenylsulfid zu synthetisieren und haben festgestellt, dass unter diesen Verbindungen die bakterizide Wirkung bei der p- am grössten, bei der m- schon schwächer und bei der o- Verbindung am geringsten ist.

Verff. haben in der Vermutung, dass, wenn schon den Phenolschwefelverbindungen solche bakterizide Wirkung zukommt, die analogen Phenolselenverbindungen zum mindesten ähnliche Wirkung entfalten können, die Synthese der bisher in der Literatur nicht verzeichneten Substanzen in Angriff genommen. Sie haben die von Hilbert und Mitarbeitern zur Synthese des Oxydiphenylsulfid angewandte Ziegersche Methode [B. 23, 2469 (1890)] benutzt und durch Kondensation von Selenophenol mit p- und o-Anisidindiazoniumsalzen p- und o- Methoxydiphenylselenid hergestellt.

p-Methoxydiphenylselenid: K.P. (1 mm) 150–151°
F.P. 45,3° (korrig).

Glänzende farblose Blättchen aus verd. Alkohol.

o-Methoxydiphenylselenid: K.P. (1 mm) 150–151°

Hellgelbe durch Abkühlung nicht kristallisierende Flüssigkeit. Bei dem Versuche diese Methoxyderivate durch Bromwasserstoff zu entmethylieren, um zu den Oxyderivaten zu gelangen, kommt man nicht zum Ziel, indem die Reaktion nicht bei der Bildung von Oxyderivaten stehen bleibt, sondern weiter geht und nach unten angegebenem Schema Diphenyldiselenid und Bromphenol zeitigt.

Die Oxyderivate sind in der Wärme gegenüber Mineralsäuren nicht stabil, sodass die Methoxyderivate als Ausgangsmaterial zur Gewinnung von Oxyverbindungen nicht geeignet sind. Daher wurden an Stelle der Methoxyverbindungen die Acetoxyderivate gebraucht.

An Stelle des p-Anisidin gingen Verff vom p-Aminophenolessigester aus, welches sie nach L. Galatis [B. 59, 843 (1926)] erhielten und dessen Diazoniumsalz sie mit Selenophenol kondensieren liessen, wobei sie das neue p-Acetoxydiphenylselenid erhielten. Durch Verseifen desselben gelangten sie zu dem gewünschten p-Oxydiphenylselenid.

p-Acetoxy-diphenylselenid: K.P (1 mm) 156–157°; F.P. 55° (korrig).

Farblose Nadeln aus verd. Alkohol.

p-Oxydiphenylselenid: K.P (1 mm) 158–159°; (0,2 mm) 148°

F.P 57° (korrig). Farblose Nadeln aus Petrolaether. Besitzt narkotische Eigenschaften.

Zur Herstellung der Oxyderivate wurden solche Körper, deren Hydroxyl durch Methyl- oder Acetylgruppen blockiert ist, gewählt. Zwar wurde der einfachere Weg, nämlich die Kondensation des freien Aminophenoldiazoniumsalzes mit Selenophenol in Betracht gezogen, aber in Anbetracht der Tatsache, dass schon die Kondensation des Diazoniumsalzes mit Thiophenol [Amer. Soc (1929) 1532] nach dieser Methode versagt hat, noch nicht ausgeführt worden, aber diese Reaktion soll später untersucht werden.

Verff. haben vom p-Aminophenolessigester ausgehend vier neue Selenverbindungen bekommen:

(I) Selencyan-p-acetoxyphenyl.

Dasselbe wurde durch Kondensation des p- Aminophenylessigester-Diazoniumsalzes mit dem von Muthmann und Schroeder [B. **33**, 1766 (1900)] hergestelltem Selencyankalium erhalten. K.P (1 mm) 155–156°. F.P 67° (korrig). Hellgelbe Nadeln aus verd. Alkohol, löslich in Chloroform, schwer löslich in Aether.

(II) Selenohydrochinon.

Dasselbe wurde aus Selencyan-p-acetoxyphenyl durch Verseifen mit Alkali erhalten. K.P. (1 mm) 105°. F.P 56–57°. Gleich nach der Destillation bildet sie weisse Kristalle. Die Substanz ist aber leicht oxydabel, sie wird schon an der Luft allmählich gelb und liefert p, p'-Dioxydiphenyldiselenid (III).

(III) p, p'-Dioxydiphenyldiselenid.

Selenohydrochinon wird entweder an der Luft autoxydiert oder durch Anwendung von Ferrichlorid oxydiert. F.P. 134°. Glänzende gelbe Bättchen aus Petrolaether. Durch Wasserstoffsuperoxyd nimmt Selenohydrochinon allmählich Gelbfärbung an, unter zeitweiliger Bildung des Diselenid, doch zersetzt sich dasselbe und gibt schliesslich freies rotbrannes Selen. Diese Reaktion soll später eingehend untersucht werden.

(IV) p, p'-Diacetoxydiphenyldiselenid.

p, p'-Dioxydiphenyldiselenid wird nach A. Verley (Ber **34**, 3354) in Pyridinlösung mit Essigsäureanhydrid acetyliert. F.P 90,5° (korrig). Gelbe Nadeln aus verd. Alkohol.

Verff. haben ferner das von Wilson, Robinson (Soc. (1928) 2287) hergestellte p-Aminodiphenyldiselenid als Ausgangsmaterial zur Synthese des p-Oxydiphenyldiselenid gewählt und ersteres diazotiert, um die Aminogruppe durch Hydroxyl zu ersetzen, wobei aber der grösste Teil verharzt, während nur ein geringer Teil als schleimige Flüssigkeit Zurückbleibt. Letztere stellt der Analyse nach ein noch unreines Oxyderivat dar und konnte wegen geringer Ausbeute nicht weiter geprüft werden.

Zum Schluss teilen Verff. mit, dass es ihnen gelungen ist, das Diphenyldi-

selenid in guter Ausbeute leicht zu gewinnen, indem sie die Methode von Wssewolod Nekrassow, der durch Einwirkung von Chlorpikrin auf Merkaptan das Disulfid erhielt [B. 62, 2091 (1929)], auf Selenophenol übertragen haben, wodurch sie das reine Diphenyldiselenid in besonders einfacher Weise mit guter Ausbeute (gelbe Nadeln. F.P. 63,5°) bekommen haben.

Verff. wünschen die Synthese der Organoselenverbindungen weiter fortzusetzen.

Shizuo Hattori: *Konstitution des Daphnins.*

(Aus d. Botan. Institut d. Kaiserl. Universität zu Tokyo.)

[Eingegangen am 29. April 1930]

Die Konstitution des Daphnins, des längst bekannten Glukosids des Daphnetins, das zuerst in der Rinde von *Daphne Mezereum* L.¹⁾ entdeckt wurde, ist bis heute noch nicht ermittelt worden. Zwar hat früher P. Leone²⁾ ein Glukosid des Daphnetins mittelst Acetobromglukose synthetisiert, und F. Wessely u. K. Sturm³⁾ haben neulich festgestellt, dass bei demselben Produkt die Glukosidbindung an der 8-Stellung des Daphnetins liegt (I). Weder Leone noch Wessely u. Sturm waren jedoch imstande, die Identität dieses synthetischen Produktes mit dem natürlichen Daphnin nachzuweisen, da die Autoren anscheinend das letztere nicht in Händen gehabt hatten.

Vor kurzem hat T. Asai⁴⁾ aus den Blüten sowie auch aus den Blättern und Rinden von *Daphne odora*, THUNBERG ein Glukosid isoliert, dessen Identität mit dem Daphnin⁵⁾ ausser allem Zweifel feststand. Dieses Präparat, welches

1) Vauquelin: Ann. de Chim, 84 (1812), 173.

2) Gazz. Chim. Ital., 55 (1925), 674.

3) B., 62 (1929), 115.

4) Acta Phytochimica, 5 (1930), 9.

5) Die in der Literatur stehende Angabe des Schmelzpunktes des Daphnins (um 200°) bezieht sich ohne Zweifel auf eine nicht völlig reine Substanz.

藥 學 雜 誌

第五十卷 第六號 (累號五百八十) 昭和五年六月發行

— 報 文 —

ゼレンの有機化合物に就て (第一報)

藥學博士 慶松 勝左衛門

藥學士 横田 嘉右衛門

S. Keimatsu u. K. Yokota: Ueber Organo-selen-verbindungen. (I)

曩に E. Hilbert 及びその協力者は〔Am. Soc. **51**, 1526〕從來存せる二、三氏の方法を改良し初めて *o*-, *m*-, *p*-, Oxy-diphenylsulfid の合成に良成績を挙げ分析によりそれらの構造を確定し更に消毒作用の比較試験を行ひ、その結果 Para 誘導體最も優れ Meta 之に次ぎ Ortho 最下位にある事を報告せり。

著者等は Hilbert 氏等の得たる フェノール硫黄化合物にして如斯殺菌力あらんには、硫黄と諸性質の類似せるゼレンにて硫黄を置換せるフェノール・ゼレン化合物にも亦かかる作用あるべきを想像し未だ文獻に表はれざるそれらの合成研究に著手せり。

ゼレン化合物の合成に當り参照せる方法を採録比較すれば、

1. Hinsberg 法〔B. **36**, 107 (1903)〕

上式の如く Phenol と Benzol-sulfinsäure とより Oxy-diphenyl-sulfid を得たれ共蒸溜の際分解すと稱し精製を経ず直ちに Methylieren を行ひ、Methoxy 誘導體となし蒸溜により精製を行ひ、次で濃鹽酸にて Entmethylieren を行ひたるも Oxy 誘導體の得量は極めて悪し。

2. Lecher 法〔B. **58**, 413 (1925)〕

Lecher は a 式の如く直接 Phenol と Phenylsulf-chlorid とを縮合せしめ反應成

績體をメチル化し Methoxy 誘導體として取り出し更に之より Oxy 誘導體を得たどれもいづれも得量悪し. この外 Lecher は Grignard 試薬に對する Phenyl-sulf-chlorid の反應を試みたり. Hilbert は之を應用し b 式の如く Phenylsulf-chlorid と *p*-Methoxy-phenyl-magnesiumbromid とを反應せしめ相當なる得量にて *p*-Methoxy-diphenylsulfid を得次でブロム水素酸にて Entmethylieren を行ひ Oxy 誘導體を得たり.

3. Zieger 法 [B. **23**, 2469 (1890)] を E. Hilbert (loc. cit.) が改良せる方法.

上式の如く Na-thiophenolat へ, *o*-, *m*-, *p*-Anisidindiazoniumchlorid を反應せしめ茲に初めて好得量にて, Methoxy 誘導體を得, 次で HBr と無水醋酸にて Methoxy を Acetoxy に換へ, Alkaliverseifen により割然と, *o*-, *m*-, *p*-Oxy 誘導體を得たり.

依て著者等は Selen 化合物の合成に當り, 前記の方法中最も優れたる第三法にて目的を達せんとせり.

即ち原料なる Selenophenol は W. Wuyts [Bl. (4) **5**, 405 (1909)] の方法により Brom-benzol より Grignard 試薬を製し之にゼレンを作用せしめ Phenyl-seleno-magnesiumbromid となし, 之を酸性の水にて分解して製造す. 之と Anisidin-diazonium 鹽とより余等は Hilbert 及び Zieger の場合と全く同様に *o*- 及び *p*-Methoxy-diphenylselenid を新に合成するを得たれども HBr の如き脱メチル劑によりて Entmethylieren を行ひ, 目的の Oxy-誘導體を得る能はず. 此際反應は Oxy-誘導體に止まらず更に進行し Diselenid 及び Brom-phenol を得たり.

(反應)

1. $\text{C}_6\text{H}_5\text{-SeNa} + \text{Cl-N=N-C}_6\text{H}_4\text{-OCH}_3 = \text{C}_6\text{H}_5\text{-Se-C}_6\text{H}_4\text{-OCH}_3(o \text{ u. } p) + \text{N}_2 + \text{NaCl}$
2. $\text{CH}_3\text{O-C}_6\text{H}_4\text{-Se-C}_6\text{H}_5 + \text{HBr} = \text{HO-C}_6\text{H}_4\text{-Se-C}_6\text{H}_5 + \text{CH}_3\text{Br}$
 $\text{HO-C}_6\text{H}_4\text{-Se-C}_6\text{H}_5 + \text{HBr} = \text{HO-C}_6\text{H}_4\text{Br} + \text{C}_6\text{H}_5\text{SeH}$
 $2\text{C}_6\text{H}_5\text{-SeH} + \text{O} = \text{C}_6\text{H}_5\text{-Se-Se-O-C}_6\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$

反應は上記の如く進行するものと思ひ得べく即ちゼレン化合物の脱メチル反應は硫黄化合物の場合とその軌を一にせず, Oxy 誘導體は溫時無機酸にて不安定なる事を窺知し得べく, 従つて Methoxy 誘導體は Oxy 誘導體の製造原料として適當ならざる事を知りたり.

依つて若し溫時無機酸にて處理する事を必要とせざるが如き原料を合成し得たらんには所期の目的に到達し得べきを信じ茲に Methoxy 誘導體に代ふるに Acetoxy 誘導體の合成を企圖せり, 即ち *p*-Anisidin に代ふるべき *p*-Amino-phenol の

(OH) の Essig-ester を L. Galatis [B. **59**, 848, (1926)] の方法にて合成しその Diazonium 鹽と Selenophenol との縮合により第一に *p*-Acetoxy-di-phenylselenid を新に合成し次で鹼化を行ひ目的の *p*-Oxy-di-phenylselenid を合成する事を得たり.

(反應)

同方法により *o*-, *m*-Oxy 誘導體を得んとせるも既に原料なる *o*-, *m*-Aminophenol の Essigester の合成に於て, *p*-Aminophenol の Essigester の製法をそのまま踏襲し得ざる點あり更に一考を要する處なり.

前述の如く Oxy 誘導體合成の原料としてはいづれも (OH) を Methoxy 又は Acetoxy として防備せるものを用るたれども, かくの如き防備なき Aminophenol 自身の Diazonium 鹽と Selenophenol との縮合により直ちに Oxy 誘導體を合成し得べき理なれども既に [Am. Soc. **1929**, (1532)] Thiophenol と Aminophenol とにてこの反應を行ひ直ちに Oxy 誘導體を得んとして成功せざる記載あるを以て敢て後日の検討に俟つ事とせり.

次に著者等は茲に得たる *p*-Aminophenol-essigester を原料として四箇の新 Selen化合物を得たり.

p-Amino-phenol-essigester の Diazonium 鹽と Muthmann, Schröder [B. **33**, 1766 (1900,)] による Selencyan, Kalium SeCNK との縮合によりて得らる.

(反應)

Selencyan-*p*-acetoxy-phenyl のアルカリ verseifen によりて得らる.

(反應)

Seleno-hydrochinon を空氣中に於て自然に酸化するか或は、鹽化鐵の如き緩和なる酸化剤を用ゐて酸化を行ふ.

(反應)

4. *p-p'*-Diacetoxy-di-phenyl-diselenid.

p-p'-Dioxy-diphenyl-diselenid を無水醋酸の Pyridin 溶液にて Acetylieren を行ひ, 容易にこのものを得たり.

(反應)

前述の外余等は又 *p*-Oxy-di-phenylselenid 合成の原料として偶々 Wilson Robinson [Soc. 1928 2287] がセレンの Quadrivalenz の研究として調製せる *p*-Amino-di-phenyl-selenid (F. P. 93°) を藉り之につき Diazotieren を行ひ Amino 基を Oxy 基に變じ目的の Oxy 誘導體を得んとし, 種々條件を換へ實驗を繰り返せるも大部分は樹脂化し少量の粘稠なる液體を得たるに止まり, このものは當然固化すべきに固化せず分析の結果未だ不純なる Oxy 誘導體なる事を察知し得たれども分量少きため研究を保留せり.

最後に余等は上記の研究に間接に關係ある物質, Di-phenyl-di-selenid の簡易にして且つ好得量ある合成法に成功したるを以て之を記述すべし.

従來此物質の製法としては下式の如く Diphenyl-sulfon に階段的に Selen を作用せしむる方法 (a) 及 Selenophenol へ H_2O_2 の如き適當なる酸化剤を作用せしむる方法 (b) あり.

然るに a 法に於ては既に Diphenyl-sulfon の得量悪しきのみならず之に Selen を附加するには, 長時間加熱せざるべからず. 而も Diselenid の得量極めて悪し.

b 法は少量の製造には可なれ共稍多量の Diselenid 製造に 廉價ならざる過酸化水素を使用する事は好しからず.

従つて此兩法とも探つてもつて Diselenid の製法となすに足らずと信ず.

偶々 Wssewolod Nekrassow [B. 62, 2091 (1929)] は Mercaptan 類に對する Chlorpicrin の作用を研究し, その際反應は下式の如く進行し反應成績體として Disulfid を好得量にて收得せり.

余等はこの方法を早速 Selenophenol に應用せんことを企てたるに幸にして其希望を達し従來の方法に比して極めて簡易に且つ純粹なる Diselenid を得量よく製

造する事を得たり.

(反應)

尙ゼレン有機化合物の合成的研究は更に繼續中に屬す.

實 驗 之 部

可及的空氣を避け Selenophenol 30g (1mol.) を, NaOH 15g (2mol.) を 3 倍量の水に溶解せる滴液に溶かし之へ銅粉 10g を加へたるものを A 液とす. *p*-Anisidin 30g (1.28mol.) を濃鹽酸 57g (2.5mol.) に溶解し之を水 200 cc にて稀釋し之へ 0°C に於て NaNO₂ 17g (1mol.) を 85cc の水溶液として徐々に加へ Diazonium 鹽の水溶液を調製したるのち過剰の無機酸を Na-Acetate にて中和す之を B 液とす.

A 液を三頸コルベンに納め Selenophenol の酸化を防ぐため之へ CO₂ を通じ攪拌しつつあるなかへ 0°-5° に於て B 液を徐々に滴下すれば圓滑に N₂ を放ち反應の進行を見るべく *β*-Niphtol により呈色反應無きを以て反應の完結を知る. 次で HCl を加へ酸性となし Zn 末を加へ加熱し, 一部 Selenophenol の酸化により傍生せる Diphenyl-di-selenid を Selenophenol に還元し次で水蒸氣蒸溜により之を驅出したる後, 析出せる樹脂様物質を冷後 Aether にて溶取し, 酸及びアルカリにて洗滌し, 可溶性部分を去り茲に中性物質の Aether 溶液を得. 芒硝にて乾燥後 Aether を去り Rückstand を蒸溜に附すれば Kp₁ 150-151° に於て稍芳香性を有する粘稠なる微黄色の液體 31g を得. 冷却により固結し稀アルコールより再結晶を行へば融點 46.3°(corr.) 光澤ある薄片狀結晶を得. 得量理論數に對し 70%.

$$\begin{aligned} 0.1982 \text{ Sbst.} : 0.0586 \text{ Se} - \text{C}_{13}\text{H}_{12}\text{OSe}, \text{ Ber. Se } 30.08 \% \\ \text{Gef. Se } 29.56 \% \end{aligned}$$

即ち *p*-Methoxy-diphenylselenid を合成し得たり.

之と全く同様にして *o*-Anisidin と Selenophenol とより *o*-Methoxydiphenylselenid を得たり. 沸點は *p*-誘導體に等しく 1mm. に於て 150-151° なれども常溫に於て結晶として得る事不能. 得量理論數に對し 70%.

$$\begin{aligned} 0.1581 \text{ Sbst.} : 0.0466 \text{ Se} - \text{C}_{13}\text{H}_{12}\text{OSe}, \text{ Ber. Se } 30.03 \% \\ \text{Gef. Se } 29.51 \% \end{aligned}$$

かくして得たる Methoxy 誘導體より HBr 及び無水醋酸との混液にて Methyl 基を離脱し目的の Oxy 誘導體を得んとせる事は不成功に終はれり. 即ち冷時無水

醋酸へ 48% HBr を加へ、物質を之に和す。常温にては反應起らず。温浴にて 85° に加温すれば反應液は黒褐色を呈す。減壓にて HBr 等を去り残渣を一旦 Verseifen せるのちアルカリ不溶の部分を Aether に溶取す。このアルカリ不溶の部分は悉く Diphenyl-diselenid (Fp 63.5°) なり。アルカリ可溶の部分を蒸溜に附するに、少量の Phenol 臭を有する物質とコルベン残渣の樹脂様物とを得たり。Phenol 臭ある物質は Halogen の定性反應を示し恐らく不純なる Brom-phenol なるべし。p-, o-methoxy 誘導體に就き全く同様の結果にして、すくなくも 1mm に於て 150° 以上に於て溜出すべき Oxy 誘導體は得られざりき。

2. p-Acetoxy-diphenylselenid $\text{C}_6\text{H}_5\text{-Se-C}_6\text{H}_4\text{-O-COCH}_3$

本品合成に當り原料として使用せる p-Amino-phenol-essig-ester に就き L. Galatis の考案に係る製法は聊か興味あるを以て特に其概要を述べることにすべし。即ち Alkohol 溶液に於て p-Aminophenol と Benzaldehyd との縮合により好得量にて得らるべき Benzyliden-p-aminophenol $\text{HO-C}_6\text{H}_4\text{-N}=\underset{\text{H}}{\text{C-C}_6\text{H}_5}$ (F.p. 181°) を濃アルカリ溶液となし之へ冷時無水醋酸の Benzol 溶液を加へ振盪し乍ら Acetyl 化を行ふ。かくして Benzyliden-p-aminophenol-essig-ester $\text{CH}_3\text{-CO-O-C}_6\text{H}_4\text{-N}=\underset{\text{H}}{\text{C-C}_6\text{H}_5}$ (F.p. 92°) は理論数の 63% の得量あり。次で之を Benzol に溶解し冷時稀硫酸にて振盪し加水分解を行へば、遊離せる Benzaldehyd は Benzol に移行し、p-Amino-phenol-essigester は H_2SO_4 鹽となり水に溶存す。NaHCO₃ にて中和し、析出し來る物質を CHCl₃ にて溶取し乾燥後蒸溜によりて精製を行ふ (Kp. 2.5mm 123°, Fp. 75°)。本品は純白針狀結晶にして理論數に對し 60% の收得あり。

如斯して得たる p-Amino-phenol-essigester を常法により Diazo 化を行ひ、過剰の無機酸を Na-acetat にて中和し、これに要せる醋酸ソーダ量を秤量し置く。之を A 液となす。

A 液 $\left\{ \begin{array}{l} \text{p-Aminophenol-essig-ester } 17.6\text{g (1 mol.)} \\ \text{H}_2\text{SO}_4 \text{ } 14\text{g } \text{H}_2\text{O } 550\text{cc.} \\ \text{NaNO}_2 \text{ } 45.8\text{cc (NaNO}_2 \text{ } 17.53\text{g in H}_2\text{O } 100\text{cc.)} \\ \text{Na-acetat } 16.1\text{g} \end{array} \right.$

一方 Selenophenol を當量のアルカリにて水溶液をなし(但し反應に預る Amino-phenol-essigester の分解を慮り過剰のアルカリを避く)之へ A 液調製に使用せる Na-acetat に當量の NaHCO₃ を加へ更に銅粉を添加し全體を B 液とす。

B 液 $\left\{ \begin{array}{l} \text{Selenophenol } 18.3\text{g (1 mol.)} \\ \text{NaOH } 45.74\text{cc (NaOH } 10.18\text{g in H}_2\text{O } 100\text{cc)} \\ \text{H}_2\text{O } 50\text{cc} \\ \text{NaHCO}_3 \text{ } 9.4\text{g} \\ \text{銅粉 } 6\text{g} \end{array} \right.$

温度 6° – 5° に於て攪拌し乍ら B 液中へ A 液を徐々に滴下すれば圓滑に N_2 を放ち β -Naphtol により Diazo 反應消失する反應の終末を明瞭に看取し得べし。析出せる油狀物質を Aether にて溶取し、乾燥後減壓に於て蒸溜を行へば、1 mm. 152° 附近より黄色の溜分を得、大部分は微黄色にして 156 – 157° に於て溜出し、冷却或は衝撃により固結す。Alkohol より再結晶を行へば、純白針狀結晶を得、融點 55° 。溜分の黄色を呈せるは、檢索の結果、反應中 Selenophenol の酸化により生じたる Diphenyl-diselenid (F.P. 63.5°) を含有せるに依る事を知りたり。得量 16.08g. 50% (理論)。

0.1724 Sbst. ; 0.0459 Se— $C_{14}H_{12}O_2$ Se. Ber. Se 27.19 %
Gef. Se 26.68 %

即ち *p*-Acetoxy-diphenyl-selenid を合成し得たり。

前記 Diselenid を混在せる *p*-Acetoxy 誘導體は、Oxy 誘導體の原料としては、精製の必要なく、そのまま過剰のアルカリにて鹼化を行へば、Diselenid は不鹼化性物質として全く純粹なる形にて分離するを得べし。アルカリ可溶の分を酸性とすれば油狀物質を析出し來る。之を Aether にて溶取し乾燥後減壓にて蒸溜を行へば、 K_{p1} 158 – 159° , $K_{p0.2}$ 148° にて溜出し來り溜出後固結す。之を石油エーテルより再結晶を行へば光輝ある純白針狀結晶を得。融點 57° 舌端麻痺性の辛味を有す。得量 73% (理論)。

0.1477 Sbst. : 0.0461 Se— $C_{12}H_{10}O$ Se Ber. Se 31.77 %
Gef. Se 31.26 %

即ち *p*-Oxy-di-phenyl-selenid を得たり。

A 液 $\left\{ \begin{array}{l} \gamma\text{-Aminophenol-essig-ester } 10\text{g} \\ H_2SO_4 \quad 8\text{g} \quad H_2O \quad 300\text{cc} \\ NaNO_2 \quad 21.45\text{cc} \quad (21.3\text{g } NaNO_2 \text{ in } H_2O \quad 100\text{cc}) \\ Na\text{-acetat } 9.1\text{g} \end{array} \right.$

B 液 $\left\{ \begin{array}{l} Selenocyanalkali \quad 9.6\text{g} \\ H_2O \quad 50\text{cc} \\ NaHCO_3 \quad 5.6\text{g} \\ \text{銅粉} \quad 5\text{g} \end{array} \right.$

攪拌しつつ B 液中へ A 液を滴下す。約 2 時間にて反應は完結し油狀物質を析出し來る。之を $CHCl_3$ にて溶取し、乾燥後減壓にて蒸溜を行へば 1 mm. 155 – 156° にて溜出しのち固結す。稀アルコールより再結晶により微黄色針狀結晶となる。Fp. 67° Aether に難溶なり。得量 7g 44% (理論)。

0.1438 Sbst. : 0.0486 Se— $C_9H_7O_2N$ Se Ber. Se 32.96 %
Gef. Se 82.45 %

5. Selenohydrochinon. $\text{HSe}-\langle \text{C}_6\text{H}_4 \rangle-\text{OH}$

Selencyan-*p*-acetoxy-phenyl 5g を Alcohol 20g に溶解し之へ Traubenzucker 2g を添加し, NaOH 3.5g の水溶液 (10cc) を混和し, 温浴上に於て水素を通じ乍ら鹼化を行ふ. Traubenzucker を使用する 目的は, Selenohydrochinon の酸化を防止するためなり. 鹼化終了後 Alcohol を除き Rückstand を水に溶解し一旦 Aether にて不鹼化性物質を除き, アルカリ水溶液を酸性となし析出せる油分を Aether にて溶取し速に乾燥後蒸溜を行ふ. 溜出後固結し漸次黄色を帯び來り被酸化性顯著なり. 溜出當初は純白にして結晶性物質なり. K_p 105°. F_p 56–57° 得量 70% (理論).

0.1681 Sbst. : 0.0754 Se — $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}$ Se. Ber. Se 45.70 %
Gef. Se 44.86 %

6. *p-p'*-Dioxy-di-phenyl-di-selenid. $\text{OH}-\langle \text{C}_6\text{H}_4 \rangle-\text{Se}-\text{Se}-\langle \text{C}_6\text{H}_4 \rangle-\text{OH}$

Selenohydrochinon を空氣中に露出し置けば漸次黄色を帯び來り Diselenid 形成さる. 又稀 FeCl_3 水溶液にて振盪する時は速かに本物質を得べし. 但し H_2O_2 の如き酸化剤にては漸次黄色を呈し一旦 Diselenid を形成するが如きも遂に赤褐色の Selen を遊離するに至る. 依て本品を得るには, 自然酸化によるか或は極めて緩和なる酸化剤によらざるべからず. 尙酸素による Selen の置換現象につきては後日の検討に俟つ事とせり. 本化合物は石油エーテルより再結晶を行へば光輝ある薄片結晶を得. F_p 134° 得量は殆んど理論數に近し.

0.1211 Sbst. : 0.0552 Se — $\text{C}_{12}\text{H}_{10}$ Se₂ Ber. Se 45.98 %
Gef. Se 45.59 %

0.0110 Sbst. in 0.103g Campher : $\Delta = 12.5^\circ$ (Rast)

Mol. Gew. 344.2 Gef. Mol. Gew. 341.75

7. *p-p'*-Diacetoxy-diphenyl-di-selenid. $\text{CH}_3\text{-OCO}-\langle \text{C}_6\text{H}_4 \rangle-\text{Se}-\text{Se}-\langle \text{C}_6\text{H}_4 \rangle-\text{O-CO-CH}_3$

p-p'-Dioxy-di-phenyl-di-selenid 0.96g をとり A. Verley (B. 34, 3354) に従ひ, 無水醋酸 0.3g を Pyridin 2.2g に溶解せる溶液にて Ester 化を行ふ. 温浴にて暫く加熱したる後 20cc の水に稀釋し茲に析出せる油分を CHCl_3 に溶取したる後 CHCl_3 を去り残留せる油分を稀アルコールより再結晶を行ふに美麗なる黄色針狀結晶を約 0.9g を得たり. 得量 75% (理論) F_p 90.5°

0.726 Sbst. : 0.0633 Se — $\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{O}_4\text{Se}_2$ Ber. Se 36.97 %
Gef. Se 36.67 %

即ち Diacetyl 誘導體を合成し得たり.

8. Selenophenol に對する Chlorpicrin の作用

(Diphenyl-di-selenid の合成) $\langle \text{C}_6\text{H}_5 \rangle-\text{Se}-\text{S}-\langle \text{C}_6\text{H}_5 \rangle$

Selenophenol 50g を Alkohol (352cc) 性 KOH(17.6g)に溶解せる液へ Chlorpicrin 17.6g の Alkohol (17.6cc) 溶液を徐々に滴下すれば漸次發熱を伴ひ反應進行し盛んに泡出し KCl を析出し全液は赤褐色を呈す。更に溫浴上にて暫く加溫し泡出の竭るをまち、熱時吸引濾過により KCl を分別す。赤褐色の濾液よりは放冷と共に全く純粹の Diphenyl-diselenid を析出す。沈澱を集め更に濾液を濃縮しそれより Diselenid を回收し得べく、かくして 44.7g の物質を收得せり。得量 96% (理論) 美麗なる黃色針狀結晶にして F.p. 63.5° を示し文獻記載の融點と一致するものなり。

ダフニンの構造

服部 靜夫

S. Hattori: Konstitution des Daphnins

セイヤウオニシバリ (*Daphne Mezereum*) の樹皮中に存する配糖體ダフニン (Daphnin) は古くより知られたる物質なるが、其の構造に關してはダフネチン (Daphnetin) 卽ち 7,8-デオキシクマリンのモノグルコシドなることの明らかにせられたるのみにして、糖の位置に就いては未だ實驗的證明なし。

曩に P. Leone [Gazz. Chim. Ital. **55**, (1925) 673.] はダフネチンをアセトブROOM グルコーゼとアルカリ性溶液中に於いて反應せしめて一のダフネチン配糖體のテトラアセチル誘導體を得。これをアムモニア瓦斯を以つて分解してアセチル基を脱してダフネチン配糖體を得たり。その融點 216-217° にして、氏は是を以つて天然ダフニンと恐らく同一物なるべしと稱せり。其の後 F. Wessely 及び K. Sturm 兩氏は Leone の實驗を反覆して同一のダフネチン配糖體を得。且つ此に於ける葡萄糖の位置の 8 なることを明らかにしたり。然れども氏等は此の合成配糖體が右旋性 ($[\alpha]_D^{25} = +29.4$) なることを觀察し、こは甚だ注意すべき事なりと附記せり。Leone も Wessely u. Sturm も *Daphne Mezereum* の皮部より Daphnin を抽出して上記合成配糖體との異同を檢せざりき。然るに理學士淺井東一氏(熊本・第五高等學校) は本邦に普通なるヂンテウゲ (*Daphne odora* THUNBERG) の花・葉・皮部にダフニンの含有せらるることを發見せられたり [Acta Phytochimica, **5** (1930), 9.]。乃ち氏に請ひてダフニン及びダフネチンの惠與を得、ダフニンにつき比旋光度を測定せるに ($[\alpha]_D^{25} = -84.2^\circ$) を得たり。合成配糖體の右旋性なるにこは左旋性なり。融點は 223-224° にして合成配糖體より稍高し。兩者を混融するに 200° 附近にて熔融し全く異物質なること明瞭となれり。且つ天然品をメチ