Analyse.

Substanz

Veratrumsäure gef.	C % 59.11	H % 5.93	-OCH ₃ % 34.02	M. G. (nach Titration) 181.5
ber. f. C ₉ H ₁₀ O ₄	59.31	5.53	34.08	182.0
(Aus dem Pharmakologischen Institut der Kaiserlichen Universität zu Keijō, Japan)				
(Autoref.)				

S. Kuwata. *Studien über die gegen Diabetes verwendeten Volksdrogen. (IV. Mitteilung). Über die Bestandteile der Rinde von Alalia chinensis L. var. glabrescens. (III). Eigenschaften des wasserlöslichen Saponins.*

Im alkoholischen Extrakt der Rinde von *Alalia chinensis* L. var. *glabrescens* wurden 2 Arten von Saponin, nämlich wasserlösliches und wasserunlösliches, isoliert. Da aber das Aglykon der beiden Saponine dieselben Eigenschaften hat, so wird dem letzteren die Bezeichnung α -Taralin, dem ersteren aber die des β -Taralin gegeben.

α -Taralin ist ein rein weisses Kristallpulver, leicht löslich in Alkohol, aber unlöslich in Äther und Wasser. Es enthält viel Asche, der Schmelzpunkt ist undeutlich. Die durch Elektrodialyse aschefrei gewordene Substanz (auch zuloige Elementaranalyse konnte kein Aschegehalt nachgewiesen werden) hat den Z. P. 202–204°. Die pulverisierte Substanz wirkt reizend auf die Nasenhöhle. Nach der Analyse stimmt sie ganz gut auf die Formel C₅₀H₇₂O₁₉. Die Molekulargewichtsbestimmung ist mit Schwierigkeiten verknüpft und die kryoskopische Bestimmung liefert kein verlässliches Resultat. Nur durch Titrieren wurde die Zahl 1172 für die Substanz, als eine einbasische Säure, erhalten. (Für C₅₀H₇₀O₁₉ aber M. G. 976). Durch Bestimmung der Verseifungszahl wurde erkannt, dass 2 esterartige Gruppen darin vorliegen.

Für das Aglykon C₃₂H₄₆O₄, worüber später berichtet werden soll und wofür hier das Mol. Gew. 498 gewählt wird, wurde bei quantitativer Bestimmung der Wert. 50,03% erhalten, der mit der Theorie (51,024%) fast übereinstimmt. Wird α -Taralin der Hydrolyse unterworfen und das vom Aglykon (Taraligenin) befreite Filtrat nach Zusatz von Bariumcarbonat zur Trockne verdampft, der

Rückstand wiederholt mit 90%ig. Alkohol extrahiert, so reduziert der nach Verjagung von Alkohol erhaltene braune Extrakt stark die Fehlingsche Lösung und zeigt die Bialsche Reaktion. Bleiessig fällt einen Teil dieses Extrakts. Nach qualitativer Prüfung scheint die Substanz Glukuronsäure zu sein. Der von Bleiessig-Niederschlag abfiltrierte Rückstand reduziert zwar die Fehlingsche Lösung, zeigt aber nicht die Bialsche Reaktion. Auch waren Xylose-, Galaktose- und Methylpentose-reaktionen negativ. Nur eine ganz schwache durch Naphthoresorcin entstandene Glucuronsäurereaktion konnte beobachtet werden. Durch Einwirkung von Phenylhydrazin konnte das Phenylhydrazon vom Z. P. 210° in gelben Nadeln erhalten werden. Die Mischprobe mit Glukosephenylosazon zeigte keine Schmelzpunktdepression. Durch Prüfung mit Hefe konnte die Gegenwart von nicht gärendem Zucker nicht nachgewiesen werden. Durch Bestimmung der optischen Aktivität des Zuckers ergab sich, dass sich aus 1 Mol α -Talin 2 Mol Glukose gebildet haben. Die quantitative Glucuronsäurebestimmung von α -Talin nach Phloroglucid- und Kohlensäuremethode gab Zahlen, die mit der Theorie übereinstimmten d. h. wenn man den Gehalt von 1 Mol Glukuron in Talin annimmt. Nach Analysenzahlen von α -Talin und dem später zu beschreibenden Acetyltalin scheint die Glukuronsäure im Molekül des α -Talin vermutlich in Form des anhydridischen Glukuron gebunden zu sein. Positive Resultate ergab nicht die Prüfung auf flüchtige Säuren im Hydrolysat des mit verd. Schwefelsäure zersetzten α -Talin. Beim Kochen von α -Talin mit Essigsäureanhydrid bildet sich der in Äther lösliche Acetylkörper, der als weisses Kristallpulver erhalten wurde. Die Kristalle begannen etwa bei 143° zu erweichen, zersetzten sich aber allmählich unter Aufschäumen ohne deutlichen Schmp. zu zeigen. Betreffs der Liebermann'schen Reaktion zeigte die Substanz keinen grossen Unterschied vom früheren Saponin. Nach Analyse und Molekulargewichtsbestimmung (Titration neben Rastscher Methode) entspricht die Substanz der Formel $C_{36}H_{88}O_{27}$ d. h. $C_{50}H_{64}O_{19} (COCH_3)_8$ und auch die Verseifung ergab Zahlen, die mit dem Werte von 8 Acetylgruppen fast übereinstimmten.

Auf Grund obiger Resultate scheint die Hydrolyse des α -Talin nach folgender Gleichung zu erfolgen :

Nach bisherigen Erfahrungen wurde aus dem Saponin wachsartige Substanz extrahiert, die sich schwierig reinigen liess und einen F. P. unterhalb 80° zeigte,

der sehr undeutlich war. Durch Hydrolyse mit Alkali wurden bei 84° schmelzende weisse Kristallschuppen erhalten. Nach diesem F. P. hat dieser Körper Ähnlichkeit mit Myricylalkohol, den van der Haar (Ber. 55, 304 (1922)) aus Rinde und Blättern von zur selben Klasse von *Aralia chinensis* L. var. *glabrescens* gehörigen *Alalia montana* gefunden hat. Aber der vorliegenden Substanz kommt Säurenatur zu und liefert eine bei 75–77° schmelzende Acetylverbindung, sodass sie eine höhere Oxyssäure zu sein scheint. Auch geht ihr die Liebermann'sche Reaktion ab. Da sie mithin in keiner Beziehung mit Terpenen und Saponinen zu stehen scheint, so wird sie nicht weiter untersucht.

Bei der katalytischen Reduktion des α -Tara'in bildet sich Glukose. Ausserdem wurde ein weisses Kristallpulver (Z. P. 229°) erhalten. Dieser Körper ist deutlich sauer und zeigt die Liebermann'sche Reaktion, aber er wurde bisher noch nicht untersucht.

α -Tara'in ist unlöslich in Wasser, aber in alkalischer Flüssigkeit löslich. Das einmal in Lösung gegangene α -Tara'in ist durch schwaches Ansäuern nicht sofort fällbar. Daher wurden vermittelst physiologischer Kochsalzlösung Saponinlösungen verschiedener Konzentrationen, ausserdem vermittelst N/100-KOH und N/100-HCl verschiedene H-Ionenkonzentrationen hergestellt und hämolytische Konstante gegen Rinderblut bestimmt. Die hämolytische Wirkung ist in neutraler Lösung am schwächsten, steigt aber mit zunehmender Azidität und bei Alkalisierung findet plötzlicher Anstieg statt. Diese Erscheinung erinnert hierbei an das hämolytische Verhalten von Saponin "Kahlbaum" oder Senegin "Merck".

Bei einer Zimmertemperatur von 11–12° und innerhalb 20 Stunden wurden die hämolytischen Konstanten einer 2% Lösung bestimmt und folgende Resultate erhalten:

Bei	PH	5,27	83300
"	"	5,55	55500
"	"	6,41	16600
"	"	7,01	11000
"	"	7,69	über 500000
"	"	8,16	bei höherer Konzentration als diese trat durch Alkali sogar Hämolyse auf.

	K _{P11}	d ₄ ¹⁵	n _D ²⁰
文 獻	128-9	1.04-1.043	1.534-1.540
著者等	127-9	1.0443	1.5340

分 析

				C %	H %
K _{P11}	1271-129°	0.0926g	CO ₂ 0.2514g, H ₂ O 0.0658g	74.04	7.95
„	„	0.0762g	CO ₂ 0.2074g, H ₂ O 0.0570g	74.23	8.37
		平均		74.14	8.16
K _{P11}	120-125°	0.0728g	CO ₂ 0.1962g, H ₂ O 0.0529g	73.50	8.13
		C ₁₁ H ₁₄ O ₂ として		74.20	7.86

Methyleugenol の酸化

Nr. 6 を 3g 水 300cc と混じアルカリ性となし熱時に KMnO₄ 9g にて酸化す。Veratrumsäure (F. 179-180°) 0.25g を得。尙同様にして Nr. 7. 3g より 1.1g, Nr. 8, 5g より 1.6g の Veratrumsäure (F. 180°) を得たり。

分析 (100°, 2 時間乾燥)

物質	0.20g	AgJ	0.5152g	CH ₃ O-%	34.02	C %	H %
物質	0.0604g	CO ₂	0.1304g	H ₂ O	0.0304g	58.88	5.63
„	0.0864g	CO ₂	0.1880g	H ₂ O	0.0480g	59.34	6.22
		平均				59.11	5.93
物質	0.10g	N/10 KOH	5.5cc			M. G. 181.5	
		C ₉ H ₁₀ O ₄ として	OCH ₃ -% 34.08, C % 59.31, H % 5.53			M. G. 182.0	

民間糖尿病に用ひらるる生薬の研究 (其ノ四)

たらのき皮の成分 (第三報)

水に不溶なるサポニン體の性状

藥 學 士 桑 田 智

たらのきの皮部にサポニン様物質の存在せることは相當周知の事實にして、その水浸液が著しく泡起し、皮部の粉末が強く鼻腔を刺戟することは有力なる證なり。嘗て近藤教授は、たらのき皮の研究報告中配糖質の存在を豫報せられ、本生薬の主成分は恐らくこの配糖質ならむと豫想せられたり〔本誌 394 1367 大正 3 年 12 月號〕。余も亦本生薬の成分を全部分離確定せんと試み、水に可溶性にして配

糖質と思惟せらるる物質を分離し、之に關する小試験を報告し、加水分解によりて $C_{34}H_{52}O_4 \cdot 2H_2O$ に該當するアグリコンと葡萄糖とグルクロン酸に類似せる物質を得たりと述べたり〔本誌 49 卷 660-668 (1929)〕。

本族の植物に配糖質殊にサボニンの含有さることが分析的に研究せられたるは既に古く 1880 年北米產たらきの *Aralia spinosa*, L. の皮部より Holden 氏によりて Araliin なる配糖質を鉛鹽として分離せるあり〔L. H. Holden: Pharm. J. Trans. {3} 11. 210; B. (1881), 1112; Amer. J. Pharm. 52, 390-391 (1880); v. Rijn: Glykoside, s. 331 (1900)〕, 氏は、アラリーンそのものは中性、從つて生薬のアルコールエキスをより鉛糖と共に沈降せる沈澱より、再びアルコールを用ひて器械的に分離し得べく、鹽酸にて加水分解すれば Araliretin なるアグリコンを得と言へり。

その翌年 Lilly 氏は、Holden 氏同様の方法にてアルコールエキスを作り、エーテル可溶物を去り、鉛糖にて沈降する部分を除去し、鉛醋にて初て沈澱する部分を脱鉛して一種の配糖質を得、之に前記 Araliin なる名稱を冠せり〔J. Lilly: Jahresber. d. Pharm. 1882, 196; B. (1882), 2746; Pharm. J. Trans. (1882) 305; v. Rijn: Glykoside, s. 331 (1900)〕。

其後 *A. papyrifera* 葉中のイノシット, *A. cordata* 皮中のグアニン、キサチン等の鹽基, *A. californica* 及 *A. nudicaulis* 根中の揮發油に關する研究等現れたれど、再び配糖質に觸れたるは、Holden, Lilly 諸氏のそれより 30 年を経たる Danzel 氏の研究なるが如し。特に Danzel 氏の材料となりしものは *A. japonica* Thunberg の葉 (japanische Aralia と記載しあり) にして、生薬のアルコールエキスをより水に不溶なる配糖質を分離し、アルコールに溶しエーテルにて沈降せしむる方法を反覆して精製し F. 260° の白色結晶塊をなす配糖質を得、之に Aralin なる名稱を與へたり〔L. Danzel, Japanische Aralia Bull. Science. Pharm. (1912) 14, 329 Journ. Pharm. et. Chim. (7) 5, 530-34, 1/6. C. (1912) (II) 196. 之を 2% 硫酸にて加水分解し F. 246-248°, 白色酸性の結晶をなす Aralidin と葡萄糖とを得たり。〕

これより先 Greshoff, Boorsma [van der Haar 氏参照] の諸氏は *Aralia montana* Bl. の樹皮中嘗てサボニン質の存在を知り、その水溶液が鉛糖にては沈澱せず鉛醋にて夥しき沈澱を生ずと記載したりしが、*Aralia montana* の樹皮並に葉よりサボニン質を分離し詳細なる化學的研究及び藥物學的研究を報告せるは van der Haar 氏なり〔van der Haar; B. 55, 3041 (1922)〕。氏は生薬をメチールアルコールにて抽出しミリチルアルコールを含む蠟燭物質を證明し、之をエーテルにて處理し生薬に對する 1.6% のサボニンを得、遊離サボニン, mg- 及び Ca-サボニンの各部に分離しすべて *Aralia-Saponin* の名を冠せり。稀酸にて加水分解し F. 275° 純白色のサボゲニンを得、 $C_{25}H_{40}(OH)(COOH)$ に一致しリーベルマン氏反應を徴し常

法にて醋化されず、メチールエステルとなして初て醋化し得べく、亞鉛末乾餾に附すれば C_9H_8 を基礎とするテルペンを得。之を Araligenin と命名せり。加水分解成績體としてはアラリゲニンの他、*l*-Arabinose, Methylpentose, *d*-Glucose, *d*-Galaktose, *d*-Gatakturonsäure を證明せり。

この他たらのきと同じうこぎ科に屬する植物中配糖質乃至はサボニンの存在を明にせられしはやつで、人參、きづた、竹節人參、等邦産植物中にも數種を算す。このうち余の最も興味を感じたるは竹節人參より抽出せられたるバナックスサボニンなりとす。竹節人參よりは嘗て Wentrup 氏 (1908) が $C_{21}H_{40}O_{10}$ に該當する溶血力強なサボニンを抽出し $C_{14}H_{22}O_4$ に相當する結晶性サボゲニンを得たる他井上氏 (明治 35 年、本誌)、Rosenthaler 及び Stadler 氏の研究あり。村山博士は主として該サボニンの分解成績體たるバナックスサボゲニンを研究せられ $C_{36}H_{58}O_4$ F. 303° を與へられ (村山義溫：本誌 **501**, 783 (大正 12 年 11 月)；同 **544**, 526 (昭利 2 年 6 月))。青山氏はその研究を續行して結晶性のプロサボゲニン、無晶形のサボニンとを分離し、前者は $C_{42}H_{66}O_{10}$ Zp. 220–221° 加水分解によりバナックスサボゲニンとグルクロン酸とを生じ、後者は $C_{101}H_{160}O_{34}$ に適し Zp. 195° 加水分解によりてプロサボゲニン、グルコゼ各 2 分子、アラビノーゼ 1 分子を得と報じたり (青山新次郎；本誌 **569**, 678 (昭和 4 年 7 月))。たらのき皮より得たる配糖質のアグリコンが融點組成其他の性狀に於て、上記バナックスサボゲニンに相似せるは興味多き事實なるも、尙稍々異なる點あり。

之を要するに、*Aralia* 屬の諸種植物中その葉、樹皮、根部より抽出せられたる配糖質は、その性狀寧ろサボニンといふに近きが如し。而して Araliin と稱せられたるものと Aralin と稱せられたるものとは、水に對する溶解度を異にし、前者は van der Haar 氏の *Aralia*-Saponin B に相當し、後者は同氏の *Aralia*-Saponin A に相當す。又、他の比較例を許さるるに於ては、青山氏の竹節人參に於けるが如く、前者はバナックスサボニン、後者は同プロサボゲニンに相當すとも言ひ得べし。

たらのき皮より抽出せる配糖質にも、水に易溶のものと難溶のものとの二種あり。前者は余の第一報に記したる物質、鉛醋により分離したるもの、後者は冷水に不溶、多量の水と共に加熱すれば寒天様に膠化し、乾涸粉末の狀態となせば、前者に比し引濕性遙に弱き白色の粉末となる。

余は初め水に易溶のものが定型的のサボニンにして、難溶のものは所謂プロサボゲニンならんと想像したるが、數多の實驗を重ねたる結果、後者は尙著量の葡萄糖及びグルクロンを含有するを認めたるを以て、之を α -タラリンと呼び、前者を β -タラリンと呼びて區別せんとす。

α -タラリン (Talarin) は純白色結晶性粉末にしてアルコールに易溶、水、エーテルに不溶、多量の灰分 (主として Mg, Ca, Na より成るが如し) を含有し融解點不明

るも、電解透析法に附し無灰となしたるものは $Zp. 202-204^{\circ}$ を有す。著明なるリーベルマン氏反應を現し、粉末は著しく鼻腔を刺戟す。分析の結果は $C_{50}H_{72}O_{19}$ によく該當す。但し、その分子量測定には困難を感じ、クリオスコピーの成績、鉛鹽による鉛の定量成績總て豫想に反し、物質が樟腦に不溶なるためラスト氏法を施行し得ず、僅に滴定の成績 1172 の附近を想像するの他なし。即ち上記分子式をとる時は分子量 976 となる。尙驗化数の測定によりエステル様の結合 2 個存在するを知る。アグリコン（他日報告を期しつつあり、 $C_{32}H_{46}O_4$ M. G. = 498 を採用す）の定量に於て 50.03% を得、理論量 51.024% に略々一致す。

α -タラリンの加水分解後生成せるアグリコンを濾取せる残渣にはフェーリング氏液の還元能強き糖成分と鉛醋によりて沈降する酸成分との存在を明にせるを以て、先づ糖類の檢索を行ひたるが、定性的にはオサゾーンの製造によりて葡萄糖のみを證明し、酵母を用ひて試験し非發酵性糖の存在せざるを知りたり。よりて加水分解後の母液を炭酸バリウム、強酒精にて處理したる後、鉛醋にて沈降する部分を去り、殘液を旋光度、アリーン氏法にて簡単に定量試験を行ひ、葡萄糖 2 分子存在すべきことを認めたり。

鉛醋によりて沈降する酸成分はグルクロン酸なるべきことは余の本報告第一報に記したると同様なるを以て茲に贅せず。 α -タラリンにつき、フロログルチッド法、炭酸法にて定量を行ひたるに、何れの成績も、グルクロン 1 分子を含有せるものとして比較的よく一致す。Rehorst 氏の Zuckrübensaponin の場合に於けるが如く、グルクロン酸の純品を得んとして努力したるも充分なる結果を得ざりき。

尙、 α -タラリンの分子中、グルクロン酸が恐らくは無水物たるグルクロンとなりて結合せるものなることは、元サボニンの分析及び後述のアセチル-タラリンの分析数がグルクロンとして結合すとせばよく理論數に合致する點より見て首肯し得べし。

揮發性酸の存在を疑ひ水蒸氣蒸溜液よりバリウム鹽を作らんと試みたるが、試料を著しく多量に用ひたるに拘らず、バリウム鹽と認めらるべきもの甚だ少く、蟻酸バリウムとしての定性試験も積極的な成績を示さず。デューロー氏法を施行したるが曲線は蟻酸としての曲線に比し著しく下位にあり。且つ實驗によりても少量の揮發性酸と誤らるべき物質少許を發生す。これらの點より推し、 α -タラリンは酸と共に煮沸することにより定型的に蟻酸を發生せず。或はその構造の一部が不規則なる分解を起し揮發性酸様のものを發生することなきかを疑ふのみに過ぎず。

α -タラリンを無水醋酸と共に煮沸すれば、エーテルに可溶性となれるアセチル化物を得。白色結晶性の粉末にして 143° 附近より軟化し、爾後比較的長き範圍に互りて發泡分解し、一定の分解點を示さず。著明なるリーベルマン氏反應を有す。

分析の結果は $C_{66}H_{88}O_{27}$ 分子量 1312 に相當し、滴定の成績、ラスト氏法による成績
 稍々之に近し。エステル数は 365.4 或は 396.4 を示し、元サボニンのエステル数
 とアセチル基 8 個の鹼化に要するエステル数との和 426 に比すれば、稍々不満足
 なる點無きにしもあらざれど先づ之に近きものなることは疑なかるべし。

敘上の成績より推して余は α -タラリンの酸による分解式を

として呈出せんとす。

爾餘の實驗としては、サボニンに夾雜する蠟様物質及びその鹼化體を得、簡單な
 る試験を行ひたるが、本品は Smp. 84° 、アセチル化物は Smp. $75-77^\circ$ 。その融
 點より推測すれば van der Haar 氏が *Aralia montana* の葉、樹皮中に在りと報告
 せるミリチールアルコールに一致するが如けれど、その分析、滴定等より推し寧ろ
 それと異なる一種の高級オキシ酸なるが如し。然れども余はその標品に乏しく、且つ
 リーベルマン氏反應を缺ぎ α -タラリン或はそのアグリコンと近縁ならざるが如きを
 を以て深く検討するの興味なく得たる實驗データのみを報告し置くに留めたり。

又、 α -タラリンの接觸還元(刈米博士法による)を試み葡萄糖の分離するを認め、
 Zp. 229° の白色結晶性粉末を得たり。本品は著明なる酸性を有しエーテルに不
 溶。従つて、アグリコンに猶他の酸基等を附著するが如きも未だ精檢せず。

最後に α -タラリンの溶血能を試験せるが本品はそのままにては水に溶解せず。
 アルカリ液に溶解し一度溶解せるものは少しく酸性となすも直ちに析出すること
 なし。よつて生理的食鹽水にて各種濃度のサボニン溶液を作り、且つ $\frac{N}{100}$ 苛性カ
 リ及び $\frac{N}{100}$ HCl を用ひ種々の水素イオン濃度となし(溶液は血球浮遊液を加へ常
 に 10cc となるが如くす)牛血に對する溶血指數を求めたるが、溶血力は中性に於
 て最も低く酸性となるに従つて増強しアルカリ性となれば一頓に増大す。その狀
 はカールバウムのサボニン或はメルクのゼネギンの溶血態度(Kofler: Die Sapo-
 nin, S. 136 参照)に酷似せり。

敘上の實驗成績は余として意に滿たざるもの少なからざれど、目下より以上の實驗を遂
 行し得ざるの事情あるを以て一先づ得たる成績のみを報告し置かんとす。終に臨み「た
 らのき」皮研究の續行を快諾せられたる近藤平三郎先生、絶えず貴重なる教示を與へられ
 たる恩師朝比奈泰彦先生に深謝の意を表す。

昭和 5 年 12 月 3 日 倉敷中央病院研究室化學部にて

實 驗 之 部

總 配 糖 質 の 抽 出

風乾せる たらのき皮粗末(木部を混ず、藤澤商店より直接購入のもの) 5 Kg を
 500g づつ小袋に納め浸出器に仕込み 20 L. の局方酒精にて 15 時間 $70-80^\circ$ にて

温浸、残渣に更に同量の酒精を加へ6時間、再三酒精を更新して6時間、前後3回の浸出液を集め減壓下に大部分の酒精を溜去し、最後に蒸發皿上に濃稠エキスとなす。粗エキスの収量 250g (風乾生薬の 5%) 重盪煎上飴状を呈し冷却すれば黄褐色粗粉となり得。本品中のクロロフィル、蠟質、プロトカテキュー酸等を除去しサポニン質を分離するため、熱酒精 500cc に熱時溶解し 1L のエーテルを加へて加温後放冷すれば黄色の沈澱と緑色のエーテル-アルコール液を得。然るにその濾過極めて困難なるが故に熱酒精溶液に 200g の酸性白土を加へて蒸發乾涸粉末となし 1L のエーテルにて 4 回温浸すればエーテルは殆んど緑色調を呈せざるに至る。エーテル液を合併濃縮しエキス 83g を得たり。之を水蒸氣蒸溜に附する特異の不快臭を有する油状質少許を溜出す。約 2L の溜液を作りエーテルにとりたるに油状質の得量言ふに足らず。僅にリーベルマン氏反應を試みたるが硫酸或は無水醋酸-硫酸によりて直ちに暗褐色となり周縁明に紫紅色を呈するを認む。テルペン様揮發油の存在を推知するに足らん。

水蒸氣蒸溜の残渣を 5% 苛性カリ水溶液中に投じ、水浴上に煮沸すること 10 時間、放冷後エーテルと共に振盪せるにエーテル層は帶緑黄色、水層は暗褐色となり、兩液の中間に不溶物を存す。

水層を集め硫酸にて強酸性となさば褐色の沈澱を生ずるが故に之を集めアルコールに溶し反覆脱色精製し數回無水アルコールより再結晶せるに遂に白色不整結晶となさり。

エーテルにて處理せる酸性白土混合残渣を局方酒精と共に温浸し殆んど浸出物なきに至らしめ、アルコールを合併減壓下にアルコールを溜去すれば汚褐色の乾燥残渣 148g を得。余はこの部分を總配糖質と見做せり (更に 50% アルコールにて少許の泡起性強き物質を抽出したれど減壓下に濃縮すること困難なりき。しかも蒸發濃縮に従ひ樹脂狀物質多量を生ずるを以て檢索を中止せり)。その収量を原生薬より算出すれば約 3% なり。

次に本品を 1% 硫酸 1L と共に研磨し、吸引することなく長時間にて濾過し、更に不溶分を同硫酸 1L と共に研磨濾過し、この操作を 3 回反覆せるに濾液は微に褐色を帶ぶるに過ぎず。残渣を乾燥し、粉末狀となし秤量せるに 86g を算す (α -Taralin)。故に可溶性の部分は 62g なることを知る (β -Taratin)。而して余はこの各々につき更に精製を行ふことなく分解産物研究の目的にて加水分解を行ひたるが、その兩者より得たる非糖分は全く同一の性状を示すを以て特に糖部分の檢索を別々に實施せり (後述参照)。

酸性の水に難溶なる部分

生薬粗末のエチールアルコール又はメタノール浸液を濃縮すれば黄綠色蠟様の物質を残し、冷水に不溶、加温すればゲラチン様の粘化體を生じ、アルカリ液に溶解

し、酸の添加によりて再び析出するも、ゲラチン様となりて採取困難なることは余の第一報〔本誌 569, 662 (昭和4年7月)〕に述べたところなり。依りて、余は濃縮残渣を1%硫酸と共に研磨攪拌し、1晝夜放置後常壓にて不溶分を濾取、磁板上に塗沫し100°以下、長時日を要して乾燥し、少々粉碎し易き且つ吸濕性を有する物質となし、石油エーテル、エーテル等にて処理し、多量の葉緑素、ワックス様物質を除去し、残渣を再び磁板上100°以下にて乾燥し、前よりも遙に粉細し易く、且つ引濕性も少々減退せる細末となし得たり。

a) エーテルに移行せる部分

前記沈澱を石油エーテルにて処理せるものは多量のクロ、フェルを含み黑色に近く、処理困難なり。エーテル浸出液より大部分のエーテルを溜去し、之に冷時石油エーテルを加ふれば、帯緑色の沈澱を生ず。これを濾取し、局方アルコールに溶解し、反覆脱色を試みたるもその目的を達し得ず。試に、アルコールを溜去し、残渣を磁皿に擴けエキシカトル中に減壓乾燥せむとしたるも粉末状の物質を得る能はず、融點も80°C以下にて極めて不定。石油エーテルには冷時難溶なるも熱時には殆んど全部溶解し、リーベルマン氏反應を呈せず、その一部をとり10%鹽酸と共に加熱冷却したるに無晶形沈澱少許を生じたるが、サボニン分解の状況と大にその趣を異にし、且つ分解成績體は依然リーベルマン氏反應陰性なり。よりて餘は10%の前性カリ液及び約 $\frac{1}{10}$ 量のアルコールを加へ、水溶上に5-6時間加熱、暗褐色の液を1晝夜放置せるに全部固結す。但しこは軟塊にして結晶を分離する能はず、そのまゝ多量の水中に投じ、長時日を要して不溶分を濾取、アルコールに溶解し、脱色精製し、同一溶媒より結晶を析出せしむるば純白色鱗片狀晶となり Smp. 84°。

融點低きを以て數ヶ月除濕器中に貯へたる標品を直ちに分析に附す。

分 析

1) 物質	0.0557g	CO ₂	: 0.1597g	H ₂ O	: 0.0620g	C%	78.48	H%	12.41
2) „	0.0738,,	„	0.2110,,	„	0.0802,,	„	77.97	„	12.07
ミリチールアルコール C ₃₁ H ₆₃ OH とすれば						„	82.31	„	14.16
C ₃₀ H ₆₀ OH „						„	83.72	„	14.49

分子量 (ラスト氏法)

1) 物質	0.0107g	樟腦	0.0937g	降下度	11.5°	故に分子量	397.2
2) „	0.0097,,	„	0.1057,,	„	7.5°	„	489.4
3) „	0.0125,,	„	0.0806,,	„	12.5°	„	496.2
4) „	0.0103,,	„	0.1028,,	„	10.5°	„	381.7
5) „	0.0144,,	„	0.1084,,	„	13.5°	„	393.
平 均						„	432.

滴定法に驗化

物質 0.0984g を無水アルコール 20cc に溶し $N/2$ 酒精製カリにて滴定せるにカリ

消費量 0.33cc 一鹽基性酸と假定するも M.G. = 591 となる。

滴定後 $N/2$ カリ液 20cc を追加し H_2 -氣流中、水浴上に 2 時間加熱。冷後 $N/2$ 鹽酸にて還測。加熱によるアルカリ消費量 0.39cc 茲に 1 個のエステル様結合ありて鹼化せられたるものと假定すれば、この成績より M.G. = 505 となる。

若し $0.33 + 0.39 = 0.72cc$ が 1 分子の本物質に結合せるものとすれば M.G. = 273.

その何れをとるもラスト氏法による M.G. に一致せず。本成績の誤差は恐らく物質の未だ不純なるか 實驗誤差に歸すべきものならん。

尙上記物質の醋化體として常法に従ひ Smp. 75-77° の物質を得たるがその分析数は C. 77.77% H. 10.90% を與へ、ラスト氏法による分子量は 484, 453, 476 を與へたり。

ベンツォイル化は困難にして生成せる物質は單一物質と認め難く検索を中止せり。

本品は van der Haar 氏が *Aralia monakana* の成分研究中に報告せるミリチールアルコールとは、又、一種異なるオキシ酸にして、生薬皮部のワックスを構成する一部分なる可きを想像す。ただ本品はリーベルマン氏反應を缺き従つてテルペン乃至は配糖體の分解産物たるアグリコンに關係比較的薄きが如きを以てより以上の検索を行はず。唯茲に得たる實驗データのみを報告し置かんとす。

b) サボニン質の分離

水、エーテルに不溶、局方アルコールに可溶なりし部分は混合サボニンと考へらる。この粉末を無水アルコール又は純メタノール(メルク)にて熱時ディゲリーレンせるに著量の不溶分あり。無水アルコールにて反覆浸出したる液を獸炭にて脱色、蒸發乾涸し、更にエーテルにて溫時處理し、再び無水アルコールに溶し、靜に、アルコールを蒸散せしむれば、純白色結晶の粉末を得。灰分 1.25% mg, Ca, Na を定性的に檢出す。150° にて黃變、260° となるも定型的融解の狀を示さず。(Fraktion I).

無水アルコールに不溶の殘渣を、80% アルコール多量と共に加溫し之に溶解し來る橙褐色の物質を反覆脱色し溶媒を溜去すれば淡黄白色の粉末を得。灰分 4.31%, (Fraktion II).

上記 80% アルコールにも尙溶解せず。多量の灰分を含有し、全然無機質に非ざることとは、之が著明なるリーベルマン氏反應を呈することによりて知らるゝ部分。(Fraktion III).

サボニン Fraktion II の電解透析

物質 2.0g を 0.1% 鹽酸 300cc と共によく研磨して透析器の中央に入れ 100 Volt の直流を通ず(隔壁は濾紙にコロデウムを引きたるものを用ひたり)。電流は初め 8 Mili Amp. を示すも漸次増大し 1 時間後には 15 Mili Amp. となれり。

両側の蒸留水を更新して電流を通すれば約3時間の後 0.15 Amp. となり尙1時間繼續せるも殆んど變化なし。然る後内容を取り出し遠心沈澱器によりてサボニン質を集め、無水アルコールに溶解せるに(初め無水アルコールに溶解せず、熱時80%のアルコールに溶解せる物質なりしに)この場合極めて易溶となれり。無水アルコール溶液に冷水少許を注加すれば直ちに白色絮状の沈澱を生ずるが故に約80%アルコールの程度となし再結晶を行はむとしたるも全質寒天様となりて處理する能はず。よりに再び蒸發乾涸し可及的少量の無水アルコールに溶解濾過し、眞容乾燥器中に靜かに溶媒を蒸散せしむ。かくして得たる純白色無晶形の粉末は 180° より稍々收縮の状を呈し $202-204^{\circ}$ に於て泡起しつゝ分解熔融す。

附 透析器は自製にがゝるもの。硝子の3槽より成り、コロジウム濾紙の隔壁を有し、兩側の槽に弱酸性となせる蒸留水を充し、 2×3 cm の白金板を極となし、中間の槽に物質を懸垂せる 0.1% 鹽酸水を盛り、電流を通じつゝ絶ず攪拌し、40cc 前後に裝置が熱發するに及び電流を斷ち兩側槽の水を更新す。かくして水の更新3回に及び、灰分は殆んど全く脱却さるゝに至る。

無灰のサボニン α -Tararin

灰分 4.3% に達するサボニン部を電解透析に附したるに無灰の物質となり分解點明瞭に現れたるを以て、水に不溶なる總サボニン部を 0.1% 鹽酸々性の水に懸垂し置き、既記の如く電解透析法を施行し、依然として不溶なる物質を無水アルコールに溶し脱色の後濃縮し純白色の結晶性粉末を得たり。分解點 $202-204^{\circ}$ 但し一定形の結晶を示さるゝを以てその純度には幾分の疑問なき能はず。

乾燥減量

數 10 日間硫酸エキシカトル中に放置したる標品を 110° 減壓下に 8 時間乾燥恆量となし 4 回の平均をとりたるが 減壓 4.3% に當る。

滴定

乾燥品 1.0395g 無水アルコール 20cc に溶し N-酒精製カリにて冷時滴定。カリ消費量 0.89cc

故に $S.Z. = 47.77$ 一鹽基性酸とすれば $M.G. = \frac{0.395}{0.89} = 117.2$ 。

滴定後同一アルカリ液 25cc を加へ水浴上、水素氣流中に 1 時間煮沸、冷後 N-HCl にて還測、加熱によるアルカリ消費量 1.5cc 故にエステル數 80.80。

鹼化 110° 減壓下 6 時間乾燥。最初より 15cc の $N/10$ 酒精製カリを加へて加熱。

- 1) 物質 0.2223g $N/10$ 酒精製カリ消費 5.5cc $\therefore$ 鹼化數 139.
- 2) „ 0.2565 „ „ 6.1 „ „ 133

但し、酒精製カリと共に煮沸すれば次第に不溶性の樹脂狀物質を生じ、水を加ふれば溶解す。

故に多量の水を加へ $N/10$ HCl にて還測せるを以て正しき數を得難けれどエステル數 2 個に相當するを見る。

鉛鹽

サポニンを無水アルコールに加温溶解し置き、鉛醋のアルコール溶液を加ふれば直ちに白色の沈澱を生ず。沈澱を濾取無水アルコールにて温時洗滌し乾燥す。120° に乾燥せる鉛鹽 0.5548g を稀硝酸と共に加温すれば全質黃色となりアグリコンを生ず。之に硫酸を加へ共に加熱すれば白色の硫酸鉛とアグリコンとを沈澱するが故に、強アルコールを加へて處理し鉛鹽のみを濾取し、白金坩堝中に焼き $PbSO_4$ となして秤量し 0.3855g を得たり。故に Pb 0.162g 物質の 47.2% 鉛醋に代ふるに鉛糖を以てせる場合も略々同様にして Pb の含量著しく大なり。

分子量

標品は樟腦に不溶、鉛鹽は過大なる鉛の含量を示すを以てクリオスコピーにて分子量を定めんとせり。然るに物質 0.1 前後水醋 10g 前後にて測定せる成績は 279 を得、水醋に代ふるにフェノールを以てせるも 235 を得たるに過ぎず。目下は上記の滴定による成績を信するの他なし。

分析 同上の乾燥品。物質の燃焼困難。長時間を要せり。

1)	物質	0.0681g	CO ₂	0.1532g	H ₂ O	0.0470g	C %	61.35	H %	7.67
2)	„	0.0678	„	0.1526	„	0.0432	„	61.38	„	6.91
3)	„	0.0748	„	0.1683	„	0.0503	„	61.36	„	7.47
4)	„	0.0778	„	0.1755	„	0.0497	„	61.39	„	7.093
									C ₃₀ H ₇₂ O ₁₉ とすれば理論量	„ 61.48 „ 7.38
									„	M.G. = 976.

タラリゲニンの定量

Zp. 202-204° を示す水に不溶性のサポニン體を 110° 減壓下に 9 時間乾燥恒量となし 0.3860g を秤取、10% の割合に濃硫酸を混じたる無水アルコール 50cc と共に沸騰水溶上 6 時間加熱、蒸發皿上にアルコールを驅馳し、水を加ふれば褐色絮狀の不溶性物を生ず。更に充分アルコールを除去し、ゲーチ坩堝に析出物を集め充分に水洗後 110-120° の空氣溶中 11 時間乾燥して恒量を得たり。かくして得たるアグリコンは 0.1931g

故に乾燥サポニンの 50.03% に當れり。

サポニン (M.G. = 976) より 1 分子のアグリコン (C₃₂H₄₆O₄ M.G. = 498 とし て) を生ずるものとすれば理論上アグリコンの收量は 51.024%

α-タラリンの糖分

α-タラリンを稀鹽酸にて加水分解し、アグリコンを濾取せる後濾液に炭酸バリウムを加へて蒸發乾涸し、90% アルコールにて反覆浸出、アルコールを餾去すれば飴狀の褐色残渣を得。本品はフェーリング氏液を著しく還元し、ビアル氏反應をも認む。然るに中性の糖液中には鉛糖に反應せず、鉛醋によりて初て沈降する酸性物質あり。依りて鉛醋による沈澱を除去し、濾液に硫酸を加へて大部分の鉛を去り硫化

水素にて脱鉛、濃縮・無水アルコールにて温浸、脱色精製後濃縮して黄白色の飴水残渣を得たり。本品は著しく甘味を有し、フェーリング氏液を著明に還元するもビアル氏反應は全く消失し、其他キシローゼ、ガラクトーゼ、メチールペントーゼ等の定性反應も之を認むる能はず。僅にナフトレゾルチンによるグルクロン酸反應を僅微に現す。

残渣の一部を水溶液となし培養せるビール下層酵母を加へ 25°C の孵卵器中に放置(對照として葡萄糖液を醗酵)。葡萄糖液に見るが如く炭酸を泡起せしめ醗酵の進行せるを知れるが、葡萄糖液がフェーリング氏液を還元せざるに至る頃、被檢液も亦殆んど全くフェーリング氏液を還元せず。非醗酵性の糖類は全く含有せられざるが如し。よりて次の如く簡單なる定量法を試みたり。

α -タラリン 0.5786g を 25cc の無水アルコール、同量の 20% 硫酸と共に水溶上 5 時間加熱後水を加へ析出せるアグリコンを去り、濾液よりアルコールを蒸散せしめ 10g の炭酸バリウムを加へて濾過、濃縮して 40cc となし鉛醋を飽和して全量を 80cc とす。その濾液 60cc をとり硫酸にて脱鉛し全量 65cc となして濾過す。濾液に就きて旋光度を検するに室温 29°C にて $+0.30^\circ$ 故に原液 40cc 中に溶存する糖を悉く葡萄糖を假定すれば、その絶対量は 0.2456g (但し葡萄糖の比旋光度として $+52.7^\circ$ を採用す)。即ち原サボニンに對して 42.45% なる數を得。

該液の 10cc をとり 20cc の新製フェーリング氏試薬と共に煮沸すれば盛なる還元を起す。析出せる亞酸化銅をアリーン氏管にとり恒量を得るに至るまで乾燥すれば 0.0638g 葡萄糖として計算すれば 25mg に當る。故に原液 40cc 中には 217mg の葡萄糖を含有し、原サボニンの 37.51% に當る。

若し原サボニン(M.G. = 976 として) より 2 分子の葡萄糖を生成するものとすれば理論上 36.88% となる。旋光度測定の結果とは稍々相離るも、アリーン氏法による成績とは偶然よく一致するを認む。蓋し非醗酵性の糖類存在せざること確實なるべし。

檢液の一部をとり フェニールオサゾンを作るに黄色針狀の結晶多量を生成し、アセトンにて洗滌後 50% アルコールより再結晶を施せるに鮮黄色光輝ある針晶となり $Zp. 210^\circ$ クルコーゼフェニールオサゾンの夫と混融するに降下なく全く同一物なるを認む。

アセトン溶液を濃縮し、エーテル、ベンツォール、アルコール等の溶媒により精製に努力し、他の糖類のオサゾンは無きやと檢對したるも何等單一の結晶性物質を分離抽出する能はざりき。

α -タラリンの酸成分

糖液中鉛醋と共に沈降する部分。

鉛醋による沈澱は帶褐白色微細、濾取して磁板上に乾燥し、硫酸又は硫化水素にて脱鉛後、過剰のバリット水を加へてバリウム鹽となし、過剰のバリットを炭酸瓦斯にて除去せる後、脱色精製し、濃縮、無水アルコールを加へて沈澱せしめ、之を急速に濾取す。この操作を約3回反覆せるに殆んど純白色の結晶性沈澱を得。本品は余の第一報中グルクロン酸のバリウム鹽と推したる部分なり。然るに本品を 115°C にて3時間乾燥せるものにつき Ba の定量を行へるに物質 0.5177g BaSO_4 0.3754g 故に Ba 0.2209g 即ち 42.49% となりグルクロン酸バリウムの Ba 含量 26.195% に比すれば約倍量を示す。物質の尙不純なるべきを想像し、バリウム鹽よりバリウムを離脱し、グルクロン酸の純品を得んと試みたるも容易にその目的を達し得ず。然るに定性試験に於てグルクロン酸たることを信するの他なきを以て（その成績は水に可溶なる配糖質につきて余の第一報の記載と概ね同様なるを以て茲に記載の煩を除く）。

その定量的試験の成績下の如し。

フロ、グルチッド法

α -タラリン（乾燥品）0.5397g 10% 鹽酸にて水浴上6時間加水分解後鹽酸濃度を12%となし前後10時間砂浴上に蒸溜（溜液が醋酸アニリンに感ぜざるに至りて中止）。

溜液に 0.3g の純フロ、グルチンの水溶液を加へ、2晝夜放置後ゲーチ坩堝上に集めて乾燥秤量しフルフロール・フログルチッド 0.0396g を得たり。グルクロンとして原サボニンの 22.01 %

$\text{C}_{50}\text{H}_{72}\text{O}_{19}$ より1分子のグルクロンを生ずるものとすれば計算量	18.03%
” 2分子とすれば	36.06%

炭酸法

檢體 0.4038g に初めより 12% 鹽酸を加へ比較的低温にて加水分解後盛に加熱し、アルカリにて洗滌せる空氣を通じつつ發性せる炭酸をカリ球に吸収せしめたり。7時間加熱 CO_2 0.0202g を得たり。こはグルクロン 0.0808g に相當し原サボニンの 20.01% 但しカリ液は5-6時間より著しく黄色を呈したり。上記2成績は稍々不満足なるもグルクロン1分子を含有するものとしてサボニンの上記分子式の眞に近きものなることを推知せしむるに足らん。

蟻酸の試験

既述の酸成分中分子の小なる酸の存在を疑ひたるを以て、硫酸にて加水分解せる液の一部を水蒸氣蒸溜に附し稍々酸性の溜液を得、之にバリット水を加へてアルカリ性となし、過剰のバリットを炭酸ガスにて除去し、溶液を濃縮し潮解性ある褐色の残渣極めて少許を得たり。本品はレゾルチンと濃硫酸とによりて橙赤色の輪帯を生ずるが如きも明瞭ならず。過クロール鐵の添加によりて著しき著色を認むる能はず。

揮發性酸の定性定量を一氣に解決せんとし、デューロー氏法に附したるが、アルカリにて酸化せる物質を酒石酸酸性となし、加熱せるに、液の泡起著しく再三失敗に歸し、僅に2例を得たり。2例共その成績大同小異なりしがその1例を示せば次の如し。

分溜液	10	20	30	40	50	60	70	80	90
消費せる石炭酸の割合	3.02	6.90	11.44	16.50	22.11	30.31	39.81	54.58	74.11
蟻酸の場合	5.9	12.2	19.0	26.4	34.4	43.2	52.8	64.6	79.6

即ち、炭酸以外に蟻酸より小なる有機性酸を考ふる能はざりしを以て同一装置にて検體を容れず盲驗を試みたるに上記の成績より稍々低けれども亦よく似たる揮發性酸量を検出せり。この點より考ふれば、 α -タラリンより1分子の蟻酸が分離するものとは認め難く、假に揮發性酸を遊離すともそは何等か不規則なる一部分の分解に起因するものならん。

オクタ-アセチル- α -タラリン

サボニン 5g を無水醋酸 25cc と共に砂浴上に軽く沸騰を持続すること1時間、冷後アルコールを和して蒸發濃縮し、水を注加すれば褐色の沈澱を生ず。之を濾取、水洗、アルコールに溶し反覆脱色し、アルコールの大部分を溜去し水を加ふれば白濁次で小板狀結晶性物質を生ず。然れども大部分はコロイド狀となりて濾取困難なるを以て之をエーテルにとり(サボニンはエーテルに不溶)エーテルを乾燥溜去し更に純エーテルにて冷時之に易溶なる部分を集め、無水アルコールより再結晶法を試みたるが一一定形の結晶を得る能はず。止むなく白色結晶性の粉末として諸種の性状を検したり。本品は 143° 附近より軟化を始め漸次泡起(分解なるべし)して判然たる融點を示さず。リーベルマン氏反應は元のサボニンに比して大差なし。

旋光度(數日間硫酸エキシカトル中に放置したる標品)

物質 0.3126g を 50cc の無水アルコールに溶し 2dm 管にて室温 9° に於て測定せ。に僅に $+0.05$ を認め得るに過ぎず。 $[\alpha]_D^{20} = +4.0^{\circ}$ (?)

酸數

物質 0.4422g 終末點明瞭ならざれどフェノールフタレインを標示薬とし

$\frac{N}{10}$ 酒精製カリにて滴定するにアルカリ消費量 3.6cc

故に S.Z. = 45.6 1 鹽基性酸とすれば M.G. = 1228

鹼化數

1) 物質 0.2532g を $\frac{N}{10}$ 酒精製カリ 20cc と共に水浴上 30 分間加熱したる後 $\frac{N}{10}$ HCl にて還測す。アルカリ消費量 18.56cc $\therefore$ V.Z. = 411.

2) 同 0.2242g のカリ消費量 17.70cc " = 442.

從つて E.Z. = 365.4 或は 396.4

$C_{30}H_{64}O_{19}(COCH_3)_8$ と假定し元サボニン2分子のアルカリを消費する。

を以て E.Z. は計算上 426 となる。

乾燥減量 硫酸乾燥器中に永く放置せる標品を 110° 減壓下に 8 時間乾燥せる場合の

減量 5 回の平均 3.35%

分析 同上の乾燥品

1) 物質	0.0655g	CO ₂ :	0.1438g	H ₂ O:	0.0410g	C%	59.88	H%	6.96
2) "	0.0742	"	0.1635	"	0.0442	"	60.09	"	6.61
3) "	0.0529g	"	0.1151g	"	0.0298g	"	59.34	"	6.26
4) "	0.0739	"	0.1629	"	0.0444	"	60.15	"	6.69
5) "	0.0806	"	0.1761	"	0.0499	"	59.59	"	6.88
C ₅₀ H ₆₄ O ₁₉ (COCH ₃) ₈ とすれば理論量							"	60.37	" 6.71

ラスト氏法による分子量

分子量著しく大なるを以て本法による成績は信じ難しと雖、本品が元サポニンと異り樟腦に可溶なるを以て、滴定の成績と對照するため測定を行へり。

1) 物質	12.1mg	樟腦	100.5mg	降下度	4°	∴ M.G. = 1204
2) "	23.3	"	101.5	"	6.5°	" = 1411
3) "	24.0	"	84.7	"	8.5°	" = 1333

上記分子式を採用すれば計算量

M.G. = 1312

α-タラリンの接觸還元

サポニン 2.0g を 60cc のアルコールに溶解し、鹽化白金 1g を 10cc の水に溶し N-苛性ソーダにて中和せる液を加へ、室温大約 19°, 大氣壓 260° 程度にて水素を附加せるに、水素の吸収容易ならず、20時間を経て初て全液黒變し初めたり。觸媒の撰擇適當ならざりしか或は本物質が接觸還元によりては容易に分解せられざるによるものならむか。よりて尙 20 時間振盪を續行し水素の吸収殆んど止みたるの狀を認めたるが故に内容を濾取し 1/3 量に濃縮し水を加へたるに白色の沈澱を生じたり。得量 1.4g。之を無水アルコールに溶しエーテルを加へたるに白色の沈澱を得。本法を更に反覆し、最後に無水アルコール溶液より靜かにアルコールを蒸散せしめ白色結晶性の粉末を得たり。本品は 195° より稍々黃變し、210° 前後より收縮、229° に於て一瞬に分解し、尙著明なる酸性と、リーベルマン氏反應とを有す。

前記沈澱を濾取せる水溶液を炭酸バリウムにて中和し乾涸したる後 95% アルコールにて反覆抽出し、アルコールを去り飴狀のエキスを得。このものの水溶液はフェーリング氏液を著しく還元し甘味を有す。その一部をとりフェニールオサゾーンを作りたるに黄色針狀の結晶多數を得、アセトンにて洗滌せるに殆んど大部分殘留し、分解點 211° を示す。即ちグリコールオサゾーンに一致す。故に接觸還元により少くとも一部の分解を惹起し葡萄糖を遊離したること明なり。

溶血作用(播磨光春君協力實驗)

大體に於て Kobert 氏に準據せる試験を行へり。

脱纖維牛血を 0.9%の滅菌食鹽水(pH=6.29)にて 2%の Blutaufschwammung とす。その pH=6.32. α-タラリンは食鹽水に不溶なるを以て $\frac{N}{10}$ NaOH 少許を加へて 2%溶液となし、 $\frac{N}{100}$ NaOH 及び $\frac{N}{100}$ HCl の食鹽水を用ひて諸種の pH を有する檢體を作る。觀察の方法は本誌上余の第一報に挙げたるものと様なるを以て省略す。室温 11-12°, 20時間以内の溶血指數を求め、pH の測定には血液漂泳の代りに 5cc の食鹽水を加へて 10cc としたるものを用ふ。即ち上記の如く 0.9% の食鹽水と之に血球を懸垂せるものととの pH の間には僅に $\frac{3}{100}$ の差異を認めたるのみなるが故なり。

メルクの精製サボニン 2% の食鹽水溶液は pH 6.34 にして同一血液標品に對し溶血指數 16600 を示す。

種々の pH に於ける α-タラリンの溶血指數は多數の實驗の結果次の如き成績の溶血指數を與へたり。

pH 5.04 以上はサボニンを加へずとも酸自身によりて溶血起る。

pH 5.27 にて 83300

pH 5.55 にて 55500

pH 6.41 にて 16600

pH 7.01 にて 11000

pH 7.63 にて 500000 以上。この pH のアルカリ度のみにては溶血起らず

pH 8.16 にて これ以上のアルカリ度にてはアルカリ自身による溶血起る。

この成績より見るときは α-タラリンは酸性に於て溶血力强まり中性に近づくに従ひて減退し、アルカリ性となればその力急激に高まるが如し。而してメルクの純サボニンと同一 pH に在りてはその溶血力亦殆んど同一なるを見る。

(PH の値はヒンヒドロ電池法にて測定せるものなり)

縮合劑としての蓚酸 (第一報)

無水フタル酸とフェノール類

藥學士 中 西 莊 吉

S. Nakanishi: Oxalsäure als Kondensationsmittel (I.)

Kondensation von Phtalsäureanhydrid mit Phenole.

従來オキシアントラヒノン類は無水フタル酸及其に對應せるポリオキシベンゾールとの濃硫酸〔Houben-Weyl: Die methoden d. org. Chem. II, 913 (III Aufl.