3) 同 473 號 565; 514 號 1001.

4) H. Scholz, Untersuchung hochsiedender Bestandteile ätherischer Öle. Inaugural-Disser-tation der Univ. Leipzig, 1930, s. 87-97.

5) Ber. Schimmel. Jubiläumsausgabe 1929. 267-282.

邦産升麻の生薬學的研究

宗 定 哲 二

(熊本薬學専門學校生薬學教室)

T. Munesada: Pharmakognostisch-botanische Untersuchung
über die japanische Droge 'Sho-ma'.

升麻は一に周麻とも稱せられ古來その品種多く異説數ふべからず。本草綱目にすでに川升麻 雞骨升麻 落新婦 鬼臉升麻等の名稱を載せたり。その原植物の如きも區々として分明ならず。然れども現支那市場に於ける升麻は本邦のサラシナシヨウマ(毛茛科)に類すと云ふ。¹⁾

本邦市場のものを見るに黒升麻及び赤升麻の二を主とするが如きも基原明ならず。我が國にては從來黒升麻にはサラシナシヨウマ *Cimicifuga foetida* L. var. *intermedia* Regel を以てこれにあてたり。その外オホバシヨウマ *C. japonica* Spreng ミツバシヨウマ *C. biternata* Miq. の如きもよく山野に自生せるを見るものにしてその根莖の形狀サラシナミヨウマと區別しがたし。本草綱目の鬼臉升麻はオホバシヨウにして本邦にて日光升麻と稱するはサラシナミヨウマに外ならずとも云ふ。

また赤升麻と稱するは虎耳草科のトリアシシヨウマ *Astilbe Thunbergii* Miq. var. *Congesta* Boiss., チダケサシ *A. chinensis* Fr. et Sav. var. *japonica* Maxim. を以てこれにあてアワユキサウ *A. chinensis* Fr. et Sav., アハモリシヨウマ *A. japonica* Miq. をも混用するが如し。小野蘭山によれば落新婦はアワユキサウなりとも稱せらる。²⁾

大和本草に「本邦の俗醫升麻と稱して用ふる物二種あり一種は烏の足と云 其葉芹に似たり 一種はたで付と云ひ 葉も莖も犬たでに似たり 二種共に升麻にあらず」とあり。³⁾ 本草綱目啓蒙に「あはもり升麻は又其の下品なり又古は金線草(ミヅヒキサウ)の根を升麻に偽り賣故にたで升麻、みづひき升麻の名あり」⁴⁾とありて *Astilbe* 属のものは次品または代り、と考へられたるが如く、なほミヅヒキ *Polygonum virginianum* L. var. *filiforme* Nakai もまた市場に出でたることあるが如し。

ノカラマツサウ *Thalictrum simplex* L. var. *affine* Regel の根もまた往々にしてこれを焼きて升麻に偽ることありとも稱せらる。⁵⁾ この外升麻なる名稱を附する植物にヤマブキシヨウマ *Aruncus silvester* Kostel. var. *americanus* Maxim (薔薇科) の如きものあれども生薬としては混交すること少かるべし。

斯くの如くその基原に就いては種類多き爲めこれを詳細に知るは不可能なり。然れども本邦市場のものは其の外形及び構造より見て黒升麻は *Cimicifuga* 属のものにして赤升麻は *Astilbe* 属のものなることは誤なからん。

升麻の化學的研究に至りては文獻に乏しく僅に北米産の *Cimicifuga racemosa* Bart. の根莖よりタンニン質、糖類、鹽基性物質、有機酸等を檢出したるを聞くのみ。またその生薬學的研究に於ても同植物に關して數種の文獻を見るのみなり。

著者は本邦産前記植物殊に *Cimicifuga* 並に *Astilbe* 兩屬植物の生薬としての差異を比較せんと欲し研究に着手せしに兩者は外觀、解剖、反應上より明に區別し得るものなれども同一屬内の種に就ては相異點を認め難きを知りたり。

1. 市場品の形状

黒升麻：灰黑色にして直徑 1-2cm の根莖なり。多くは分岐著しくして甚だしく不整形をなし稍々眞直のもの、彎曲せるもの等あり。長さ 10cm に及ぶものもあり外面に縦皺ありて處々に横走の輪節を示すことあり。細根又はその痕跡を有す。往々往個々數個の地上莖の基部を附することあり、或はその脱落によりて特異の凹入皿狀を呈す。質堅硬にして折難くその破切面は平坦ならず灰褐色乃至青黑色を呈し稍々纖維性の黄褐色を帯びたる脈管束によりて放射線をあらはす (Fig. 1-2)。しばしば空洞をなすことあり。著臭を認めず稍々收斂性にして苦味強し。

赤升麻：外面暗褐色を呈し多くは 1-2cm の厚さに横切せるものなり。直徑 1cm 内外なれども往々にして 2.5cm に至るものあり。表面に細根又はその殘痕を有することあり。又稍淡褐色の微細なる鱗毛を被るもの、輪節の顯著なるもの、叉狀に分岐せるもの等あり。各片の兩面は暗褐色にしてその外周には淡褐色の脈管束の並列による著明なる放射線を描き髓部は皿狀に陥沒せり (Fig. 13-14)。

質堅強にして破碎しがたく、破切面は粗糙にして著しく纖維性なり。特臭を有せず、その味稍若くして著しく收斂性なり。

2. サラシナシヨウマ *Cimicifuga foetida* L. var. *intermedia* Regel.

市場の黒升麻と比較するに外觀、構造、反應ともに異同を認めず。根莖の構造：外部は擬上皮によりて被はれその各細胞は僅かに厚膜化し汚褐色を呈す、アルカリによりて黄色を帯びアルカンナ丁幾、ズダン III の液にて微に赤くなる。表面より見れば多角形をなす (Fig. 3 Md, Fig. 4)。

外皮部は主として略圓形にして薄膜性の柔細胞より成るも外周に近き部位には單獨または數個の群をなす核細胞を認む。その各細胞は膜壁の層理明にして多數の孔紋を有しよく木化せり (Fig. 3 Sz, Fig. 5 Sz)。

内皮部は幅狭き篩管部を有しその外邊には數個又は 10數個の細胞より成る纖維群を認めその縦斷面に於ては孔斑著明なり (Fig. 3 Fs, Fig. 6)。皮部髓線は幅廣くその各細胞は薄膜性にして半徑の方向に延長せり (Fig. 3 Ms)。

第 一 圖

第 二 圖

第 三 圖

第 四 圖

新生組織は脈管束内のものは明なれども束外のものは概して不明なり (Fig. 3 Cm).

脈管部は割合狭長にしてその脈管は多くは稍多角形をなし著しく木化せる膜壁は主として孔紋・網紋・階紋を示すも最も内側にある第一期脈管は環紋または螺旋紋を有す。また脈管の側壁に大なる側孔を認むることあり (Fig. 8).

木部髓線は數列より十數列に至る半徑性に延長せる略長方形の薄膜性細胞より成る (Fig. 3 Ms).

髓はほぼ圓形の薄膜性細胞より成り木化せず、孔紋は割合著明なり。

全組織を通じて所々に著明の汚褐色又は赤褐色を呈する内容物を有する細胞あり、その内容物は酒精、エーテル、テレピン油、クロロフォルム、抱水クロラール溶液に不溶なり (Fig. 3 Se)。また各部の柔細胞は澱粉及び油滴を有す。澱粉は徑 7μ に達する球狀または橢圓に近き形狀を有する單澱粉粒をなしその層紋・臍點は認めず (Fig. 9 St)。油滴は球狀をなし甚だ小にしてズダン III にて赤染しオスミウム酸にて黒色となり酒精・抱水クロラールに溶けず、エーテル、クロロフォルムに可溶なり (Fig. 9)。結晶性物質は全組織中に認めず。

本根莖の斷面又はその浸出液に過クロール鐵を加ふるに稍青黒色を呈するのみにして顯著ならず。斷面にワニリン鹽酸又はジメチルアミノベンザアルデヒド液を加ふるに呈色せず、オルチン鹽酸を加ふれば木化せる細胞膜のみ褐紫色乃至汚紫色を呈す。

粉末を乾溜するも褐色のテール様物質を溜出するのみ。

根の構造：根莖より出づる根はその直徑 1.5mm を超ゆるもの稀にして黒褐色を呈す。横斷面をルーベにて見るに中心柱に於ける脈管束は四弧性なり。顯微鏡によりて檢するに上皮細胞は半徑の方向に延長しその外側の細胞膜は角皮により被はれ外方に半圓狀に突出せり、表面よりうかがへば各細胞は縦の方向に長くして長方形を呈し縦の壁は著しく波狀を示す (Fig. 11-12)。

柔細胞は澱粉粒及び油滴を含有す。

其の他の *Cimicifuga* 屬。本屬植物中本邦に割合よく見る次の二種に就いてその根莖の外観・構造・反應を檢するに市場の所謂黒升麻と一致しサラシナショウマと區別するを得ず。

オホバショウマ *Cimicifuga japonica* Spr.

ミツバショウマ (イヌショウマ) *C. biternata* Miq.

3. チャゲサシ *Astilbe chinensis* Fr. et Sav. var. *japonica* Maxim.

山野に自生せるものを輪切して乾燥し市場の赤升麻と比較するに略同一の形狀をなしその構造・反應に至りては全く區別するを得ず。

根莖の構造：根莖の表面には、屢々毛鱗を見る、これを檢するに多細胞性に褐色

の細胞膜を有しワニリン鹽酸に櫻赤色を呈する内容物を有す (Fig. 15). 根莖の横斷面を檢するにその外部は觸線性に延長せる數層の杓細胞によりて被はれその各細胞の膜壁は暗褐色を呈しその内に暗褐色の内容物を含む細胞膜、内容物共に過クロール鐵液にて黒青色を、オスミウム酸液にて黒色を、ワニリン鹽酸にて櫻赤色を呈す (Fig. 16 Kk).

杓層下には厚膜組織を認めずして直ちに薄膜性の柔細胞となる。

第一期皮部は澱粉に富みまた所々に多數の蓆酸石灰の簇晶を認む。篩管部の外邊には纖維群ありてその膜壁は厚化し木化反應を呈す縦斷面に於ては割合兩端尖鋭ならず孔斑著明なり (Fig. 16 Fs, Fig. 18).

新生組織は脈管束外のものは不明なり。

脈管部に於ては所々に著明の年輪層を有すること多し。脈管は主として階紋又は孔紋脈管をなし往々にしてその側壁に長橢圓形の大なる孔斑數個連接せるを認むることあり (Fig. 16 Gf, Fig. 17). 脈管部と髓との境界に存する第一期脈管のみは多くは螺旋紋脈管をなす (Fig. 16 Gp).

髓線は廣幅くして多くは各細胞は半徑性に延長し澱粉に富み所々に蓆酸石灰結晶を有す。

全組織を通じて所々に褐色の内容物を有す細胞あり、この内容物は水、酒精、エーテルに不溶にして過クロール鐵にて黒青色と、濃厚苛性カリ液にて黒褐色に、オスミウム酸液にて黒色に、ワニリン鹽酸にて鮮櫻赤色となる (Fig. 16 Se).

柔細胞は何れも直徑 15μ に至る澱粉粒と共に微細なる油滴を含有す。

根莖の斷面にワニリン鹽酸又はデメチルアミノベンザルデヒド液を注げば著しく櫻赤色となりオルチン鹽酸にては木化せる部分のみ赤紫色となる。斷面また浸出液に過クロール鐵液を加ふれば著しく青藍色を呈す。

粉末の乾溜によりては特徴を發見せず。

なほ同屬の植物トリアシショウマ *Astilbe Thunbergii* Miq. var. *Congesta* Boiss. アワモリショウマ *A. japonica* Miq. に就いて檢するにチダケサシと區別するを得ず。

4. ミヅヒキ *Polygonum virginianum* L. var. *filiforme* Nakai.

山野に自生せる宿根草にしその根莖は直徑 2.5cm に及ぶものあり外面帶褐色を呈し堅硬なり。横斷面に於ては黒褐色の皮部によりて圍まれその内に類白色の木部を認む。皮部は厚さ 3mm を超ゆること稀なり。木部は狹長なる脈管部と稍濃厚なる色調を有する髓線とが交互に半徑性並列して放射線を描きその中心に類白色にして他と區別し易き髓を有す (Fig. 19). 著明の香氣を有せず嚼めば稍收斂性なり。新しき斷面を少時空中に曝せば青藍色を帶ぶるに至る。

構造. 外部を圍む杓層は數層の黒褐色を呈する杓細胞より成りその各細胞は觸

線性に延び薄膜性なり。その直下には厚角組織を認めずして殆んど圓形をなす柔細胞より成り多量の澱粉と僅少の油滴とを包藏す。澱粉は直徑 12μ に至る單澱粉粒又は 2-7 の複合澱粉より成る (Fig. 21)。また所々に蓚酸鹽の簇晶を認む (Fig. 20 Kr)。

篩管部は狹長にしてその外側に纖維群あり。脈管部との境界面は内方に突入せり。

皮部髓線は幅廣くして各細胞は篩管部と明に區別せらる。

木部は各細胞の膜壁多少厚化し孔斑著明なり。脈管はほぼ 1 列に半徑性に配列せり。その縦斷面に於ては多くは階紋脈管をなしただ髓に近き部分の第一期脈管のみ螺旋紋をあらはせり (Fig. 20 Gf)。

木部髓線は略長方形をなし著明の孔紋を有する細胞より成り髓に近き部位に於てはその細胞膜の厚化特に著しく脈管部との區別稍々困難となる (Fig. 20 Ms)。

髓は圓形の細胞より成り薄膜性にして澱粉に富み蓚酸鹽の簇晶を有す。

斷面にワニリン鹽酸又はデメチルアミノベンザアルデヒド 硫酸を注加すれば櫻赤色を呈し過クロール鐵液を加ふれば深青藍色を呈す。

摘 要

上記の如く *Cimicifuga. Astilbe* 兩屬間の區別は難からざれども同屬内に於てはこれを區別すること困難なり。また所謂タデ升麻(ミヅヒキ)は全々別の構造を有するを以て混交することなかるべし。

	サラシナシヨウマ屬	チダケサシ屬
枹屬	有せず、擬上皮あり	有す
石核細胞	外皮部にあり	なし
結晶	なし	簇晶あり
ワニリン鹽酸	斷面呈色せず	斷面櫻赤色となる
オルチン鹽酸	木化せる部分のみ 僅に汚赤褐色となる	木化せる部分のみ美赤紫 色となる
過クロール鐵	僅に呈色す	著しく青藍色となる

本研究に當りては學校長村山博士は種々の便宜を與へられ標品鑑定には緒方正資、上妻博之兩氏にまた標本採集には近藤飛彈夫氏に負ふ所大なり。なほ川上貞雄氏は終始實驗上の勞をとられたり。上記諸氏に深く感謝す。

文 獻

- 1) 中尾萬三、木村康一；漢藥寫真集成 1, 67 (1929)
- 2) 小野蘭山；本草綱目啓蒙第 9 卷
- 3) 貝原益軒；大和本草第 6 卷
- 4) Wehmer, C.; Pflanzenstoff: 1, 314 (1929)

圖 版 説 明

Fig. 1-2: 市場の黒升麻

1. 生薬全形 2. 生薬横断面(ルーベにて見たるもの)

Fig. 3-12: サラシナショウマ

3. 根茎横断面 4. 表面より見たる擬上皮 5. 外皮部の觸線性縦断面
6. 篩管部外邊の纖維 7. 脈管束横断面(新生組織附近) 8. 脈管部縦断面
9. 澱粉及び油滴を有する柔細胞 10. 根の横断面(ルーベにて見たるもの)
11. 根の表皮を表面より見たるもの 12. 根の表皮附近横断面

Fig. 13-14: 市場の赤升麻

13. 生薬全形 14. 生薬横断面(ルーベにて見たるもの)

Fig. 15-18: チダケサシ

15. 根茎表面の毛鱗 16. 根茎の横断面 17. 篩管部外邊の纖維
18. 脈管部縦断面

Fig. 19-21: ミヅヒキ

19. 根茎横断面(ルーベにて見たるもの) 20. 根茎横断面 21. 澱粉粒

Cm: 新生組織; Ct: 角皮, Ep: 上皮, Fs: 纖維, Gf: 脈管又は脈管部, Gl: 孔紋脈管,
Gp: 第一期脈管, Gs: 螺旋紋脈管, Gt: 階紋脈管, Kk: 枳層, Kr: 蓚酸石灰結晶, Md:
擬上皮, Ms: 髓線, Oe: 油滴, Sb: 篩管又は篩管部, Ss: 分泌物細胞, St: 澱粉, Sz: 石核
細胞.

(昭和6年6月4日, 熊本藥學專門學校生薬學教室にて)

日本産タラ肝油の生薬學的研究 (第十二報)

河 合 龜 太 郎

K. Kawai: Pharmakognostische Studien
über den Lebertran des japanischen Dorsch ("Tara").
(XII. Mitteilung).

本報は本誌本年4月號(第51卷第4號)所載第11報の繼續なり。

第 一 編

肝油の理化學的諸性質

本編には肝油の比重・屈折率・酸度・鹼化數・沃度數及び不飽和物量に關する研究成績を掲載す。

(注意)爰に試料肝油に就き特記すべき一事あり。其は漁場に於てタラを購ひ魚體・肝臓の實驗に關聯して製出したる油粒に各地の製油所より特に試験用として蒐集せる試料には脱蠟を行はざるもの多きこと之れなり。勿論市場に於ける薬用肝油は各國藥局方の規定に準じ製造後冷凍に依り所謂蠟分(Stearin)を脱却したるものなるが故に嚴密なる意味に於ける兩者の比較には此の點に留意すべきこと當