本研究に當りては學校長村山博士は種々の便宜を與へられたり。なほ川上貞雄氏は終始實驗上の勞をとられたり併せて感謝の意を表す。

文 献

- 1) 工藤祐舜：日本有用樹木分類學，225 (昭和 5 年)
- 2) 松村任三：植物名彙，I, 14 (大正 4 年)；II, 24 (大正 5 年)
- 3) Dragendorff, G.: Heilpflanzen, 289 (1898)
Engler-Gilg: Syllabus der Pflanzenfamilien, 233 (1924)
- 4) Wehner, C.: Pflanzenstoffe I, 485 (1929)
- 5) 淺野三千三：日本藥報 7, 7 (昭和 7 年)

圖 版 説 明

Fig. 1-7: 合歡皮

1: 横断面, 2: 枹層の髓線性縦断面, 3: 石核細胞, 4: 髓線附近の横断面擴大, 5: 篩管部半徑性縦断面, 6: 篩管部髓線性縦断面, 7: 澱粉。

Fig. 8: サイカチ樹皮

8: 内皮部及び附近の横断面

Fig. 9: イヌエンジュ樹皮

9: 外皮部横断面

Fs: 纖維, Kk: 枹層, Kr: 蓆酸石灰結晶, Ms: 髓線, Sb: 篩管または篩管部, Sp: 篩板, St: 澱粉, Sz: 石核細胞

(昭和 7 年 2 月 10 日 熊本藥學專門學校生藥學教室にて)

地骨皮(枸杞皮)の生薬學的研究

宗 定 哲 二

(熊本藥專生藥學教室)

T. Munesada: Pharmakognostische Untersuchung
der Wurzelrinde von Lycium-Arten.

クコは本州九州四國を始め臺灣朝鮮支那の各地に分布せる茄科の植物にして草本狀灌木をなし *Lycium chinense* Miller¹⁾ なる學名を有す。古來枸杞なる漢名を以て之に充て所謂地骨皮はその根皮の生薬名なり。古書には苦彌、杞根、却暑、却老根、仙杖、地骨冠、金山茄根等の異名を載せまたヌミグスリなる和名を記したり。和語本草綱目²⁾ には「此れ枸杞の根の皮なり。其根長くして地下に行く故に地骨

の名あり」とした小野蘭山²⁾は枸杞に二種ありて唐ゴコ及びオニゴコを區別し前者を眞のものなりとし後者は枸棘にして枸杞に非ずとせり。而してオニゴコの異名としてオランダゴコ、アマクサゴコ、ヤブトウガラシ、アマゴシヤウ等を挙げたり。其他の文獻に於ても *Lycium chinense* Miller を以て枸杞の原植物とするは一致せるが如し。

Lycium 屬植物成分の化學的報文を案するに古屋恒次郎氏³⁾はクコの果實よりベタインを證明した。他の同屬植物に於ても果實にベタイン及び色素の存在を記載するものありと雖も根皮に就ては報告せられたるを聞かず。⁴⁾

市場の地骨皮を検するにその形狀、構造ともに野生のクコの根皮に一致す。著者は本邦内地市場品竝に朝鮮の藥舗にて販賣するものに就いてクコの根皮と比較しなほ二三他の本屬植物根皮との差を知らんとして本實驗に著手せしも何れも同様の外觀構造を有し異同を辨すること能はざりき。

生 薬 の 形 状

市場の地骨皮は多くは管狀または槌狀をなし厚さ 1 cm 長さ 5 cm に及ぶものあり外面は黄褐色にして粗糙、龜甲狀の凹凸あり、内面は汚灰褐色にして縦の方向に微細なる線紋を示す。破碎し易くその切面に於ては内外の二層を認むべし。外層は稍厚くして往々にして内層よりも大なるものもあり、黄褐色にして甚だ輕質脆弱なり。内層は灰白色を呈し稍平坦、質緻密堅硬なり。

氣味緩和なれども水を加へて熱すれば微に特香を認む。嚼むも殆んど無味にして後僅に苦味を感じるのみ。

斷面をルーペを以て見るに白色の粉狀物質の存在するを見、殊に内層部に於て多量なるを知るべし。また横斷面に於ける黄褐色の外層中には觸線性に延びたる數個の線條を認め、灰白色の内層の半徑性縱斷面に於ては褐色の縦線と類白色のものが交互に並列せり。

生 薬 の 構 造

顯微鏡を以て檢するに黄褐色の外層中には數層の枳層 (Fig. 3 Kk) の觸線性に走るを見る、その細胞は半徑の方向に短く濃褐色を呈する。薄膜性細胞膜を有しこれを觸線性斷面に於て見れば縦の方向に稍短き長方形または多角形の枳細胞緊密に連續しその側壁の著しく波狀をなすを認むべし (Fig. 4)。

これらの枳層間の細胞は巨大にして略圓形をなし各細胞は多くは空虚なれども所々に碳酸石灰の砂晶を含むものあり、またその膜壁は枳質反應、木化反應を示し往々にし孔斑を認むることあり (Fig. 5)。

外層に連接する内層もまたすべて薄膜性細胞より成り厚膜のものを認めず。そ

の枳層に近き部位の細胞の膜壁には稍著明の孔斑を有するもの多し (Fig. 5).

髓線は枳層に及び之に接續するもの多く常に 1 列の細胞より成りその各細胞は半徑性に延長せる長方形をなし縦斷面に於ては圓形を示し高さ 11 個の細胞を超ゆるものは甚だ稀なり、澱粉に富むも蓆酸石灰を有すること少し (Fig. 3, 6, 8 Ms).

篩管部は髓線間に介在し其の柔細胞は澱粉に富みまた蓆酸石灰の砂晶を有す。篩管群は所々に壓縮せられ多くは觸線の方に延長せる不規則の形狀を呈し横斷面に於てもすでにその篩板の結節狀をなせるを認むるも縦斷面に於ては種々の形狀のものを明視し得べくまた兩篩管間の側壁に數個連續せる篩板の存在するを知る (Fig. 3, 6-8 Lb, Sp).

本生薬中の澱粉は單澱粉粒また 2-7 個より成る複合澱粉をなしその各粒の多くは直徑 5μ 内外なれども 10μ 移にを越ゆるものもあり、臍點及び層理を認めず (Fig. 10).

斷面または浸出液は過クロール鐵、ワニリン鹽酸によりて呈色せず。粉末を乾溜するもテール様物質を得るのみなり。

二三の *Lycium* 屬根皮の構造

實驗に供せしは本校植物園培養のクコ *Lycium chinense* Miller にしてその根皮の形狀構造反應に於て市場の生薬と全く一致するを知りたり。

また著者が歐洲より種子を得て本校に栽培せし次の 2 種に就いて見るにその植物の外見形狀に於ては明に クコ と區別するを得れどもその根皮の構造、外觀共に差異を辨すること能はず。

Lycium ruthenicum Murr. (原產地東部ロシア、中央アジア)

Lycium halimifolium Mill. (原產地支那)

摘 要

市場の地骨皮は クコ の根皮とその外形構造全く一致す。然れども他の *Lycium* 屬植物根皮もまた同様の構造を有するものあるを以てこれと區別することは不可能なり。

本研究に當りては村山學校長は種々の便宜を與へられ川上貞雄氏は終始實驗の勞をとられたり。深く感謝の意を表す。

文 獻

- 1) 中井猛之進、小泉源一：大日本樹木誌 卷 1, 485 (昭和 2 年)
- 2) 岡本爲竹：和語本草綱目 卷 13
- 3) 小野蘭山：本草綱目啓蒙 卷 32
- 4) 古屋恒次郎：本誌 368, 998 (大正 1 年)
- 5) Wehmer, C.: Pflanzenstoffe II, 1081 (1931)

圖 版 説 明

地骨皮: Fig. 1-10

1: 生薬の全形, 2: その横断面をルーペにて見たるもの, 3: 顕微鏡にて見たる横断面, 4: 枳層の觸線性縦断面, 5: 枳層附近の柔細胞膜壁の孔斑, 6: 髓線附近の横断面, 7: 篩管部半徑性縦断面, 8: 篩管部觸線性縦断面, 9: 蓆酸鹽の砂晶, 10: 澱粉.

Kk: 枳層, Ks: 蓆酸石灰結晶, Ms: 髓線, Sb: 篩管または篩管群, Sp: 篩板, St: 澱粉.

(昭和7年2月17日 熊本藥學專門學校生藥學教室にて)

硫化ソーダ法による定性分析法に就て (第一報)

普通金屬の定性分析

高 木 誠 司

(東京帝國大學藥學科分析化學研究室)

硫化水素を主要分類試薬とする定性分析法は最も広く採用せられ居れども、硫化水素が不快臭を有し且つ有毒なるは大なる缺點なりとす。殊に排氣不完全なる實驗室内に於て多數の學生をして此毒ガスを濫用せしめ時々失心の事故を起すことあるは教育上寒心に堪へざるものと云はざるべからず。

故に硫化水素を使用せざる分析法の探求は夙に多數の研究者によつて企圖せられ既に完成せりと認め得らるるもの數種に及べり。然れども硫化物を利用する分析システムは遍く普及し居れるを以て全然硫化物を取扱はざるが如き、餘りに急激なるシステムの變革は學界及び技術界に共鳴せられざるの觀あり。然るに獨り Georg Vortmann (1908)¹⁾ の唱道し、Hanofsky 及び Artmann²⁾ の繼承せし所謂硫化ソーダ法は硫化水素の代りに硫化ソーダを使用する方法にして、分析法の順序及び分類は硫化水素法と聊か相異なる點あれども、硫化物を取扱ふ點に於て其軌を一にするを以て注目すべき方法なりと云はざるべからず。

此所謂硫化ソーダ法に於ては硫化ソーダを可及的アルカリ性溶液に於て使用するが故に硫化水素發生の機會少きを特長とす。即ち硫化水素は全然發生せざるに非ず。例へば硫化物を酸に溶解せしむる際に硫化水素發生すれども、其量たるや甚だ微々たるものにして、假令多數實驗者の集團的使用の際と雖も、室内の空氣を汚染すること甚しからざるなり。