Rhynchophyllins, aber fehlt es dem vordern nur die Reaktion von Wismuthsubnitrat-Schwefelsäure. Unter vielen wären die folgende charakteristisch: $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4$ rot — grün — gelb, Chlorkalk + H_2SO_4 rosarot, Molybdän-Schwefelsäure farblos — blau, Formalin-Schwefelsäure farblos — rot, Schwefelsäure farblos.

Die durch Verseifung entstandene Aminosäure zeigt auch die ähnlichen Farbenreaktionen wie beim Hanadamin, färbt sie sich aber nicht durch Molybdän- H_2SO_4 .

Nach obigen Reaktionen könnte man dem Hanadamin die folgende Formel erteilen.

Unter den 4 Sauerstoffatomen in Hanadamin sind vielleicht 2 O in $-\text{COOCH}_3$, der dritte im alkoholischen Hydroxyl gebunden.

Die Stickstoffatome des Hanadamins sind wahrscheinlich beide tertiär, an welchen kein Methyl gebunden ist.

S. Keimatsu, K. Yokota und J. Satoda: *Ueber Organo-Selenverbindungen. (IV. Mitteil.)*

Wir haben bisher hauptsächlich über Synthesen von Selenphenolverbindungen der Konstitution wie

mitgeteilt. (vergl. Journ. of Pharm. Soc. Japan Nr. 580, 531; Nr. 594, 605; Nr. 598, 1007). Theoretisch sind noch viele neue Verbindungen zu erwarten je nach Art der Atomgruppen und Stellung derselben gegenüber Selen im Kern. Im folgenden seien einige neue Resultate unserer Untersuchung mitgeteilt.

(I) *Synthese des o-Oxydiphenylselenid*

Durch Einführung von 1 Oxygruppe in die Formel I sind theoretisch folgende Isomere möglich :

Von diesen Verbindungen ist bereits in der I. Mitteilung (loc. cit.) das p-Oxyderivat beschrieben worden. Dasselbe wurde durch Verseifung des durch Kondensation von p-Aminophenol-acetatdiazoniumsalz mit Selenophenolat erhaltenen p-Acetoxydiphenylselenid leicht synthetisch erhalten. Aber diese Methode lässt sich nicht zur Synthese des m- und o-Derivates verwenden, weil m- und o-Aminophenolacetat, die als Ausgangsmaterial dienen, sich schwer synthetisieren lassen. Daher wurden, wie in der II. Mitteilung (loc. cit.) darauf hingewiesen wurde, m- und o-Bromdiphenylselenid hergestellt und durch Anwendung der Methode von Rosenmund (Ber. **35**, 2232 (1920)) gelang es m-Derivat sicher zu synthetisieren, aber bei der o-Verbindung war die Ausbeute schlecht und es konnte nur eine unreine Substanz erzielt werden.

Auf folgendem Wege wurde nun diesmal die o-Verbindung bestimmt synthetisch erhalten :

Durch Kondensation von o-Nitranilin-diazoniumsalz mit Selenophenolat wurde zunächst o-Nitrodiphenylselenid (gelbe Nadeln vom Fp. 92°) erhalten. Letzteres wurde durch Reduktion in o-Amino-diphenylselenid (Kp. 159° unter 1.4 mm; Fp. 35°. Farblose Nadeln) übergeführt und nach Diazotierung des Chlorhydrats (Zp. 163°. Farblose Nadeln) in Eisessigsuspension mittels Amylnitrit und Zugabe von trockenem Äther wurde ziemlich stabiles Diazoniumchlorid (gelbes Pulver) erhalten. Auf dasselbe wurde nun die Methode von Wallach (A. 235, 234 (1886)), Hantzsch (Ber. 33, 1536 (1900)) angewandt, d. h. durch Erwärmen des erhaltenen Diazoniumchlorids mit Essigsäureanhydrid wurde die Diazogruppe durch Acetoxygruppe nach Wunsch glatt ersetzt. Nach Destillation des überschüssigen Essigsäureanhydrids wurde der Rückstand verseift, und durch Ansäuern des alkalilöslichen Anteils schied sich ein Öl ab. Durch Analyse wurde dasselbe als Oxyderivat identifiziert. Ausbeute: 35% der Theorie. (Hellgelbes Öl vom Kp. 120–131° unter 0,5mm).

Das durch Acetylierung des Oxyderivats in Pyridin mit Essigsäureanhydrid erhaltene Acetoxyderivat stellt ein hellgelbes Öl vom Kp. 137–138° unter 0,5mm dar. Wir glauben, dass diese Methode nicht nur zur Gewinnung des o-Derivats geeignet ist, sondern dass auf diesem Wege auch m- und p-Derivat synthetisieren lassen.

Mit der Absicht nach Bauer's Methode (Ber. 46, 93 (1913)) erhaltenes o,o'-Diamino-diphenyl-diselenid unter Anwendung derselben Reaktion d. h. unter Substitution der Aminogruppe durch Oxygruppe in o,o'-Dioxy-diphenyl-diselenid

überzuführen, wurde das Diaminoderivat dieser Reaktion unterworfen, aber das erwünschte Produkt konnte auf diesem Wege nicht erzielt werden.

(II) *Über Elektroreduktion des Selencyan-o-Nitrophenyl.*

Fr. Fichter (Ber. 44, 3636 (1911)) und seine Mitarbeiter berichten, dass sie zur Reduktion des Rhodan-o-Nitrobenzols die Methode der Elektroreduktion mit

Kupferkathode benutzen, wobei das primär entstehende Reduktionsprodukt sich umlagert und in Rhodan-p-aminophenol übergeht.

Gelingt es nun auf demselben Wege aus Selencyan-o-Nitrophenyl das Selen-p-aminophenol zu erhalten, so müsste man durch Verseifung des letzteren und durch nachfolgende gelinde Oxydation das Isomer des in dieser Mitteilung II (vergl. Journ. of Pharm. Soc. Japan Nr. **594**, 605) beschriebenen 3,3'-Diamino-4,4'-dioxy-diphenyl-diselenid, bekommen können. Das nach Bauer (loc. cit.) hergestellte o-Nitro-Selencyanbenzol wurde unter gleichen Reaktionsbedingungen der Elektroreduktion unterworfen, wobei nur die Nitro- und Selencyangruppe reduziert und das bereits bekannte o,o'-Diamino-diphenyl-diselenid erhalten wurde, sodass das erwartete Reaktionsprodukt nicht erzielt werden konnte. Kurz wir haben festgestellt, dass die Selencyangruppe gegenüber Rhodangruppe bei Reduktion nur geringen Widerstand entgegensetzt.

(III) *Über Synthese des p-Oxy-o'-carboxy-diphenylselenid:*

Da zufolge unserer II. Mitteilung (loc. cit.) p-Oxy-diphenylselenid

stark bakterizid wirkt und das später zu berichtende o-Carboxy-diphenylselenid

scheinbar pharmakologisch interessant wirkt, so glauben wir, dass die Synthese des p-Oxy-o'-carboxy-diphenylselenid, welches den chemischen Bau der beiden

eben erwähnten Verbindungen gleichzeitig aufweist, nicht ohne Bedeutung ist.

Die Synthese dieser Substanz gelang uns auf folgendem Wege :

Nach dem Schema (I) wurde zunächst Anthranilsäuremethylesterdiazoniumsalz durch Umsetzung mit Kaliumcyanselenid (KSeCN) in o-Selencyan-benzoesäuremethylester übergeführt und letzteres in ätherischer Lösung mittels Zinkstaub und 20%ig. Schwefelsäure reduziert, wodurch Selenosalicylsäuremethylester (Kp. 110° unter 2,5mm) erhalten wurde. Dann wurde eine alkoholische Lösung des Esteralkalisalzes bereitet und durch Kondensation mit dem Diazoniumsalz des p-Aminophenolessigesters p-Acetoxy-diphenylselenid-o'-carbonsäuremethylester (Kp. 205° unter 1mm; Fp. 92°. Farblose, rechteckige dünne Blättchen) hergestellt und durch Verseifung dieser Verbindung das erwünschte p-Oxy-o'-carboxy-diphenylselenid (Fp. 215°. Farblos, dünne rechteckige Blättchen) synthetisiert. Da von dieser Verbindung verschiedene Isomere möglich sind, so setzen wir diesbezügliche synthetische Versuche fort.

(IV) Über Organo-Selenmercuriverbindungen.

Waldo (Amer. Soc. **53**, 992 (1931)) hat mitgeteilt, dass durch Kondensation des Natriumsalzes der Thiosalicylsäure $\text{C}_6\text{H}_4\text{C}(\text{SH})(\text{COONa})$ mit Organo-mercurihalogeniden R-Hg-X viele Arten von Organo-Schwefelmercuriverbindungen resultieren, deren Natriumsalze wasserlöslich und stark bakterizid sind. Da wir glücklicherweise Seleno-Salicylsäurederivate in Händen hatten, haben wir sofort die Kondensation mit Organo-mercurihalogenid versucht und einige neue Organo-Selenmercuriverbindungen bekommen und möchten darauf hinweisen, dass bei ähnlichen homologen Schwefel- und Selenverbindungen doch grosse Unterschiede abwalten.

1) *Äthylmercuri-seleno-salicylsäure.*

Nachdem in der Wasserstoffatmosphäre eine alkoholische Lösung des neutralen Salzes der Selenosalicylsäure durch Umsetzung der letzteren mit 2 Mol. NaOH bereitet worden war, wurde eine alkoholische Lösung des Organomercuri-halogenids, welch' letzteres aus Grignard-Reagens und Mercurichlorid hergestellt werden kann, tropfenweise zur alkoholischen Lösung des Dinatriumselenosalicylats zugefügt und die Reaktion bei 30–40° vor sich gehen lassen:

Nach Zusatz wurde das Rühren etwa 3 Stunden fortgesetzt und nachdem die Reaktion vollständig beendet war, wurde der Alkohol bei möglichst niedriger Temperatur abdestilliert. Der Rückstand wurde in Wasser aufgenommen, dann von unlöslicher Substanz abfiltriert, das klare Filtrat mit Essigsäure angesäuert und das Ausscheidungsprodukt gesammelt. Kristallisiert man das letztere bei 40° aus Alkohol um (bei höherer Temperatur erfolgt Zersetzung), so erhält man es in hellgelben, grossen Kristallen. Zp. 112–115°. Ausbeute: 52% der Theorie.

Nach der Methode von Rupp und Noell (Ber. **39**, 3702; Ber. **40**, 3276) wurde der Quecksilbergehalt quantitativ bestimmt und für die obige Substanz ihre Konstitution festgelegt.

2) *p-Äthylmercuri-selenobenzoessäure.*

Da p-Äthylmercuriseleno-benzoessäures-Natrium in Alkohol unlöslich ist, so wird, ausgehend vom p-Carboxy-selenophenol, dessen neutrales Alkalisalz in alkoholischer Lösung mit der alkoholischen Lösung des Äthylmercurichlorids tropfenweise versetzt, wobei sofort das Reaktionsprodukt ausfällt, sodass man nötig hat, dasselbe abzufiltrieren.

Zp. 325–330°. Farblose Prismen. Ausbeute: 61% der Theorie.

3) *Propylmercuri-seleno-salicylsäure*.

Hellgelbe Masse. Zp. 111–113°

4) *p*-Propylmercuri-selenobenzoessäure.

Farblose Kristalle. Da sie sich beim Erwärmen langsam zersetzt, so ist der Zp. nicht klar.

Die obigen Verbindungen sind löslich in Alkohol, Aceton, aber unlöslich in Benzol, Äther, Petroläther, Chloroform etc. Beim Stehen der wässrigen Lösung des Natriumsalzes trübt sie sich allmählich und scheidet unlösliches Quecksilberalkyl $\text{Hg}(\text{R})_2$ ab. Auch beim Stehen der alkoholischen Lösung der freien Säure scheidet sich unlösliches Dicarboxy-diphenyl-mercuridiselenid ab. Es wurde erkannt, dass die Zersetzung bei gewöhnlicher Temperatur langsam in folgender Weise vor sich geht:

Mit steigender Temperatur erfolgt die Zersetzung schneller, z. B. findet die Zersetzung in Diselenid und Quecksilber in folgender Weise durch 2 stündiges Kochen der Methanollösung oder durch einstündiges Kochen der äthyalkoholischen Lösung statt:

Wenn das Alkyl eine Methylgruppe ist, so ist die Verbindung besonders unbeständig, sodass sie schliesslich nicht rein isoliert werden konnte.

Wir hatten die Absicht phenyliertes Derivat darzustellen und liessen mit Phenylmercurichlorid reagieren, aber die Reaktion geht nach folgendem Schema vor sich, sodass der Zweck nicht erreicht werden konnte:

Während die Schwefelverbindungen und deren Alkalisalze von Waldo (loc. cit.) nicht unbeständig sind, haben wir bei unseren Selenverbindungen beobachtet, dass letztere darin grossen Unterschied zeigen.

酸アルカリ性となし析出する結晶性粉末を吸濾す。F 97-105° (約 70° にて減壓乾燥)

分析	Sub. 0.0932g	H ₂ O 0.0508g	CO ₂ 0.2300g
	gef.	C. % 67.30	H % 6.10
	Ber C ₂₄ H ₂₀ N ₂ O ₅	67.28	6.39

(昭和七年四月二十日)

ゼレン有機化合物の合成的研究(第四報)

慶松 勝左衛門

横田 嘉右衛門

里田 勳

(東京帝國大學藥學科藥品製造學教室)

(昭和七年五月廿五日受理)

S. Keimatsu, K. Yokota und I. Satoda: Über Organo-Selen-Verbindungen(IV Mitteilung)

余等は是迄主として $\langle \text{I} \rangle$ -Se- $\langle \text{II} \rangle$ 及び $\langle \text{II} \rangle$ -Se-Se- $\langle \text{II} \rangle$ の如き Formel を礎基とせる Selen-Phenol 化合物の合成に就き報告せり。(本誌 580, 531頁; 591, 605 頁; 598, 1007 頁). 斯の如き Formel に於て Selen に對し Kern に結合すべき原子團の位置及び種類の異るに依り理論上更に多くの新化合物を生成すべし. 本報告には前報より引き続き試みたる二三の業績に就き述ぶべし.

Formel(I) に一箇の Oxy 基を挿入すれば理論上次の三つの Isomer 存在すべし.

實際夫等の内 *p*-Oxy 化合物は既に第一報(loc. cit.)に於て報告せる如く *p*-Aminophenolacetat-diazo-Saiz と Selenophenolat との縮合に依りて得たる *p*-Acetoxydip-

henylselenid を verseifen する事に依りて容易に合成し得たりき。然るに此の方法は *m*-及び *o*-化合物の合成には應用する事を得ず。その理由は原料となすべき *m*-及び *o*-Aminophenolacetat の合成は二つとも至難なるが故なり。依て *m*-及び *o*-化合物の合成の爲に第二報所報 (loc. cit.) の如く新に *m*-及び *o*-Bromdiphenyl-selenid を合成し此物につき Rosenmund 氏の Phenol 分解法(B. **53**, 2232 [1920])を試みたるに *m*-Oxy-diphenylselenid は確實に合成し得たるも *o*-化合物はその得量悪しく且つ純粹なるものとして得られざりき。

扱て残れる *o*-化合物を今回次の反應徑路に依り確實に合成し前報を補遺する事を得たり。

即ち *o*-Nitrilanilindiazoniumsalz と Selenophenolat との縮合に依りて *o*-Nitro-diphenylselenid を合成し次で夫を還元し附して *o*-Amino-diphenylselenid と爲しその HCl-Salz を Eisessig に Suspendieren し置き夫に Amylnitrit を作用せしめ diazotization を行ひたる後乾燥 Aether に投じたるに比較的安定なる Diazoniumsalz を取り出し得たるを以て此物に Wallach 氏(A. **235**, 234[1886])及び Hantzsch 氏(B. **33**, 2536[1900])等の方法を應用し即ち Diazo 鹽を Essigsäureanhydrid と共に加温し $-N=N-Cl$ 基を $-O-CO-CH_3$ 基に置換せん事を企てたるに幸に其目的を達したり。過剰の Essigsäureanhydrid を蒸溜し去れる Rückstand を verseifen せる後 Alkali 溶性分を酸性となせるに油分を析出せり。分析に依り *o*-Oxy-diphenylselenid なる事を確定せり。

本方法は原料竝に反應徑路より考ふれば單に *o*-化合物の製法としてのみならず *m*-及び *p*-化合物の一般合成法としても採用し得べき事と信ず。

<i>o</i> -, <i>m</i> -及び <i>p</i> -Oxydiphenylselenid の性状比較表		
<i>o</i> -	<i>m</i> -	<i>p</i> -
微黃色油狀 Kp _{0.5} 130-131°	微黃色油狀 Kp ₁ 156-157°	純白針狀結晶 Kp ₁ 158-159° Fp 57°

次で Bauer 氏法(B. **46**, 93[1913])に依り *o,o'*-Diamino-diphenyldiselenid [$NH_2-C_6H_4-S_{22}-C_6H_4$] (Orangefarbene Nadelchen Fp 81°) を造り此物に就き上述の同一反應を試

み Amino 基を Oxy 基に換へ、第一報所報の *p,p'*-Dioxy-diphenyl-diselenid の Isomer として *o,o'*-Dioxy-diphenyldiselenid を合成せんとせるも成功せざりき。

(II) Selencyan-*o*-Nitrophenyl $C_6H_4 \begin{smallmatrix} NO_2(1) \\ \diagdown \\ SeCN(2) \end{smallmatrix}$ の電氣的還元

Fr. Fichter 氏等(B. 44, 3636[1911]) は Rhodan-*o*-Nitro-phenyl の還元研究に於て特に銅の陰極を用ゐる(約 2 Amp. / qdm)電氣還元を行ふ時に限り反應の中途に於て Umlagerung を營み生成體として Rhodan-*p*-aminophenol を得る 事を報告せり。

依て若し Selen-cyan-*o*-Nitro-phenyl より同一反應徑路に依り Selencyan-*p*-aminophenol を得らるるならば、此物を verseifen して Amino-monoselenobrenzcatechin となし之を緩和に酸化して茲に第二報所報の 3,3'-Diamino-4,4'-dioxy-diphenyldiselenid の Isomer として 1,1'-Diamino-4,4'-dioxy-diphenyl-diselenid を得らるべき理なり。依て Bauer 氏法(loc. cit.)に依り Selencyan-*o*-Nitrophenyl (gelbe Nadel Fp. 142°)を合成し此物を同一條件に依り電氣還元を試みるに其結果は單なる NO₂ 基、SeCN 基の還元に終はり Umlagerung は認められずして生成物として既知の *o,o'*-Diaminodiphenyldiselenid を得たるに止まり當初の目的を達し得ざりき。即ち SeCN 基は SCN 基に比較し還元に対する抵抗小なる事を推定し得たり。

(III) *p*-Oxy-*o'*-carboxy-diphenylselenid の合成

p-Oxydiphenylselenid $HO-C_6H_4-Se-C_6H_4-$ は第二報に於て報告せる如く強力なる殺菌性を有し且つ後日報告すべき *o*-Carboxy-diphenylselenid $COOH-C_6H_4-Se-$ も亦興味ある藥理作用を有するやに念はるる關係上、兩構造を同時に具ふ

る標題の *p*-Oxy-*o*'-carboxydiphenylselenid を合成する 事は大いに 意義ある ものと 信ず。 本物質の合成は次の反應式に依れり。

先づ(1)式に依り Anthranilsäuremethylester-diazonium-salz と Selencyankali との縮合に依り *o*-Selencyanbenzoesäuremethylester を造り之を Aether-lösung と爲しそのまゝ 20% H_2SO_4 + Zn にて還元を行ひ茲に Selenosalicylsäuremethylester を合成し次で(2)式に依りその Alkohol 性 Ester-alkali 溶液と *p*-Aminophenolacetat-diazonium-salz との縮合に依り *p*-Acetoxy-diphenylselenid-*o*'-carbonsäuremethylester を造り夫を verseifen し容易に *p*-Oxy-*o*'-carboxy-diphenyl-selenid を合成し得たり。

本物質は重曹及び炭酸ソーダの水溶液に易溶なるが故に夫の水溶性 Alkali-Salz として種々の藥理的試験に供し得べきものにして、この性質は *o*-Carboxy-diphenylselenid のアルカリ鹽が水に難溶なる缺點を補ひ、更に又水に難溶なる爲諸試験に不便なる *p*-Oxy-diphenylselenid(溶解度約 0.03%)の缺を矯正せるものと信ず。尙本物質には多數の Isomer あるを以て引続き夫等の合成に従事せり。

(IV) 二三のゼレン水銀有機化合物に就て

Waldo 氏は (Amer. Soc., **53**, 992, [1931]) Thiosalicylsäure $\text{C}_6\text{H}_4\text{C}(\text{SH})(\text{COOH})$ (1) の Natrium 鹽と種々なる Organo mercurihalogenid ($\text{R}-\text{Hg}-\text{X}$) との縮合に依り數種の Organo-Schwefel-Mercuri 化合物 $\text{C}_6\text{H}_4\text{C}(\text{R}'\text{S}-\text{Hg}-\text{R})(\text{COOH})$ を合成し而してそれ等の Alkali 鹽は水溶性にして強き殺菌性を有し殊に $-\text{S}-\text{Hg}-$ 基に連なる Radical (R, R') が Alkaryl (C_6H_5 と C_2H_5 の如き)なるものが最も安定にして消毒力に富める事を報告せり。

幸ひ余等は前節の仕事に於て Waldo 氏の場合に於ける Thiosalicylsäure に Homolog なる Selenosalicylsäure 類を取扱ひ居れるが故に早速此物と Organo-mercurihalogenid との縮合を試みたるに二三の新しきゼレン水銀有機化合物を得たる外同様な Homolog に於ても Selen 化合物と Schwefel 化合物とが大いに相違せる性質を有する事を知りたり。

今原料 Selenosalicylsäure 及び *p*-Carboxyselenophenol を苛性アルカリに依り中性鹽の形にて Alkohol に溶解せしめ置き之に一般に Grignard Reagenz と Mercurihalogenid とより得らるべき Organomercurihalogenid を Alkohol 溶液として作用せしむる時は反應は次式の如く進行す。

斯の如くして得たる物質は何れも少々不鮮明なる分解點を有し溶媒に對しては Alkohol, Aceton に可溶性にして Benzol, Aether, Petrolaether, Ligroin, Chloroform 等に不溶なり。又アルカリに依りて水溶性鹽を形成す。然るに該物質は安定ならずして今その Natrium 鹽の水溶液を放置する時は次第に混濁を生じ不溶性物質として Quecksilberalkyl $(\text{R})_2\text{Hg}$ を析出す。又遊離の酸を Alkohol 溶液として放置する時に於ても次第に Alkohol に不溶なる黄色物質 Dicarboxydiphenylmercuridiselenid $[\text{COOH—C}_6\text{H}_4\text{—Se—}]_2$ を析出す。依て Organo-Selen-Mercuri 化合物は常溫に於て徐々に次式の如く分解するものなる事を認めたり。

此分解は溫度の上昇と共に次第にその速度を増大し、Methanol 溶液にては 2 時間又 Aethylalkohol 溶液にては 1 時間の煮沸に依り 殆んど完全に次式の如く更に分解は進行し生成物として最後に Dicarboxydiphenyldiselenid 及び水銀とを確證したり。

今 Alkyl(R)の相違に依る各個の安定度を見るに $\text{R}=\text{CH}_3$ 即ち *o*-及び *p*-Methylmercuriselenobenzoessäure は Alkyl 誘導體中最も不安定にして速かに Quecksilbermethyl 及び Dicarboxy-diphenylmercuridiselenid に分解し純粹なる状態に取出す事不可能なりき。 $\text{R}=\text{C}_2\text{H}_5$ 及び C_3H_7 即ち *o*-及び *p*-Aethylmercuriselenobenzoessäure 及び *o*-及び *p*-Propylmercuriselenobenzoessäure は CH_3 -誘導體に比し遙に安定にして純粹なる状態に取出す事を得たり。然れ共此等の物にても前述の如く徐々に分解する事を免れず乾燥状態に於て既に三日後には約 1% の分解生成物を混有するに至るべし。

次に $\text{R}=\text{C}_6\text{H}_5$ 即ち Phenylmercuriselenobenzoessäure の合成を試み Phenylmercurihalogenid を用る Alkyl 化合物の場合と全く同様の操作を行ひたるも所期の目的物は得られずして生成物として Quecksilberphenyl 及び Dicarboxy-diphenylmercuridiselenid とを得たり。即ち Phenylmercuriselenobenzoessäure は著しく不安定にして一度生成するならんも反應中既に次式の如く分解するものなる事を知りたり。

斯の如く余等の Organo-Selen-Mercuri 化合物は決して安定なるものに非ず。然るに Waldo 氏は彼の Organo-Schwefel-Mercuri 化合物に於て不安定なる事實を認め居らず。之れ兩者の性質の大いに異なる點とす。

尙ゼレン化合物の合成的研究は更に繼續中に屬す。本研究費用の一部は之を東照宮三百年祭記念會奨勵金に仰けり。謹で爰に深厚の謝意を表す。又實驗に協力せる撰科生鈴木新太郎君の勞を謝す。

實 驗 之 部

 1. *o*-Nitrodiphenylselenid

o-Nitranilin 25g(0.18 Mol.)

HCl(38%) 36g(0.36 Mol.)

H₂O 360cc

NaNO₂(3N-水溶液)60cc(0.18 Mol.)

Selenophenol 28g(20cc)(0.18 Mol.)

NaOH 7.7g in H₂O 100cc

A液

B液

常法に依り Nitranilin を diazo 化した後僅少の Na-acetat を用ゐるその無機酸を中和せる溶液を A 液とす. Selenophenol を對應量の 苛性アルカリにて 水溶液と爲せるものを B 液とす. 今冷時 (0°-5°) A 液中へ 攪拌し乍ら B 液を滴下すれば冷時窒素を放ち同時に結晶性の生成物を析出す. (銅粉の添加を必要とせず). 生成物を Aether に溶取し芒硝にて乾燥後減壓にて蒸溜を行ふに Kp. 150-180° に於ける溜分 43g あり. 斯の如く沸點の間隔廣き理由は反應中 Selenophenol の酸化に依りて生成せる Diphenyldiselenid (C₆H₄-Se-Se-C₆H₄) が混在し此物が比較的 低き沸點にて溜出し一方 Kp. 180° に近き部分は *o*-Nitodiphenylselenid なるが故なり. 二者を蒸溜に依り分離する事は容易ならず. 又後述する如く先へ進むべき原料としては兩者を完全に分離するの必要なし.

Kp. 180° に近き部分を Alkohol より再結晶を行ふに黄色針狀結晶を得. Fp. 92°.

Sbst.	0,2474	Se : 0,693	— C ₁₂ H ₉ O ₂ NSe	Ber.	Se.	28,47%
				Gef.	Se.	28,01%

即ち *o*-Nitrodiphenylselenid なる事を確定せり.

 2. *o*-Amino-diphenylselenid 及びその鹽酸鹽.

前節の Diphenyldiselenid を混在せる儘の *o*-Nitrodiphenylselenid 43g を Aether に溶解し 20% H₂SO₄ の上層を爲さしめ夫に Zn 末を少量宛添加し乍ら約 40° 温に於て還元を行ふ. Aether の黄色消失せる折を以て還元の終末となし, Aether 層を分別し芒硝にて乾燥す. この際還元に依て生成せる *o*-Amino-diphenylselenid は温時水中にて殆んど硫酸鹽を形成せず從て Aether に溶存し居れるが故に夫へ

乾燥 HCl を通じ HCl 鹽として析出せしむる事に依り同時に溶存せる Diphenyldiselenid の還元によりて生成せる Selenophenol 分を茲に於て完全に分離する事を得たり。斯の如くして得たる HCl 鹽は未だ灰色を呈せるが故に一旦アルカリにて分解し更に Aether に溶取し芒硝にて乾燥後減壓蒸溜に依り精溜を行ふに遊離の Amino 化合物は Kp. $_{1.4}$ 159° にて溜出せり。刺戟に依り固化し Alcohol より再結晶により Fp. 35° 無色針狀結晶を得たり。得量 21g.

Sbst.	0,2424	Se : 0,0767	—	C ₁₂ H ₁₁ NSe	Ber.	Se.	31,89%
					Gef.	Se.	31,64%

即ち *o*-Aminodiphenylselenid を得たり。

精製 Amino 化合物を再び乾燥 Aether に溶解し夫に乾燥 HCl を通じ茲に純白なる HCl 鹽の粉末物質を得たり。Zp 163° 得量 24g *o*-Nitranilin 25g より理論得量 48%。

Sbst.	0,2160	AgCl : 0,1128	—	C ₁₂ H ₁₁ NClSe	Ber.	Cl ₂	13,09%
					Gef.	Cl ₂	12,92%

即ち *o*-Amino-diphenylselenid-HCl-Salz なる事を確證したり。

o-Amino-diphenylselenid-HCl Salz 16,3g(0,058 Mol.) を Eisessig 40cc に suspendieren し置き約 10° 温にて攪拌し乍ら Amylnitrit 24,8cc (0,17 Mol.) を滴下し diazo 化を行ふ。

Diazo 化進行すると共に HCl-鹽は溶解し内容は濃赤褐色溶液となるべし。約 1 時間攪拌を繼續し充分 Diazo 化完結したる後 Diazo 液を冷乾燥 Aether (300cc) 中に攪拌し乍ら注加す。Diazo-Salz は黄色粉狀物質として析出す。依て手早く absaugen し Aether にて洗滌後 Diazo Salz を Essigsäureanhydrid 約 80g に投じ、水浴上約 40° に加温すれば圓滑に窒素を泡出す。窒素の發生熄みたる後過剰の Essigsäureanhydrid を減壓にて溜取す。Rückstand を Alcohol 性アルカリ溶液 (NaOH 8g) にて verseifen 後水中に投じ Aether にて振盪し不變化性物質を除去し水溶液に就き酸性と爲すに油分を析出せり。依りて Aether にて溶取し芒硝にて乾燥後減壓蒸溜に附するに Kp. $_{0.5mm}$ 130-131° の溜分 5g を得たり。微黄色油狀物質得量 36%(理論)

Sbst.	0,2137	Se : 0,0673	—	C ₁₂ H ₁₀ OSe	Ber.	Se.	31,77%
					Gef.	Se.	31,49%

即ち *o*-Oxy-diphenylselenid なる事を確定したり。

o-Oxy-diphenylselenid 4g を Essigsreanhydrid 3g と Pyridin 10g との混合液にて處理し約 4.4g *o*-Acetoxydiphenylselenid を得たり. 殆んど無色液體 Kp. 0.5 137-138° 得量94%(理論)

Sbst.	0.2550	Se: 0.0686 - C ₁₄ H ₁₂ O ₂ Se	Ber.	Se.	27.19%
			Gef.	Se.	26.90%

既に Lesser 氏等は(B. 47, 2505[1914])次の(I)式による生成物が偶々(II)式に依りて得たる *o*-Selenocyanbenzoësäuremethylester と性質相一致する 事よりして其構造を確知せり.

但(II)式に依る實驗經過に就き何等詳細なる 報告無きを以て茲に余等の行へる所を記載せんとす.

Anthranilsäuremethylester	15.1g (1/10 Mol.)	} A 液
2N-HCl	107cc (ca. 2/10 Mol.)	
H ₂ O	300cc	
2N-Na-NO ₂	50cc (1/10 Mol.)	

上記の割合にて冷時(0°) diazo 溶液を調製す. Anthranilsäuremethylester-HCl-Salz は多量の水の中に於て一部 freie Base に分解するが故にその diazo 化を完了する爲に NaNO₂ 液滴下後も相當時間放置せしむるを要す. (約 2 時間)斯くして少量の Na-Acetate にて無機酸を中和せる溶液を A 液とす.

KSeCN	1.45 (1/10 Mol.)	} B液
H ₂ O	70cc	
N-NaHCO ₃	14cc	

B 液中に A 液を滴下する時は烈しく窒素を泡出し同時に黄色物質を生成す. 反應は約 2 時間にて完結す. 生成物を吸濾し水洗後 Methanol より再結晶を行ふ 無色針狀結晶 17.5g, 73%(理論) Fp. 114-115° Lesser 氏の物と相一致す.

o-Selenocyan-benzoesäuremethylester 12g

Aether	120cc
20% H ₂ SO ₄	120cc
Zn 末	12g

o-Selenocyan-benzoesäuremethylester を Aether に suspend. し 20% H₂SO₄ と層積し夫に Zn 末を少量宛添加し乍ら水浴上 40° 温にて還元を行ふ。初め Aether 溶液は微黄より更に少しく着色し次で無色となり-SeCN が-Se-Se-より-SeH に還元さるる経過を看取し得べし。Aether 層無色となればこの時を還元の終末と爲し時を移さず Aether 層を芒硝にて乾燥後 Aether Rückstand を H₂ 或は CO₂ 氣中に減壓蒸溜に附す。斯くして Kp₁ 113°-114° の無色油分 9.7g(90% 理論)を得たり。

Stst.	0,2440	Se : 0,0892 - C ₈ H ₈ O ₂ Se	Ber.	Se	36,80%
			Gef.	Se	36,58%

本物質は空氣中にて徐々に酸化せられ Fp. 143-144° 無色の Diselenid に變化す。

6. *p*-Acetoxy-diphenylselenid-*o*'-carbonsäuremethylester.

Seleno salicylsäuremethylester	10.7g
2N-NaOH(50% Alkohol 溶液)	25cc

A液

H₂ 氣中 50% Alkoholische NaOH Lsg. を冷却し置き夫に約 10cc の Alkohol に稀釋せる Selenosalicylsäuremethylester を加へ A 液となす。

<i>p</i> -Aminophenol-essigester	7.8g
10 N-HCl(F=1.04)	10.4cc
H ₂ O	90cc
NaHO ₂ (3N)	17.4cc

B液

上記割合にて diazo 化を行ひ過剰の無機酸を Na-Acetat にて中和せる溶液を B 液とす。

水素氣流中攪拌し乍ら A 液に B 液を滴下す。(0°-2°) 初め 赤褐色を帶び來り次で盛に窒素を泡出すると同時に油狀物質を析出す。約 2 時間後 Diazo 反應消失するに及び反應物を Aether にて溶取す。操作中 Selenophenol 分の一部は酸化せられ Diselenid を形成し混在し來るを免れざるが故に其を分離する爲め Aether 溶液に就き還元を行ひ(20% H₂SO₄ 80cc, Zn 末 6g)復活せる Selenophenol 分を Pb-Acetat にて Pb-Salz として固定除去す。斯く Diselenid 分を去れる Aether 溶液を芒硝にて乾燥後その Rückstand を減壓蒸溜に附するに Kp₁ 205° の

粗溜分 8g を得たり。Methanol に溶解し 冷却摩擦すれば 純白長方形薄板結晶として析出す。純品 4g を得。Fp. 92.

Subst.	0,2315	Se: 0,0520 - C ₁₆ H ₁₄ O ₄ Se	Ber.	Se. 22,63%
			Gef.	Se. 22,46%

即ち *p*-Acetoxy-diphenylselenid-*o*'-carbonsäuremethylester なる事を確定せり。

7. *p*-Oxy-diphenylselenid-*o*'-carbonsäure

p-Acetoxy-diphenylselenid-*o*'-carbonsäure-methylester 1,75g を 50% Alkoholische 2N-NaOH Lsg. 19cc に依り verseifen す。Alkohol を去り Rückstand を水に溶解し HCl 酸性と爲すに無色結晶性物質を析出す。Alkohol より再結晶を行ふ事に依り純白長方形薄板結晶 1,5g を得たり。95%。(理論) Fp. 215°

Subst.	0,2305	Se: 0,0620 - C ₁₃ H ₁₀ O ₃ Se	Ber.	Se. 27,01 %
			Gef.	Se. 26,89 %

8. Aethylmercuriselenosalicylsäure $C_6H_4 \begin{smallmatrix} \text{COOH(1)} \\ \text{Se-Hg-C}_2\text{H}_5(2) \end{smallmatrix}$

o, o'-Dicarboxy-diphenyldiselenid 1g を Aether 200cc に溶解し夫を 25% H₂SO₄ に屑漬し 40° 温にて Zn 末を少量宛添加し還元を行ひ茲に Selenosalicylsäure の Aether 溶液を調製す。Selenosalicylsäure は空氣との接觸により速かに元との Diselenid に戻るを以て手早く Aether 層を分取し H₂ 氣中に於て Aether を蒸溜し去り。Rückstand を直ちに Alkohol に溶解し夫に 0,4g の NaOH を 20cc の Alkohol に溶解せるものを加へ茲に Selenosalicylsäure の中性 Natrium-salz の Alkohol Lsg. を造る。この溶液を 30-40° に加温し H₂ 氣中攪拌しつつ 1,4g の Aethylmercurichlorid を 70cc の Alkohol に溶解せるものを滴下し反應せしむ。尙約 3 時間攪拌を繼續し反應を完結せしむ。次で 40°C 以下にて Alkohol を減壓にて溜取し Rückstand を水に溶解し此の際未反應の Aethylmercurichlorid を濾別する時は黄色澄明なる Aethylmercuriseleno-salicylsäures Natrium の水溶液を得べし。この水溶液を 20% CH₃COOH にて酸性となす時は黄色の Aethylmercuriselenosalicylsäure を析出す。約 2g. 約 40° の Alkohol に溶解し氷と食鹽とにて冷却放置する時は大なる柱狀結晶となりて析出す。微黄色を呈し Zp 112-115° 得量 1,12g (52%理論)

Subst.	0,1216	Hg: 0,05628 - C ₉ H ₁₀ O ₂ SeHg	Ber.	Hg 46,68%
			Gef.	Hg 46,30%
				(nach Rupp u. Noll)

9. *p*-Aethylmercuriselenobenzoessäure $C_6H_4 \begin{smallmatrix} \text{COOH(1)} \\ \text{Se-Hg-C}_2\text{H}_5(4) \end{smallmatrix}$

p,p'-Dicarboxy-diphenyldiselenid 1g と Aethylmercurichlorid 1.4g を原料となし前と全く同様に行ふ。唯 *p*-aethylmercuriselenobenzoessäure の Natrium-Salz は Alkohol に不溶性なるを以て *p*-Carboxy-selenophenol の中性 Natrium-salz の Alkohol 溶液に Aethylmercurichlorid の Alkohol 溶液を滴下する時は直ちに生成せる *p*-Aethylmercuriselenobenzoessäures-Natrium は析出し来るを以て反應終了後夫を absaugen し水に溶解し 20% CH₃-COOH にて酸性と爲し frei の物質を採集す。1.31g (61%) 無色柱狀結晶 Zp. 325-330°.

Sbst.	0,1830	Hg: 0.0853 - C ₉ H ₁₀ O ₂ SeHg	Ber.	Hg	46,68%
			Gef.	Hg	46,64%

10. Propyl-mercuriselenosalicylsäure $\text{C}_6\text{H}_4 \begin{smallmatrix} \text{COOH(1)} \\ \text{Se-Hg-C}_3\text{H}_7(2) \end{smallmatrix}$

Aethylmercuriselenosalicylsäure の場合と全く同様にして合成したり。 *o,o'*-Dicarboxy-diphenyldiselenid 1g より本物質 1.2g を得。微黄色結晶にして Zp. 110°-113°.

Sbst.	0,1367	Hg: 0,0614 - C ₁₀ H ₁₂ O ₂ SeHg	Ber.	Hg	45,20%
			Gef.	Hg	44,98%

11. *p*-Propyl-mercuriselenobenzoessäure $\text{C}_6\text{H}_4 \begin{smallmatrix} \text{COOH(1)} \\ \text{Se-Hg-C}_3\text{H}_7(4) \end{smallmatrix}$

p-Aethylmercuriselenobenzoessäure の場合と同様に行ひたり。

p,p'-Dicarboxy-diphenyl-diselenid 1g より本物質 1.4g を得たり。

無色結晶なり。之を毛細管中に熱するに次第に黄色を帯び次に徐々に黑色を呈するも夫の變化極めて徐々にして分解點明かならず。

Sbst.	0,1121	Hg: 0.05050 - C ₁₀ H ₁₂ O ₂ Se-Hg	Ber.	Hg	45,20%
			Gef.	Hg.	45,07%