während der Schmelzpunkt des anderen bei 230° liegt; dieser löst sich in Aceton nur schwer. Mit Dimethylsulfat liefert die Säure nur einen Methyl-ester, der bei 230° schmilzt. Wenn man aber die mit Alkali behandelte, dann bei 290–291° schmelzende Ursolsäure mit Diazomethan oder Dimethylsulfat methyliert, so entsteht stets nur ein einziger, bei 170–172° schmelzende Methyl-ester 172° schmilzt.

Durch Behandlung der Ursolsäuremethyl-ester mit Säure oder Alkali werden ihre Schmelzpunkte gar nicht geändert. Infolgedessen lässt sich die Isomerie-Erscheinung der Ursolsäure einfach nicht durch eine Umlagerung der Doppelbindung erklären; aber die Annahme einer $\text{H}-\overset{\text{I}}{\underset{\text{I}}{\text{C}}}-\text{COOH}$ -Gruppe in der Konfiguration könnte zu ihrer Deutung in Betracht kommen.

Vorläufig möchten wir hier für die bei 284–285° schmelzende Ursolsäure die Bezeichnung α -Ursolsäure und für die mit Alkali behandelte bei 290–291° schmelzende Säure die Bezeichnung β -Ursolsäure vorschlagen.

Die Säure aus Folia Rhododendron Hymenanthos wäre dann mit dieser β -Ursolsäure identisch.

(Autoref.)

I. Keimatsu: Synthese des 1-(3',4')-Methylendioxybenzyl-3-methyl-6,7-methylendioxyisochinolin (Eupaverin) und des 1-Phenyl-3-methyl-6,7-methylendioxyisochinolin.

[Aus der Apotheke des Tokyo Fraternity Memorial Hospitals]

(Eingegangen am 9. Sept. 1933)

Keitmain und seine Mitarbeiter haben aus Safrylamin und Homopiperonylsäure Eupaverin genanntes Alkaloid hergestellt, bei welchem eine fünf-

mal grössere therapeutische Wirkungsbreite als Papaverin beobachtet wurde.
(E. Merck's Jahresbericht, 1930, 12-25)

Verf. hat Eupaverin (V), und zwar 1-Phenyl-3-methyl-6,7-methylen-
oxyisochinolin (VII), nach der Methode der Papaverin-Synthese von
Mannich und Walther (Arch. 265, 1-11) in guter Ausbeute dargestellt.

Verf.'s Synthese geht in folgenden Stadien vor sich:

Verf. hat folgende neue Verbindungen mit unten angegebenen Eigen-
schaften erhalten:

1-(β -Nitro- β -methyl- α -methoxy-äthyl)-3,4-methylenedioxybenzol (II)

gelb. dickflüss. Öl $K_p = 165-170^\circ$

α -Methyl- β -methoxy- β -(3,4-methylenedioxyphenyl)-äthylamin (III)

farblos. dünnflüss. Öl $K_p = 147-148^\circ$

Krist. nach läng. Stehen.

weiss. seidenartig. Krist. Fp. 97–100°

N-Homopiperonyl- α -methyl- β -methoxy- β -(3,4-methylenedioxyphenyl)-äthylamin (IV)

weiss. Krist. Pulv. Fp. 142–144°

Golddoppelsalz des Eupaverin

$C_{19}H_{15}NO_4 \cdot HAuCl_4 \cdot H_2O$ orang. rot. amorph. Pulv. Zp. 171–173°

Platindoppelsalz des Eupavarin

gelbl. Krist. Pulv. Zp. 202°

N-Benzoyl- α -methyl- β -methoxy- β -(3,4-methylenedioxyphenyl)-äthylamin (VI)

weiss. Krist. Pulv. Fp. 165°

1-Phenyl-3-methyl-methylenedioxyisochinolin (VII)

weisse Nadeln. Fp. 143°

Hydrochlorid des (VII)

$C_{17}H_{13}O_3N \cdot HCl \cdot 2H_2O$

grünl. gelb. seidenartig. Kristalle. Zp. 171–172°

wasserfreies Salz: weisses Pulv. Zp. ca. 225°

Golddoppelsalz der (II)

$(C_{17}H_{13}O_3N)_2 \cdot HAuCl_4$ goldfarb. amorph. Pulv. Zp. 220°

Homopiperonylsäureäthylester

farblos. Flüssigkeit. $Kp_8=145-147^\circ$

Verf. hat α -Methyl- β -methoxyl- β -(3,4-methylenedioxyphenyl)-äthylamin (III) aus α -Methoxy- β -brom-dihydroisosaflrol und Ammoniak oder Hexamethylenetetramin unter verschiedenen Bedingungen darzustellen versucht, aber noch keinen Erfolg gehabt.

前記のエステルをピリジンとベンツ、イルクロリドによつてベンツォイル化し、稀硫酸中に投じて生成せる赤褐色の析出物をアルコールより精製結晶せしむ。Fp. 215-216° (Korr.) の無色板状の結晶なり。

分析

物質 47.08mg CO₂: 136.66mg H₂O: 40.57mg C% 79.17 H% 9.64

CH₃O- の定量。

物質 4.89mg AgI: 1.92mg CH₃O% 5.18

C₂₉H₄₆ $\begin{cases} \text{OCOC}_6\text{H}_5 \\ \text{COOCH}_3 \end{cases}$ として C% 79.38 H% 9.47 CH₃O% 5.40

VI. ブロムラクトン。

遊離酸の水醋酸溶液を氷冷しつつ之にブロムの水醋酸溶液を滴下し、室温にて數時間放置せるも容易にブロムの脱色を起さず。50° 以下の微温を施し、1 日間放置せるに著しくブロムの褪色を認めたるを以て、反應液を水に投じ析出する黄色の沈澱を濾取しエーテルに溶し、少許の 10% カリ鹼液と共に、振盪せるに、鹽となりて兩液層間に集積する部分著しく多く、中性のエーテル蒸發殘渣は僅微量に過ぎず。之をメタノールより再結晶に附し Zp. 210° (Korr.) の針狀品を得たるも、更に再結晶を反覆し分析に附するに至らざりき。

(昭和 8 年 8 月 20 日稿於倉敷中央病院藥局)

1-(3',4')-メチレンジオキシベンチル-3-メチル-6,7-メチレンジオキシイソヒノリン(オイパベリン)及び1-フェニル-3-メチル-6,7-メチレンジオキシイソヒノリンの合成

慶 松 一 郎

(東京同愛記念病院藥品試験室)

(昭和 8 年 9 月 9 日受理)

I. Keimatsu: Synthese des 1-(3',4')-Methylenedioxybenzyl-3-Methyl-6,7-methylenedioxyisochinolins (Eupaverin) und des 1-Phenyl-3-methyl-6,7-methylenedioxyisochinolins.

慶松: 1-(3',4')-メチレンジオキシベンチル-3-メチル-6,7-メチレンジオキシイソヒノリ¹⁰⁷¹
ン(オイバベリン)及び 1-フェニル-3-メチル-6,7-メチレンジオキシイソヒノリンの合成

最近 Kreitmair, Wolfes 及び Dobrowsky 等はパバベリン型合成アルカロイド
約 15 種に就て、その毒作用並に效力作用を驗して、醫藥品としての價值を比較し、
就中表記の 1-(3',4')-Methylenedioxybenzyl-3-methyl-6,7-methylenedioxyisochino-
lin が最も優秀なる事を闡明したり。(E. Merck's Jahresbericht 1930, 12-25)

即ち同氏等は上記各アルカロイドの白鼠に對する致死量と、蛙の摘出腸の痙攣せしめたる
ものを鎮靜せしむるに要する最少濃度 (Wirksame Grenzkonzentration) とを測定し、その各
のパバベリンに於ける數値を 1 となし、その比を以て該アルカロイドの治療系数 (Therapeu-
tische Wirkungsbreite) となし (即ちパバベリンの治療系数=1) たるに、表記の 1-(3',4')-
-Methylenedioxybenzyl-3-methyl-6,7-methylenedioxyisochinolin のそれば 5 にして、パバベリ
ンの 5 倍なるを知りたり。よりにて同氏等は之を Eupaverin と命名し、Merck 會社より發賣
せしめたり、

余は本化合物に興味を抱き、之が合成を試みたり。蓋し、本標品は我國市場には
未だ供給され居られざるものの如く、且余が採りたる合成過程は、Kreitmair 等
の方法とは異り従つてその中間成績體の 2, 3 は文獻上未記載のものなれば、茲
にその結果を報告せんとす。

Kreitmair 等は本化合物の合成を、Pictet の Dihydropapaverin 合成法 (B. **42**
1979) に倣ひて、Safrylamin と α -Homopiperonylsäure とを原料として Dihydro-
Eupaverin を製し、之を Palladiumasbest と共に加熱して脱水素せしむる Späth
のパバベリン合成法 (B. **60**, 704) によりたるものの如し。

余は大體 Mannich 及び Walther のパバベリン及び類似鹽基合成法 (Arch.
265, 1-11) に倣ひたり、尙之と同様にして 1-Phenyl-3-methyl-6, 7-methylenedio-
xyisochinolin をも合成したり。

即ち Piperonal と Nitroäthan とより Äthylamin の存在に於て α -Piperonyl-
iden-Nitroäthan (I) を製し、之に Na-methylat を作用せしめて 1-(β -Nitro- β -
methyl- α -methoxy-äthyl)-3,4-methylenedioxy-benzol (II) を製し、このものを
Verkupferte Zinkstaub と蟻酸にて還元して α -methyl- β -methoxy- β -(3,4-methy-
lendioxyphenyl)-äthylamin (III) となし、之に別に製せる α -Homopiperonylsäure-
chlorid を作用せしめて N-Homopiperonyl- α -methyl- β -methoxy- β -(3,4-methy-
lendioxyphenyl)-äthylamin (IV) となし、之にキシロール中にてオキシ鹽化磷を
作用せしめて 1-(3',4')-Methylenedioxybenzyl-3-methyl-6,7-methylenedioxy-isochi-

nolin (V) 即ち Eupaverin に達したり. 又 1-Phenyl-3-methyl-6,7-methylendioxyisochinolin (VII) に於ては, α -Methyl- β -methoxy- β -(3,4-methylenedioxyphenyl)- α thylamin に Benzoylchlorid を作用せしめて N-Benzoyl- α -methyl- β -methoxy- β -(3,4-Methylenedioxyphenyl)- α thylamin (VI) を製し, 之より所求の鹽基を得たり.

而して Homopiperonylsäurechlorid は表示の過程により實驗の部に示す如くにして製したり.

上述の製造行程を表示せば次の如し,

茲に余が新に得たる物質とその性狀を示せば次の如し.

(Ⅱ) 黄色濃稠液 $Kp_6 = 165-170^\circ$

(Ⅲ) 無色流動性液體 $Kp_8 = 147-148^\circ$ 長時間放置する時は結晶化す. 結晶せるものは
白色絹絲狀晶. $Fp\ 97-100^\circ$

慶松: 1-(3',4')メチレンジオキシベンチル-3-メチル-6,7-メチレンジオキシイソキノリン(オイパベリン)及び1-フェニル-3-メチル-6,7-メチレンジオキシイソキノリンの合成¹⁰⁷³

(Ⅳ) 白色結晶末 Fp 142-144°

(Ⅴ) の金複鹽 橙赤色無晶形粉末, Zp 171-173°, $C_{19}H_{15}NO_4 \cdot HAuCl_4 \cdot H_2O$ に一致す.

(Ⅴ) の白金複鹽 淡黄色結晶性粉末 Zp 202° (181° にて黒變)

(Ⅵ) 白色結晶末 Fp 165°

(Ⅶ) 白色針狀品 Fp 143° (139° より軟化)

(Ⅷ) の鹽酸鹽 $C_{17}H_{13}O_3N \cdot HCl \cdot 2H_2O$, 帶綠黄色絹絲狀結晶 Zp. 171-172°

同鹽の無水物 白色粉末 Zp 約 225°

(Ⅶ) の金複鹽 ($C_{17}H_{13}O_3N_2 \cdot HAuCl_4$) 黄金色無晶形粉末 Zp 220°

Homopiperonylsäureäthylester 無色液體 $Kp_D = 145-147°$

尙余は、 α -Methyl- β -Methoxy- β -(3,4-Methylenedioxyphenyl) äthylamin (III) を α -Methoxy- β -brom-dihydroisosafröl (Arch. 248, 170) にアンモニアを作用せしめて得んことを望み、種々なる條件にて反應をと試み、或は又、 α -Methoxy- β -brom-dihydroisosafröl にウロトロピンを作用せしめて目的のアミンを得んことを試みたれども何れも、未だ成功の域に達せず。

又 Homopiperonylsäure は、Piperonal を還元して Piperonylalkohol となし、之に HCl gas を作用せしめて Piperonylchlorid となし、KCN にて Piperonylcy-anid となし、(以上 J. v. Braun u. K. Wirtz B. 60 I. 110) 之より酸を得ん事を望みたるが、こは實驗の途中にあり。

(追記) 最近 Merck 会社にては、1-(3',4')-methylenedioxyphenyl-3-methyl-6,7-methy-lendioxyisochinolin が Eupaverin よりも更に優秀なる治療價値を有する事を知り、之を Neupaverin と命名したり、(E. Merck's Jahresbericht 1931 138-139) このものの試製は余の望む所なれども遺憾乍ら原料を消費し盡したれば後日に譲ることとせり。

本實驗に際し、教示を與へられたる菅澤博士、又援助と厚意を寄せられたる鈴木藥局長及び伊藤巳西三君、等に對し滿腔の謝意を表す。

實 驗 の 部

第 1 節. α -Methyl- β -methoxy- β -(3,4-methylenedioxyphenyl)-äthylami の製造
 α -Piperonyliden-nitroäthan (I)

Knövenagel u. Walter (B. 37, 4508) に従ふ。即ち Piperonaln 36g, Nitroäthan 18g を Äthylamin 約 2.5g と共に丈夫なるコルベンに入れて室溫に放置す。1 日にして結晶析出。2 日目に至り、結晶最早増加せず。5 日後に結晶を取出し、ア

1074 慶松: 1-(3',4')メチレンジオキシベンチル-3-メチル-6,7-メチレンジオキシイソヒノリン(オイパペリン)及び1-フェニル-3-メチル-6,7-メチレンジオキシイソヒノリンの合成

ルコールにて洗ふ。黄色の美しい針状晶にして Fp. 98-99°, 即ち文献の記載に一致す收穫率理論量の 65-70%.

1-(β -nitro- β -methyl- α -methoxy- α thyl)-3, 4-methylenedioxy-benzol (II)

Rosenmund (B. 60, 392) が Piperonyliden-nitromethan より 1-(β -nitro- α -methoxy- α thyl)-3,4-methylenedioxy-benzol を得たる方法に倣ひて製る。即ち α -Piperonyliden-nitro α than 32g とメタノール 200cc の混合物に, メタノール 60cc に金属ナトリウムを加へたるものを 15° に於て除々に加ふ。然る時は茲に黄色の透明液を得。次にこの液に氷醋酸を加へて酸性となし。外部より強冷するも結晶析出せず。即ち液を 50°, 減壓にて蒸發濃縮し, 次に水中に注入し, 析出する油狀物質をエーテルに採り, このエーテルを 1%炭酸ソーダ溶液にて洗ひ, 後水洗, 芒硝にて乾燥エーテルを溜取す。残渣は帶褐黄色の濃稠液にして, 得量 30.5g, 即ち理論量の 82.6% に相當す。

このものを精製するには, 減壓蒸溜に附すべし。即ちこのものは, 6mm の減壓下に於て 165-170° にて溜出する黄色濃稠液にして, 放置する時は漸次赤色を帶ぶるに至るなり。蒸溜残渣は, 黄色結晶にして Fp. 99°, 即ち α -Piperonyliden-nitro α than に他ならず,

粗製物より精製物の得量は約 90% なり。但し次の Amin の製造は粗製物にて充分なり,

α -Methyl- β -methoxy- β -(3,4-methylenedioxyphenyl)- α thylamin. (III)

Mannich (Arch. 265, 1-11) が 1-(β -nitro- α -methoxy- α thyl)-3,4-methendioxy-benzol を還元して β -Methoxy- β -(3,4-methendioxy-phenyl)- α thylamin を得たる方法に従ふ。即ち 1-(β -Nitro- β -methyl- α -methoxy- α thyl)-3,4-methylenedioxy-benzol 10g を 85% の蟻酸約 50cc に溶解せしめ, 之を氷にて冷しつつ Zinkstaub 20gを含有する Verkupferte Zinkstaub (Houben: Die Methoden der Org. Chemie 2, 304 に従ひて製る) を少量づつ加へ, 全量を加へ終らば 50-60° に數分間溫め, 後 1-2 時間, 或は一夜室温に放置後, Zinkstaub を濾別し, 濾紙上の Zinkstaub は 70% のメチルアルコール及び 85% の蟻酸各 50cc 宛にて洗ひ, 濾液及び洗液を合し, 之を 50°, 減壓にて液にメチルアルコール臭がなくなるまで蒸發し, 殘液に水を加へ, この液をエーテルにて振る事 2 回次に苛性アルカリにてアルカリ性となし, エーテルにて振り, エーテルを乾燥, 溜取して目的物のアミンを得。酸

慶松: 1-(3',4')メチレンジオキシベンチル-3-メチル-6,7-メチレンジオキシソヒノリ 1075
ン(オイバベリン)及び1-フェニル-3-メチル-6,7-メチレンジオキシソヒノリンの合成

性にてエーテルに來れるものは、このエーテル液を炭酸ソーダ溶液にて洗ひ(洗液アルカリ性となるまで)、次に水洗(中性まで)、乾燥、エーテルを溜取す。茲に得る殘渣は即ち未反應のニトロ化合物なれば、次回の還元に戻す。斯の如く、未反應の物質を順次次回に戻す事を繰返して殆んど全部のニトロ化合物をアミンに變ずるを得べし。余は本還元を5回に分ちて行ひたるが、總得量は、原料ニトロ化合物 21.5g よりアミン 15g にして、理論量の約 80% なり。

本鹽基を精製するには、減壓蒸溜に附すべし。即ち本鹽基は、8mm の減壓下 147-148° にて溜出する無色流動性液體なり。粗鹽基より精製鹽基の得量は約 90% なり。

本鹽基は放置する時は除々に黄變し、長時日放置する時は、白色絹絲狀に結晶す。この結晶は Fp 97-100°。本鹽基は水に易溶なり。又本鹽基の鹽酸鹽は甚だしく吸濕性にして處理困難、又金複鹽は常に油滴として析出し、結晶し難し。

第二節. Homopiperonylsäurechlorid

大體は北里氏の方法(本誌大 15, 659)に従ひたれど、幾分變えたり。即ち Decker の方法(B. 42, 1188)によりて Piperonal 及び馬尿酸より Piperonal-hippursäure (Inneresanhydrid) を得、之を苛性アルカリにて加水分解して Methylendioxyphenylbrenztraubensäure と安息香酸のアルカリ鹽の混合溶液となし、次にこの兩者を分つ事なく、Cain, Simonson, Smith 等が P-Methoxy-phenylessigsäure を得たる方法(J. Ch. soc. 103, 1036 (1913))に倣ひ、このアルカリ性溶液に過酸化水素を加へて Methylendioxyphenylbrenztraubensäure を Homopiperonylsäure にまで酸化し、次に液を酸性となして Homopiperonylsäure と安息香酸の混合物を取出し、この兩酸を鹽酸アルコールにてエステル化し、茲に得るエステルを減壓下に分溜す。然る時は安息香酸エチルエステルは 9mm の減壓下 82-85° にて溜出し、Homopiperonylsäure äthylester は 9mm に於て 145-147° にて溜出す。このエステルをアルコール性苛性カリにて鹼化して Homopiperonylsäure (Fp 122-128°) を得たり。

本方法による Homopiperonylsäure の得量は余り良好ならず、Piperonal-hippursäure (Anhydrid) より計算して理論量の約 30% に過ぎず。上述の Methylendioxyphenylbrenztraubensäure と安息香酸とを分つに際し、Perkin (J. Ch. Soc. 125, 1686 (1924)) の如く亞硫酸ガスを利用するか、或は Decker の如く水蒸氣蒸

溜によりて安息香酸を除く方よきが如し。(北里氏は Perkin の方法を採用せり)

次に Homopiperonylsäure を Säurechlorid とすには、北里氏は PCl_5 を用ひたれども、余は Thionylchlorid を利用して好結果を得たり。即ち計算量の約倍量の Thionylchlorid に酸を溶解せしめ、次に水浴上減壓にて過剰の Thionylchlorid を除く時は、茲に黄色油狀の Homopiperonylsäurechlorid を得。

第三節. 1-(3',4')-Methylenedioxybenzyl-3-methyl-6,7-Methylenedioxyisochinolin (Eupaverin) 及び 1-Phenyl-3-methyl-6,7-methylenedioxyisochinolin の製造 N-Homopiperonyl- α -methyl- β -methoxy- β -(3,4-methylenedioxyphenyl)-äthylamin (IV).

Homopiperonylsäurechlorid を用ひ、N-Benzoyl 誘導體(後述)と同様にして製る。80% メタノールより結晶せしめたるものは Fp 142-144° の白色結晶なり。

分析

物質 0.0947g N_2 27cc (28°, 763.4mm) %N	3.91
$\text{C}_{19}\text{H}_{19}\text{O}_5\text{N}$ としての理論數	3.92

1-(3',4')-Methylenedioxybenzyl-3-methyl-6,7-methylenedioxyisochinolin (Eupaverin (V))

上記の N-Homopiperonylamin 1.1g をキシロール 7cc, オキシ鹽化磷 2.5cc と共に約 30 分間沸騰せしめ、冷後後述の 1-Phenyl-3-methyl-6,7-methylenedioxyisochinolin と同様に處理す。粗鹽基の得量 0.86g にして、理論量の約 90% なり。80% メタノールより再結晶せしめたるものは白色絹絲狀結晶にして Fp 141°, 即ち文獻の記載に一致す。

分析

物質 0.0590g N_2 2.6cc (28° 759.3mm) % N	5.02
$\text{C}_{19}\text{H}_{15}\text{O}_4\text{N}$ としての理論數	4.56

呈色反應

濃硫酸に冷時汚綠色に溶解、溫時紫色を呈す。之亦文獻に一致す。

鹽酸鹽

鹽基を約 5% の鹽酸に溫時溶解せしめ放冷する時は、微黄色針狀結晶として析出す。本鹽は約 152-154° にて一旦熔融發泡し、其儘溫度を上ぐる時は白色

慶松: 1-(3',4')メチレンデオキシベンチル-3-メチル-6,7-メチレンデオキシイソヒノリン(オイバペリン)及び1-フェニル-3-メチル-6,7-メチレンデオキシイソヒノリンの合成¹⁰⁷⁷

結晶となり、再び約 255° にて分解す。即ち結晶水が飛びて再び結晶し、無水物が 255° 附近にて分解するものと考へらる。文献によれば水より結晶せしめたる鹽は 1 分子の結晶水を含有するものにして、約 158° にて熔融、又純アルコールより結晶せしめたるものは無水物にして約 253° にて分解すと。

金複鹽

橙赤色無晶形粉末、Zp. 171-173°, 風乾せるものを 100-110° 減壓にて乾燥するに減量なし、よりて金の定量をなすに 1 分子の結晶水を含有するものに一致す。故に 110-120° にて乾燥せんとするに、一部分分解樹脂化して結晶水を測定すべからず。即ち分析の結果より之を推定す。

金の定量 (100-110° 乾燥)

物質 0.0457g	金 0.0134g % Au	29.32
	$C_{19}H_{15}O_4NH \cdot AuCl_4 \cdot 2H_2O$ として	29.70
	$C_{19}H_{15}O_4NH \cdot AuCl_4$ として	30.52
	$C_{19}H_{15}O_4N \cdot H \cdot AuCl_4 \cdot 2H_2O$	28.92

白金複鹽

淡黄色結晶性粉末、水に易溶、Zp. 202 (181° 黒變) 少量にして Pt の定量をなすべからず。

N-Benzoyl- α -methyl- β -methoxy- β -(3,4-methylenedioxyphenyl)- α ethylamin (VI) Mannich (Arch. 265, 1-11) が β -Methoxy- β -(3,4-methylenedioxyphenyl)- α ethylamin の N-Benzoyl 誘導體を製したる方法に倣ふ。即ちアミン 1g $N/2$ NaOH 10cc と共に氷にて冷しつつ、之に Benzoylchlorid 1g を 2-3 滴宛加へて強く振盪して反應せしめ、全部の Benzoylchlorid を添加後、2-3 滴のアルコールを加ふる時は反應物は全部固化す。液を濾別し、80% メタノールより結晶せしむ、得量殆んど定量的。本物質は Fp. 165° の白色結晶體なり。

分析

物質 0.0774g	N_2 3.48cc (27°, 765,3mm) % N	5.05
	$C_{18}H_{19}O_4N$ としての理論數	4.58

1-Phenyl-3methyl-6,7-methylenedioxyisochinolin (VII)

Mannich (Arch. 265,1-11) が 1-Phenyl-6,7-methylenedioxyisochinolin を製りたる方法に倣ふ。即ち上記 N-Benzoyl- α -methyl- β -methoxy- β -(3,4-methylenedio-

1078 慶松: 1-(3',4')メチレンジオキシベンチル-3-メチル-6,7-メチレンジオキシイソヒノリン(オイバペリン)及び1-フェニル-3-メチル-6,7-メチレンジオキシイソヒノリンの合成

xyphenyl) -äthylmin 0.8g をキシロール 5.5cc 及びオキシ鹽化磷 2cc と共に沸騰せしむる事約 30 分, 冷後石油エーテルを加へ, 析出する樹脂狀反應成績物を傾瀉によりて液より分ち, 更に石油エーテルにて洗ひ, 次に約 5% の鹽酸に溶解せしめ (殆んど全部可溶), 次にアルカリ性となして析出する鹽基をベンゾールに採る. 粗鹽基の得量は 0.46g にして理論量の約 70% なり. 之を 80% メタノールより再結晶せしむる時は Fp 143° (139 より軟化) の白色針狀品となる.

分析

物質 0.0520g N ₂ 2.35cc (25°, 763.8mm) % N	5.03
C ₁₇ H ₁₃ O ₃ N とするの理論數	5.32

呈色反應

濃硫酸に冷時微黃色に溶解, 溫時帶靑紅色

鹽酸鹽

鹽基のアルコール溶液に鹽酸を加へ, 液を蒸發する時は, 帶綠黃色の絹絲狀結晶として析出す. Zp 171-172° にして 2 分子の結晶水を有す 140° 減壓にて乾燥せる無水物は白色粉末にして Zp 約 225° なり.

i) クロル定量 (風乾)

物質 0.0519g AgCl 0.0224g % Cl	10.9
C ₁₇ H ₁₃ O ₃ N·HCl·2H ₂ O とするの理論數	10.6

ii) 結晶水測定 (140°, 減壓)

物質 (風乾) 0.0344g 減量 0.0036g % H ₂ O	10.47
C ₁₇ H ₁₃ O ₃ N·HCl·2H ₂ O とするの理論數	10.73

iii) クロル定量 (無水物)

物質 0.0172g AgCl 0.0080g % Cl	11.51
C ₁₇ H ₁₃ O ₃ NHCl とするの理論數	11.84

以上に依り本鹽は 2 分子の結晶水を有するものと認む.

金複鹽

鹽基の鹽酸溶液に鹽化金溶液を加ふる時は, 黃金色無晶形の沈澱として金鹽を得再結晶せんとすると樹脂化する故, 沈澱そのものをよく水洗し, 乾燥して金の定量をなす.

本金鹽は Zp 220° にして 110° 減壓に乾燥するも減量なし.

金の定量

慶松: 1-(2',4')メチレンジオキシベンチル-3-メチル-6,7-メチレンジオキシソビノリン(オイバベリン)及び1-フェニル-3-メチル-6,7-メチレンジオキシソビノリンの合成 1079

物質 0.0502g 金 0.0112g % Au	22.31
(C ₁₇ H ₁₃ ON) ₂ HAuCl ₄ としての理論数	22.77
C ₁₇ H ₁₃ O ₂ N·HAuCl ₄ ..	32.70

以上により、本金鹽は鹽基 2 分子と HCl·AuCl₃ 1 分子の結合せるものと認む。

第四節. α -Methoxy- β -bromdihydroisosafröl より α -Methyl- β -methoxy- β -(3,4-methylenedioxyphenyl)-äthylamin を得んとする試み。

α -Methoxy- β -bromdihydroisosafröl

Mannich (Arch. 248, 166-170) に従ふ。即ち Isosafröl に、エーテル又は石油エーテル溶液に於て、ブロムを作用せしめて Isosafröldibromid を製し(得量定量的)、このものにメチルアルコールを作用せしめて目的物を得たり(得量定量的)。本物質は淡黄色濃稠をにして、K_{p3}=135-136° K_{p3-6}=149-152°, K_{p6-7}=152-154°。(文献 K_{p4}=148-149°)

α -Methoxy- β -bromdihydroisosafröl にアンモニアを作用せしめんとする

試み (D. R. P. 274350 に倣ひて)

i) アルコール性アンモニア

a) ブロム誘導體をアルコールに溶解せしめ、乾燥アンモニアガスを通するも變化なし。

b) ブロム誘導體 15g, アルコール性アンモニア (6 %) 45cc を封管中沸騰水浴中に 4 時間加熱したるに大部分原物質を回収し、アミンと覺しきもの痕跡なり。

c) ブロム誘導體 30g, アルコール性アンモニア (7 %) 400 を加壓釜中 110-140° に 10 時間加熱したるに、大部分樹脂化し、アミンと覺しきもの痕跡なり。

ii) アンモニア水

a) ブロム誘導體をアンモニア水と常溫にて振盪するに反應せず。

b) ブロム誘導體 8g, 20% アンモニア水 30cc を封管中 115-140° (不注意の爲寸時 210° まで上げたり) に 15 時間加熱したるに、一部は回収したけれども、樹脂化する部分多く、常法によりて處理してアミン様物質約 0.5g を得たり。但しこのものはベンゾイル誘導體を作らず。

c) ブロム誘導體 7g, 20% アンモニア水 30cc を封管中 120° に約 100 時間

加熱，常法により處理，一部回收，一部樹脂化，アミン様物質得量約 0.5g. 但しベンゾイル誘導體を作らず.

α -Methoxy- β -brom-dihydroisosafröl にウロトロピンを作用せしめん

とする試み

Benzylchlorid にウロトロピンを作用せしめて Benzylamin を得る方法 (C, 1922, III, 51) に倣ひて，ブロム誘導體とウロトロピンの計算量をクロロホルム 中にて水浴上に少しく溢め，次にクロロホルムを溜取せるに，何等反應せる形跡なく，原物質を回收したるのみなりき．本反應は二回試み，兩回共成功せざりき．

ヒスタミン同族體の合成及その藥理作用に就て

玉 蟲 雄 藏

(海軍軍醫學校化學教室)

(昭和 8 年 9 月 15 日受理)

Y. Tamamushi: Über synthese von Homologen des
Histamin und deren pharmakologische Wirkung.

1907 年 Windaus u. Vogt (B. **40**, 3691) により初めて合成せられたるヒスタミンはイミドアツォルの 1 誘導體にして顯著なる藥理作用を有するに拘はらず一般臨牀上の應用に適せざるは有害なる副作用大なるに起因するものの如し.

爾來諸學者によりイミドアツォル誘導體中よりヒスタミンと同等の藥理作用を有し有害なる副作用なき藥物を創製せんとする努力は續行せられつつあるも未だその域に達せざる状態にして得られたる新劑は何れもヒスタミンに比し遙に微弱なる藥理作用を有するに過ぎず.

著者は曩に (本誌 **616**, 580, 1933) 2-メチルイミドアツォル-4,5-ヂカルボン酸に五鹽化磷及磷オキシクロリドを作用せしめ 2-メチルイミドアツォル-4,5-ヂカルボン酸-5-クロリド (I) を更に (本誌 **617**, 664, 1933) この酸クロリドを錫及鹽酸を以て還元し 2-メチル-5-オキシメチルイミドアツォル-4-カルボン酸 (II) を得たることを報告せり.

著者は (II) の $-\text{CH}_2\text{OH}$ を $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$ とし一種の新ヒスタミン同族體と