Sign -, severe rickets. Sign +, slight healing evidenced by a trace of calcium deposit in the metaphysis.

Sign + +, moderate healing evidenced by calcified strip in the metaphysis.

(7) The albino rats each about 50 g in weight were fed on the diet containing 10 % Aburatsunoame liver oil. Then the male gained some 240 g and the female 170 g in their body weights respectively during 90 days and they appeared well nourished. No difference could be noticed from the results of experiments made with cod liver oil or olive oil under the same conditions.

M. Asano und T. Kanematsu: Über die Konstitution des Spilanthol, des scharfen Prinzips des Parakresse II.

B. 65 1602-4 (1932)

Michizo Asano und Fumio Nakatomi: Synthese einiger ungesättigter, aliphatischer Isobutylamide.

M. Asano und T. Kanematsu [Ber. 65, 1602-1604 (1932)] haben festgestellt, dass dem Spilanthol die Konstitution des Decadiensäureisobutylamid $\text{CH}_3 \cdot (\text{CH}_2)_2 \cdot \text{CH} = \text{CH} - \text{CH} = \text{CH} - (\text{CH}_2)_2 \cdot \text{CONH} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH} \begin{smallmatrix} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \end{smallmatrix}$ zukommt. Wir haben in der Absicht zu prüfen, ob ähnliche Verbindungen narkotische Eigenschaften wie Spilanthol haben oder nicht, folgende Fettsäureisobutylamide synthetisiert.

- 1) N-Isobutylundecylensäureamid $\text{CH}_2 = \text{CH} \cdot (\text{CH}_2)_8 \cdot \text{CO} \cdot \text{NH} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH} \begin{smallmatrix} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \end{smallmatrix}$ Eine wachsähnliche, feste Verbindung vom niedrigen Schmelzpunkt. K_p 116-117°. Nicht narkotisch.
- 2) $\Delta^{\alpha, \beta}$ -Nonylsäure-n-butylamid $\text{CH}_3 \cdot (\text{CH}_2)_5 \cdot \text{CH} = \text{CH} \cdot \text{CO} \cdot \text{NH} \cdot (\text{CH}_2)_3 \cdot \text{CH}_3$ Hellgelbe, viskose, ölige Substanz, die im Winter aber

fest wird. Nicht narkotisch.

- 3) N-Isobutylgeraniumsäureamid $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \diagup \\ \text{C} - \text{CH} \cdot (\text{CH}_2)_2 \cdot \text{C} = \text{CH} \cdot \text{CO} \cdot \\ \diagdown \\ \text{CH}_3 \end{array}$
 $\text{NH} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \diagup \\ \text{CH}_3 \end{array}$ Hellgelbes, sehr viskoses Öl, das sich an der Luft allmählich bräunt. Kp_3 154–157°. Es ist ein Isomer des Spilanthol, schmeckt nur schwach scharf, hat aber keine narkotische Wirkung.

Ferner wurde durch Kondensation von Citral mit Malonsäure in Pyridinlösung bei Gegenwart einiger Tropfen Piperidin Dimethyldekatriensäure $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \diagup \\ \text{C} = \text{CH} \cdot (\text{CH}_2)_2 \cdot \text{C} = \text{CH} - \text{CH} = \text{CH} - \text{COOH} \\ \diagdown \\ \text{CH}_3 \end{array}$ hergestellt, aber es gelang nicht dieselbe mit Isobutylamin in Reaktion zu bringen.

Nach obigem Ergebnis sind mindestens 2 Doppelbindungen in der Säuregruppe nötig, um in spilantholähnlichen Verbindungen die narkotische Eigenschaft zu erreichen, auch scheint die gegenseitige Stellung der Doppelbindung vom Einflusse zu sein. Auch die Anzahl der Kohlenstoffatome in der nicht verzweigten Kette der Säuregruppe muss in Erwägung gezogen werden.

Michizo Asano und Fumio Nakatomi: Scharfschmeckende Substanz und ihre chemische Konstitution. (II. Mitteil.).

(vergl. I. Mitteilung Journ. of Pharm. Soc. Japan Nr. 531, 375–308).

H. Staudinger und andere haben viele Arten ω -Phenylfettsäuren synthetisiert und haben angegeben, dass darunter

am schärfsten schmeckt. [Ber. 56, 699; 711 (1923)].

Wir haben die 3 folgenden ω -Furylfettsäurepiperidide synthetisiert. Unter

色強きも, イシナギ, 鮎, メカデキの肝油に及ばざる事を報告せり。

(工業試験場報告 第20回第2号 97頁)

辻本博士は小樽にて購入せる油角鯨肝油2種につき其の特数を測定せり。

(辻本氏著 海産動物油)

油角鯨肝油の成分に關しては外山, 土屋兩氏の詳細なる研究あり。

飽和脂肪酸は全脂肪酸の15%に當り, myristic, palmitic, stearic, arachidic Behenic, $C_{24}H_{48}O_2$ 存し palmitic acid 主要部を占む。

不飽和酸は Zoomaric, oleic, $C_{20}H_{38}O_2$, 鯨油酸, 鯨油酸存在す。其の他 $C_{14}H_{26}O_2$ 存する如し。olein 酸列より不飽和度高き酸は主として C_{20} 及び C_{22} の酸より成り, C_{18} の酸を含むが如し。

不鹼化物は軟牛酪狀固體にして温むる時は淡黄一橙黄色の液となる。コレステロール 2.7-4%を含む。主成分はバチルアルコール, キミルアルコール, セラキールアルコールより成る。

(工業試験場報告 第22回第11号 159頁)

(„ 第20回第2号 179頁)

参 考 文 献

- (1) S. and S. Schmidt-Nielsen. Biochem. Jour. 23, 1153 (1929)
(2) S. Schmidt-Nielsen Z. physiol. chem. 189, 229 (1930)

オランダセンニチの成分スピラントール の構造に就て (第2報)

浅 野 三 千 三

兼 松 鐵 雄

(昭和8年1月19日受理)

(昭和6年11月10日金澤醫科大學附屬藥學專門部)

M. Asano u. T. Kanematsu: Über die Konstitution des
Spilanthols, des scharfen Prinzips der Parakresse. II.

に朝比奈・浅野はキバナオランダセンニチ *Spilantes oleracea* Jacquin の麻醉

性成分スピラントール Spilanthol を水素化して得らるるヒドロスピラントール $C_{14}H_{29}ON$ を合成してその構造を N-イソブチルカプリンアミド $CH_3 \cdot (CH_2)_8 \cdot CO \cdot NHCH_2CH(CH_3)_2$ と確定せり. [本誌 **460**, 503(1920); **480**, 85(1922)]

其後余等はオランダセンニチ *Spilanthus Acmella* L. f. *fusca*, Makino 中にもスピラントールの含有するを認めこの中よりスピラントールを純粹に抽出しその集成を $C_9H_{15}CO \cdot NH \cdot CH_2 \cdot CH(CH_3)_2$ と決定し尙オゾン酸化の成績體よりデクロロー法によりワレリアン酸と蟻酸とを推定し且粗琥珀酸の少許を得たることよりスピラントールの構造を次の如く豫報せり[本誌 **544**, 521(1927)]

今回予等は多量の材料を入手せるを以て再びオゾン酸化を吟味せるに酸化成績體として琥珀酸を純粹に捕捉したるのみならず1鹽基性酸の混合よりは蟻酸を分解したる後再びデクロロー法を試みたるに正酪酸に最もよく一致するを見たり. さすれば前報のアレン結合は之を訂正して當然共軛二重結合を有するものとせざるべからず. 尙スピラントールに Diels 等のデエン合成法を應用して無水マレイン酸を作用せしめたるに $C_{18}H_{27}O_4N$ なる縮合成績體を得たる事は上の斷定を裏書きするものとす.

即ちスピラントールは次の如く構造確定せられその無水マレイン酸との縮合成績體は下に示さるる如き構造を有するものなり.

本研究に際しキバナオランダセンニチの栽培竝にその浸出に盡力せられたる富山藥學専門學校長高橋博士及び同校教授上野博士の御好意に對し深甚なる感謝を捧ぐるものなり. 尙微量元素分析を施行せられたる野口敬身教授に厚く謝意を表

す。

実験の部

ブロム水素酸によるテトラヒドロスピラントールの分解

テトラヒドロスピラントールを濃厚ブロム水素酸(50%)と共に閉管中 160° に 6 時間加熱す。分解終りたる後之を開きて茲に析出する物質をエーテルにとり炭酸ソーダ液にて振盪し可溶の酸性物質を再び稀硫酸にて析出せしめエーテルにとりエーテルを溜去すれば結晶を残す。之を減壓にて蒸溜精製せり。Kp₄ 136-140.

滴定による分子量測定

物質	0.1484g:	0.1 N-KOH	8.43cc,	分子量	176
	C ₁₀ H ₂₀ O ₂ として			„	172

此酸を α -トリイデヒンと共に閉管中に加熱するに Fp 76-77° の α -トリイデヒドを得。N- α -トリールカプリンアミド(Fp 77°) と混融するに融點の降下なし。

元素分析

物質	0.0559g:	CO ₂	0.1604g,	H ₂ C	0.0533g,	C%	78.26,	H%	10.67
„	0.0834g:	N	4.1cc (26.5°, 749mm)					N%	5.37
	C ₁₇ H ₂₇ ON として			„	78.10,	„	10.42,	„	5.36

次にテトラヒドロスピラントールのブロム水素酸による分解の際水に可溶性の部分蒸發乾涸したる後この鹽類残滓をとり α -トリオールスルフォ酸クロリドを加へカリ滷液と共に暫く振盪するに結晶を析出す。之をリグロインより再結晶するに Fp 77° なり。之を N-イソブチール- α -トリオールスルファミド(Fp 77°) と混融するに融點の降下を示さず。

オゾンに依るスピラントールの分解

スピラントール 10g を無水クロロフォルムに溶解し冷却しつつ酸素にて稀釋されたるオゾンを充分に通じたる後減壓にてクロロフォルムを驅出しここに得たる粘稠なる残滓に水を加へ加温す。冷後エーテルを加へエーテル可溶部(A)と水可溶部(B)とに別つ。(B)は蒸發乾涸す。此際揮發する物質は強く酸性を呈し還元性あり。主として蟻酸なり。残滓は之を溫醋酸エステルにて反覆浸出し浸液を濃縮すれば結晶を析出す。之を醋酸エステルより再結晶するに Fp 184-5° を示す。之を琥珀酸(Fp 184-5°) と混融するに融點の降下認められず。

滴定による分子量測

物質	0.1153g:	0.1N-KOH	18.95cc	分子量	122
----	----------	----------	---------	-----	-----

$C_4H_6O_4$ として „ 118

元素分析

物質 3.226mg: CO_2 4.82mg, H_2O 1.55mg, C% 40.75, H% 5.38

$C_4H_6H_4$ として „ 40.66, „ 5.12

又(A)より炭酸ソーダ液にて酸性物質をとり尙夾雑する蟻酸を分解するため酸化銀と共に加温したる後硫酸々性となしエーテルにとり再び炭酸ソーダ液に轉溶せしめ之を蒸發乾涸したる後更に硫酸々性にして蒸溜し溜液はカリ滷液にて中和し蒸發乾涸す。此殘滓についてデユクロー法を試むるに次の結果を得たり。

溜分(cc)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
n-Buttersäure 理論値	17.6	33.6	47.5	60.0	70.6	79.5	86.5	92.5	97.0	100
實驗値	20.0	36.6	50.0	61.5	71.0	79.0	85.5	91.5	96.0	100

スピラントールに無水マレイン酸の作用

6g のスピラントールに 3g の無水マレイン酸を加へ氷冷しつつよく攪拌し均等の粘稠液となし後水浴上に加温したるに $50-60^\circ$ にて次第に結晶を析出し來る。更に漸次温度を高むるに再び液状を呈す。一夜放置したる後水を加へ加熱し水に不溶なる部分をエーテルにとりエーテルを溜去せる褐色の殘滓をアルコールより再結晶するに 0.5g の絹絲狀光澤ある輕鬆なる針狀晶を得たり。Fp $167-168^\circ$

分子量測定(ラスト法)

物質 0.0056g: 樟腦 0.0542g $\Delta = 13^\circ$ 分子量 318

$C_{18}H_{27}O_4N$ として „ 321

元素分析

物質 0.0497g: CO_2 0.1230g, H_2O 0.0360g, C% 67.50, H% 8.11

„ 3.240mg: N 0.126cc (23° , 760mm) N 4.39

$C_{18}H_{27}O_4N$ として „ 67.24, „ 8.47 „ 4.36

本品を 0.1N-KOH 液にて冷時滴定するに恰も 2 鹽基性酸として要する苛性カリ液の半量にて中和せられたり。