— 報 文 —

男性ホルモンの研究 (第三報)

雞冠の生長に依る男性ホルモン検定法に就て (其一)

雞冠測定法批判竝に新測定法

緒 方 章

伊 藤 四 十 二

(昭和 8 年 1 月 23 日受理)

(東京帝國大學醫學部藥學科臟器藥品化學教室)

A. Ogata und Y. Ito: Untersuchung des männlichen Sexualhormons.
(III. Mitteilung) Über Auswertung des männlichen Sexualhormons
nach des Hahnenkamm-Methode. (I). Eine neue Methode zur
Ausmessung des Hahnenkamm Wachstums-Koeffizienten.

男性ホルモンの生理試験法批判

男性ホルモンの化學的研究に際して應用せらるる生理試験法にて今日迄に發表せられたるものは殆ど總て完全なるものとなすを得ず。以下此等男性ホルモン試験法の大要を記し簡単に批判せん。

1. モルモット精蟲の運動に依る試験 Moore [Proc. Soc. exper. Biol. & Med. **24**, 847 (1927)] の提唱に依るものにして去勢モルモットの副睪丸中に於ける精蟲の生存期間 (23-25 日) を睪丸ホルモンの注射に依り正常の状態 (65-70 日間) に迄延長せしむる事を原理となすものにして實際に於ては去勢後直に檢體を注射し 副睪丸中の精蟲生存限を 30 日以上延長し得るものを以て有效となすなり。

此方法は理論的には甚だ興味ある方法なれど製品の強度を數値を以て表示する事困難なるのみならず成績の判定に非常に長時間を要する事を缺點となす。

2. 電氣的刺激に依るモルモットの射精試験 1922 年 Batteli に依り發見され 1930 年 Moore & Gallagher [The Amer. Journ. Anat. **45**, 39(1930)] は睪丸エキスの試験に又 1931 年 Kabak [Endokr. **9**, 250(1931)] は男尿エキスを就き試みたり。

正常モルモットの脳髓の一定部位に電氣的刺激を與ふれば射精す。今モルモットを去勢せば電氣刺激を與ふるも射精物は漸次減少し遂に之れを見ざるに至るなり。依つてかかる状態にある去勢モルモットに睾丸ホルモンを注射し正常の状態に復するや否やを見るを原理となす。

此方法は製品の應用目的に一致せる生理反應にして結果の觀察は全く客觀的にして2週間以内に判定し得らるるのみならず去勢手術以外の操作は頗る簡單にして同一動物を長期間反覆して使用し得らるる等種々の長所を有するも遺憾ながら用量と作用強度との關係が不明瞭なる事を缺點とす。

3. 去勢による男性生殖器附屬器官の退行變化が復活することを組織學的又は細胞學的に觀察する試験法 男性生殖器附屬器官即ち輸精管、精囊、攝護腺及 Cowper 氏腺等の機能は睾丸ホルモンに依り支配され従つて去勢に依り著く萎縮退行す。かくの如き状態にある去勢鼠に男性ホルモン檢體を注射して正常の構造に復するや否やを檢するなり。上述諸腺の内その形状の比較的大なると、著しき變化の目標となるべきものの存在する等の爲に精囊及攝護腺を對照とする方法最も一般に用いらる。是に屬するものに次の如き諸氏の方法あり。

Laewe u. Voss の去勢廿日鼠精囊の細胞學的復活試験法 (Cytologische Regenerationstest)

[Akadem. Anzeiger Nr. 20(1929); Klin. Wchschr 481(1930)] Loewe u. Voss の去勢廿日鼠精囊上皮細胞の細胞核分裂に依る試験 (Mitose test) [Dtsch. Med. Wchschr. Nr. 30(1930)] Moore & Gallagher の去勢白鼠精囊の細胞學的試験. [Amer. Journ. Anat. **45**, 109(1930)] Amson の正常幼白鼠精囊の組織學的試験. [Endokr. **9** 241(1931)] Martin の去勢廿日鼠精囊の細胞學的試験に肉眼的觀察(主として幅及長さ)を併用する方法. [Endokr. **7** 180(1930)] 武藤忠次氏の去勢廿日鼠精囊及攝護腺の肉眼的觀察(主として重量)に組織學的檢査を併用する方法. [朝鮮醫學會雜誌第 91 號(1928)] Moore, Price & Gallagher の白鼠攝護腺(主として中葉及後葉)の細胞學的試験法. [Amer. Journ. Anat. **45**, 71(1930)].

是等の諸法に就きその長所及短所を一括して考察するに男性生殖器附屬器官の構造の變化は男性ホルモンに特有なる反應なるを以て原理としては男性ホルモンの試験法として當を得たるものなれど結果の判定は主觀的の誤謬に陥り易く純客觀的に正確なる判斷を下す事を得ざる缺點あり。しかのみならず組織學的、殊に細胞學的試験法にありては固定染色等に特別の技術を必要とするを以て化學實驗室に於ける試験に適當ならず。若し夫れ精囊、攝護腺等の肉眼的觀察〔重量、長さ及幅等に依り比較す〕に至りてはその測定の不正確なる事論を俟ずして明なり。要是男性生殖器附屬器官の組織學的及細胞學的試験は定性法としては良好なるべきも定量法としては不適當なり。

4. Lendle の抗女性作用を應用する方法 [Archiv f. exper. Pathol. u. pharmacol. **159**, 463(1931)] 成熟雌白鼠に男性ホルモンを注射してその發情間期を延長せしむる事實を應用したるものにして 5 日間の注射に依り正常の週期(4-6 日)を 10 日間に延長するものを以て有効となすものにして性週期は Allen-Doisy 法に依りて檢す。

此方法は檢體の用量少量にて足り〔雞冠法の約 $1/10$ - $1/50$ 量にて足ると云ふ〕動物を去勢する必要無く從つて試験材料は容易に得らるる等の長所を有するも性週期の變動は動物の僅かの健康状態の變化に依りても起り得るを以て夾雜物質に依り著しく影響され從つて試験結果に絶對的の信用を置くを得ず又長期間を要する等の缺點あり。更に此方法に於て、若し男性ホルモンと女性ホルモンとが生理的に眞に拮抗的のものならば可なるべきも果してしかるや未だ確定せられざる今日に於ては信を置き難し。

5. 魚[Bitterling: *Rhodeus amarus*] の婚姻色の發顯に依る方法 Glaeser 及 Haempel [Pffüger's Arch. **229**, 1(1931)] に依り發表せられしものにして鯉科に屬する淡水魚中の或種のもの一獨逸にては Bitterling (*Rhodans amarus*), Elritze (*Phoxinus laevis*), Stichnig (*Gasterosteus* Art.) 等, 本邦に於ては やりたなご (*Achellognathus intermedium*), おひかは (*Zacco platypus*), かはむつ (*Zacco temminckii*) — の雄は生殖時期に體色を變じて所謂婚姻色を呈す。しかして此現象は男性ホルモンと密接なる關係を有するものにして是等の魚類を去勢せば最早體色の變化を起さず。依りて去勢したる Bitterling に男性ホルモンを注射し體色の變化を起したるものを以て有効となすなり。しかれども此反應は男性ホルモンにのみ特有なるものにはあらずしてヨヒムビンの如き所謂催淫薬に依りても生起せらるるを以て兩氏等はヨヒムビンの一定量に依りて生起さるる體色の變化を以て魚單位を規定せり。Gläser 及 Hämpel 兩氏は此方法に依れば 4-5 時間の短時間にて試験を終了し得る事、試験の對照物が小なる爲檢體少量にて足り鋭敏度の高き事、ヨヒムビンの如き化學的純粹なる物質の一定量の顯はす作用を以て標準となすを以てその效價を表示し易きこと及同時に檢體中に含有さるる夾雜物の毒性の試験を兼ねるを得る事等の諸種の利點の存在する事を主張せるも今此方法の缺點に就き考察せんに、魚が小なる爲に(體長 10cm 以下)去勢手術が非常に困難、且去勢の結果創傷部位に諸種の菌類繁殖し從つて魚の死亡率非常に大なる事、野生水棲動物なるを以て嚙齒類動物、雞等に比し飼養が稍困難なる事等存在するも尙更に重要な欠點は、效果檢定の對照となるものが色彩の變化なるを以てその生理的強度を數値を以て示すに主觀的誤謬に陥り易く又如何なる程度の色の變化を以て反應の限界となすべきかに就き正確なる標準を與ふる事困難なるべし。

以上の諸種の方法の外 尙次の如き諸法あるも何れも實用的ならず。

Steinach 及 McCartney & James の去勢蛙の抱擁反射を喚起する方法 [Steinach: Zen-

tralblat f. Physiol. **24**, 551(1910); Mc Cartney & James: Proc. Soc. of exp. Biol. & Med. **26**, 186(1929)) Wang & Hoskins の白鼠の活動能力に依る試験法 [Wang: Amer. Journ. of Physiol. **73**, 581(1925); Hoskins: Endokl. **9**, 277(1925)] Lanz の精囊中の液體の Ph-値測定に依る方法 [Pflügers' Arch. **222**, 181(1929); Sitz. Ber. Gesamt. Morphol u. Physiol. München, **39**, 62(1930))

6. 去勢雄雞の雞冠生長に依る方法 雄雞の睪丸を摘出せば雞冠及び肉垂は著しく萎縮褪色し, これに睪丸を移植する時は再び其發育を來す事は 1849 年 Berthold [Arch. Anat. Physiol. wiss. Med. **42**, (1849)] に依り始めて發見せられ 1918 年に至り Pézard [Bull. biol. de France et Belgique **52**, 101(1918)] は此反應は男性ホルモンの生理試験法として適當なりとなし次で McGee, [Proc. Inst. Med. Chicago, **6**, 242(1927)], McGee, Juhn & Domm [Amer. J. Physiol. **87**, 406(1928)], 及 Gallagher [Amer. J. Physiol. **87**, 447(1928)] 等に依り稍詳細に研究せられ遂に 1929 年 Gallagher & Koch [The J. of biol. Chem., **84**, 495(1929)] 1930 年 Funk [Amer. J. Physiol. **92**, 440(1930)] に依り夫々睪丸或は男尿より男性ホルモンの抽出に際して實地に應用せらるるに至り 以來今日に至る迄殆ど總ての人々に依り採用せられたる最も一般的なる試験法なり。

雞冠法は去勢手術比較的容易にして同一動物を反覆使用し得、又飼育も簡單に行はれ反應も比較的鋭敏なるのみならず效果檢定の對像は雞冠の大きなを以て個性による反應の動搖を避けて適當なる測定を行ひ得ば既述の他の總ての方法と異り、比較的正確に 全く客觀的に數値を以て その生理的強度を表示し得る特長を有す。

然れ共此方法を生理的定量法として實施するに當りては未だ不備の點多々存在し今日迄種々の人々に依り幾分改良せられたりと雖も未だ完全なるものと云ふを得ざるを以て此方法が醫療的應用と直接の關係ありや又果して男性ホルモンにのみ特有なる反應なりや否や未だ疑問の存する所なるも著者等は此方法を生理的定量法として完成せしめんと欲し研究を開始し、先決問題として雞冠の大きさの測定竝に表示法に就き一新知見を得たるを以て茲に報告せんとす。尙その他の問題に關しては今日引續き研究中なるを以て追て報告すべし。

雞冠測定法批判

既述の如く製品の効果檢定の對照となるものは雞冠の大きなを以て雞冠の正確にして簡單なる測定法を必要となすものなり。現今迄に測定法竝に表示法として發表せられて又一般に使用せられ居るものを大別せば、Mc Gee 及 Gallagher

等の長さ〔L〕及高さ〔H〕を以てする直線的測定法と de Fremery 及 Schöller 等の面積測定法との二種となす事を得。

直線的測定法に於ては先づ長さ〔L〕及高さ〔H〕を規定し、その表示法に更に Mc Gee Juhn & Domm [Amer. J. physiol. **87**, 406(1928)] に依る L 及 H の相乗

第 1 圖

—— 注射直前の輪廓
 注射5日間後の輪廓

積〔L×H〕を以てする方法, Gallagher & Koch [J. of Pharmacol & exper. Therapeut. **40**, 327, (1930)] の提唱に依る〔L+H〕を以てする算術和に依る方法及び Dodds, Greenwood, Allan & Gallimore [Biochem. J. **24**, 1031 (1930)] の〔L〕のみを以てする表示法あり。

既に第一報[本誌 **52**, 679(1932)] に於て記載せし如く長さとは雞冠の嘴に接する最前端の一點より最後端に至る

距離を云ひ、高さとは雞冠の多數の突起の内成る可く眼に近くしかもその突起の最大なるものの一を選定し、その先端より雞冠の基部即ち羽毛に移らんとする點迄の距離を言ふ。然れ共雞冠は外力に依りて容易に伸縮するを以て測定に際し 1mm 位の誤差を生ずる事易々たり。就中高さの測定に至りては雞冠の基部の基準となすべき點不明瞭なる爲毎回の測定に於て同一點を取る事を得ず。又頭部上平面に對する「ものさし」

の角度如何に依り著しく測定値を異にするものにして屢々大なる誤差を伴ふを常とするものなり。

次に各表示法に就き考察せんに〔L×H〕法に於ては、是即ち兩邊の長さを L

第 2 圖

(第 2 表 D 參照)

及び H とす矩形の面積にして眞の雞冠の面積〔片側表面積〕に非ざる事を俟ずして明なり。若し上述の如くして選定したる一の突起のみが生長し他の突起は全然變化せざるものならば可なるべきも實際に於ては雞冠は第 1 圖の如く前部より後部にかけて一樣に生長し又各突起總てが夫々増大するものなるを以て單に唯一の突起の高さの増加數のみを以てしては雞冠の眞の増大度を表示する事を得ず。著者等の計算の結果に依ればその生長率從つて増加率は全面積〔但し雞冠陰影像の全面積にして從つて雞冠の片側表面積と見做すべきもの〕に比し遙に小となる。〔歐文報告第 2 圖及歐文報告第 2 表及本文第 2 表 D 及第 3 表 A, E, F 及第 2 圖參照〕

又 L 及び H の測定誤差は既述の如く稍々大なるを以て L 及 H を相乗積したる結果の誤差は更に大なるべく從つてその値には信をおき難し。

茲に生長率とは注射第 2 日, 第 3 日, 第 4 日, 第 5 日, 第 6 日の測定値を夫々注射直前即ち第 1 日の測定値にて除したる値を言ふ。

増加率とは注射第 2 日, 第 3 日, 第 4 日及第 5 日, 第 6 日に於ける増加數を夫々注射直前即ち第 1 日の測定値にて除したる値を言ふ。

第一報に於て茲に用ふる増加率の事を生長率と稱したるも本報に於て上記の如く訂正す。

次に $[L + H]$ 表示法は算術和なるを以て $[L \times H]$ 法に於けるが如き誤差の擴大を防止し得べきもかかる表示法は雞冠の生長狀態より考ふれば何等意義を有せず且つ雞冠陰影像に就きて測定したる總面積の増加に比し著く小にしてその生長率從つて増加率は $[L \times H]$ 表示法より更に遙に小となる〔歐文報告第 2 圖及歐文報告第 2 表及本文第 2 表 D, 及第 3 表 A, E, F 及第 2 圖參照〕

$[I]$ 表示法に至りては $[L + H]$ 法に比し更に雞冠の生長狀態を無視したる事甚しきものにしてたとへ H の誤差を防止し得ても生長率從つて増加率は $[L + H]$ 法よりも尙小となる。〔歐文報告第 2 圖及歐文報告第 2 表及本文第 2 表 D, 及第 3 表 A, E, F 及第 2 圖參照〕

斯の如く直線的測定法はその操作頗る簡便なるも眞の雞冠の生長を表示する事を得ず而も上述の如き種々の缺點を有する爲に de Fremery, Laqueur, Freud [Pflüger's Arch. 226, 740(1930)] 等は面積に依る測定法を提唱するに至れり。

抑々雞冠は立體的のものなるを以て生長するに従ひて著しく容積を増大す。故

に最も理想的なるはその容積を測定するにあるも雞冠は外力の爲に著しく伸縮する事等の爲に現今簡単にその容積を測定する事は殆ど不可能の事なり。故にかかると現状に於ては雞冠の面積に依る測定法が最も理想に近きものと考ふるを得べく此點よりして著者等は de Fremery 等の説に賛するものにして又 Schöller & Gehrke [Wiener Arch. f. inner. Mediz. **21**, 329(1931)] も此方法を支持せり。但し茲に面積と稱するは雞冠の陰影像に就きての面積にして雞冠その儘の表面積を意味せざるも大體雞冠片側の表面積と考ふれば大差なかるべし。同氏等は寫眞印畫紙上に雞冠を擴けてレンズを用ひずして直上より光線を與へてその陰影を撮影しこの陰影像に就きて面積測定器 Planimeter を以て雞冠の全面積を測定せり。撮影の具體的方法に關する報告には接せざるも著者等の實驗に依れば上述の如き方法にては1人にて撮影する事困難にして少くとも1人の助手を要し又雞の固定その他に多大の不便を感じ1羽の雞の撮影に比較的長時間を要す。従て多數の雞を短時間内に撮影する事は殆ど不可能なるを以て著者等は新に一裝置を考案し甚だ簡単に撮影し得るに至れり。此方法に依る時は1羽平均4-5分間にて足りしかも1人にて撮影する事を得。(此操作の詳細は後述す)

此雞冠陰影像の總面積測定法に依る表示法は或程度迄雞冠の眞の生長を表はし又歐文報告第2圖に示す如くその生長率は前記直線的測定法に依る各表示法の何れよりも大即ち鋭敏に感ずるものなるを以て今日迄に行はるる諸種の測定法中最も合理的なれども陰影像面積の測定に誤差を生じ易き缺點あり。

Planimeter に依る測定誤差

閉曲線にて圍れたる平面の面積の測定には重量法と Planimeter に依る方法あり。しかして重量法はその操作頗る煩雜にして到底實用的ならず Planimeter に依る方法最も簡便なり。然れ共 Planimeter は比較的大にして且つ邊緣の凹凸小なる平面の面積測定には適當なれども雞冠陰影像の如き小面積にして然も不整形なる面積の測定に際してはかなり大なる誤差を生ずるものにして同一像を數回測定したる場合殆ど毎回その値を異にするを以て正確なる値を得んが爲には少くも10回測定してその平均をとらざるべからず。

歐文報告第1表は15枚の異なる陰影寫眞につき各枚10回づつ測定したる場合の毎回の値の變動を示したるものにして別に27例に就き同様の事を試みたるが合計42例の結果を綜合せば、10回測定値中その最大値と最小値との差は平均

面積約 300 qmm につき最小 168 qmm 最大 280 qmm にして 42 例を平均して 113 qmm となれり, 是に依りて見るも雞冠全面積を以て増加率を示さむとせば出來得る限り多數の測定値を採りその平均をとることの必要なることを知り得べし.

斯の如く雞冠面積の Planimeter 測定値は稍々信をおき難き爲に幾何學的に測定したる面積既知の平面を Planimeter を以て測定し Planimeter 測定値は眞値(幾何學的測定値を以て眞値と見做す)と幾程の誤差を生ずべきかを調査せし所次の如き結果を得たり.

Planimeter による測定値 a と 幾何學測定値 b との間に生ずる 誤差(51 例第 4 表參照)				故に Planimeter による測定値は簡單な る多角形に於ても大約±3%の誤差を生ず るものと見て差支なかるべし。此比較に使 用したる面積は第 1 圖雞冠陰影像中總て直 線を以て圍まれたる B なる多角形の部分に して平均約 400 qmm あり。是を多數の三 角形に分割し各三角形の面積を幾何學的に測定してその總和をとりて基準(上記 の幾何學的測定値 b) となし次に同じ B の部分を Planimeter にて測定し, 前者 よりも大なる値を +, 小なる値を - となしてその誤差の b に對する百分率を 求めたり。
	b < a	b = a	b > a	
例 數	34	2	15	
最 大	+ 11.8%	0	- 9.0%	
最 小	+ 0.4%	0	- 0.2%	
平 均	+ 3.1%	0	- 2.2%	

以上述べし如く Planimeter を以て雞冠全面積を測定する事はかなり大なる誤差を伴ふのみならず勞力・時間等の浪費甚しく且又凹凸極なき陰影像の總面積を測定することなれば簡單なる多角形のときより遙に大なる誤差を生ずることを覺悟せざる可からざる上に Planimeter の如き高價なる器具を必要となす等の缺點あり.

Freud [Pflügers' Arch. 228 1(1931)] は多數の雞に就きて研究せし結果, 雞冠陰影像の總面積測定に依る方法最も合理的にして直線的測定法是に次ぎ [L×H] の方 [L+H] よりも良好なりと稱せり. しかれども此研究に於ける [L] 及 [H] の測定は陰影像に就きて行ひたるものにして雞冠直接に測定したるものにあらざるを以て [L] の場合は變り無しとするも [H] に至りては印畫紙上に於ける雞冠の擴け方如何に依り著しくその大さを異にして雞冠其物による實測値とも異なるも

のなり。余等の報告中に記せる〔L〕及〔H〕は雞冠に直接に「ものさし」をあてて測りたるものなり。

著者等の新測定法

雞冠測定の要件として更に考慮を要すべきは檢體を小量に用ひて然も最大の結果を得るにあり。故に若し雞冠中最も生長率大なる部分を見出し得ば此部分の生長率を求むる事によりて上記の條件を満足し得べし。

依つて著者等は毎日有效エキスを注射しつつ後述の装置を用ひて雞冠の陰影像を撮影し此陰影像を歐文報告第 1 圖の如く A, B, C, A', C' の如く区分し〔總面積 S〕, $[A + B + C]$, $[A' + B + C']$, $[B]$, $[B + A']$, $[B + C']$, $[A]$, $[C]$, $[A']$ 及 $[C']$ の各面積を Planimeter にて、或は幾何學的に測定し同時に又雞冠そのものにつき〔L〕及〔H〕を測定して $[L \times H]$, $[L + H]$ 及 $[L]$ を求め、是等 13 部分の生長率によりて如何なる部分が最も鋭敏に感ずるかを檢索せり。各雞に就きての上記各部分の毎日の測定値は第 1 表 A に、此測定値より計算して得たる生長率は第 2 表 B に又増加率は第 3 表 D に夫々記載せり。

歐文報告第 2 表 及本文第 3 表 A, B は總數 16 羽の雞に就きて測りたる生長率及増加率の平均値なるも此實驗に於ては睾丸エキス或は尿エキスの種々異たる製品を 3 羽或は 5 羽づつに與へたるものにして此爲に各群の雞の雞冠生長率並に増加率の絕對値は相等しからず従つてその總數の平均値をとりて絕對値を彼此相對照する事は不可能なるも上述 13 部分の各々の生長率並に増加率の大小に關する相對的の比較をなすには、かくの如き各注射エキスの異なる雞冠の測定値の平均値を用ひても可なるべきを信ず。

雞冠陰影像の各部分の定め方. [歐文報告第 1 圖参照]

雞冠陰影像に於て、雞冠の嘴に接する點 a より後端の頭部に接する點 b 迄直線 ab を引き是を基底線となす。此基底線及雞冠の輪廓曲線を以て圍まれたる面積を〔總面積 S〕となす。

雞冠の形狀を觀察するに大體前部、中部、後部の三部に分たれ前部はその邊緣最も平滑にして中部は切れ目の大なる突起を有し後部には通常中部に比較して小なる切れ目多數存在するを見る。[歐文報告第 1 圖 A, B 及 C]

中部の大なる多數の突起の内前端のもの 1 を選定しその前方の谷の底 c より前記基底線 ab に垂線 cd を下し、ac なる外廓曲線及 cd, da なる直線に依りて圍ま

るる部分を〔A〕となし、是に内接する $a c d$ なる三角形を〔A'〕となす〔雞冠の前部〕。c 點より各突起の谷底の點を順次直線を以て結び最後の大なる突起の後部谷底點 e と基底線 ab の最後端の點 b とを結び $c e b d$ なる多角形を作り是を〔B〕となす〔雞冠の中部〕。次に $e b$ なる直線及 $e f b$ なる外廓曲線に依りて圍まるる部分を〔C〕となし〔雞冠の後部〕。曲線 $e f b$ 上に任意の一點 f をとり e 及 b と結びて得る三角形 $e f b$ を〔C'〕となす。此 f 點の取り方は三角形 $e f b$ が可及的大となる如くす。

原則としては上記の如く區劃せしも雞冠の形狀に依り多少變更を要する場合あり。

歐文報告第 2 表の〔A + B + C〕には 6 羽、〔C〕には 7 羽、〔A〕には 5 羽の如き少數の測定値を掲げたるは、歐文報告第 1 圖に於て明なる如く〔A〕及〔C〕の如き部分は夫々陰影像の邊緣に位置せる爲に撮影に際して純平行光線を使用せざる限り〔B〕の如き中間基本部分に比しその像に歪を生ずる事を免れざるものにして撮影誤差を生ずる事及〔A〕及〔C〕の如き非常に小なる面積は通常の Planimeter を以てしては前記の如くその値に對して信を置く事不可能なる以上多數の陰影像に就きてかかる手数をかくる事は實用的に殆ど無意味なるを以て著者等はかかる部分を生長率測定の目標とすることを放棄する事となし茲には唯他の部分との大體の關係を示さむが爲に僅に數羽に就ての測定値のみを掲げたるものなり。

又同表中第 2 日に於て屢々 11 羽の雞に就きて測定せるは、一般に注射第 2 日に於ては雞冠の生長率小にして往々誤差の範圍内に屬する事あるを以て此第 2 日は實用的に殆ど不必要なりと思惟せしが爲にして 16 羽中 5 羽は第 2 日目の測定を行はざりしなり。第 2 表 B1 各部生長率比較試験に於て雞冠の突起の各々に關しては Nr. 51 唯一羽のみに就て行ひ他は行はざりき。其理由は此各部が前記〔A〕及〔C〕の部分よりも尙遙かに小なる爲にその測定誤差の一層大なる事及び雞冠の生長に従ひて突起は丸味をおび來り従つて撮影に際して完全なる陰影像を得る事困難となり撮影誤差を生ずる惧大なる爲に此部分を考慮することの不合理なることを知りたる爲なり。第 1 表 A1 及第 2 表 B1 Nr. 51 に突起 1, 2, 3, 4 と記せるは前方の突起を 1 とし順次後方に向つて 2, 3, 4 と番號を附したるものなり。

上記の理由により著者等は主として〔B〕, 〔總面積〕, 〔 $L \times H$ 〕, 〔 $L + H$ 〕及

第 3 圖
(歐文報告第 2 表參照)

第 4 圖
(歐文報告第 2 表參照)

[L] の 5 項に就きて比較考察せんとす。

歐文報告第 2 表及これをグラフにて示したる歐文報告第 2 圖、及本文第 3 圖、第 4 圖、第 5 圖を觀るに生長率の最大なる部分即ち最も感度高き部分は [B] にして [B + C'] は殆ど [B] に等しく續いて [A' + B + C']、

[B + A'], [C']
[A + B + C],
[總面積], [C],
[L × H], $\frac{1}{2}$ [A],
[A'], [L + H] 及び [L] の順なり。

故に從來行はるる雞冠面積測定に於て手數を要し且不正確なる値を與ふる「總面積」を放棄

して [B] を採用せば結果は遙に鋭敏にして且つ實行も簡捷となる。[L × H]

第 5 圖
(歐文報告第 2 表 参照)

[L + H] 及 [L] 等は既に考慮の必要なし. 此順位は [B] を除きては前述 Freud の實驗結果と一致す. 此 [B], [總面積], [L × H], [L + H] 及び [L] の感度順位は又第 2 表に明なる如く殆ど總ての難に於て見らるるものにして唯 [B] と [總面積] との關係が第 2 表 B2 及 B3 中 Nr. 91.

111, 133, 81 の 4 例に於て反對するを見るも其差は著しきものに非ず. 則ち太字にて示せるものがその生長率, 總面積 > B の關係にあるものなり.

斯の如き異例の存するは主として總面積の測定に際して生ぜし誤差に基因するものと考へられ殊に Nr. 111, 133, 81 等に於て 5 日の内 1 日或ひは 2 日のみ [總面積] の方大となれるは全く總面積の測定誤差に基くものなり.

[B + C'] は [B] と殆ど同等の鋭敏度を有するも [C'] は [C] の内部の三角形にして前述の如く邊緣に存在するを以て撮影誤差を生じ易く從てその値に對して餘り信をおき難きを以て C' は測定の際除外する方至當なり.

歐文報告第 2 表中ゴシックにて印刷せる數を見るに

[L] に於ける 第 6 日の生長率は [B] の第 2 日或ひは第 3 日,
 [L + H] ” 第 6 日 ” ” [B] の第 3 日に,
 [L × H] ” 第 6 日 ” ” [B] の第 4 日に,
 [總面積] ” 第 6 日 ” ” [B] の第 5 日の値に

大約等しきを知る. 茲に用ひし數値は平均値なるを以て總ての場合に常に斯くの如き關係成立するものとは勿論斷言し得ざるも或程度成立し得るものと思ふを得べし, 斯の如き關係は又増加率の場合に於ても明に認むる事を得. [第 3 表参照]

是を以て見れば〔L〕表示法, 〔L + H〕表示法, 〔L × H〕表示法, 〔總面積〕表示法に於て各々 6 日間を要するものは〔B〕表示法に於ては夫々 3 日間, 3 日間, 4 日間及 5 日間に於て既に同等の効果が顯はる事となり従つて〔B〕表示法に依る時は從來の直線的測定法に比し 2-3 日間を, 又〔總面積〕表示法に比し約 1 日間を短縮し得, 然も計測誤差は之等に比して遙に小なり。

更に 14 羽の雞に就き〔L〕, 〔L + H〕, 〔L × H〕, 〔總面積〕及〔B〕の生長率を求めたるも全く前と同じ順位を得たり。〔各雞の測定値は第 1 表 B に生長率は第 2 表 C〕此實驗に於ては兩群共に同一の尿エキスを 3 日間注射したるも 7 羽づつ 2 群となし 1 群には他の群の約倍量を與へたり。此 14 羽の平均生長率は第 2 表 D の如し(括弧内の數は 13 例平均を示す) 尙増加率は第 3 表 E 及 F に記載せるも生長率と同様の關係にあり。

以上論述せる所を約言すれば〔B〕による表示法は他の何れの表示法よりも優るのみならず更に此〔B〕なる部分は總て直線を以て圍まれたる平面なるを以て是を多數の三角形に分割し幾何學的に各三角形の面積を測定してその總和を求むる事に依り甚だ簡単に測定し得 Planimeter の如き高價なる器具を必要とせず又 Planimeter に依る測定誤差をも伴はざるを以て雞冠測定法として最も信頼し得べき結果を與ふ。

〔B〕の測定法によりて生じ得る誤差の問題の詳細に關しては遺憾ながら未だ本報に於て發表し得る迄に立至らざるも最後に此研究に際して同時に得たる結果より誤差の問題の一端に觸れむとす。

既に論ぜし如く雞冠陰影像の〔總面積〕表示法に於ては撮影及面積測定によりて二重誤差を生ずる事を免れ得ざるに反し〔B〕表示法にては, 測定誤差は顧慮する必要無く此方法に於て生じ得る誤差は殆ど全く撮影誤差のみと考へて可なるべし。故に著者等は撮影誤差によつて生じ得る増加率算出に際しての最大誤差を算出せり。

此最大誤差は, 注射第 1 日, 第 2 日, 第 3 日……第 6 日にそれぞれ 2 枚或は 3 枚の陰影像を撮影してその〔B〕を測定し, 同一日に於ける各像の〔B〕の誤差(若し 3 枚の像ならばその最大誤差)を求め, 第 2 日以後第 6 日迄の間に於て此誤差の最大なるものを選び是に第 1 日(即ち注射直前)の誤差を加算したるもの

を第 1 日の 2 枚又は 3 枚の像の内面積の最小なるものの値を以て除したる商の百分率を以て表示す。

例へば 第 1 日 $\left\{ \begin{matrix} 220 \text{ qmm} \\ 228 \text{ qmm} \end{matrix} \right\}$ 誤差 8 qmm
 第 4 日 $\left\{ \begin{matrix} 318 \text{ qmm} \\ 314 \text{ qmm} \end{matrix} \right\}$ 誤差 4 qmm
 第 6 日 $\left\{ \begin{matrix} 383 \text{ qmm} \\ 383 \text{ qmm} \end{matrix} \right\}$ 誤差 0

の如き場合には第 4 日の誤差 4 qmm に第 1 日の誤差 8 qmm を加へたる $8 + 4 = 12 \text{ qmm}$ を第 1 日の最小値 220 qmm にて除したる商の百分率即ち $\frac{8+4}{220} \times 100 = 5.5\%$ を増加率算出最大誤差%とす

第 5 表は 10 羽の雞の雞冠陰影像の〔總面積〕及〔B〕に就き上述の如き計算を行ひたる結果なるも是を平均せば

〔B〕に於ては 5.8% $\left\{ \begin{matrix} 10 \text{ 例中誤差の最小なるもの } 1.1\% \\ \text{ ” ” 最大なるもの } 9.8\% \end{matrix} \right.$
 〔總面積〕に於ては 4.9% $\left\{ \begin{matrix} 10 \text{ 例中誤差の最小なるもの } 1.0\% \\ \text{ ” ” 最大 ” } 13.0\% \end{matrix} \right.$

の如し。

此結果に依れば〔總面積〕の方誤差やや小なるも、前述の如く〔總面積〕の数値夫れ自身が不確實なるを以て實際の誤差は 4.9%以上に昇るべく誤差の最大なるものは〔B〕のときよりも遙に大なり。

〔B〕の誤差は全くその撮影の仕方如何に依り生ずるものにして撮影に際して細心の注意を以てせば恐らく上記の如き大なる誤差を生ずる事無かるべし。

著者等考案の雞冠陰影像撮影装置に就て

著者等は既述の如く de Fremery 等の推奨せる雞冠陰影像の撮影を試みたるもその操作頗る煩雜なる爲その方法を放棄し別に一新装置を考案試作し甚だ簡便に撮影し得るに至れり。此装置の製作に際しては殆ど有り合はせのものを使用して試作したるものなるを以て未だ完全なるものと稱し得ざる可きも斯の如き簡單粗雜なるものにては著者等は好結果を挙げ得たり。

装置全體の模式圖は歐文報告第 3 圖に示す如きものにして一枚の平木板上に雞の固定圓筒 A 及是と一定の距離を隔てて光源 B を固定したるものなり。圖の上部別圖は A を上部より見たるものにして a より b を引出したるものなり。

固定圓筒 A は蓋 a 及び中身 b より成るブリキ製の罐にして蓋 a のみ平板

上に固定し b は両端開放し且つ a 中に自由に抜挿しすることを得。又 a 及 b には其上面に切れ込み f 及 f' を作る。今 b の後端より矢の方向に雞を頭部を先きにして押し込み b を a 内の適當の所迄差し込みたる後上記 f 及び f' に依つて作られたる小孔 m より頭部のみを上方へ摺み出す。斯の如くせば雞は頭部のみを罐外上方へ出し、罐内に於て坐せるを以て極めて自然の姿勢を取り跪く事尠し。

蓋 a の上部、切れ込み f に接して圖の如く折曲けたるブリキ板 g を直角にハンダ着し h の如き木製の衝立を是に嵌め h を上下に自由に動き得る如くす。衝立 h (歐文報告第 4 圖)は中央部を切り込みたるものにして此凹部の奥には板に接してガラス板 i を差し込みガラス板と木板との間は印畫紙を差し入れ得るだけの間隙を残す。雞冠と印畫紙の距離を常に一定となす爲にはセルロイド板を 2 枚に折りて作りたる帽子 j を雞冠に被せその兩端をブリキ板にて作れる固定溝 e, e' 中に差し込みて固定す。

光線は純粹の平行光線を以て理想となすも其裝置簡單ならざるを以て著者等は廢物を利用して歐文報告第 3 圖 B の如き光源裝置を試作せり。

空ブリキ罐 d 中に電燈を入れて蓋し此蓋に其直徑よりやや小さき孔を穿ち是に細長きブリキ圓筒 c を熔接し c, d 共にその内部に煤煙を塗りて亂反射を避けしめたり。光源には 250 watt の電球を使用し印畫紙面と電球の先端との距離を 120 cm となし又 c の先端より出でたる光束が印畫紙面に直角に放射さるる如く B を平木板上に固定せり。斯かる條件の下にては普通のガスライト紙ならば電球の新しきときには約 10 秒間の露出にて充分なり。

著者等の裝置によりて撮影したる寫眞圖は(本誌 52, 1083 及 1084 頁 1932)にあり。

結 論

以上の實驗に依り著者等は雞冠の測定法竝にその大きさの表示法としてはその陰影像を撮影しその陰影像中所謂「B」の部分のみを測定しその大きさを表示する事が最も合理的且簡捷なることを發見し、而してその撮影器につき新裝置を考案したり。

雞冠各部測定値

第一表 A1

睾丸エキス(オリーブ油溶液)毎日 1cc(=100 g 睾丸) づつ朝夕 2回 5日間注射.

[L] [H] [L+H] は mm. 其他は qmm を以て大きさを示す. 以下之に準ず

雞番號	日	[總面積]	[B]	[A]	[A']	[C]	[C']	[突起 1]
Nr. 51	第 1 日	1104	392	200	143	232	84	80
	第 2 日	1224	447	240	161	240	90	48
	第 3 日	1392	523	256	169	280	99	56
	第 4 日	1528	584	275	179	304	110	64
	第 5 日	1924	624	296	195	336	120	56
	第 6 日	1928	820	336	190	296	120	80
雞番號	日	[突起 2]	[突起 3]	[突起 4]	[L]	[H]	[L×H]	[L+H]
Nr. 51	第 1 日	88	90	48	63	37	2331	100
	第 2 日	80	96	80	64	37	2368	101
	第 3 日	96	112	80	66	39	2574	105
	第 4 日	104	136	112	68	40	2720	108
	第 5 日	128	136	120	70	43	3010	113
	第 6 日	120	192	120	72	44	3168	116

注射開始 4 月 8 日, 終了 4 月 12 日

第一表 A 2.

第 19 號注射液.

尿クロロフォルムエキス (CF₄) 2.5g を 50cc の水に溶解したるもの.

Nr. 134, Nr. 111 には毎日 1cc づつ 2 回注射.

Nr. 137, Nr. 149 には毎日 1cc づつ 3 回注射.

雞番號	日	[總面積]	[B]	[A]	[A']	[C]	[C']	[L]	[H]	[L×H]	[L+H]
Nr. 111	第 1 日	608	231	104	67	112	42	54	28	1512	82
	第 2 日	616	229	96 ₍₁₂₎	63	136	44	55	29	1595	84
	第 3 日	768	278	111	83	152	56	58	31	1798	89
	第 4 日	880	352	152	99	168	61	60	33	1980	93
	第 5 日	992	400	160	108	200	63	62	35	2170	97
	第 6 日	1056	412	152	102	216	75	64	36	2304	100
Nr. 134	1	592	251	—	30	128 ₍₅₎	76	53	27	1431	80
	2	616	269	—	30	136 ₍₁₀₎	76	54	28	1512	82
	3	664	294	—	28	160 ₍₁₀₎	79	55	29	1595	84
	4	784	358	—	33	192 ₍₅₎	88	57	31	1767	88
	5	816	383	—	30	192 ₍₅₎	89	58	32	1856	90
	6	880	426	—	35	208 ₍₂₀₎	101	60	31	1860	91

Nr.137	1	784	290	120	93	152 ₍₁₀₎	47	60	30	1800	90
	2	816	309	128	100	168 ₍₁₀₎	51	60	31	1860	91
	3	992	378	176	130	192 ₍₁₀₎	63	63	32	2016	95
	4	1136	437	184	141	224 ₍₁₅₎	70	66	34	2244	100
	5	1272	515	200	148	248 ₍₁₅₎	91	68	35	2380	103
	6	1528	683	256	162	256 ₍₁₅₎	95	72	39	2664	109
Nr.149	1	680	234	120	66	128	30	53	30	1590	83
	2	688	239	128	68	128	30	53	31	1643	84
	3	792	291	136	77	152	40	54	32	1728	86
	4	976	364	144	86	208	54	57	34	1938	91
	5	1152	430	152	91	216	65	60	36	2160	96
	6	1232	519	168	95	208	68	62	38	2356	100

注射開始 4 月 8 日・終了 4 月 12 日

第 一 表 A 3.

睾丸エキス

雞番號	日	〔總面積〕	〔B〕	〔A〕	〔A'〕	〔C〕	〔C'〕	〔L〕	〔H〕	〔L×H〕	〔L+H〕
Nr. 19	第 1 日	997	401	136	104	237	84	64	28	1792	92
	第 2 日	1146	485	149	116	280	102	65	31	2015	96
	第 3 日	1219	553	141	115	280	113	66	33	2178	99
	第 4 日	1312	636	128	107	293	113	69	36	2484	105
	第 5 日	1472	706	152	117	315	134	71	37	2627	108
	第 6 日	1629	820	168	126	352	150	73	39	2847	112
雞番號	日	〔總面積〕	〔B〕	〔A'〕	〔C'〕	〔L〕	〔H〕	〔L×H〕	〔L+H〕		
Nr.119	第 1 日	552	225	71	40	50	23	1150	73		
	第 2 日	587	255	65	46	51	24	1224	75		
	第 3 日	664	305	68	48	53	26	1378	79		
	第 4 日	731	354	70	60	55	28	1540	83		
	第 5 日	803	379	80	65	58	30	1740	88		
	第 6 日	885	411	79	81	60	31	1860	91		
Nr.133	1	932	369	30	156	64	32	2048	96		
	2	979	370	27	165	65	32	2080	97		
	3	1045	425	28	179	66	33	2178	99		
	4	1144	448	25	193	69	35	2415	104		
	5	1296	522	25	225	71	37	2627	108		
	6	1416	591	27	238	74	38	2812	112		

Nr. 56	1	829	274	129	30	57	27	1539	84
	2	968	367	149	38	59	29	1711	88
	3	1064	398	150	44	62	31	1922	93
	4	1253	489	173	51	64	33	2112	97
	5	1496	649	180	63	66	35	2310	101
	6	1533	609	190	62	67	37	2479	104
Nr. 57	1	896	348	150	45	60	29	1740	89
	2	1021	438	149	38	60	32	1920	92
	3	1120	466	150	63	62	34	2108	96
	4	1283	588	162	70	65	37	2405	102
	5	1469	671	183	76	65	38	2470	103
	6	1459	616	200	88	67	39	2613	106
Nr. 17	1	731	241	99	74	58	24	1392	82
	2	776	284	90	79	58	25	1450	83
	3	880	336	114	95	62	28	1736	90
	4	988	373	116	100	64	30	1920	94
	5	1096	430	125	100	66	31	2046	97
	6	1171	458	126	121	68	32	2176	100

Nr. 19, 119, 133. は 4 月 21 日注射開始. 4 月 25 日終了

Nr. 56, 57, 17. は 5 月 5 日注射開始. 5 月 9 日終了

第 1 表 A 4.

Nr. 81, 15. には第 22 號注射液.

尿クロロフォルムエキス(CF₁₁) 0.82g をオリーブ油 10cc に溶解した
るものを毎日 0.9cc づつ 1 回注射.

Nr. 91, 18, 1. には第 22 號注射液.

尿クロロフォルムエキス(CF₁₁) (重量不明) を毎日 0.9cc づつ 1 回注射.

雞番號	日	寫眞番號	〔總面積〕		〔B〕		〔A'〕		〔C'〕		〔L〕	〔H〕	〔L×H〕	〔L+H〕
				平均 值		平均 值		平均 值		平均 值				
Nr. 81	第 1 日	①	368		173		46		80					
				388		168		51		80	50	27	1350	77
	第 2 日	②	408		163		56		80					
		—	—	—	—	—	—	—	—	51	27	1377	78	
	第 3 日	①	488		210		64		80					
				492		211		67		80	52	29	1508	81
	第 4 日	②	496		211		70		80					
		—	568	504	223	223	77	77	96	96	53	29	1537	82
	第 5 日	①	568		260		89		112					
				568		262		86		112	54	30	1620	84
		②	584		263		83		112					

鶏番號	日	寫眞番號	〔總面積〕		〔B〕		〔A'〕		〔C'〕		〔L〕	〔H〕	〔L×H〕	〔L+H〕
				平均値		平均値		平均値		平均値				
Nr. 15	第6日	①	584		277		91		96					
				588		279		93		92	56	31	1736	87
	第1日	②	592		280		94		88					
		①	616		220		53		44					
	第2日	②	616		224		53		44		53	31	1643	84
		①	616		228		53		44					
	第3日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	32	1728	86
	第4日	①	680	680	266	266	56	56	47	47	55	33	1815	88
		②	792		318		71		56					
	第5日	①	788		316		67		56		57	34	1938	91
		②	784		314		63		56					
	第6日	①	848	848	347	347	73	73	59	59	58	36	2088	94
		②	904		383		77		62					
Nr. 91	1	①	640		323		60		43					
		②	652		323		60		44		55	28	1540	83
	2	①	664		—		—		45					
		②	—		—		—		—		55	30	1650	85
	3	①	880	880	409	409	70	70	56	56	56	32	1792	88
		②	1056		533		81		—					
	4	①	1060		531		81		70		59	35	2065	94
		②	1064	1060	528		81		68					
	5	①	1136	1136	539	539	88	88	72	72	62	35	2170	97
		②	1304		593		91		88					
	6	①	1304		592		88		88		65	37	2405	102
		②	1304	1304	591		84		88					
Nr. 18	1	①	552		258		65		34					
		②	560		259		63		34		50	22	1100	72
	2	①	568		—		—		—					
		②	—		—		—		—		52	24	1248	76
	3	①	728	728	351	351	60	60	50	50	54	26	1404	80
		②	904		441		77		57					
	4	①	900		436		77		57		56	28	1568	84
		②	896		431		77		57					
	5	①	1000		497		78		65					
		②	992	992	494		75		65		58	29	1682	87
	6	①	984		491		72		65					
		②	984		491		72		65					

	6	{	①	1096		536		78		74						
			②	1088	1092	536		80		74	74	61	30	1830	91	
Nr. 1	1	{	①	752		333		92		48						
			②	744	748	329		91		48	58	26	1508	84		
	2										61	29	1769	90		
	3	①	1048	1048	498	498	99	99	70	70	64	32	2048	96		
	4	{	①	1264		610		135		86						
			②	1256	1260	607		131		87	66	35	2310	101		
	5	①	1312	1312	652	652	128	128	86	86	68	35	2380	103		
	6	{	①	1464		712		149		106						
			②	1464	1464	707		145		102	70	35	2450	105		

7 月 20 日注射開始・7 月 24 日終了

第 1 表 B 1.

第 30 號注射液.

尿クロロフォルム残渣 (CF₁₁) 20g を 50cc のオリーブ油に溶解し

毎日 1cc づつ 1 回 3 日間注射.

雞番號	日	(總面積)	(B)	(L)	(H)	(L × H)	(L + H)
Nr. 18	第 1 日	600	237	55	24	1320	79
	第 3 日	712	—	57	25	1425	82
	第 4 日	736	319	59	26	1521	85
Nr. 111	1	560	186	55	28	1540	83
	3	680	250	57	31	1767	88
	4	768	282	59	32	1888	91
Nr. 112	1	512	203	51	25	1275	76
	3	648	282	54	27	1458	81
	4	712	338	56	29	1624	85
Nr. 122	1	664	219	58	28	1624	86
	3	744	250	59	30	1770	89
	4	832	291	61	31	1891	92
Nr. 160	1	872	316	60	32	1920	92
	3	1016	396	62	35	2170	97
	4	1120	448	63	36	2238	99

Nr. 150	1	1072	384	64	34	2176	98
	3	1352	540	66	38	2508	104
	4	1424	575	68	38	2508	104
Nr. 155	1	680	283	56	—	—	—
	3	768	335	57	—	—	—
	4	816	379	58	—	—	—

11 月 29 日注射開始・12 月 1 日終了

第 1 表 B 2.

第 31 號注射液・

尿クロロフォルム残渣 (CF₁₁) 3.8g をオリーブ油 50cc に溶解し
 毎日 1cc づつ 1 回 3 日間注射・

雞 番 號	日	〔總面積〕	〔B〕	〔L〕	〔H〕	〔L × H〕	〔L + H〕
Nr. 15	第 1 日	632	219	53	31	1643	84
	第 3 日	736	262	55	33	1815	88
	第 4 日	752	294	56	34	1904	90
Nr. 134	1	648	280	55	29	1595	84
	3	816	394	59	33	1931	92
	4	944	450	60	35	2100	95
Nr. 154	1	672	211	57	29	1653	86
	3	776	259	60	30	1785	90
	4	824	285	61	33	2013	94
Nr. 158	1	832	358	60	34	2040	94
	3	1064	502	64	37	2368	101
	4	1224	574	65	39	2535	104
Nr. 128	1	688	286	58	32	1856	90
	3	824	370	61	37	2227	98
	4	944	421	63	39	2457	102
Nr. 73	1	440	114	51	25	1275	76
	3	464	129	51	26	1326	77
	4	464	129	52	27	1404	79
Nr. 164	1	648	221	55	31	1705	86
	3	808	304	57	34	1910	91
	4	888	366	59	35	2065	94

11 月 29 日注射開始・12 月 1 日終了

雞冠各部生長率

第 2 表 B 1.

雞番號	日	[B]	[B+C]	[A'+B+C]	[B+A]	[C]	[A+B+C]	[總面積]	[C]	[L×H]
Nr. 51	第 1 日	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	第 2 日	1.14	1.15	1.13	1.14	1.07	1.12	1.11	1.03	1.16
	第 3 日	1.33	1.31	1.28	1.29	1.18	1.29	1.26	1.21	1.30
	第 4 日	1.49	1.46	1.41	1.43	1.31	1.41	1.38	1.31	1.43
	第 5 日	1.59	1.56	1.52	1.53	1.43	1.52	1.47	1.45	1.54
	第 6 日	2.09	1.93	1.83	1.89	1.43	1.76	1.74	1.28	1.77
雞番號	日	[A]	[A']	[L+H]	[L]	[突起 1]	[突起 2]	[突起 3]	[突起 4]	[突起 1+2+3+4]
Nr. 51	第 1 日	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	第 2 日	1.20	1.13	1.01	1.02	1.20	1.91	1.07	1.67	1.14
	第 3 日	1.28	1.18	1.05	1.05	1.40	1.09	1.24	1.67	1.29
	第 4 日	1.38	1.25	1.08	1.08	1.60	1.18	1.51	2.33	1.56
	第 5 日	1.48	1.36	1.13	1.11	1.40	1.45	1.51	2.50	1.65
	第 6 日	1.68	1.33	1.16	1.14	2.00	1.36	2.13	2.50	1.92

第 2 表 B 2.

雞番號	日	[B]	[B+C]	[A'+ B+C]	[B+A]	[C]	[A+ B+C]	總 面 積	[C]	[L×H]	[A]	[A']	[L+H]	[L]
Nr.111 注射 4 月 8 日-4月 12日	第 1 日	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	第 2 日	0.99	1.00	0.99	0.98	1.05	1.03	1.01	1.21	1.05	0.92	0.94	1.02	1.02
	第 3 日	1.20	1.22	1.23	1.21	1.33	1.21	1.26	1.36	1.19	1.07	1.24	1.09	1.07
	第 4 日	1.52	1.51	1.51	1.51	1.45	1.50	1.28	1.50	1.31	1.46	1.48	1.13	1.11
	第 5 日	1.73	1.70	1.68	1.71	1.50	1.70	1.63	1.79	1.44	1.54	1.61	1.18	1.15
	第 6 日	1.91	1.89	1.82	1.83	1.79	1.81	1.74	1.93	1.52	1.46	1.52	1.22	1.19
Nr.134 注射 4 月 8 日-4月 12日	2	1.07	1.06	1.05	1.06	1.00	1.06	1.04	1.06	1.06	—	1.06	1.03	1.02
	3	1.13	1.14	1.12	1.15	1.04	1.19	1.12	1.25	1.11	—	0.93	1.05	1.04
	4	1.43	1.36	1.34	1.39	1.16	1.43	1.32	1.50	1.23	—	1.10	1.10	1.08
	5	1.53	1.44	1.41	1.47	1.17	1.48	1.38	1.50	1.30	—	1.00	1.13	1.09
	6	1.66	1.61	1.57	1.64	1.33	1.64	1.49	1.63	1.30	—	1.17	1.14	1.13
Nr.137 注射 4 月 8 日-4月 12日	2	1.07	1.07	1.09	1.07	1.09	1.08	1.04	1.11	1.03	1.07	1.08	1.01	1.00
	3	1.30	1.31	1.33	1.33	1.34	1.33	1.27	1.26	1.12	1.47	1.40	1.06	1.05
	4	1.51	1.50	1.51	1.51	1.49	1.50	1.45	1.47	1.25	1.53	1.52	1.11	1.10
	5	1.78	1.80	1.75	1.73	1.94	1.71	1.62	1.63	1.32	1.67	1.59	1.14	1.13
	6	2.36	2.31	2.19	2.21	2.02	2.13	1.95	1.68	1.48	2.13	1.74	1.21	1.20

Nr.149 注射 4月8日 H-4月 12日	2	1.02	1.02	1.02	1.02	1.06	1.03	1.01	1.00	1.03	1.07	1.03	1.01	1.00
	3	1.24	1.25	1.24	1.23	1.33	1.20	1.16	1.19	1.09	1.13	1.17	1.04	1.02
	4	1.56	1.58	1.53	1.50	1.80	1.49	1.44	1.62	1.22	1.20	1.30	1.10	1.07
	5	1.84	1.88	1.78	1.74	2.17	1.66	1.69	1.69	1.36	1.27	1.38	1.16	1.13
	6	2.22	2.22	2.07	2.05	2.27	1.86	1.81	1.63	1.48	1.40	1.44	1.20	1.17
Nr. 19 注射 4月21日 H-4月 25日	2	1.21	1.21	1.19	1.19	1.21	1.18	1.15	1.18	1.12	1.09	1.12	1.04	1.02
	3	1.38	1.37	1.33	1.32	1.35	1.26	1.22	1.24	1.22	1.04	1.11	1.08	1.03
	4	1.59	1.54	1.45	1.47	1.35	1.37	1.32	1.32	1.39	0.94	1.03	1.14	1.08
	5	1.76	1.73	1.62	1.63	1.60	1.52	1.48	1.48	1.47	1.12	1.13	1.17	1.11
	6	2.04	2.00	1.90	1.87	1.79	1.73	1.63	1.49	1.59	1.24	1.21	1.22	1.14
Nr.119 注射 4月21日 H-4月 25日	2	1.15	1.14	1.09	1.08	1.15	—	1.06	—	1.06	—	0.92	1.03	1.02
	3	1.36	1.33	1.24	1.26	1.20	—	1.32	—	1.20	—	0.96	1.08	1.06
	4	1.57	1.56	1.44	1.43	1.50	—	1.32	—	1.34	—	0.99	1.14	1.10
	5	1.68	1.68	1.56	1.55	1.63	—	1.45	—	1.51	—	1.13	1.21	1.16
	6	1.83	1.86	1.70	1.66	2.02	—	1.60	—	1.62	—	1.11	1.25	1.20
Nr.133 注射 4月20日 H-4月 24日	2	1.00	1.02	1.01	1.00	1.06	—	1.05	—	1.02	—	0.90	1.01	1.02
	3	1.15	1.15	1.14	1.14	1.15	—	1.12	—	1.06	—	0.93	1.03	1.03
	4	1.21	1.22	1.22	1.19	1.24	—	1.23	—	1.18	—	0.83	1.08	1.08
	5	1.41	1.42	1.39	1.37	1.44	—	1.39	—	1.28	—	0.83	1.13	1.11
	6	1.60	1.58	1.54	1.55	1.53	—	1.52	—	1.37	—	0.90	1.17	1.16
Nr. 56 注射 5月4日 H-5月 8日	2	1.34	1.33	1.28	1.28	1.27	—	1.17	—	1.11	—	1.15	1.05	1.04
	3	1.45	1.45	1.37	1.36	1.47	—	1.28	—	1.25	—	1.16	1.11	1.09
	4	1.78	1.78	1.64	1.64	1.70	—	1.51	—	1.37	—	1.34	1.15	1.12
	5	2.37	2.34	2.06	2.06	2.10	—	1.80	—	1.50	—	1.40	1.20	1.16
	6	2.22	2.21	1.76	1.98	2.07	—	1.85	—	1.61	—	1.47	1.24	1.18
Nr. 57 注射 5月7日 H-5月 8日	2	1.26	1.21	1.15	1.18	0.84	—	1.14	—	1.10	—	0.99	1.03	1.00
	3	1.34	1.35	1.25	1.24	1.40	—	1.25	—	1.21	—	1.00	1.08	1.03
	4	1.69	1.67	1.51	1.15	1.56	—	1.43	—	1.38	—	1.68	1.15	1.08
	5	1.93	1.90	1.71	1.71	1.69	—	1.64	—	1.42	—	1.22	1.16	1.08
	6	1.77	1.79	1.66	1.64	1.96	—	1.63	—	1.50	—	1.33	1.19	1.12
Nr. 17 注射 5月4日 H-5月 8日	2	1.18	1.15	1.09	1.01	1.07	—	1.06	—	1.04	—	0.91	1.01	1.00
	3	1.39	1.37	1.32	1.32	1.28	—	1.20	—	1.25	—	1.15	1.10	0.07
	4	1.55	1.50	1.42	1.44	1.35	—	1.35	—	1.38	—	1.17	1.15	1.10
	5	1.78	1.68	1.58	1.63	1.35	—	1.50	—	1.47	—	1.26	1.18	1.14
	6	1.90	1.84	1.70	1.72	1.64	—	1.60	—	1.56	—	1.27	1.22	1.17

第 2 表 B 3.

雞番號	日	[B]	[B+C']	[A'+B+C']	[B+A']	[C']	[總面積]	[L×H]	[A']	[L+H]	[L]
Nr. 81	第1日	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.90	1.00	1.00	1.00	1.00
	第2日	—	—	—	—	—	—	1.02	—	1.01	1.02
	第3日	1.26	1.17	1.20	1.27	1.00	1.27	1.12	1.31	1.05	1.04
	第4日	1.33	1.29	1.32	1.37	1.20	1.30	1.14	1.51	1.06	1.06
	第5日	1.56	1.51	1.54	1.59	1.40	1.46	1.20	1.69	1.09	1.08
	第6日	1.66	1.50	1.55	1.70	1.15	1.52	1.29	1.82	1.13	1.12
Nr. 15	2	—	—	—	—	—	—	1.05	—	1.02	1.02
	3	1.19	1.17	1.15	1.16	1.07	1.10	1.10	1.06	1.05	1.04
	4	1.41	1.39	1.37	1.38	1.27	1.28	1.18	1.26	1.08	1.07
	5	1.55	1.51	1.48	1.52	1.34	1.38	1.27	1.38	1.12	1.10
	6	1.71	1.66	1.63	1.66	1.41	1.47	1.33	1.45	1.14	1.11
Nr. 91	2	—	—	—	—	—	—	1.07	—	1.02	1.00
	3	1.27	1.27	1.25	1.25	1.27	1.35	1.16	1.17	1.09	1.02
	4	1.64	1.63	1.59	1.60	1.57	1.63	1.34	1.35	1.13	1.08
	5	1.67	1.66	1.64	1.64	1.64	1.74	1.41	1.47	1.17	1.13
	6	1.83	1.85	1.80	1.78	2.00	2.00	1.56	1.47	1.23	1.18
Nr. 18	2	—	—	—	—	—	—	1.13	—	1.06	1.04
	3	1.36	1.37	1.30	1.28	1.47	1.30	1.28	0.95	1.11	1.08
	4	1.68	1.68	1.60	1.59	1.68	1.61	1.43	1.22	1.17	1.12
	5	1.91	1.91	1.78	1.77	1.91	1.77	1.53	1.91	1.21	1.16
	6	2.07	2.08	1.94	1.91	2.18	1.95	1.66	1.27	1.26	1.22
Nr. 1	2	—	—	—	—	—	—	1.17	—	1.07	1.05
	3	1.51	1.51	1.43	1.42	1.46	1.40	1.36	1.09	1.14	1.10
	4	1.84	1.84	1.76	1.76	1.81	1.68	1.53	1.44	1.20	1.14
	5	1.98	1.96	1.85	1.86	1.79	1.75	1.58	1.41	1.23	1.17
	6	2.15	2.15	2.04	2.03	2.13	1.96	1.62	1.59	1.25	1.21

注射開始 7 月 20日. 終了 7 月 24 日

第 2 表 C

雞番號	日	[B]	[總面積]	[L×H]	[L+H]	[L]
Nr. 18	第 1 日 (11月29日)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	第 3 日	—	1.19	1.08	1.04	1.04
	第 4 日	1.35	1.23	1.15	1.08	1.07
Nr. 111	3 (12月 1日)	1.34	1.21	1.15	1.06	1.04
	4	1.52	1.37	1.23	1.10	1.07

Nr. 112	3 (12月 1日)	1.39	1.27	1.14	1.07	1.06
	4	1.67	1.39	1.27	1.12	1.10
Nr. 122	3 (12月 1日)	1.14	1.12	1.09	1.03	1.02
	4	1.33	1.25	1.16	1.07	1.05
Nr. 160	3 (12月 1日)	1.25	1.17	1.15	1.05	1.03
	4	1.50	1.28	1.16	1.08	1.05
Nr. 150	3 (12月 1日)	1.41	1.26	1.15	1.06	1.03
	4	1.50	1.33	1.15	1.06	1.06
Nr. 155	3 (12月 1日)	1.19	1.13	—	—	1.02
	4	1.34	1.20	—	—	1.04
Nr. 15	3 (12月 1日)	1.20	1.17	1.10	1.05	1.06
	4	1.34	1.19	1.16	1.07	1.10
Nr. 134	3 (12月 1日)	1.41	1.26	1.21	1.10	1.07
	4	1.61	1.46	1.32	1.13	1.09
Nr. 158	3 (12月 1日)	1.40	1.28	1.16	1.07	1.07
	4	1.60	1.47	1.24	1.11	1.08
Nr. 154	3 (12月 1日)	1.25	1.15	1.08	1.05	1.05
	4	1.35	1.23	1.22	1.09	1.07
Nr. 128	3 (12月 1日)	1.29	1.20	1.20	1.09	1.05
	4	1.47	1.37	1.32	1.13	1.09
Nr. 73	3 (12月 1日)	1.13	1.05	1.04	1.01	1.00
	4	1.13	1.05	1.67	1.04	1.02
Nr. 164	3 (12月 1日)	1.38	1.25	1.12	1.06	1.04
	4	1.66	1.37	1.21	1.09	1.07

第 2 表 D

	14 羽 の 雞 冠 各 部 生 長 率			
	第 1 日	第 2 日	第 3 日	第 4 日
B	1.00	—	1.29 ₍₁₃₎	1.46
總 面 積	1.00	—	1.19	1.28
L × H	1.00	—	1.13 ₍₁₂₎	1.25 ₍₁₃₎
L + H	1.00	—	1.06 ₍₁₃₎	1.09 ₍₁₃₎
L	1.00	—	1.04	1.07

雞冠各部増加率

第 3 表 A

増加率 平均値 (16 例)					
日	[B] %	[總面積] %	[L × H] %	[L + H] %	[L] %
第 2 日	12.6 ⁽¹¹⁾	8.6 ⁽¹¹⁾	6.9	2.8	1.7
第 3 日	30.3	23.6	16.3	7.3	5.1
第 4 日	54.9	42.4	30.2	12.4	9.2
第 5 日	75.2	57.3	39.7	16.2	12.5
第 6 日	94.2	71.7	49.9	20.2	16.5

第 3 表 B

睾丸エキス A, B, C 増加率 % 平均値 (7 例)						
雞番號	日	[B]	[總面積]	[L × H]	[L + H]	[L]
Nr. 119	第 2 日	17.7	12.0	6.8	2.6	1.5
Nr. 133		33.6	22.0	18.4	7.5	5.1
Nr. 19	第 3 日	55.3	37.8	31.5	12.7	9.2
Nr. 17	第 4 日	78.5	53.3	42.1	16.8	12.4
Nr. 56	第 5 日	92.5	65.7	51.6	20.6	15.8
Nr. 57	第 6 日					
Nr. 51						

(第 3 表 D より得たる平均値)

尿エキス A, B, C 増加率 % 平均値 (9 例)						
雞番號	日	[B]	[總面積]	[L × H]	[L + H]	[L]
Nr. 111	第 2 日	3.8 ⁽⁴⁾	2.7 ⁽⁴⁾	7.0	2.9	1.9
Nr. 134		27.8	24.8	14.6	7.1	5.1
Nr. 137	第 3 日	54.6	46.1	29.2	12.1	9.2
Nr. 149	第 4 日	72.6	60.3	37.8	15.8	12.7
Nr. 81	第 5 日	95.6	75.3	48.6	19.9	17.0
Nr. 15	第 6 日					
Nr. 91						
Nr. 18						
Nr. 1						

(第 3 表 D より得たる平均値)

第三表C 睪丸エキス-A増加率%平均値

	H	(B)	(總面積)	(L×H)	(L+H)	(L)
Nr. 119	第2日	10.6	8.8	6.8	2.7	1.7
	第3日	27.8	18.2	15.9	6.3	4.1
Nr. 133	第4日	45.4	32.2	30.1	12.0	8.5
Nr. 19	第5日	60.8	44.0	42.1	16.8	12.6
	第6日	83.1	58.9	52.6	21.0	16.6

睪丸エキス-B増加率%平均値

	H	(B)	(總面積)	(L×H)	(L+H)	(L)
Nr. 17	第2日	25.9	12.2	8.6	3.1	1.2
	第3日	39.5	24.5	23.6	9.5	6.3
Nr. 56	第4日	67.3	43.1	37.8	14.9	10.3
Nr. 57	第5日	102.7	64.8	46.4	18.1	12.6
	第6日	96.4	69.3	55.9	21.6	15.4

睪丸エキス-C増加率%平均値

	H	(B)	(總面積)	(L×H)	(L+H)	(L)
Nr. 51	第2日	14.0	10.9	1.6	1.0	1.6
	第3日	33.4	26.1	10.4	5.0	4.7
Nr. 51	第4日	49.0	38.3	16.7	8.0	7.9
	第5日	59.2	47.1	29.1	13.0	11.1
Nr. 51	第6日	109.0	74.6	35.9	16.0	14.3

尿エキス-A増加率%平均値

	H	(B)	(總面積)	(L×H)	(L+H)	(L)
Nr. 111	第2日	3.8	2.7	4.5	1.8	1.0
	第3日	23.0	20.3	12.4	5.8	4.5
Nr. 134	第4日	50.0	41.4	25.3	11.0	9.0
Nr. 149	第5日	71.8	58.2	35.3	15.2	12.7
Nr. 137	第6日	104.8	74.6	47.8	16.9	17.2

尿エキス-B増加率%平均値

	H	(B)	(總面積)	(L×H)	(L+H)	(L)
Nr. 81	第2日	—	—	3.6	1.9	2.0
	第3日	22.2	18.6	11.1	5.0	3.9
Nr. 15	第4日	36.9	28.9	16.0	7.4	6.8
	第5日	55.4	42.0	23.6	10.5	8.7
Nr. 15	第6日	68.6	49.5	30.8	13.7	11.7

尿 エ キ ス-C 増 加 率 % 平 均 値

	日	(B)	(總面積)	(L × H)	(L + H)	(L)
Nr. 91	第 2 日	—	—	12.6	5.0	3.2
	第 3 日	39.2	35.0	26.6	10.4	6.7
Nr. 18	第 4 日	72.4	63.8	43.3	16.7	11.0
Nr. 1	第 5 日	85.3	75.5	50.5	20.1	15.3
	第 6 日	101.7	96.8	61.7	24.8	20.3

第 3 表 D

雞 番 號	日	(B)		(總面積)		(L × H)		(L + H)		(L)	
		増加數 qmm.	増加率 %	増加數 qmm.	増加率 %	増加數 qmm.	増加率 %	増加數 mm.	増加率 %	増加數 mm.	増加率 %
Nr. 51 睾丸エキス C	第 2 日	55	14.0	120	10.9	37	1.6	1	1.0	1	1.6
	第 3 日	131	33.4	288	26.1	243	10.4	5	5.0	3	4.7
	第 4 日	192	49.0	424	38.3	389	16.7	8	8.0	5	7.9
	第 5 日	232	59.2	520	47.1	679	29.1	13	13.0	7	11.1
	第 6 日	428	10.9	824	74.6	837	35.9	16	16.0	9	14.3
Nr. 19 睾丸エキス A	2	84	18.4	149	15.0	223	12.4	4	4.3	1	1.6
	3	152	32.7	222	22.2	336	21.5	7	7.6	2	3.1
	4	235	57.5	315	31.6	692	38.6	13	14.1	5	7.8
	5	305	72.7	475	47.6	835	46.6	16	17.4	7	10.9
	6	419	106.4	632	64.4	1055	58.9	20	21.7	9	14.1
Nr. 119 睾丸エキス A	2	30	13.3	35	6.3	74	6.4	2	2.7	1	2.0
	3	80	35.5	112	20.3	228	19.8	6	8.2	3	6.0
	4	129	57.2	179	32.4	390	33.9	10	13.7	5	10.0
	5	154	68.4	251	45.4	590	51.3	15	20.5	8	16.0
	6	186	82.7	333	60.3	710	61.7	18	24.7	10	20.0
Nr. 133 睾丸エキス A	2	1	0.2	47	5.0	32	1.6	1	1.0	1	1.6
	3	56	15.1	113	12.1	130	6.3	3	3.1	2	3.1
	4	79	21.4	212	22.7	367	17.9	8	8.3	5	7.8
	5	153	41.4	364	39.0	579	28.3	12	12.5	7	10.9
	6	222	60.2	484	51.9	764	37.3	16	16.7	10	15.6
Nr. 56 睾丸エキス B	2	93	33.9	139	16.7	172	11.2	4	4.8	2	3.5
	3	124	45.2	235	28.3	383	24.9	9	10.7	5	8.8
	4	215	78.4	424	51.1	573	37.2	13	15.5	7	12.3
	5	375	136.8	667	80.4	771	50.1	17	20.2	9	15.8
	6	335	122.2	704	84.9	940	61.1	20	23.8	10	17.5

Nr. 57 睾丸エキス B	2	90	26.1	125	13.9	180	10.3	3	3.4	0	0
	3	118	33.9	224	25.0	368	21.2	7	7.9	2	3.3
	4	240	68.9	387	43.1	665	38.2	13	14.6	5	8.
	5	323	92.8	573	63.9	730	42.0	14	15.7	5	8.3
	6	268	77.0	563	62.8	873	50.2	17	19.1	7	11.7
Nr. 17 睾丸エキス B	2	43	17.8	45	6.1	58	4.2	1	1.2	0	0
	3	95	39.4	149	20.3	344	24.7	8	9.8	4	6.9
	4	132	54.7	257	35.1	528	37.9	12	14.6	6	10.3
	5	189	78.4	365	49.9	654	47.0	15	18.3	8	13.8
	6	217	90.0	440	60.2	784	56.3	18	22.0	10	17.1
Nr. 111 尿エキス A	2	-2	-0.87	8	1.3	83	5.5	2	2.4	1	1.9
	3	47	20.3	160	26.3	286	18.9	7	8.5	4	7.4
	4	121	52.4	272	44.7	468	31.0	11	13.4	6	11.1
	5	169	73.2	384	63.1	658	43.5	15	18.3	8	14.8
	6	211	91.3	448	73.6	792	52.4	18	22.0	10	18.5
Nr. 134 尿エキス A	2	18	7.2	24	4.1	81	5.7	2	2.5	1	1.9
	3	43	17.1	72	12.1	164	10.1	4	5.0	2	3.8
	4	107	42.6	192	32.4	336	23.5	8	10.0	4	7.5
	5	132	52.6	224	37.8	425	29.7	10	12.5	5	9.4
	6	175	69.7	288	48.6	429	30.0	11	13.8	7	13.2
Nr. 137 尿エキス A	2	19	6.6	32	4.1	60	3.3	1	1.1	0	0
	3	88	30.3	208	26.5	216	12.0	5	5.6	3	5.0
	4	147	49.5	352	44.9	444	24.7	10	11.1	6	10.0
	5	225	77.6	488	62.3	580	32.2	13	14.4	8	13.3
	6	393	136.0	744	94.9	864	60.4	19	21.1	12	20.0
Nr. 149 尿エキス A	2	5	2.1	8	1.1	53	3.3	1	1.2	0	0
	3	57	24.4	112	16.4	138	8.7	3	3.6	1	1.9
	4	130	55.5	296	43.5	348	21.9	8	9.6	4	7.5
	5	196	83.8	472	69.4	570	35.9	13	15.7	7	13.2
	6	285	122.0	552	81.1	766	48.2	17	20.5	9	17.0
Nr. 81 尿エキス B	2	—	—	—	—	27	2.0	1	1.3	1	2.0
	3	43	25.6	104	26.8	158	11.7	4	5.2	2	4.0
	4	55	32.7	116	29.9	187	13.9	5	6.5	3	6.0
	5	94	55.9	180	46.4	270	20.0	7	9.1	4	8.0
	6	111	66.1	200	51.6	386	28.6	10	13.0	6	12.0
Nr. 15 尿エキス B	2	—	—	—	—	85	5.2	2	2.4	1	1.9
	3	42	18.8	64	10.4	172	10.5	4	4.8	2	3.8
	4	92	41.1	172	27.9	295	18.0	7	8.3	4	7.5
	5	123	54.9	232	37.6	445	27.1	10	11.9	5	9.4
	6	159	71.0	292	47.4	540	32.9	12	14.3	6	11.3

第 3 表 D の 續 き

雞 番 號	日	〔B〕		〔總面積〕		〔L × H〕		〔L + H〕		〔L〕	
		増加數 qmm.	増加率 %	増加數 qmm.	増加率 %	増加數 qmm.	増加率 %	増加數 mm.	増加率 %	増加數 mm.	増加率 %
Nr. 91 尿エキス C	2	—	—	—	—	110	7.1	2	2.4	0	0
	3	86	26.6	228	35.0	252	16.4	5	6.0	1	1.8
	4	208	64.4	408	62.6	525	34.1	11	13.3	4	7.3
	5	216	66.9	484	74.2	630	40.9	14	16.9	7	12.7
	6	269	83.0	652	100.0	865	56.2	19	22.9	10	18.2
Nr. 18 尿エキス C	2	—	—	—	—	148	13.5	4	5.6	2	4.0
	3	92	35.5	168	29.9	304	27.6	8	11.1	4	8.0
	4	177	68.3	340	60.5	468	42.5	12	16.7	6	12.0
	5	235	90.7	432	76.9	582	52.9	15	20.8	8	16.0
	6	277	107.0	532	94.7	730	66.4	19	26.4	11	22.0
Nr. 1 尿エキス C	2	—	—	—	—	261	17.3	6	7.1	3	5.2
	3	169	51.4	300	40.1	540	35.8	12	14.3	6	10.3
	4	278	84.5	512	68.4	802	53.2	17	20.2	8	13.8
	5	323	98.2	564	75.4	872	57.8	19	22.6	10	17.1
	6	378	115.0	716	95.7	942	62.5	21	25.0	12	20.7

第 三 表 E

尿 エ キ ス-D 増 加 率 % 平 均 値 (7 例)						
雞 番 號	日	〔B〕	〔總 面 積〕	〔L × H〕	〔L + H〕	〔L〕
18, 111, 112 122, 160, 150, 155	第 3 日	26.9 (6)	19.2	12.4 (6)	5.2 (6)	3.3
	第 4 日	44.4	29.3	18.9 (6)	8.3 (6)	6.3

尿 エ キ ス-E 増 加 率 % 平 均 値 (7 例)						
雞 番 號	日	〔B〕	〔總 面 積〕	〔L × H〕	〔L + H〕	〔L〕
15, 134, 128 154, 158, 73 164	第 3 日	29.0	19.4	13.1	6.1	4.6
	第 4 日	45.2	30.5	22.5	9.5	6.9

尿 エ キ ス-D, E 増 加 率 % 平 均 値 (14 例)						
日	B (%)	總 面 積 (%)	L × H (%)	L + H (%)	L (%)	
第 3 日	28.0	19.3	12.8	5.7	3.9	
第 4 日	44.8	30.0	20.8	9.0	6.6	

第 三 表 F

雞 番 號	日	〔B〕		〔總面積〕		〔L × H〕		〔L + H〕		L	
		増加數 qmm	増加率 %	増加數 qmm	増加率 %	増加數 qmm	増加率 %	増加數 mm	増加率 %	増加數 mm	増加率 %
Nr.18 尿 エキスをD 以下〔D〕	第3日	—	—	112	18.7	105	8.0	3	3.8	2	3.6
	第4日	82	34.1	136	22.7	201	15.2	6	7.6	4	7.2
Nr. 111 〔D〕	3	64	34.4	120	21.4	227	14.7	5	6.0	2	3.6
	4	96	51.6	208	37.1	348	22.6	8	9.6	4	7.2
Nr. 112 〔D〕	3	79	38.4	136	26.6	183	14.4	5	6.6	3	5.9
	4	135	66.5	200	39.1	349	27.4	9	11.8	5	9.8
Nr. 122 〔D〕	3	31	14.1	80	12.0	146	9.0	3	3.5	1	1.7
	4	72	32.9	168	25.3	267	16.4	6	7.0	3	5.2
Nr. 160 〔D〕	3	80	25.3	144	16.5	250	13.0	5	5.4	2	3.3
	4	132	41.8	248	28.4	318	16.6	7	7.6	3	5.0
Nr. 150 〔D〕	3	156	40.6	280	26.1	332	15.3	6	6.1	2	3.1
	4	191	49.7	352	32.8	332	15.3	6	6.1	4	6.3
Nr. 155 〔D〕	3	52	18.4	88	12.9	—	—	—	—	1	1.8
	4	96	33.9	136	20.0	—	—	—	—	2	3.6
Nr. 15 〔E〕	3	43	19.6	104	16.5	172	10.5	4	4.8	2	3.8
	4	75	34.2	120	19.0	261	15.9	6	7.1	3	5.7
Nr. 134 〔E〕	3	114	40.7	168	25.9	336	21.1	8	9.5	4	7.3
	4	170	60.7	296	45.6	505	31.7	11	13.1	5	9.1
Nr. 154 〔E〕	3	48	22.8	104	15.5	132	8.0	4	4.7	3	5.3
	4	74	35.1	152	22.6	360	21.8	8	9.3	4	7.0
Nr. 158 〔E〕	3	144	40.2	232	27.9	328	16.1	7	7.4	4	6.7
	4	216	60.3	392	47.1	495	24.3	10	10.6	5	8.3
Nr. 128 〔E〕	3	84	29.3	136	19.8	371	20.0	8	8.9	3	5.2
	4	135	47.2	256	37.2	601	32.4	12	13.3	5	8.6
Nr. 73 〔E〕	3	15	13.1	24	5.5	51	4.0	1	1.3	0	0
	4	15	13.1	24	5.5	129	10.1	3	4.0	1	2.0
Nr. 164 〔E〕	3	83	37.5	160	24.7	205	12.0	5	5.8	2	3.6
	4	145	65.6	240	37.0	360	21.1	8	9.3	4	7.3

第 4 表 幾何學的測定値に對する Planimeter 測定値の誤差%

雞 番 號	日	[B]をプラニメーターにて5回測定したる平均値 (qmm) a	[B]を幾何學的に測定したる値 (qmm) b	b を基準となしたる場合 a の誤差 (qmm)	誤 差 (%)
Nr. 51	第 1 日	400	392	+ 8	+2.0
	第 2 日	488	447	+41	+9.1
	第 3 日	552	523	+29	+5.6
	第 4 日	576	584	- 8	-1.4
	第 5 日	624	624	0	0
	第 6 日	800	820	-20	-2.4
Nr. 111	1	232	231	+ 1	+0.4
	2	232	229	+ 3	+1.3
	3	304	278	+26	+9.3
	4	352	352	0	0
	5	416	400	+16	+4
	6	448	442	+ 6	+1.1
Nr. 134	1	248 ₍₁₀₎	251	- 3	-1.4
	2	264	269	- 5	-1.8
	3	304 ₍₁₀₎	294	+10	+3.4
	4	368 ₍₁₀₎	358	+10	+2.8
	5	392 ₍₁₀₎	383	+ 9	+2.3
	6	432	426	+ 6	+1.4
Nr. 137	1	264	290	-26	-9.0
	2	328	309	+19	+6.1
	3	376	378	- 2	-0.5
	4	440	437	+ 3	+0.7
	5	520	515	+ 5	+1.0
	6	672	683	-11	-1.6
Nr. 149	1	232	234	- 2	-0.9
	2	248	239	+ 9	+3.9
	3	280	291	-11	-3.9
	4	368	364	+ 4	+1.1
	5	448	430	+18	+4.2
	6	512	519	- 7	-1.3
Nr. 19	1	403	401	+ 2	+0.5
	2	477	485	- 8	-1.7
	3	535	553	-18	-3.3
	4	635	636	- 1	-0.2
	5	696	706	-10	-1.4
	6	832	820	+12	+1.5

雞 番 號	日	[B]をプラニメーターにて10回測定したる平均値 (qmm) a	[B]を幾何學的に測定したる値 (qmm) b	b を基準となしたる場合 a の誤差 (qmm)	誤 差 (%)・
Nr. 15	第 1 日	224	219	+ 5	+2.3
	第 3 日	264	262	+ 2	+0.8
	第 4 日	296	294	+ 2	+0.7
Nr. 134	1	272	280	- 8	-2.9
	3	400	394	+ 6	+1.5
	4	456	450	+ 6	+1.3
Nr. 111	1	208	186	+22	+11.8
	3	256	250	+ 6	+ 2.4
	4	296	282	+14	+ 5.0
Nr. 122	1	224	219	+ 5	+2.3
	3	264	250	+14	+5.6
	4	312	291	+21	+7.2
Nr. 128	1	296	286	+10	+3.5
	3	384	370	+14	+3.8
	4	448	421	+27	+6.4

第 5 表 増加率算出に際し撮影誤差によつて生じ得る最大誤差百分率

雞番號	日	寫眞番號	〔B〕			寫眞番號	〔總 面 積〕		
			面 積 (qmm)	最大誤差 (qmm)	増加率算出に際して生じ得る最大誤差%		面 積 (qmm)	最大誤差 (qmm)	増加率算出に際して生じ得る最大誤差%
Nr. 81	第 1 日	1	173	10	8.0%	1	368 _(5)	40	13.0%
		2	163			2	408 _(5)		
	第 3 日	1	210	1		1	488 _(5)	8	
		2	211			2	496 _(5)		
	第 5 日	1	260	3		1	568 _(5)	0	
		2	263			2	568 _(7)		
第 6 日	1	277	3	1	584 _(5)	8			
	2	280		2	592 _(5)				
Nr. 15	第 1 日	1	220	8	5.5%	1	616 ₍₁₀₎	0	1.0%
		2	228			2	616 ₍₁₀₎		
	第 4 日	1	318	4		1	792 _(3)	8	
		2	314			2	784 _(5)		

Nr. 18	第 6 日	1	383	4.2%	1	904 ₍₅₎	5.8%
		2	383		2	912 ₍₁₀₎	
	第 1 日	1	258		1	552 ₍₁₀₎	
		2	259		2	568 ₍₅₎	
	第 4 日	1	441		1	904 ₍₅₎	
Nr. 1		2	431		2	896 ₍₅₎	
	第 5 日	1	497		1	1000 ₍₅₎	2.2%
		2	491		2	984 ₍₅₎	
	第 6 日	1	536		1	1098 ₍₅₎	
		2	536		2	1088 ₍₅₎	
Nr. 126	第 1 日	1	333	6.2%	1	752 ₍₅₎	1.9%
		2	324		2	744 ₍₅₎	
	第 4 日	1	610		1	1264 ₍₃₎	
		2	604		2	1256 ₍₃₎	
	第 6 日	1	712		1	1464 ₍₃₎	
Nr. 137		2	701		2	1464 ₍₃₎	
	第 1 日	1	359	4.7%	1	864 ₍₅₎	4.0%
		2	369		2	864 ₍₅₎	
	第 4 日	1	431		1	952 ₍₅₎	
		2	438		2	960 ₍₅₎	
	第 6 日	1	454		1	1024 ₍₅₎	
Nr. 149		2	454		2	1040 ₍₅₎	
	第 1 日	1	340	6.5%	1	824	8.0%
		2	338		2	808	
	第 4 日	1	345		1	888	
		2	325		2	872	
		3	328		3	888	
Nr. 149	第 6 日	1	389	8.0%	1	944	4.0%
		2	378		2	944	
	第 1 日	1	274		1	792 ₍₅₎	
		2	286		2	800 ₍₅₎	
		3	279		3	784 ₍₅₎	
Nr. 149	第 4 日	1	287		1	856 ₍₅₎	8
		2	297		2	864 ₍₅₎	

Nr.134	第6日	1	309	4.0%	1	904 ₍₅₎	16	4.0%
		2	203		2	888 ₍₅₎		
	第1日	1	274		1	600 ₍₅₎		
		2	274		2	616 ₍₅₎		
Nr.111	第4日	1	292	9.8%	1	656 ₍₅₎	0	8.8%
		2	303		2	656 ₍₅₎		
	第6日	1	337		1	720 ₍₅₎		
		2	338		2	728 ₍₅₎		
Nr.122	第1日	1	194	1.1%	1	576	32	4.4%
		2	197		2	544		
		3	199		3	560		
	第4日	1	230		1	624		
Nr.122		2	244	1.1%	2	632	16	4.4%
	第6日	1	290		1	680		
		2	290		2	696		
	第1日	1	272		1	720		
Nr.122		2	271	1.1%	2	728	16	4.4%
		3	271		3	736		
	第4日	1	279		1	752		
		2	281		2	736		
Nr.122	第6日	1	283	1.1%	1	776	16	4.4%
		2	284		2	760		

	〔B面積〕	〔總面積〕
増加率算出に際して起り得る最大誤差平均値	5.8%	4.9%
以上 10 例中誤差の最大なるもの	9.8%	13.0%
” ” 最小 ”	1.1%	1.0%

總面積の欄中 () はプラニメーターによる測定回数を示す

Journal of the Pharmaceutical Society of Japan

Editor: A. OGATA

YAKUGAKUZASSHI

Subeditor: S. TAKAGI

A. Ogata und Y. Ito: Untersuchung des männlichen Sexualhormons. (III. Mitteil.). Über Auswertung des männlichen Sexualhormons nach der Hahnenkamm-Methode. (I) Eine neue Methode zur Ausmessung des Hahnenkamm-Wachstums-Koeffizienten.

[Aus dem pharm. Institut der Medizin, Fakultät der Tokyo kaiserl. Universität]

(Eingegangen am 23. Jan. 1933)

Von den bisher zur Auswertung des männlichen Sexualhormons nach der Hahnenkamm-Methode publizierten beiden Verfahren werden bei dem einen (a) die Länge des Hahnenkamms (L) und dessen Höhe (H) bestimmt, um die Kammgrösse durch $(L+H)$, $(L \times H)$ oder einfach durch (L) auszudrücken, während nach dem anderen Verfahren (b) der Schatten des Hahnenkamms direkt auf photographischem Gaslichtpapier aufgenommen wird, sodass die Bildfläche mit dem Planimeter ausgemessen werden kann. Man kann nach der ersten Methode die Ausmessung sehr einfach machen, aber grosse Messungsfehler und Unempfindlichkeit sind dabei in Kauf zu nehmen. Auch nach (b) sind die Fehler nicht unbeträchtlich. Aus diesen Gründen ist die Ausarbeitung einer Methode sehr erwünscht, die bei hoher Empfindlichkeit die Messungsfehler auf ein Minimum reduziert.

Da die Hähne im Vergleich mit Ratten und Mäusen grösser sind, so sind bei der Verwendung der Hähne zu Versuchstieren grosse Mengen des männlichen Sexualhormons nötig. Gelänge es aber, die nach Injektion mit männlichem Sexualhormon am empfindlichsten reagierende Stelle des Hahnenkamms zu ermitteln und würde diese Stelle anstatt der ganzen Hahnen-

kammfläche gemessen, so sollte man mit einer kleinen Probe denselben Wachstumskoeffizienten erhalten können wie durch Verwendung grosser Mengen Probe. Verff. haben diesen Punkt untersucht und sind zu folgenden Resultaten gelangt.

Da bei dieser Untersuchung die Wachstumskoeffizienten aller Hahnenkammteile verglichen werden, so kann man jedes Präparat, welches kammwachstumsfördernde Bestandteile enthält, für die Versuche gebrauchen. Daher wurden viele Arten Testesextrakte und Extrakte des männlichen Harnes [vergl. Journ. of the Pharm. Soc. of Japan Nr. **606**, 79 (1932), ferner *ibid.* Nr. **610**, 187 (1932)] verwendet.

Bei der planimetrischen Ausmessung kleiner am Rande gezackten Flächen kommen viele Fehler vor. Namentlich ist es bei einem Bilde des Hahnenkamms mit undeutlichem Profil unmöglich, die Nadel des Planimeters ganz genau zu bewegen, sodass der Fehler grösser wird. Wenn man dasselbe Bild wiederholt planimetriert, so erhält man jedesmal ein abweichendes Resultat. Als zur Feststellung der Differenzen zwischen Maximal- und Minimalwerten der Ausmessung bei 15 verschiedenen Photographien von Hahnenkammschatten je 10 mal die ganze Hahnenkammfläche gemessen wurde, wurden bei einer durchschnittlichen Messfläche von 306 qmm eine Minimaldifferenz von 16 qmm, eine Maximaldifferenz von 280 qmm und eine Durchschnittsdifferenz von 106 qmm gefunden. (vergl. Tabelle I).

Tabelle I.

Hahnen- nummer	Ausmessungswerte										Durch- schnitts- zahl qmm	Differenz des Maxi- mal- und Minimal- wertes der Ausmessung in qmm.
Nr. 15.	224	224	*200	△240	216	232	224	208	240	200	224	40
	*184	△360	256	248	288	248	232	296	288	208	264	176
	*264	320	312	256	304	320	296	288	△344	264	296	80

Hahnen- nummer	Ausmessungswerte										Durch- schnitts- zahl qmm	Differenz des Maxi- mal- und Minimal- wertes der Ausmessung in qmm
Nr. 134.	256	△352	*232	320	272	280	312	304	248	280	272	120
	408	*344	△440	392	392	400	400	392	400	400	400	96
	464	472	480	440	472	*424	424	△488	472	424	456	64
Nr. 111.	216	*200	△216	200	208	200	216	216	200	208	208	16
	256	264	*224	△304	248	248	264	264	240	272	256	80
	296	*248	296	△228	288	272	320	296	288	296	296	80
Nr. 122.	232	224	232	232	248	*200	232	△248	224	200	224	48
	248	264	*128	△408	280	152	352	200	304	320	264	280
	344	272	312	320	320	312	312	*240	△376	304	312	136
Nr. 128.	288	304	*148	△344	272	344	200	304	296	312	296	96
	352	416	400	384	△432	*312	416	368	432	328	384	120
	440	456	456	400	472	440	472	448	*360	△512	448	152

* bedeutet Minimalwert.

△ bedeutet Maximalwert.

Da aus diesem Grunde die Ausmessung der ganzen Hahnenkammfläche auf der Photographie des Schattens mit grossen Schwierigkeiten verknüpft ist und noch dazu nicht exakte Resultate liefert, haben Verff. in der Absicht, die durch das männliche Sexualhormon den grössten Wachstumskoeffizienten aufweisende Stelle des Hahnenkamms zu finden und anstatt die gesamte

Figur 1.

Fläche nur diese besondere Stelle auszumessen, die Photographie der Hahnenkammfläche nach Figur 1 in einzelne Teile zerlegt und die Wachstumskoeffizienten dieser Einzelteile ausgemessen.

- (S) Eine Gerade ab wurde von dem Punkte a , wo der Kamm den Schnabel berührt, bis nach b , wo der Kamm den Hinterkopf gerade berührt, gezogen. Die von dieser geraden Linie und der krummen Profillinie eingeschlossene Fläche wurde ausgemessen.
- (A) Vom Punkte c , der den tiefsten Punkt der Ausbuchtung vor der vorersten grossen Zacke aufweist, wurde auf die Linie ab ein Lot cd gefällt. Die durch die krumme Profillinie ac und die beiden Geraden ad und cd eingeschlossene Fläche wurde gemessen.
- (A') Die Fläche des Dreiecks acd wurde gemessen.
- (B) Das Vieleck $cbda$, das dadurch entsteht, dass Punkt c mit den in den einzelnen, tiefsten Ausbuchtungen der Zacken liegenden Punkten, ferner Punkt e in der tiefsten Stelle der Ausbuchtung hinter der letzten, grossen Zacke mit dem Punkte b durch Gerade verbunden werden, wurde ausgemessen.
- (C) Die durch die Gerade cb und die krumme Profillinie cfb eingeschlossene Fläche wurde ausgemessen.
- (C') Das Dreieck, das durch Verbindung des beliebigen Punktes f der krummen Linie cfb (nämlich des Punktes, wodurch Dreieck $\triangle cfb$ möglichst gross wird) mit den Punkten c und b entsteht, wurde ausgemessen.

Vergleicht man den Wachstumskoeffizienten jedes Einzelteils und den der Summe jedes Einzelteils mit B, so ist nach Tabelle II und Figur 2 der Wachstumskoeffizient von B am grössten.

Tabelle II.

Vergleichs des Wachstumskoeffizienten aller Teile des Hahnenkamms.

Reihen- folge der Empfind- lichkeit	Anzahl der zur Ausmessung gebrauchten Hähne.		Injektionstage					
			I	II	III	IV	V	VI
1	16	(B)	1,00	1,13 ⁽¹¹⁾	1,30	1,55	1,75	1,94
2	15	(B+C')	1,00	1,12 ⁽¹¹⁾	1,30	1,55	1,74	1,93
3	15	(A'+B+C')	1,00	1,10 ⁽¹¹⁾	1,27	1,49	1,65	1,81
4	16	(B+A')	1,00	1,09 ⁽¹¹⁾	1,26	1,48	1,78	1,82
5	15	(C')	1,00	1,07 ⁽¹¹⁾	1,29	1,48	1,65	1,84
6	6	(A+B+C)	1,00	1,08	1,25	1,45	1,60	1,82
7	16	(S)	1,00	1,08 ⁽¹¹⁾	1,24	1,41	1,57	1,72
8	7	(C)	1,00	1,10	1,22	1,42	1,56	1,54
9	16	(L×H)	1,00	1,08	1,19	1,32	1,41	1,52
10	5	(A)	1,00	1,07	1,20	1,30	1,42	1,58
11	16	(A')	1,00	1,02 ⁽¹¹⁾	1,11	1,24	1,32	1,38
12	16	(L+H)	1,00	1,03	1,07	1,12	1,16	1,20
13	16	(L)	1,00	1,02	1,05	1,09	1,13	1,17

Anmerkung: Als Wachstumskoeffizient wird der Durchschnittswert der durch Ausmessung jedes Hahnes erhaltenen Zahlen genommen. Die eingeklammerte Zahl bedeutet die Anzahl der nur an dem betreffenden Tage ausgemessenen Hähne.

Figur 2.

Da nämlich der Wachstumskoeffizient

von (L)	am 6. Tage mit dem des (B) vom 2. oder 3. Tage.
„ (L+H)	„ 6. „ „ „ „ (B) vom 3. Tage.
„ (L×H)	„ 6. „ „ „ „ (B) vom 4. Tage und
„ (S)	„ 6. „ „ „ „ (B) vom 5. Tage.

im allgemeinen übereinstimmt, so würde, wenn man (S) ausmisst und ihren Wachstumskoeffizienten des 6. Tages als Einheit wählt, durch Ausmessung von (B) bereits der Test am 5. Tage beendet und man könnte die Prüfung um 1 Tag abkürzen. Da überdies (B) ein Vieleck ist, so könnte man diese Fläche durch Zerlegung in mehrere Dreiecke geometrisch ausrechnen und ohne Benutzung eines besonderen Instrumentes wie Planimeter nur durch Messung der Geraden die Fläche ausrechnen. Da die Flächen (A), (C) und (A'), (C') klein sind und durch ihre Vereinigung mit (B) und Ausmessung der addierten Flächen kein besonderer Erfolg erzielt wird, der Fehler dadurch eher grösser wird, haben Verff. diese Flächenausmessung nicht in Betracht gezogen. Daher wurden die in der Tabelle II in gotischer Schrift angegebenen Zahlen allein in Figur 2 graphisch dargestellt. In diesem Versuche wurden viele Ausmessungen an reichlichem Versuchsmaterial gemacht. Die Resultate werden in der in japanischer Sprache in dieser Zeitschrift erscheinenden Mitteilung angegeben; hier wird davon Abstand genommen.

Bei diesem Ausmessungsverfahren kommt als Fehlerquelle nur die Art der Aufnahme der Photographie in Betracht. Verff. haben daher zur Vereinheitlichung der Aufnahmebedingungen eine in der Figur 3 dargestellte Vorrichtung ersonnen.

Figur 3.

Figur 4.

In der Figur 3 ist A eine aus dem Deckel a und Zylinder b bestehende Blechbüchse, bei der a auf einem Holzbrett fixiert ist. Der Zylinder b ist an beiden Enden offen und es lässt sich frei in a einschieben. In der Richtung des Pfeilstrichs wird zunächst der Hahnenkopf durch die hintere Öffnung von b und dann b selbst in passender Weise in a hineingeschoben, um den Hahnenkopf aus der durch f und f' gebildeten Öffnung m herauszugreifen und den Hahnenkamm an die Zelluloidplatten j mittels der Klemme c lose zu befestigen (Figur 4). Oberhalb a ist bei f eine Blechplatte g senkrecht angeschmolzen und ein in der Mitte mit einem Einschnitt versehene, hölzerne Schirm h angebracht. Dieser Schirm ist frei nach oben und unten beweglich. Eine Glasplatte i wird an der hinteren Wand der Einschnittstelle von h hineingeschoben (Figur 4). Zwischen Glas und Holzplatte bleibt nur soviel Raum übrig, dass man photographisches Kopierpapier hineinstecken kann.

Auf diese Weise bleibt die Entfernung zwischen Hahnenkamm und Kopierpapier stets konstant. Als Lichtquelle dient eine in der Blechbüchse a befindliche elektrische Birne von 250 Watt. In die vordere Öffnung der Blechbüchse a mündet ein langer, dünner Blechzylinder und zur Vermeidung starker Reflexion werden c und d innerlich mit Russ bestrichen. Die Entfernung zwischen Lichtquelle und Kopierpapier beträgt 120 cm.