H. Kondo u. S. Ikawa: Untersuchung über die Bestandteile des "Senso" (II. Mitteil.).

[Aus dem pharm. Inst. der medicin. Fakultät der Tokyo Kaiserl. Univ.]

(Eingegangen am 27. März, 1933)

In der vorigen Mitteilung [Diese Zeitschrift **66**, 11 (1933)] haben wir gezeigt, dass im "Senso" das ψ -Bufotalin (früher das Bufotalin; Erklärung folgt) $C_{26}H_{36}O_6$ als seinen Hauptbestandteil enthalten ist, aus diesem die Desacetyl-, Halogen- und Oxydationsverbindungen sich leicht ableiten liessen. Nun sind es aber uns gelungen, vom ψ -Bufotalon, $C_{26}H_{34}O_6$, ausgehend, über dessen Desacetylverbindung die verschiedenen, bisher unbekannten Produkte darzustellen, welche in die Konstitution des ψ -Bufotalins neue Einblicke verschafft haben.

Folgende Tabelle veranschaulicht etwa unseren Arbeitsgang.

Zunächst führten wir Verseifung des ψ -Bufotalons ebenso wie beim vorhererwähnten Des-Acetyl- ψ -Bufotalin mit N/5 alkohol. Kalilösung aus, wobei gleichzeitig der Lactonring sich abspaltete und eine entacetylierte Oxy-säure entstand. Die erhaltene Des-Acetyl- ψ -Bufotalonsäure verliert bei Aufarbeiten der essigsauren Verseifungsflüssigkeit 1 Mol. Wasser ziemlich leicht, um sich in das Des-Acetyl- ψ -Bufotalon zurückzuziehen, besonders schnell geht es vor, wenn man Salzsäure anstatt Essigsäure anwendet, ja sogar im ungetrockneten Zustande schon. So wurde die mit Essigsäure frei gemachte und bei niedriger Temperatur schnell getrocknete Des-Acetyl- ψ -Bufotalonsäure $C_{24}H_{34}O_6$ gleich mit Diazomethan methyliert; der letztere wurde durch Einwirkung von Essigsäureanhydrid zum Monoacetyl-Desacetyl- ψ -Bufotalonsäuremethylester $C_{27}H_{38}O_7$ umgewandelt, was man es dadurch schliessen kann, dass die durch die Abspaltung des Lactonrings entstandene Hydroxylgruppe ein primärer oder sekundärer Alkohol sein soll. Um das Monoacetyl-Derivat verseift zu werden, liessen sich 2 Mol. Kali-menge verbrauchen, und die Substanz ging bald in ihrer H_2SO_4 -sauren Flüssigkeit wieder in das Des-Acetyl- ψ -Bufotalon über.

Es ist wohl bekannt, dass die in der Acetoxyl-Form sich befindende OH-Gruppe im ψ -Bufotalin nicht mehr wieder acetyliert werden kann, sobald einmal verseift worden ist; so geben das Des-Acetyl- ψ -Bufotalin bzw. der Des-Acetyl- ψ -Bufotalonsäuremethylester beide nur Monoacetyl-Derivat, nicht aber Diacetyl-. Warum? Durch Einwirkung von Hydroxylamin auf den Des-Acetyl- ψ -Bufotalonsäuremethylester bei Anwendung eines Überschusses von Aetzkali wurde feinen, hell gelborangen Krystalle gewonnen, die bei 165° sintern und den Schmelzpunkt $200-201^\circ$ (unter Aufschäumen) zeigen. Sie geben die Lassaigne'sche Reaktion deutlich, lösten sich in Alkalicarbonat-lösung nicht. Zuzufolge der Analyse kommt ihnen eine Zusammensetzung $C_{24}H_{34}O_5N_2$ zu und erwiesen sie sich als Des-Acetyl- ψ -Bufotalon-dioxim $C_{24}H_{32}O_3(=NOH)$. Obwohl sie an Analysenzahlen mit dem Des-Acetyl- ψ -Bufotalonoxaminoxim $C_{24}H_{36}O_6N_2$ ganz anders ist, haben wir doch vor-

sichtshalber auf die Reaktionen derselben mit Fehling'scher Lösung und gelbem Quecksilberoxyd geprüft; es verhielten sich negativ, also kein Oxaminoxim. Dieses Ergebnis ist wohl leicht erklärlich, wenn man darauf annimmt, dass die in Frage kommende Hydroxylgruppe nach Verseifung gleichzeitig in Keto-Form tautomerisiert, ungefähr so:

Ebenso wurden das Des-Acetyl- ψ -Bufotalin und Des-Acetyl- ψ -Bufotalinchlorid beim Acetylieren nur an ihren ursprünglich sekundären Alkohol acyliert;

sie gaben weder Diacetyl-Verbindung, noch Dichlorid. Da das Des-Acetyl- ψ -Bufotalon kein Anhydrid, namentlich Furazan, gibt, so scheint es kein α -Diketon zu sein. Auch gibts da kein $\Delta^{\alpha,\beta}$ -Keton bzw. keine $\Delta^{\alpha,\beta}$ -Carbonsäure, da das kein Oxaminoxim liefert.

Von dem Des-Acetyl- ψ -Bufotalon selbst ausgegangen, wurde genau dasselbe Des-Acetyl- ψ -Bufotalon-dioxim wie oben genannten erhalten.

Um die Keto-Enol-Tautomerie der genannten OH-Gruppe sicher festzustellen, haben wir weiter über die Einwirkung des Hydroxylamins auf das Des-Acetyl- ψ -Bufotalin und auch über den Charakter des Acetoxyls im Tetrahydro- ψ -Bufotalin untersucht.

Wurde also der Des-Acetyl- ψ -Bufotalinsäuremethylester, welcher durch die Einwirkung von Diazomethan auf die freie Säure in Aether-Methanol-lösung dargestellt wurde, mit Hydroxylamin in analoger Weise wie beim Des-Acetyl- ψ -Bufotalinsäuremethylester behandelt, so gab er eine feinen, hellgelben Krystalle vom Fp. 170–174° unter Aufschäumen (bei 140° sintern). Es löste sich in Alkalicarbonatlösung nicht, zeigte die Lassaigne'sche Reaktion deutlich. Zufolge der Stickstoff-Bestimmung erwiesen sie ein Monoxim, Des-Acetyl- ψ -Bufotalinoxim, $\text{C}_{24}\text{H}_{34}\text{O}_4$ ($=\text{NOH}$). Dabei muss der Lactonring ebenso wie beim Des-Acetyl- ψ -Bufotalonsäuremethylester geschlossen sein, indem der Methylester durch Einwirkung von Alkali verseift ist; die Zeisel's CH_3O -Bestimmung des Oxims verliefte wohl negativ.

Wenn die Acetoxylgruppe des ψ -Bufotalins durch die Entacetylierung

wirklich zur Ketogruppe tautomerisiert, so muss es sicher sein, dass ihre Tautomerieerscheinung durch vorherige Hydrierung ihrer Doppelbindung zwischen dem Nachbarkohlenstoff vollständig aufgehoben werden soll. So wurde das ψ -Bufotalin in alkoholischer Lösung mit palladinierter Tierkohle und Wasserstoff katalytisch hydriert, wobei 2 Mol. Wasserstoff absorbiert wurden. Nach Aufarbeiten des Reduktionsproduktes wurden scheinbar zwei Substanzen: eine in Aether schwer, andere leicht lösliche, erhalten. Die vordere einmal in Essigester gelöst, dann aus verd. Alkohol umkrystallisiert, erwies sich als Tetrahydro- ψ -Bufotalin $C_{25}H_{40}O_6$. Die letztere aber blieb immer amorph, doch wurde sie um so mehr unlöslich in Aether, wenn man sie wiederholt in Aether löst und das Lösungsmittel abdestilliert. Schliesslich wurde sie so krystallinisch gemacht, was darauf durch die Analyse festgestellt wurde, dass sie nichts anders als das Tetrahydro- ψ -Bufotalin ist.

Nun wurde das Tetrahydro- ψ -Bufotalin mit N/2-alkohol. Kalilösung verseift, das erhaltene Des-Acetyl-Tetrahydro- ψ -Bufotalin wurde in umgekehrter Weise mittels Essigsäureanhydrides wieder zu einem Diacetyl-derivate übergeführt, das durch die Acetylzahl-Bestimmung festgestellt wurde. Das erhaltene Diacetyl-derivat ist so zu nennen: das Monoacetyl-Tetrahydro- ψ -Bufotalin $C_{23}H_{42}O_7$.

Auf Grund dieser Ergebnisse haben wir noch die Einwirkung der Bromwasserstoffsäure auf Tetrahydro- ψ -Bufotalin versucht; dabei entstand demgemäss das Tetrahydro- ψ -Bufotalinbromid, $C_{24}H_{39}O_5Br$, d. h. ein Beweis, dass der eigentliche tertiäre Alkohol im ψ -Bufotalin bei der Hydrierung in takt blieb und jetzt durch Brom versetzt ist. Durch Verseifung desselben ergab sich das Des-Acetyl-Tetrahydro- ψ -Bufotalinsäurebromid $C_{24}H_{39}O_5Br$; umgekehrt durch darauffolgende Acetylierung liess sich dies zum Monoacetyl-

Tetrahydro- ψ -Bufotalinbromid $C_{28}H_{41}O_6Br$ überführen, was bei der vorhererwähnten brom-freien Substanz der Fall war. Dabei die Acetoxylgruppe im Tetrahydro- ψ -Bufotalin durch Entacetylierung in sekundären Alkohol umgeformt, soll natürlich für erneute Acetylierung bereit sein.

In der ersten Mitteilung hat es sich gezeigt, dass bei der Behandlung des ψ -Bufolins mit konz. Salzsäure das immer noch das Acetoxyl enthaltende Anhydro-Bufotalinchlorid gewonnen wurde. Dieses Mal haben wir über dieselbe Reaktion zeitlich genau untersucht und festgestellt, dass dabei ebenso wie die voranstehende Arbeit kein ψ -Bufotalin erhalten wurde, und sogar durch 5-8 Minuten lange Einwirkung von Säure fast kein Chlorid sich bildete, sondern nur das Ausgangsmaterial regenerieren konnte.

In Betreff der zwei $C=C$ -Doppelbindungen im ψ -Bufotalin haben wir jetzt der einen nachgewiesen, dass sie sich zwischen dem Acetoxyl tragenden und benachbarten Kohlenstoffe stattfindet, und gleichzeitig der tertiären Alkohol bildende Kohlenstoff aber keine Doppelbindung hat. Ob die andere Doppelbindung im Lactonring liegt oder nicht, weiss man noch gar nicht. Da aber die Legal'sche Reaktion sich negativ verhält, so scheint es wenigstens kein $\Delta^{\alpha,\gamma}$ -Lacton vorzuliegen. Ausserdem im Hinblick dass die OH-Gruppe der durch Verseifung des Lactons zu Stande kommenden Oxsäure ein primärer oder sekundärer Alkohol sein muss, wäre ein $\Delta^{\beta,\gamma}$ -Lacton immer mehr zweifelhaft. Das Bufotalin von Wieland soll aber einen ungesättigten Lactonring haben, wie er bei iso-Bufocholansäurebildung (A. 493, 272-280) gezeigt hat.

Also im Vergleich unseres ψ -Bufotalins mit dem Bufotalin von Wieland ist am Charakter des Acetoxyls ganz verschieden; das vordere zeigt die Keto-Enol-Tautomerie, das letztere nicht. Durch conc. Salzsäure erleidet das letztere das Abreissen der Essigsäure unter Bildung vom Bufotalin, das vordere aber gar nicht. Die beiden sind so nicht identisch, sondern eine isomere Substanz mit einander. Wir wollen unsere Substanz " ψ -Bufotalin" nennen.

ルには難溶なり。

次に 120° にて乾燥恒量を得たる物質に就き 分析したる に次の如き 成績にし
て 2-チオール-4-メチルイミドアツォリル-5-醋酸のモノピクリン酸鹽なることを知
れり。

物質, 0.1052g	CO ₂ , 0.1374g	H ₂ O, 0.0295g	C%, 35.62*	H%, 3.18
物質, 0.0912g	N, 15cc	t, 23°	B, 745mm	N%, 17.76
C ₁₂ H ₁₁ O ₉ N ₅ S	として理論數	C%, 35.90	H%, 2.77	N%, 17.45

終に臨み本研究は恩師近藤教授の御懇篤なる御指導と御鞭撻によるものなり謹
んで謝意を表す。

(昭和 7 年 9 月 1 日 海軍軍醫學校化學教室にて認む)

蟾 酥 の 成 分 研 究 (第二報)

近 藤 平 三 郎

井 川 俊 一

(昭和 8 年 3 月 27 日受理)

(東京帝國大學藥學科藥化學教室)

H. Kondo u. S. Ikawa; Untersuchungen über die
Bestandteile des „Senso“ (II)

第一報(本誌 **661**, 11-23, 1933)に於て余等は蟾酥中に主成分として Bufotalin
C₂₆H₃₆O₆ の存在を認め、其のデスアセチル化合物體、ハロゲン化合及酸化體等を造
りて報告したりしが、今回は酸化體 Bufotalon C₂₆H₃₄O₆ より出發して其のデスア
セチル化合物體を得て、前回に於ける未解決の諸點を明かにし以て Bufotalin の構
造決定に光明を見出したるを以て茲に第二報として報告すべし。今本研究の大様
を圖示すれば次の如し。

Bufotalin は今回 ψ -Bufotalin と改稱す(理由は後段に記述すべし)。

先づ ψ-Bufotalon に就きて前回と同様に N/5 アルコール性カリを以て鹼化を行ひしに、2 モルの KOH に相當するカリを消費したるを以て、デスアセチル化と同時にラクトン環も亦鹼化を受けオキシ酸となりたるを知る。然れ共此の滴定中和液を醋酸々性となして濃縮したる後醋酸エステルにて抽出し、其の減壓蒸溜残渣を稀アルコールより結晶せしめて濾別し乾燥せしむる時は、既に其の大部分は炭酸アルカリに不溶性を示し、再びラクトン閉鎖したる Desacetyl-ψ-bufotalon を得ること Desacetyl-ψ-bufotalin に於けるが如し。況んや醋酸々性にて濃縮する代りに鹽酸々性にてなす時は、乾燥せざるに既に炭酸アルカリに溶解せず。依つて N/2 アルコール性カリを以て鹼化し低温にて急速に乾燥せしめしに、明かに水 1 分子多き Desacetyl-ψ-bufotalonsäure C₂₄H₃₄O₆ に一致する物質を得たり。此際鹼化に要せしカリの量は理論數に比して少きも未鹼化物 ψ-Bufotalon を回収せるに因りて納得し得べし。Desacetyl-ψ-bufotalonsäure はデアゾメタンにてメチル化

するに明かにモノメチルエステルを生じ、此者を更に無水醋酸にてアセチル化すれば Monoacetyl-desacetyl- ϕ -bufotalonsäuremethylester $C_{27}H_{38}O_7$ を生ずるを以てラクトン環の開裂せられて生じたるオキシ基は第一級若くは第二級アルコールなることを知る。又此のモノアセチル誘導體を鹼化せしむるに2モルに相當する KOH を必要とするを以てメチルエステル ($-COOCH_3$) も亦同時に鹼化せられたること明かなり。鹼化物は硫酸々性にて水蒸氣蒸溜に附せるを以て最早炭酸アルカリに溶解せず、則ち Desacetyl- ϕ -bufotalon に他ならず。

茲に於て第一報にて未解決なりしアセチルオキシ基の形にて存在する水酸基の本性の追究に着手せり。即ち該アルコールは一度鹼化する時は再び復活アセチル化するを得ず、Desacetyl- ϕ -bufotalin 及 Desacetyl- ϕ -bufotalonsäuremethylester が各々モノアセチル誘導體のみを生じ又前者は鹽酸瓦斯に因りてデクロリドを生ぜざるを以て、恐らくは鹼化を受くる際分子内轉位 (Keto-Enol-Tautomerie) を營むに非ずやと考へ後者に對するヒドロキシルアミンの作用を研究せり。即ち Desacetyl- ϕ -bufotalonsäuremethylester に對し過剰の苛性アルカリの存在の下にヒドロキシルアミンを作用せしめしに、 165° にて收縮し (sintern) Fp. $200-201^\circ$ (發泡下) を示す淡橙色の微細なる結晶を得たり。Lassaigne 氏反應顯著にして炭酸アルカリに溶解せず、分析の結果 $C_{24}H_{34}O_5N_2$ に一致し Desacetyl- ϕ -bufotalon-dioxim $C_{24}H_{32}O_3(=NOH)_2$ なることを認む。Desacetyl- ϕ -bufotalon-oxaminoxim $C_{24}H_{36}O_6N_2$ としての理論數とは明かに異なるも念の爲 Fehling 氏液及黃色酸化汞に對する反應を試験せしに果して陰性にしてオキシアミノオキシムに非ざることを確めたり。然ればデスアセチル化に因りて生じたる遊離の水酸基は第三級アルコールにして、之が直に轉位によりてケト型となりオキシムを生成すと考ふことを得、從つて Desacetyl- ϕ -bufotalin 及 Desacetyl- ϕ -bufotalinchlorid のアセチル化に際しては元來の第二級アルコールのみアセチル化せられ、デアセチル化合體を生ずることなく、又デクロリドを生ずることなし。無水物即ちフラザンを生ぜざるを以て α -デケトンならず、又オキシアミドオキシムを生成せざるを以て α,β -不飽和ケトン及 α,β -不飽和カルボン酸ならず。

上記の如く Desacetyl- ϕ -bufotalonsäuremethylester はヒドロキシルアミンに逢ひて Desacetyl- ϕ -bufotalon-dioxim を與ふるも、Desacetyl- ϕ -bufotalon よりも全く同様にして同一デオキシムを生ず。

以上のケト・エノル轉位を一層確實にせんが爲余等は更に進んで Desacetyl- ψ -bufotalin に就きて同様にヒドロキシルアミンに對する作用を追究し、又一方に ψ -Bufotalin の水素化飽和體なる Tetrahydro- ψ -bufotalin に就きてアセチルオキシ基の性質を研究せり。乃ち ψ -Bufotalin を $N/2$ アルコール性カリを以て鹼化して得たる Desacetyl- ψ -bufotalinsäure $C_{24}H_{36}O_6$ を急速に低温乾燥し、前記の如くジアズメタンを作用せしめてメチルエステルとなし、此者に就き Desacetyl- ψ -bufotalonsäuremethylester と同様に苛性アルカリの存在の下にヒドロキシルアミンと反應せしめ、 140° にて收縮し Fp $170-174^\circ$ (發泡下) を示す微黄色の微細なる結晶を得たり。炭酸アルカリに溶解せず、Lassaigne 氏反應顯著にしてオキシムの證なり。窒素分析の結果はモノオキシムに一致し、Desacetyl- ψ -bufotalonsäuremethylester の場合に徴し Desacetyl- ψ -bufotalin-oxim $C_{24}H_{34}O_4 (=NOH)$ なること明かなる所なれ共尙念の爲 Zeisel 氏法に據りてヨード水素酸(無水醋酸添加)と共に煮沸分解せしめ全くヨード銀の沈澱の生ぜざることを確めたり。

次に ψ -Bufotalin を常法は依りバラデウム炭を以て接觸還元せしに 2 モルの水素を吸収したりしが、此際乾燥エーテルに難溶性の部分と易溶性の部分とを生じ、前者は醋酸エステルを以て處理したる後稀アルコールより結晶せしめ Tetrahydro- ψ -bufotalin $C_{26}H_{40}O_6$ なることを知れり。又易溶性部はエーテルを蒸發濃縮したる後石油エーテルを滴加放置するも結晶せざるを以て再び溶媒を溜去したるに、既に一部エーテルに難溶性となれるを見、該法を反覆し遂に全部結晶性となすことを得たり。本物質も亦分析の結果 Tetrahydro- ψ -bufotalin $C_{26}H_{40}O_6$ に一致せり。

茲に於て Tetrahydro- ψ -bufotalin を $N/2$ アルコール性カリを以て鹼化し Desacetyl-tetrahydro- ψ -bufotalinsäure $C_{24}H_{40}O_6$ となし、逆にアセチル化せしにジアセチル化合物を生じたること此者の鹼化に因りて明かなり。即ち Monoacetyl-tetrahydro- ψ -bufotalin $C_{25}H_{42}O_7$ なること推定せらるるも、今 ψ -Bufotalin の第三級アルコールの隣に二重結合を假定せんか、之が接觸還元の際に當然第二級アルコールを生じ従つてアセチル基を攝取すべき理なるを以て、果して Tetrahydro- ψ -bufotalin に於ても尙第三級アルコールを所有するや否やを決定せんが爲此者に對するブロム水素酸の作用を試験せり。然るに第一報に於て報告したる如くテトラヒドロ化合物にても明かに第三級アルコールのブロムに因りて置換したる

Tetrahydro- ψ -bufotalinbromid $C_{26}H_{39}O_5Br$ を生じ、之を鹼化すれば Desacetyl-tetrahydro- ψ -bufotalinsäurebromid $C_{24}H_{39}O_5Br$ となり、次でアセチル化に依りて Monoacetyl-tetrahydro- ψ -bufotalinbromid $C_{25}H_{41}O_6Br$ となること前項ブロムを有せざるものと全く相對應す。然れば Tetrahydro- ψ -bufotalin のデスアセチル化によりて生じたるアルコールは第二級なるべく従つてアセチル基の出入は自由なるべき理なり。

之を要するに ψ -Bufotalin 中に アセチルオキシ基の状態にて存在する水酸基は第三級アルコールにして(水素化に因りて第三級となりアセチル化に應ず)、鹼化に因りてアセチル基を脱離すると同時に轉位を起しエノル型よりケト型に移行すること疑なし。

則ち 2 個の二重結合の中 1 個はアセチルオキシ基に隣接し、他の 1 個の二重結合は固有の第三級アルコールに隣接せざることを知る。且又 Wieland 及小竹氏の推定せるが如くラクトン環中に二重結合を假定せば、之にて 2 個の二重結合の位置は決定せる理ならんも Legal 氏反應(ψ -Bufotalin, Desacetyl- ψ -bufotalin, 及 ψ -Bufotalon に就てなせり)陰性なるを見れば β, γ -不飽和ラクトンに非ざるが如く(同反應は Gitoxigenin にては血赤色を呈す)、一方に於てラクトン環の鹼化せられて生じたるオキシ酸のアルコールが第一級若くは第二級なることよりして益々 β, γ -不飽和ラクトンに疑を生ずるを以て此の點に關しては更に追究し判明せしむる所あらんとす。

第一報に於て余等は ψ -Bufotalin に對する濃鹽酸の作用を試験せし際依然としてアセチル基を有する Anhydro- ψ -bufotalinchlorid を生ずることを報告したりしが、今回更に時間的に該反應を追試し前回報告同様 ψ -Bufotalin を得ざること

を認めたり。即ち 5-8 分間にては殆ど Chlorid を化生せず原物質 ϕ -Bufotalin を回収せり。然れば此者の鹼化によりて Desacetyl- ϕ -bufotalin を生ず。此の點及 Acetyloxy を形成する OH 基がケト及エノル變移を営む性質を有する點より考ふれば余等の ϕ -Bufotalin $C_{26}H_{36}O_6$ は Wieland 氏の夫れと其性質全く identisch なるものに非ずと考ふるを至當とするを以て今後 ϕ -Bufotalin と改稱せんとす。

本研究費用の一部は文部省自然科学奨励補助金に仰けり。謹んで爰に謝意を表す。

實 験 の 部

1. ϕ -Bufotalon の鹼化. ϕ -Bufotalon を $N/2$ アルコール性カリ ($f = 1.024$) に溶解し水浴上に僅に煮沸せしむること 30 分—1 時間の後冷却し, Phenolphthalein を指示薬として Tüpfel-methode に依り $N/2$ 鹽酸 ($f = 1.013$) を以て還測したり。

- (i) 物質 0.8553g 鹼化時間 30 分
 $N/2$ KOH の使用量 $40 \times 1.024 = 40.96\text{cc}$
 $N/2$ HCl の使用量 $34.90 \times 1.013 = 35.35\text{cc}$
 鹼化に要せし $N/2$ KOH の量 $40.96 - 35.35 = 5.61\text{cc}$
- (ii) 物質 1.5026g 鹼化時間 1 時間
 $N/2$ KOH の使用量 $40 \times 1.024 = 40.96\text{cc}$
 $N/2$ HCl の使用量 $29.95 \times 1.013 = 30.33\text{cc}$
 鹼化に要せし $N/2$ KOH の量 $40.96 - 30.33 = 10.63\text{cc}$

今若し ϕ -Bufotalon 中の Acetoxyl-gruppe 及 Lactonring を鹼化せしむる爲 2Mol の KOH を攝取せんには (i) に於て 7.74cc, (ii) に於て 13.58cc の $N/2$ KOH を消費せざるべからず。従つて實驗數 (i) 及 (ii) は明かに未鹼化物の存在を示せり。

ϕ -Bufotalon の回収. (i) の滴定中和液は嚙て黄色の沈澱を沈降するに至るを以て醋酸酸性となし充分沈着せしめて之を濾別したり。帶褐黄色結晶性粉末にして Fp. 230-240° (發泡下) を示し、炭酸ソーダに不溶性にして分析の結果原物質 ϕ -Bufotalon $C_{26}H_{34}O_6$ に一致す。

分析

物質 0.0924g,	CO ₂ 0.2384g,	H ₂ O 0.0632g,	C 70.37,	H 7.65
$C_{26}H_{34}O_6$ とするの理論數			„ 70.54,	„ 7.75

Desacetyl- ψ -bufotalonsäure の分離. 上記回収 ψ -Bufotalon の濾別母液を減壓にて濃縮し醋酸エステルにて振盪抽出す. 次に芒硝にて乾燥後其の減壓蒸溜残渣を稀アルコールより結晶せしむ. 本物質は白色にして ca 105° にて sintern し Fp. 150-160° (発泡下) を示す. 炭酸ソーダに容易に溶解し, 分析の結果 Desacetyl- ψ -bufotalonsäure $C_{24}H_{34}O_6$ に一致す.

分析

物質 0.0956g,	CO ₂ 0.2412g,	H ₂ O 0.0713g,	C 68.81,	H 8.34.
$C_{24}H_{34}O_6$ としての理論数			„ 68.85,	„ 8.19.

(ii) の滴定中和液は醋酸酸性となしたる後減壓にて可及的にアルコールを溜去し, 炭酸アルカリにてアルカリ性となし水浴上に加温しつつ沈澱の溶消に努めたり. 僅少の不溶性部分(ψ -Bufotalon)を濾過し母液を(i)と同様にして處分したり.

2. ψ -Desacetyl- ψ -bufotalonsäure のメチル化. 0.159g の Desacetyl- ψ -bufotalonsäure を 3cc のメタノールに溶解したるものを, 豫め 0.5cc の Nitrosomethylurethan より造れる Diazomethan (0.18-0.2g) のエーテル溶液中加入すれば瞬時に反應して泡沸す. 尚 1 夜間放置して處分したり. 白色にして 85° にて sintern し Fp. 115-120° (発泡下) を示し, 又炭酸アルカリに溶解せず. メトキシル基定量の結果 Desacetyl- ψ -bufotalonsäuremethylester $C_{24}H_{36}O_5$ (OCH_3) に一致す.

メトキシル基定量

物質 0.0430g,	AgJ 0.0212g,	CH ₃ O 6.51
$C_{24}H_{36}O_5$ ($-OCH_3$) としての理論数		„ 7.17

3. Desacetyl- ψ -bufotalonsäuremethylester のアセチル化. 0.5g の Desacetyl- ψ -bufotalonsäuremethylester を 3cc の無水醋酸に溶解し, 水浴上に 3 時間加熱したる後(其の溶液 1 滴を採り数滴の無水醋酸を加へて稀釋し之に濃硫酸 1 滴を加へしも Desacetyl- ψ -bufotalonsäuremethylester と全く同じく赤褐色を呈し漸次焦茶色に變化するのみ), 内容在水中に注入し過剰の無水醋酸を分解せしめ, 硝子棒にて摩擦しつつ飴狀物を器壁に附着固化せしむ. 次に母液を傾瀉し各々を醋酸エステルにて抽出し, 抽出液は常法に依りて處理し, 淡黄色の結晶性物質を得たり. 105° にて sintern し Fp. 130-140° を示し發泡せず. 之を鹼化するに 2Mol の KOH を要し, 又鹼化液を硫酸酸性にて水蒸氣蒸溜に附して得たる溜液は之を中

和するに 1 Mol の KOH を要するを以て Monoacetyl-誘導體なること疑なし.

Monoacetyl-desacetyl- ϕ -bufotalonsäuremethylester の鹼化.

(i) 0.1008g の物質を 15cc の $\frac{N}{5}$ アルコール性カリ ($f = 0.953$) に溶解し, 水溶上に 1 時間煮沸反應せしめ, 冷後 Phenolphthalein を標示薬とし $\frac{N}{5}$ HCl ($f = 0.939$) を以て還測したり.

$$\frac{N}{5} \text{ KOH の使用量} \quad 15.17 \times 0.953 = 14.45\text{cc}$$

$$\frac{N}{5} \text{ HCl の使用量} \quad 13.25 \times 0.939 = 12.44\text{cc}$$

$$\text{鹼化に要せし } \frac{N}{5} \text{ KOH の量} \quad 14.45 - 12.44 = 2.01\text{cc}$$

然るに物質 ($\text{C}_{27}\text{H}_{38}\text{O}_7$ 即 Monoacetyl-誘導體として) 0.1008g に對し理論上 2Mol の KOH は $\frac{N}{5}$ KOH として 2.10cc に相當す. 従つて Acetyl-gruppe の附着せる OH は第 1 級若くは第 2 級にして $-\text{COCH}_3$ の同時に 鹼化せられたるを知る.

(ii) 0.2000g の物質を 15cc の $\frac{N}{5}$ アルコール性カリ ($f = 0.953$) に溶解し, 水溶上に 1 時間煮沸反應せしめたる後, N-硫酸にて微に酸性となして水蒸氣蒸溜に附し, 溜液の酸性を呈せざるに至らしむ. 溜液に Phenolphthalein を滴加し $\frac{N}{5}$ -KOH ($f = 0.953$) を以て滴定せしに此の $2.05 \times 0.953 = 1.92\text{cc}$ を要したり. 然るに物質 ($\text{C}_{27}\text{H}_{38}\text{O}_7$ 即 Monoacetyl-誘導體として) 0.2g に對し理論上 1 Mol の KOH は $\frac{N}{5}$ -KOH として 2.10cc に相當するを以て明かに 1 個の Acetyl-gruppe を結合せり.

4. Desacetyl- ϕ -bufotalonsäuremethylester に對する Hydroxylamin の作用.
0.85g の Desacetyl- ϕ -bufotalonsäuremethylester を 58cc の 96% アルコールに溶解し, 之に 0.5g の鹽酸ヒドロキシルアミン及 1.6g の KOH を加へ, 更に 10cc の水を加へて沸騰水溶上に 1 時間加熱し 1 夜間放置す. 翌日減壓にてアルコールの大部分を溜去したる後, 醋酸酸性となし醋酸エステルにて抽出したりしが, 此際醋酸エステルに不溶性の部分は之を濾別せり. 醋酸エステル溶液を芒硝にて乾燥後, 減壓にて溶媒を溜去し残渣を稀アルコールより結晶せしめたり. 淡橙黄色を帶び, 165° にて sintern し Fp. $200-201^\circ$ (發泡下) を示す. Lassaigne 氏反應顯著にして, 又炭酸アルカリに溶解せず. Oxaminoxim の反應陰性なり, 即ち Fehling 氏液を還元せず, 酸化汞(黄色)及水と共に煮沸するも綠青色の呈色反應なし(ニトロゾ化合物を生成せざる證). 分析の結果 $\text{C}_{24}\text{H}_{34}\text{O}_5\text{N}_2$ に一致し, Des-

acetyl- ϕ -bufotalon-dioxim なること明かなり.

分析

物質 0.0998g, CO_2 0.2458g, H_2O 0.0713g, C 67.17, H 8.00
 „ 0.1024g, N_2 5.5cc (19°, 754mm) N 6.23
 $\text{C}_{24}\text{H}_{32}\text{O}_3 (= \text{NOH})_2$ としての理論数 C 66.93, H 7.96, N 6.51

5. $\text{N}/_2$ アルコール性カリに依る ϕ -Bufotalin の鹼化. 0.3572g の ϕ -Bufotalin を 20cc の $\text{N}/_2$ アルコール性カリ ($f=1.024$) に溶解し, 水溶上に 僅に煮沸せしむること 30 分の後冷却し, Phenolphthalein を標示薬とし $\text{N}/_2\text{-HCl}$ ($f=1.024$) を以て還測したり.

$\text{N}/_2\text{-KOH}$ の使用量 $20 \times 1.024 = 20.48\text{cc}$

$\text{N}/_2\text{-HCl}$ の使用量 $16.98 \times 1.024 = 17.38\text{cc}$

鹼化に要せし $\text{N}/_2\text{-KOH}$ の量 $20.48 - 17.38 = 3.1\text{cc}$

然るに 2 Mol の KOH を攝取せんには本物質 0.3572g に對し理論上 3.2cc の $\text{N}/_2\text{-KOH}$ を必要とするを以て, Acetyloxy-gruppe 並に Lactonring の鹼化せられたること明かなり.

Desacetyl- ϕ -bufotalinsäure の分離. 上記滴定中和液を醋酸にて微に酸性となし, 減壓にてアルコールの大部分を去り濃縮したる後, 析出せる飴狀物を醋酸エステルを以て抽出し, 芒硝にて乾燥せり. 次に醋酸エステルを溜去し, 残渣を稀アルコールより結晶性に導きたり. 白色にして Abderhalden 乾燥器にて 40° にて乾燥したるものは 95° にて sintern し Fp. 130° (發泡下) を示す. 炭酸アルカリに可溶性なるも念の爲次の如くジアゾメタンに依るメチル化を行ひたり.

6. Desacetyl- ϕ -bufotalinsäure のメチル化. 0.15g の Desacetyl- ϕ -bufotalinsäure に 15cc の乾燥エーテルを加へ, 次に 0.5cc の Nitrosomethylurethan より造れる Diazomethan のエーテル溶液を加ふれば, 最初不溶性にして飴狀となりて器底に沈降せる物質は忽ち發泡しつつ反應し溶消するを認む. 依つて更に一夜間放置したる後處分したり. 乾燥し恒量に達しめたるものは 80° にて sintern し Fp. 110-115° を示し, Desacetyl- ϕ -bufotalinsäure よりも融點低し.

メトキシル基定量

物質 0.0400g, AgJ 0.0190g, CH_3O 6.27,
 $\text{C}_{24}\text{H}_{32}\text{O}_5 (-\text{OCH}_3)$ としての理論数 „ 7.14,

7. Desacetyl- ϕ -bufotalinsäuremethylester に對する Hydroxylamin の作用.

0.5g の Desacetyl- ψ -bufotalinsäuremethylester を 17cc のアルコール (96%) に溶解し、之に 0.15g の鹽酸ヒドロキシルアミン及 0.35g の KOH (85%) を加へ、更に 3cc の水を加へて全溶せしめたる後沸騰水浴上に致し 1 時間煮沸反應せしむ。40 時間放置後減壓にてアルコールを除去し、水にて稀釋し、醋酸酸性となして醋酸エステルを以て振盪抽出す。此際 Desacetyl- ψ -bufotalonsäuremethylester に於ける如く醋酸エステルに不溶性の部分は生ぜざりき。次に醋酸エステル液を芒硝にて乾燥せしめ、其の蒸溜殘渣を稀アルコールより結晶せしむ。微黄色にして 140° にて sintern し漸次黄褐色を帶び Fp. 170-174° (發泡下) を示す。又炭酸アルカリに溶解せず、Lassaigue 氏反應顯著にして Oxim の證なり。窒素分析の結果は Monoxim に一致し、Desacetyl- ψ -bufotalonsäuremethylester の場合に徴し、Desacetyl- ψ -bufotalinoxim なること明かなる所なれども尙念の爲 0.0411g の物質を用ひ Zeisel 氏法に依りてヨード水素酸(無水醋酸添加)と共に煮沸分解せしめ、全く AgJ の沈澱の生ぜざることを確めたり。

窒素分析

物質 0.1500g,	N ₂ 4.70cc (18°, 748.8mm)	N 3.62
C ₂₄ H ₃₄ O ₄ (=NOH) とするの理論數		„ 3.36

8. ψ -Bufotalin の接觸還元 2g の ψ -Bufotalin を 100cc の無水アルコールに溶解し、之を豫め 0.1g の獸炭と 20cc の 1% 鹽化パラジウム熱溶液 (0.12g の Pd に相當す) との混合物を水素氣流中に振盪し置きたるものに加へ、再び水素氣流中に振盪したり。5 1/2 時間にして 80cc の水素を吸収し更に 15 時間にて 140cc の水素を吸収せり。都合 220cc の水素を吸収し、2 Mol とするの理論數 218cc (20°, 746.8mm) に一致す。

Tetrahydro- ψ -bufotalin の分離 念の爲尙 8 時間振盪したる後、パラジウム炭を濾別し、減壓にてアルコールを溜去したり。殘渣は無色飴狀なるを以て減壓にて更に膨脹せしめて乾燥したる後、乾燥エーテルと共に 1 時間靜に煮沸せしめて冷却し易溶部と難溶部とに分割したり。

(i) 難溶部は醋酸エステルにて處理したる後稀アルコールより結晶せしむ。Abderhalden 乾燥器中にて沸騰クロロホルム上に恒量に達せしめたるものは、85° にて sintern し始め、Fp. 120-130° を示し漸次泡出して 150° にて全體發泡す。Liebermann 氏反應は始め赤紫色を呈し漸次褐色となる。分析の結果 Tetrahydro-

ψ -bufotalin $C_{26}H_{40}O_6$ に一致す.

分析

物質 0.0966g, CO_2 0.2454g, H_2O 0.0760g, C 69.28, H 8.80
 $C_{26}H_{40}O_6$ としての理論数 „ 69.59, „ 8.99

(ii) エーテル易溶部はエーテルを蒸發濃縮したる後石油エーテル (Kp. 35-52°) を滴加し放置するも結晶せざるを以て再び溶媒を溜去したるに、既に一部エーテルに難溶性となれり. 依つて之を濾別し (i) に於ける如く醋酸エステルにて處理し、稀アルコールより結晶せしめたり. 斯くして之を全部結晶性となすことを得. 本物質は 80° にて sintern し始め Fp. 115-125° を示し 155° にて全體發泡す. Liebermann 氏反應は (i) に於ける如く遂に黄褐色に終る. 分析の結果は $C_{26}H_{40}O_6$ に一致し (i) と同様に Tetrahydro- ψ -bufotalin なり.

分析 (物質は Abderhalden 乾燥器中にて 60° にて恒量を得せしむ)

物質 0.0930g, CO_2 0.2356g, H_2O 0.0742g, C 69.09, H 8.93
 $C_{26}H_{40}O_6$ としての理論数 „ 69.59, „ 8.99

9. Tetrahydro- ψ -bufotalin の鹼化. 0.9492g の Tetrahydro- ψ -bufotalin を 50cc の $N/2$ アルコール性カリ ($f = 0.9894$) に溶解し水浴上に 1 時間煮沸反應せしめ、冷後 $N/2$ -HCl ($f = 1.0526$) を以て還測したり. 但し Phenolphthalein を標示薬とし Tüpfel-methode に依る.

$N/2$ -KOH の使用量 $50 \times 0.9894 = 49.47cc$

$N/2$ -HCl の使用量 $40.2 \times 10.526 = 42.27cc$

鹼化に要せし $N/2$ KOH の量 $49.47 - 42.27 = 7.20cc$

Acetoxy-group 及 Lactonring を鹼化せしむべき 2Mol の KOH に對する理論数

$$4000 \times \frac{0.9492}{C_{26}H_{40}O_6} = 4000 \times \frac{0.9492}{448.3} = 8.47cc$$

理論数 8.47cc に對し $N/2$ KOH の消費量 7.20cc は物質の 85%が鹼化せられたることを示す.

Desacetyl-tetrahydro- ψ -bufotalin の分離. 上記滴定中和液を醋酸々性となし減壓濃縮してアルコールの大部分を溜去すれば、漸次鹼化物は黄褐色の飴狀物となりて析出するを以て之を冷却し醋酸エステルを以て抽出せり. 芒硝にて乾燥後溶媒を溜去し、稀アルコールより結晶性に導きたり. 素焼板上に乾燥したるもの得量 0.725g, Liebermann 氏反應は最初 Tetrahydro- ψ -bufotalin に於ける如く

赤紫色を呈せず, 橙赤色にして漸次赤褐色, 紫褐色を経て汚綠色となり, 橙黄色を経て褪色す. 60° にて恒量を得せしめたるものは炭酸アルカリに不溶性にして, Desacetyl-tetrahydro- ϕ -bufotalinsäure の再びラクトン化し Desacetyl-tetrahydro- ϕ -bufotalin となれることを示すものなり. 100° にて sintern し Fp. $120-135^{\circ}$ (發泡下) を示す.

10. Desacetyl-tetrahydro- ϕ -bufotalin のアセチル化. 0.5g の Desacetyl-tetrahydro- ϕ -bufotalin を 4cc の無水醋酸に溶解し沸騰水浴上に 3 時間加温反應せしむ. 冷後水を加へて過剰の無水醋酸を分解せしめ, 析出せる飴狀物を醋酸エステルにて抽出したり. 芒硝にて乾燥後, 其の減壓蒸溜殘渣を稀アルコールより結晶せしむ. 75° にて sintern し, $95-105^{\circ}$ にて全體濕潤し Fp. $140-144^{\circ}$ を示す. 本物質は炭酸アルカリに全く溶解せず. Liebermann 氏反應は橙赤色なり. 之を鹼化するに 3 Mol の KOH を要するを以て Diacetyl-desacetyltetrahydro- ϕ -bufotalin 即 Monoacetyl-tetrahydro- ϕ -bufotalin なること明かなり. 今若し ϕ -Bufotalin の第 3 級アルコールの隣に二重結合を假定すれば, 之が接觸還元の際に當然第 2 級のアルコールを生じ, 従つて Acetyl-gruppe を攝取すべき理なれども次項 Tetrahydro- ϕ -bufotalin に對するブロム水素酸の作用にて明かなる如く, Tetrahydro-化合物に於ても依然として第 3 級アルコールを現有するを以て斯かる憂なし.

Monoacetyl-tetrahydro- ϕ -bufotalin の鹼化. 0.2452g ($\frac{1}{2000}$ Mol) の物質を 20cc の $N/5$ アルコール性カリ ($f = 0.9580$) に溶解して水浴上に 1 時間煮沸鹼化せしめ. 冷後 Phenolphthalein を標示薬とし $N/10$ -HCl ($f = 1.0526$) を以て還測したり.

使用せし $N/5$ -KOH の 量 $20.00 \times 0.958 = 19.16\text{cc}$

$N/10$ -KOH として $19.16 \times 2 = 38.32\text{cc}$

使用せし $N/10$ -HCl の 量 $23.10 \times 1.0526 = 24.31\text{cc}$

鹼化に要せし $N/10$ -KOH の 量 $38.32 - 24.31 = 14.01\text{cc}$

然るに 0.2452g の物質中 2 個の Acetoxy-grouppe 及 1 個の Lactonring を鹼化せしむるには 3Mol の KOH 即 $N/10$ -KOH 15cc を必要とするを以て本物質は Diacetyl-desacetyltetrahydro- ϕ -bufotalin 即 Monoacetyl-tetrahydro- ϕ -bufotalin なること明かなり. 因に Acetoxy-grouppe 1 個なる時は理論上 10.00cc の $N/10$ -KOH を必要とす.

11. Tetrahydro- ψ -bufotalin に對するブロム水素酸の作用. 0.6g の Tetrahydro- ψ -bufotalin を 20cc の氷醋酸に溶解し(微黄色), 氷水にて冷却しつつ之に乾燥ブロム水素酸を導通飽和せしめしに, 内容暗赤褐色を呈し濃稠舍利別狀となれるを以て, 其儘氷水中に放置す. 3 晝夜後減壓下に 僅に加温せしめつつ過剰のブロム水素酸及氷醋酸を溜去し, 水を加へて攪拌せしに黄緑色の沈澱を得たり. 常法によりて精製し結晶性となしたるものは, 77° にて sintern し $97-100^{\circ}$ にて濕潤し Fp. 138° (黒褐色となりて發泡す) を示す. Beilstein 氏反應顯著にして Br を含有し, Liebermann 氏反應は黄 $\rightarrow$ 黄赤 $\rightarrow$ 黄色なり. 分析の結果は第 3 級アルコールの Br にて置換したる Tetrahydro- ψ -bufotalinbromid $C_{26}H_{39}O_5Br$ に一致す.

分析

物質 0.0992g,	CO_2 0.2226g,	H_2O 0.0710g,	C 61.20,	H 8.01,
„ 0.0990g,		AgBr 0.0372g,		Br 15.99
$C_{26}H_{39}O_5Br$ とする理論數		C 61.03,	H 7.69,	Br 15.63.

12. Tetrahydro- ψ -bufotalinbromid の鹼化. 0.2556g ($1/2000$ Mol) の Tetrahydro- ψ -bufotalinbromid を 20cc の $N/5$ -アルコール性カリ ($f = 0.9580$) に溶解して水浴上に 1 時間煮沸鹼化せしめ, 冷後 Phenolphthalein を標示薬とし Tüpfel-methode に依り $N/10$ -HCl ($f = 1.0526$) を以て還測したり.

使用せし $N/5$ -KOH の 量	$20.00 \times 0.958 = 19.16cc$
$N/10$ -KOH として	$19.16 \times 2 = 38.32cc$
使用せし $N/10$ -HCl の 量	$26.80 \times 1.0526 = 28.20cc$
鹼化に要せし $N/10$ -KOH の 量	$38.32 - 28.20 = 10.12cc$

然るに 0.2556g の物質中 1 個の Acetoxy-grouppe 及 1 個の Lactonring を鹼化せしむるには 2Mol の KOH 即ち $N/10$ -KOH 10cc を必要とするを以て本物質は明かに Acetyl-grouppe を有す.

Desacetyl-tetrahydro- ψ -bufotalinbromid の分離. 上記滴定中和液を更に $N/10$ -HCl にて微に酸性となしたる後, 減壓にてアルコールの大部分を溜去し, 殘部を醋酸エステルにて抽出せり. 芒硝にて乾燥後, 溶媒を溜去し, 稀アルコールより結晶せしむ. 微黄色にして 70° にて sintern し, $95-100^{\circ}$ にて軟化濕潤し Fp. $120-125^{\circ}$ (發泡下) を示す. 炭酸アルカリに溶解せず, Desacetyl-tetrahydro- ψ -bufotalinsäurebromid の再びラクトン化し, Desacetyl-tetrahydro- ψ -bufotalinsäure-

bromid となれるを示す. Liebermann 氏反應は黃褐色にして, 又 Beilstein 氏反應顯著なり (Br を含有す).

13. Desacetyl-tetrahydro- ψ -bufotalinbromid のアセチル化. 0.2g の Desacetyl-tetrahydro- ψ -bufotalinbromid を 2cc の無水醋酸に溶解し沸騰水浴上に 3 時間加温反應せしむ. 冷後水を加へて過剰の無水醋酸を分解し, 器壁に附着せる飴狀物を醋酸エステルにて抽出せり. 抽出液を常法に依りて處理し黃色結晶性物質を得たり. Abderhalden 乾燥器にて低温乾燥せしに, 55° にて sintern し, Fp. $75-90^{\circ}$ (黒褐色を呈す) を示せり. 炭酸アルカリに溶解せず, Beilstein 氏反應顯著にして, 又 Liebermann 氏反應は黃褐色を呈す. 之を鹼化するに 3Mol の KOH を要するを以て Diacetyl-desacetyltetrahydro- ψ -bufotalinbromid 即 Monoacetyl-tetrahydro- ψ -bufotalinbromid $C_{23}H_{41}O_6Br$ なること明かなり.

Monoacetyl-tetrahydro- ψ -bufotalinbromid の鹼化. 0.1500g の物質を 20cc の $N/5$ -KOH (アルコール性, $f=1.008$) に溶解し水浴上に 1 時間煮沸鹼化せしめ, 冷後 Phenolphthalein を標示薬とし Tüpfel-methode に依り $N/10$ -HCl ($f=1.052$) を以て還測したり.

使用せし $N/5$ -KOH の 量 $20 \times 1.008 = 20.16cc$

$N/10$ -KOH として $20.16 \times 2 = 40.32cc$

使用せし $N/10$ -HCl の 量 $31 \times 1.052 = 32.61cc$

鹼化に要せし $N/10$ -KOH の 量 $40.32 - 32.61 = 7.71cc$

然るに 0.15g の物質 (Diacetyl-desacetyltetrahydro- ψ -bufotalinbromid 即 Monoacetyltetrahydro- ψ -bufotalinbromid $C_{23}H_{41}O_6Br$ として) 中の 2 個の Acetoxygruppe 及 1 個の Lactonring を鹼化せしむるには 3Mol の KOH 即 8.13cc の $N/10$ -KOH を必要とするを以て, 本物質は Monoacetyl-tetrahydro- ψ -bufotalinbromid なること疑なし.

(昭和 7 年 12 月例會發表)