Journal of the Pharmaceutical Society of Japan

Editor: A. OGATA

YAKUGAKUZASSHI

Subeditor: S. TAKAGI

Y. Asahina u. M. Ishidate; Ueber den d-Epicampher.

[B. 66, 1913 (1913)]

Y. Asahina u. M. Ishidate; Ueber 5- und π -Oxycampher und ihre Derivate.

[B. 67, 71 (1934)]

R. Kitamura: Über die Einwirkung von Wasserstoffsuperoxyd auf organischen Schwefelverbindungen. (II. Mitteil.)

[Aus d. Kitamura Chem. Institut, Osaka.]

(Eingegangen am 27. Januar 1934)

In der ersten Mitteilung [Diese Zeitschrift 623, 1 (1934)] hat Verf. darüber gezeigt, dass bei der Einwirkung des alkalischen H_2O_2 auf verschiedene organische Schwefelverbindungen eine Entschwefelung in Sinne der nachfolgenden Gleichung stattfindet.

Da die Reaktion immer sehr günstig verläuft, hat Verf. dadurch mit folgenden Verbindungen eine quantitative Untersuchung, namentlich die Reaktionsgeschwindigkeitsbestimmung und die Mass- und Gewichtsanalyse des entstandenen SO_4 durchgeföhrt.

1. Allylthioharnstoff

2. Thioharnstoff

3. Thiobenzamid

4. Xanthogensaureskalium	C_2H_5OCSK
5. Thiocumazon
6. Thiocumothiazon
7. Rhodankalium	$KSCN$
8. 6-Methylthiouracil
9. Thiobenzanilid	$C_6H_5CSNHC_6H_5$
10. Thioformanilid	$HCSNHC_6H_5$
11. Thioacetanilid	$CH_3CSNHC_6H_5$

Die Reaktion ist in dem Mengenverhältnisse von 10 Mol H_2O_2 auf 1 Mol Substanz in 0.01 Mol-Lösung bei 20° in 0.13–1.5 manchmal in 2.5 Stunden quantitativ beendet. Man kann doch die Reaktion durch Steigerung der Konzentration noch schneller verlaufen lassen. z. B.

Substanz	Mol-Konz. d. Subst.	Mengen d. H_2O_2	Versuchs-Temp.	Zeit zur Vollend- ung d. Reaktion
Allylthioharnstoff	0.077	8.0 Mol	20°	9 Min.
Thiobenzamid	0.066	8.6	17	8

Dabei ist Erwärmung unnötig, vielmehr starkes Erhitzen ist schädlich. Bei der quantitativen Versuche ist es vorteilhafter, doppelt soviel Alkali als theoretischer Menge zu brauchen und dabei Ätzalkali trifft das Alkali-karbonat über, um die quantitativen Resultaten zu erzielen.

Diese Reaktion hat bei der Untersuchung von organischen Schwefelverbindungen nachfolgende Vorzüge.

1. Bei der Elementalanalyse des Schwefels in solcher Verbindungen, in der sich eine Doppelbindung zwischen C- und S-Atom befindet, gibt diese Methode genauere Resultaten als die von Carius und ist sogar bedeutend einfacher.
2. Durch Kombinierung dieser Methode mit der von Carius kann man die zwei Typen von Schwefelverbindungen: einen von $>C=S$ Ver-

bindungen und den anderen, unter einander bestimmen.

3. Bis heute giebt es keine allgemeine Methode, mit welcher einen im Zustande der Lösung sich befindende nicht ionisierten Schwefel in organischen Verbindungen quantitativ bestimmen kann. Jedoch kann man mit Hilfe dieser Methode in sehr verdünnten Lösungen, zwar in 0.001 Mol-Lösung, bequem ihn gewichts- oder massanalytisch bestimmen.

Im folgenden werden einige Beispiele unter vielen, die unter verschiedenen Bedingungen durchgeführt wurden, angegeben.

	SC $\begin{array}{l} \text{NHC}_3\text{H}_5 \\ \text{NH}_2 \end{array}$	KSCN	$\begin{array}{l} \text{C}_6\text{H}_5- \\ \text{CSNH}_2 \end{array}$	$\begin{array}{l} \text{C}_2\text{H}_5- \\ \text{OCSSK} \end{array}$	$\text{C}_6\text{H}_4\begin{array}{l} \text{NH-CS} \\ \\ \text{CH}_2\text{-O} \end{array}$	$\text{C}_6\text{H}_4\begin{array}{l} \text{NH-CS} \\ \\ \text{CH}_2\text{-S} \end{array}$	
Probe (g)	0.1162	0.2092	0.1960	0.2005	0.2039	0.1989	
Wasser (cc)	81.0	172.7	196.0	196.0	171.0	189.3	
N-KOH (cc)	9.0	4.3	5.0	4.0	9.0	4.7	
H_2O_2 (cc) (1 Mol-Lös.)	10.0	24.0	20.0	30.0	22.0	14.0	
Gesamtolum (cc)	100.0	204.0	221.0	205.0	222.0	208.0	
Mol-Konz. d. Sbst.	0.01	0.01	0.0065	0.0067	0.0057	0.0053	
H_2O_2 Mole 1 Mol : Sbst.	10.0	11.0	13.2	21.9	18.0	13.0	
Reaktionsdauer (Stdn).	2	2	2	2	1	2	
S% {	Gef.	27.39	32.47	23.21	39.96	19.04	17.74
	Ber.	27.61	33.00	23.39	40.01	19.39	17.70

	$\text{SC} \begin{array}{l} \text{NH-CO} \\ \text{NH-C(CH}_3\text{)=CH} \end{array}$	$\text{SC} \begin{array}{l} \text{NH}_2 \\ \text{NH}_2 \end{array}$	$\text{C}_6\text{H}_5\text{-} \\ \text{CSNHCH}_6\text{H}_5$	$\text{HC:} \\ \text{NHC}_6\text{H}_5$	$\text{CH}_3\text{-} \\ \text{CSNHCH}_6\text{H}_5$	
Probe (g)	0.1992	0.0761	0.1171	0.1391	0.1511	
95% Alkohol (cc)	—	—	11.0	30.0	—	
Wasser (cc)	197.0	50.0	16.5	20.0	50.0	
N/10-KOH (cc)	4.5 (N-KOH)	40.0	22.0	40.0	40.0	
H_2O_2 (1 Mol-Lös.) (cc)	22.5	10.0	5.5	10.0	10.0	
Gesamtolum	224.0	100.0	55.0	100.0	100.0	
Mol-Konz. d. Sbst.	0.0062	0.01	0.01	0.01	0.01	
H_2O_2 Mole: 1 Mol Sbst.	16	10	10	10	10	
Reaktionsdauer	1.5	2	2	2	3	
BaSO_4 (g)	0.3219	0.2335	0.1266	0.2355	0.2370	
S% {	Gef.	22.19	42.13	14.84	23.58	21.53
	Aer.	22.53	42.13	15.04	23.58	21.22

Zur Gewichtsanalyse benutzt man S-freies H_2O_2 -lsg. (Es wird durch einmalige Destillation käuflicher konz. H_2O_2 -Lösung in Vakuum erhalten.) Nachdem man die Substanz unter Zusatz von über 2 Mol. Alkali in Wasser gelöst und eine bestimmte Menge von S-freiem H_2O_2 hinzugegeben hat, läßt sie (1–2 Stdn.) Dann säuert man die Lösung mit HCl an und gibt BaCl_2 -Lösung hinzu. Das gefällte BaSO_4 läßt man ohne Erhitzen³⁾ eine Nacht stehen und filtriert, oder in üblicher Weise erhitzt man sofort und filtriert.

Reaktionsdauermessung durch Massanalyse.

Zuerst wird die Substanz in Wasser (od. Alkohol) und Ätzalkali- od. Alkalikarbonat-Lösung gelöst. Nachdem man eine bestimmte Menge von H_2O_2 einwirken liess, nimmt man einen Teil der Lösung nach einem bestimmten Zeitraum aus und titriert mit N/10-Säure (1), oder säuert man die Lösung zuerst mit N/10- HCl an und titriert die überschüssige Säure mit N/10- KOH zurück (Indikator: Methylorange oder Methylrot.) Wegen der Gegenwart von H_2O_2 ist Phenolphthalein nicht geeignet). Die Methode (1) ist nicht ganz genau, da die Reaktion während der Titration etwas weiter verläuft.

Durch die Methode (2) kann man eine gute Resultate erzielen.

(i) Thioharnstoff

Versuchs-Nr.	I	II	III	IV
$\text{SC(NH}_2)_2$ (g)	0,0761	0,0761	0,0761	0,0761
Wasser (cc)	54,0	5,00	45,0	50,0
N/10-KOH (cc)	40,0	40,0	40,0	40,0 ($\text{N/10-Na}_2\text{CO}_3$)
H_2O_2 (1 Mol-Lös.) (cc)	6,0	10,0	15,0	10,0
Gesamtvoolum (cc)	100,0	100,0	100,0	100,0

3) Filtrieren ohne vorher Erhitzen ist unbedingt notwendig, wenn man bei einem Gemisch von reagierten und nicht reagierten Schwefelverbindungen beiden quantitativ aus einander setzen will. Da der Reaktionsmechanismus in alkalischem und saurem Zusatz verschieden ist, kann man bei Anwendung der Erhitzungsmethode (In der III. Mitteilung wird Ausführliches beschrieben.) diese beiden Fälle nicht unterscheiden.

Mol-Konz. d. Sbst.	0,01	0,01	0,01	0,01
H ₂ O ₂ Mole: 1 Mol Sbst.				
Versuchs-Temp.	21°	21°	23°	20°
Reaktionszeit (Min.)	150	30	21	35

Fig. 1

(2) Allylthioharnstoff.

Versuchs-Nr.	I	II	III	IV	V (Na ₂ CO ₃)
$\text{S}=\text{C} \begin{smallmatrix} \text{NHC}_3\text{H}_5(\text{g}) \\ \text{NH}_2 \end{smallmatrix}$	0,1162	0,1162	0,1162	0,2	0,1162
Wasser (cc)	54,0	50,0	45,0	6,0	50,0
N/10-KOH (cc)	40,0	40,0	40,0	14,0	40,0
				(N/2-KOH) (N/10-Na ₂ CO ₃)	
H ₂ O ₂ (1 Mol-Lös.) (cc)	6,0	10,0	15,0	2,4	10,0
				(19,5 o/v)	
Gesamtvolum (cc)	100,0	100,0	100,0	22,4	100,0
Mol-Konz. d. Sbst.	0,01	0,01	0,01	0,077	0,01
H ₂ O ₂ Mole: 1 Mol Sbst.	6	10	15	8	10
Versuchs-Temp.	ca. 20°	ca. 20°	ca. 20°	20°–38°	19°
				Selbsterwärmung	
Reaktionszeit (Min.)	186	30	20	9	35

Fig. 2

(3) Thiobenzamid

Versuchs-Nr.	I	II	III	IV	V	VI
$\text{C}_6\text{H}_5\text{CSNH}_2$ (g)	0,1371	0,1371	0,1371	0,2000	0,1371	0,1371
N/10-KOH (cc)	40,0	40,0	40,0	11,7	40,0	40,0
				(N/2-KOH)	(N/10-K ₂ CO ₃)	(N/10-K ₂ CO ₃)
Wasser (cc)	54,0	52,0	50,0	8,3	52,0	50,0
H ₂ O ₂ (1 Mol-Lös.) (cc)	6,0	8,0	10,0	2,2	8,0	10,0
				(19,5 o/v H ₂ O ₂)		
Gesamtvolum (cc)	100,0	100,0	100,0	22,2	100,0	100,0
Mol-Konz. d. Sbst.	0,01	0,01	0,01	0,066	0,01	0,01
H ₂ O ₂ Mole : Sbst. 1 Mol	6	8	10	8,6	8	10
Versuchs-Temp.	20°	20°	20°	ca. 17°	20°	20°
Reaktionszeit (Min.)	nicht vollendet	110	51	9	nach langen Stdn.	300

Fig. 3

Fig. 4

(4) Xanthogensaureskalium

Versuchs.- Nr.	II	III	IV	V	VI	VII
C_2H_2OCSSK (g)	0,1603	0,1603	0,1603	0,1603	0,1603	0,1603
N/10-Alkali (cc)	KOH 40,0	KOH 40,0	Na_2CO_3 40,0	Na_2CO_3 40,0	Na_2CO_3 70,0	neutral 0,0
Wasser (cc)	48,0	35,5	48,0	35,5	5,5	75,5
H_2O_2 (1 Nol-Lös.) (cc)	12,0	24,5	12,0	24,5	24,5	24,5
Gesamtvolum (cc)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Mol-Konz. d. Sbst.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
H_2O_2 Mole: 1 Atom S	6	12,3	6	12,3	12,3	12,3
Versuchs-Temp.	17°	17°	20°	20°	20°	ca. 20°
Bemerkungen	klar	klar	geringe Trübung	geringe Trübung	klar	starke Trübung u. Geruch
Reaktionszeit (Min.)	nicht vollendet	40	nicht vollendet	nicht vollendet	40	nicht vollendet

Fig. 5

(5) Thiocumothiazon

VersuchsNr.	I	II
$\text{C}_6\text{H}_4 \begin{cases} \text{NH-CS} \\ \text{CH}_2\text{-S} \end{cases}$	0,1812	0,1812
N/10-KOH	40,0	40,0
Wasser	150,0	50,0
H ₂ O ₂ (1 Mol-Lös.)	10,0	10,0
Gesamtvolum	200,0	100,0
Mol-Konz. d. Sbst.	0,005	0,01
H ₂ O ₂ Mole : 1 Mol Sbst.	10	10
Versuchs-Temp.	20°	20°
Reaktionszeit in Min.	60	20

Fig. 6

(6) Thiobenzanilid (vergl. Fig. 6, I)

$\text{C}_6\text{H}_5\text{CSNHC}_6\text{H}_5$ (g)	0,2132
94% $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (cc)	20,0
Wasser (cc)	30,0
N/10-KOH (cc)	40,0
H_2O_2 (1 Mol-Lös.) (cc)	10,0
Gesamtvolum (cc)	100,0
Mol-Konz. d. Sbst.	0,01
H_2O_2 Mole: 1 Mol Sbst.	10,0
Versuchs-Temp.	Zimmer-Temp. (25° – 28°)
Reaktionszeit (Min.)	60

(7) Thioformanilid (vergl. Fig. 6, II)

$\text{HCSNHC}_6\text{H}_5$ (g)	0,1371
95% $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (cc)	30,0
N/10-KOH (cc)	40,0
Wasser (cc)	20,0
H_2O_2 (cc)	10,0
Gesamtvolum (cc)	100,0
Mol-Konz. d. Sbst.	0,01
H_2O_2 Mole: 1 Mol Sbst.	10
Versuchs-Temp.	20°
Reaktionszeit (Min.)	50

(8) Thioacetanilid (vergl. Fig. 6, III)

$\text{CH}_3\text{CSNHC}_6\text{H}_5$ (g)	0,1512
N/10-KOH (cc)	40,0
Wasser (cc)	50,0
H_2O_2 (1 Mol-Lös.) (cc)	10,0
Gesamtvolum (cc)	100,0
Mol-Konz. d. Sbst.	0,01
H_2O_2 Mole: 1 Mol Sbst.	10
Versuchs-Temp.	20°
Reaktionszeit (Min.)	110

(9) 6-Methylthiouracil (vergl. Fig. 7, I)

N/10-KOH (cc)	40.0	Mol-Konz. d. Sbst.	0.01
Wasser (cc)	50.0	H ₂ O ₂ Mole: 1 Mol Sbst.	10
H ₂ O ₂ (1 Mol-Lös.) (cc)	10.0	Versuchs-Temp.	20°
Gesamtolum (cc)	100.0	Reaktionszeit (Min.)	8

Fig. 7

(10) Thiocumazon (vergl. Fig. 7, II)

$\text{C}_6\text{H}_4 \begin{cases} \text{NH-CS} \\ \text{CH}_2\text{-O} \end{cases}$ (g)	0.1651		
N/10-KOH (cc)	40.0	Mol-Konz. d. Sbst.	0.01
Wasser (cc)	50.0	H ₂ O ₂ Mole : 1 Mol Sbst.	10
H ₂ O ₂ (1 Mol-Lös.) (cc)	10.0	Versuchs-Temp.	20°
Gesamtvolum (cc)	100.0	Reaktionszeit (Min.)	80

H. Kondo und S. Ikawa: Ueber Des-Acetyl- ψ -bufotalin-säureamid und dessen Hofmannsche Umlagerung (Untersuchung über die Bestandteile des "Senso" III.)

[Aus d. pharm. Inst. d. Univ. Tokyo]

(Eingegangen am 5. Feb. 1934)

In der II. Mitteilung (Diese Zeitschrift **614**, 62) haben die Verfasser gezeigt, dass die durch Verseifung des Acetoxyls vom ψ -Bufotalin entstandene OH-Gruppe der Des-Acetyl- ψ -bufotalinsäure gleichzeitig in beständige Keto-Form tautomerisiert und infolgedessen eine Doppelbindung verloren geht, worauf das Vorhandensein einer Gruppe $>\text{C}=\text{C}-\text{O}.\text{COCH}_3$ im ψ -Bufotalin nachgewiesen wurde. Aber betreffs der Stellung der anderen Doppelbindung ist die Frage noch offen geblieben, ob sie im Lactonring ψ -Bufotalins befindlich ist, wie es Prof. H. Wieland in seinem Bufotalin nachgewiesen hat, oder nicht.

Wenn nun ein ungesättigter Lactonring im ψ -Bufotalin sich vorstellen könnte, so müsste es ein $\Delta^{\alpha,\beta}$ ungesättigter sein, wie ca. (I) od. (II), sei es aus der tautomerisierbaren oder anderen Doppelbindung bestanden, da die gesättigte Natur der β,γ -Stellung in voriger Mitteilung höchst wahrscheinlich ist.

過酸化水素と有機硫黄化合物の反應に就て (第二報)

定量的研究 (第一報)

北 村 良 一

〔北村化學研究所(大阪)〕

(昭和8年12月1日受理)

R. Kitamura: Über die Einwirkung von Wasserstoffsperoxyd auf organischen Schwefelverbindungen. (II. Mitteil.)

I. Mitteil. über quantitative Untersuchung.

著者は前報文に於てSの直接結合せるCに任意の二重結合を保有する代表的有機硫黄化合物は alkali 性 H_2O_2 によりてSを H_2SO_4 として脱硫しSの位置にOを置換するも、二重結合なき場合にはかかる反應の生起せざる事を報告せり。

本反應は猛烈にして發熱を伴ひ濃溶液に於ては殆ど反應瞬時に終結し又適當の條件に於ては反應成績物の收得量非常に良好なり。故に本報告に於ては本反應の量的關係の研究結果を記述し且前報文に掲げた本反應を表示する方程式

が果して正當なりや否やも併せて吟味せんとす。

扱て此目的には前述の如くSを SO_4 に變化することを利用しここに生成せる H_2SO_4 を測定せば本反應の經過を容易に追及する事を得べし。依つて

- 1 $BaSO_4$ として沈澱せしむる重量分析.
- 2 反應速度の測定.
- 3 容量分析.

を後に示す如き方法にて次の各化合物に就て實驗せり。此結果本反應は精密なる意味に於て定量的に完結する事、且普遍的なる事、竝に前記方程式の正しき事を立證し得たり。

1. Allylthioharnstoff	$\text{SC} \begin{smallmatrix} \text{NHC}_3\text{H}_5 \\ \text{NH} \end{smallmatrix}$	3. Thiobenzamid	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CSNH}_2$
2. Thioharnstoff	$\text{SC}(\text{NH}_2)_2$	4. Xanthogensaureskalium	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OCSK}$

5. Thiocumazon		8. 6-Methylthiouracil	
6. Thiocumothiazon		9. Thiobenzanilid	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CSNHC}_6\text{H}_5$
7. Rhodankalium	KSCN	10. Thioformanilid	$\text{HCSNHC}_6\text{H}_5$
		11. Thioacetanilid	$\text{CH}_3\text{CSNHC}_6\text{H}_5$

今之等の實驗成績を綜合するに反應速度は各化合物の構造, 濃度, H_2O_2 の量, 溫度等種々の因子に依り變化すべきも著者の標準法即ち可檢物質の濃度 0.01 Mol 水溶液に於て物質 1 Mol に對し H_2O_2 10 Mol, KOH 4 Mol 20° の場合にては反應完結時間は略 0.13-1.5 時間の間にあり. 故に今之等の硫黄化合物中の S を定量せんと欲せば此時間以後に於て其反應溶液に就て普通の方法により H_2SO_4 の重量又は容分析をなせば可なり. 反應終結時間未知の化合物にありても前記の條件にて 2.5 時間放置せば充分ならんと思ふ. ¹ (此事竝に構造と速度との關係に就ては尙後の報告を参照されたい). 以上は S 化合物の濃度 0.01 Mol の如き非常に稀薄なる場合なるが尙一層迅速を望む時は其の濃度を高むれば極めて短時間に完結せしむる事を得べし. 例へば

物質	物質の Mol 濃度	物質 1 Mol: H_2O_2 Mol	實驗溫度	反應完結所要時間
Allylthioharnstoff	0.077(= 0.89%)	8.0	20°	9 分
Thiobenzamid	0.066(= 0.9%)	8.6	17°	8 分

又此際加熱は必要なく強き加熱は場合に依り反つて害あり. 何故なれば本反應の要求する以外の形の S の一部も H_2SO_4 となる事あるを以てなり. alkali は通常 4 Mol 理論量 2 Mol を用ふれば種々の場合に適切なり (例へば alkali 量少なき時檢體の溶解困難なる場合多し又酸性化合物にありては 2KOH にては不足なり. 其他反應終結後尙幾分の alkali の存在を可とす). 苛性アルカリを用ひたる時は炭酸アルカリのときに比し反應稍迅速に進行す. 後者は物質に依り前者に比し可なり遅き事あり. 故に物質の變化, 反應自體の研究等を顧慮する事なく單に分析の成績のみを求むる場合には苛性アルカリを用ふるを得策とす.

本反應の定量的應用例の 1-2 を掲ぐれば

(1) 二重結合を有する C に直接結合せる S の化合物 (äther 形 S, 環内 S を除く) ² (之等の形の S 化合物に就ては後に報告す). 中 S の定量分析を Carius 氏法に代へ實施するに極めて正確なる成績を得べし. 且その技術甚簡單にして無機硫酸の

定量と殆ど同様なり、故に Carius 氏法に比し多大の時間を節約し得るのみならず、誤差を生ずる機會極めて少なく又特殊の裝置等を必要とせざるを以て一時に多數の檢體に就て實施し得らる。

(2) 従て簡単に物質の純度檢定の用に供する事を得、又 Carius 氏法と併用する事により前記結合状態の S と然らざるものとの完全なる分離定量を容易く遂行し得べし。

(3) 有機硫黄化合物をそのまま溶液として其中の S を定量することは今日迄その方法の記載を見ず、然るに本方法に依る時はよく 0.01 Mol 以下の稀薄溶液中にても重量及び容量法に依り簡單且精密に定量する事を得。³ (0.001 Mol 溶液にても完全に定量する事を得(第七報参照).)

以上に依り著者の新法は今後尙多くの種屬の化合物に實驗を重ねその普遍性なる事を確證し得ば有機硫黄化合物の化學研究上頗る興味ある事と信ぜらるるを以て更にその研究を進めんと欲す。

實 驗 の 部

(1) BaSO_4 となして沈澱せしむる重量分析。

先ず試料 1 Mol を 2 Mol より過量の Alkalilauge 並に水に溶かし之に一定量の H_2O_2 水(S 絶對不含)⁴ (H_2SO_4 不含の H_2O_2 水は丸石製藥會社より特製供給を受けたり、茲に當時の技師長須田勝三郎氏の好意に對し謹謝の意を表す、現今は濃厚普通過酸化水素を單に眞空蒸溜して自製す、但し此際ゴム栓等に接觸する機會を可及的(或は絶對に)避くるを要する事勿論なり。)を冷時に於て加へ室溫のまま一定時間(1-2 時間)放置す、此際稀薄液にても少しく發熱すべし、今かかる實驗を 2 種宛行ひ、一は一定時間放置後直に又他の一つは同様室溫放置後更に 30-40 分間 80° 内外に溫めたる後共に HCl 酸性となし BaCl_2 にて BaSO_4 として沈澱せしむ、之に依り加熱の影響を調査せり。

茲に沈澱せる BaSO_4 は (1) 加熱せず室溫のまま一夜放置後濾過するか (2) 常法の通り直ちに加熱處理して濾過し坩堝中熱灼秤量す。

本報告にては實驗の嚴正を期するため HCl 酸性となしたる後も加熱せず室溫に一夜放置後濾過せり、以下多數の實驗中より摘録すべし。

本反應を起し得べき S 化合物と然らざるものとの混合物(又は同一分子中かかる二様の形の S を有する場合)の完全なる分離定量又は本反應自體の研究を行ふ際には是非とも

(1) の非加熱法を取る事必要なり。何故なれば 4 Mol 以上の H_2O_2 を用ひたる時は HCl 酸性後尙幾分の H_2O_2 残存し且 H_2O_2 は酸性にては熱に對し可なり安定なる故加熱せばアルカリ性のときに反應せざりし他型の化合物に更に酸性 H_2O_2 が作用し幾分かの SO_4^{--} を生成する事あるを以てなり。(酸性冷 H_2O_2 液にてはかかる作用極めて微弱に過ぎず) 蓋しアルカリ性と酸性の兩場合は各その反應の機作を異にするを以て(第三報に詳説)加熱法にてはこの兩化合物の S の嚴正なる區別をなす事不可能なり。然れども以上の如き兩型 S の共存せざる時は何れの方法をとるも無論結果は同一なり。若し夕暮實驗を行ひ一夜放置するとせば加熱法よりも却つて簡略なり。

(1) Allylthioharnstoff (Merck)

Allylthioharnstoff は實驗 [I] 及 [IV] に見る如く反應溫度以外の條件を變ずるも S 定量結果に變化なし又 [I] と [II] とを比較するに成績全く同一にして加熱の必要を認めず。[III] は稍物質の濃度を高め H_2O_2 の量を減じたるも定量的に BaSO_4 を得たり。[IV] [V] の成績不良なるはアルカリ性 H_2O_2 の分解速度急なるためにて、又 [VIII] の如くアルカリを加へざる場合には室温 2 時間にては殆んど全く BaSO_4 を沈澱せず 72 時間反應せしめて僅に理論量の 19.6% を、又同じく中性 80° 3 時間加熱するも漸く 63.4% を脱硫したるのみなり。[IX]

實驗番號	I	II	III	IV	V
試料 (g)	0.2019	0.2026	0.3338	0.5024	0.4988
水 (cc)	198	198	0	0	0
10% KOH (cc)	3.2	3.2	6	6	6
H_2O_2 (6.76 Mol-Lös cc)	3.0	3.0	20.0	20.0	20.0
反應液全量 (cc)	204.2	204.2	26.0	26.0	26.0
物質 1 Mol : H_2O_2 Mol 數	12 Mol	12 Mol	6 Mol	4 Mol	4 Mol
物質の Mol 濃度	0.0086	0.0086	0.110	0.166	0.165
反應溫度及時間	室温 2 時間	室温 2 時間 80° 0.5 時間	室温 2 時間	室温 1 時間	室温 2 時間
BaSO_4	0.4077	0.4109	0.6724	0.9799	0.8518
S%	27.72	27.82	27.66	26.77	23.72
$\text{NH}_2\text{-CS-NHC}_3\text{H}_5$	(M. G. 116.15) として S% 計算數 27.61				

實驗番號	VI	VII	VIII	IX
試料 (g)	0.1162	0.1162	0.1162	0.1162
水 (cc)	85	18.0	90.0	90.0
10% KOH (cc)	5.0	5.0	0	0
H_2O_2 (1 Mol-Lös cc)	10.0	15.0	10.0	10.0
反應液全量 (cc)	100.0	200.0	100.0	100.0

物質 1 Mol: H_2O_2	10 Mol	15 Mol	10 Mol	10 Mol
物質の Mol. 濃度	0.01	0.02	0.01	0.01
反應溫度及時間	室溫 2 時間	室溫 2 時間	室溫 2 時間	80° 3 時間
BaSO_4	0.2316	0.2300	0.0455	0.1490
S%	27.39	27.18	(a) 5.37 (b) 5.31	17.00

(2) Thioharnstoff (Kahlbaum)

Thioharnstoff の場合も加熱の必要なく稀薄液にて 2 時間以内に全 S を定量的に分離す。

實驗番號	I	II	III	IV
試料 (g)	0.1881	0.2005	0.6155	0.07612
水 (cc)	197	197	0	0
KOH-液 (cc)	4.4 (10%)	4.4 (10%)	20.0 (10%)	40.0 ($\text{N}/_{10}$)
H_2O_2 (cc)	4.8(6.76Mol-Lös.)	4.8(6.76Mol-Lös.)	8.0(0.9Mol-Lös.)	10.0(1Mol-Lös.)
反應液全量 (cc)	289	289	100.0	100.0
物質 1Mol: H_2O_2	15 Mol	13.8 Mol	9 Mol	10 Mol
物質の Mol-濃度	0.0085	0.009	0.08	0.01
反應溫度及時間	室溫 2 時間	室溫 2 時間 80° 0.5時間	室溫 1 時間	室溫 2 時間
BaSO_4	0.5826	0.6233	1.8870	0.2335
S%	42.52	42.61	42.08	42.13

$\text{NH}_2\text{-SC-NH}_2$ (M. G. 76.12) として S%計算數 42.13%

(3) Thiobenzamid

Kahlbaum 製品を純粹なるものと看做し其まま實驗に供したるに反應數同行ふも S の量を多く發見す (I, II) 酒精より再結晶を行ひたるも尙 Fp. 112-115.5° にして S の量又理論數より多し (III, IV). 於茲尙一層精製の必要を感じ稀薄カリ液に溶かすに不溶分あり之を濾別し透明の濾液を鹽酸酸性となし析出せる沈澱を採集し (Fp. 114.5-115.7°) 此物に就て定量を行ふに満足なる結果を與ふ (V, VI). 本例は品質簡易檢定の好例なり. 本實驗にても加熱の有無は定量結果を左右せず.

實驗番號	I	II	III	IV
試料 (g)	0.1908 Kahlbaum 製品そのまま	0.1976	0.2030 酒精より一回再結晶したるもの	0.1960
水 (cc)	198	198	198	198
10%KOH (cc)	3	3	3	3
H_2O_2 液 (cc)	2.8(6.76Mol-Lös.)	2.8(6.76Mol-Lös.)	20.0(0.94Mol-Lös.)	20.0(0.94Mol-Lös.)
反應液全量 (cc)	203.8	203.8	221	221

物質 1 Mol: H_2O_2	13.6Mol	13Mol	12.7Mol	13.2Mol
物質の Mol 濃度	0.0068	0.007	0.0067	0.0065
反應溫度及時間	室溫 2 時間	室溫 2 時間	室溫 1 時間	室溫 1 時間
$BaSO_4$	0.3374	0.3523	0.3617	0.3450
S%	24.28	24.55	24.46	24.17

$C_6H_5CSNH_2$ (M. G. 137.13) として S% 計算數 23.39

アルカリにて精製したるものの分析

實驗番號	V	VI
試料 (g)	0.1960	0.1337
水 (cc)	198	198
10% KOH (cc)	3	3
H_2O_2 (0.94 Mol-Lös. cc.)	20	20
反應液全量 (cc)	221	221
物質 1 Mol: H_2O_2	13.2Mol	20Mol
物質の Mol 濃度	0.0065	0.0044
反應溫度及時間	室溫 2 時間	室溫 1 時間 80° 0.5 時間
$BaSO_4$	0.3313	0.2225
S%	23.21	22.89

(4) Xanthogensaureskalium (自製品)

C_2H_5OCSSK は一分子中 2S を有す、故に H_2O_2 の Mol 數は S の 1 Atom を單位として表示せり。

實驗番號	I	II	III	IV
試料 (g)	0.2005	0.1934	0.4897	0.4904
水 (cc)	199	199	0	0
10% KOH (cc)	2	2	7	7
H_2O_2 液 (cc)	4.5(6.76Mol-Lös.)	4.5(6.76Mol-Lös.)	32(0.94 Mol-Lös.)	65(0.94Mol-Lös.)
反應液全量 (cc)	20.55	205.5	39	72
S の 1 Atom: H_2O_2	11.0 Mol	11.4 Mol	4.5 Mol	4.4 Mol.
物質の Mol 濃度	0.0067	0.0065	0.087	0.047
反應溫度及時間	室溫 2 時間	室溫 2 時間 80° 0.5 時間	室溫 1 時間	室溫 2 時間
$BaSO_4$	0.5690	0.5640	1.412	1.404
S%	39.96	40.01	39.6	39.3

C_2H_5OCSSK (M. G. 160.28) として S% 計算數 40.01

(5) Cumothiazon

實驗番號	I	II
試料 (自製品) (g)	0.2036	0.2005

10% KOH (cc)	5.0	5.0
水 (cc)	195.0	195.0
H ₂ O ₂ (0.94Mol-Lös cc.)	22.0	22.0
反應液全量 (cc)	222.0	222.0
物質の Mol 濃度	0.0059	0.0055
物質 1Mol: H ₂ O ₂	16.8Mol	17Mol
反應溫度及時間	室溫 1 時間	室溫 1 時間 80° 0.5 時間
BaSO ₄	0.2822	0.2813
S%	19.04	19.30

(6) Thiocumothiazon (自製品)

Thiocumothiazon に於ては室溫に於て各實驗共に定量的に側鎖の S のみ H₂SO₄ となり沈降す。然るに加熱したる時 (II) は環中の S の一部も H₂SO₄ となり脱硫し來る。此の故に本反應には加熱を避くるを可とする事前述の如し。

實驗番號	I	II	III	IV
試料 (g)	0.1989	0.2021	0.4017	0.1812
水 (cc)	198.0	198.0	0	52.0
10% KOH (cc)	2.6	2.6	4	40.0(N/10-KOH)
H ₂ O ₂ 液 (cc)	2.1(6.76Mol-Lös.)	2.1(6.76Mol-Lös.)	23.0(0.94Mol-Lös.)	8.0(1Mol-Lös.)
反應液全量 (cc)	202.7	202.7	27.0	100.0
物質の Mol 濃度	0.0054	0.0055	0.082	0.01
物質 1Mol: H ₂ O ₂	12.9Mol	12.7Mol	9.8Mol	8Mol
反應溫度及時間	室溫 2 時間	室溫 2 時間 80° 0.5 時間	室溫 1 時間	20° 1 時間
BaSO ₄	0.2570	0.3032	0.5115	0.2385
S%	17.74	20.59	17.48	18.07

(7) Rhodankalium (Merck)

實驗番號	I	II	III	IV
試料 (g)	0.2093	0.2003	1.2671	0.9285
水 (cc)	175.6	175.6	0	0
10% KOH (cc)	2.4	2.4	10.4	8
H ₂ O ₂ (0.94Mol-Löscc.)	26.0	26.0	65.0	80.0
反應液全量 (cc)	204.0	204.0	17.0	88.0
物質 1Mol: H ₂ O ₂	11.4Mol	11.9Mol	4.7Mol	6.3Mol
物質の Mol 濃度	0.01	0.01	0.77	0.11

反應溫度及時間	室溫 2 時間	室溫 2 時間 80° 0.5 時間	室溫 1 時間	室溫 2 時間
BaSO ₄	0.4950	0.4877	3.040	2.248
S%	32.47	33.43	32.92	33.25

KCNS (M. G. 97.18) として S% 計算數 33.00

(8) 6-Methylthiouracil (自製品)

實驗番號	I	II
試料 (g)	0.1992	0.2004
水 (cc)	198.0	198.0
10% KOH (cc)	2.5	2.5
H ₂ O ₂ 0.94Mol-Lös.)	24.0	24.0
反應液全量 (cc)	224.5	224.5
物質 1Mol: H ₂ O ₂	16Mol	16Mol
物質の Mol 濃度	0.0062	0.0064
反應溫度及時間	室溫 1.5 時間	室溫 1 時間 80° 0.5 時間
BaSO ₄	0.3219	0.3254
S%	22.19	22.30

(9) Thiobenzanilid

Kahlbaum 製品を用いたるも其ままにては酒精に不溶分あり。因て一度酒精溶液となして不溶分を去り再結晶法を行ふ。斯くして得たるものは Fp. 94.5-98° にして尙不純なり。故に之を稀薄 KOH-液に微溫溶解し不溶分を濾別し稀 HCl にて分解し析出せる結晶を採集す。Fp. 98.5-99.6°

本物質は單に KOH 水溶液と暫時溫むるも完全なる溶液を得難く、加熱を持續せば一部分解し一定の値を得ず、故に先づ少量の酒精に溶かし之に水及 KOH 液を加へて完全に淡黃色透明の溶液とす。

今此液に H₂O₂ 液を加ふれば暫時の後白澱著しく析出し (Benzanilid) 且液は脱色す、發熱微弱なり。2 時間放置後 HCl 酸性となし普通の如く處置す。

實驗 (I), (II) は Kahlbaum 品を單に酒精より再結晶せしめたる試料にして尙少しく不純なるを示し實驗 (III) は更に上記の如く KOH 液不溶分を去り精製したるものなり。

實驗番號	I	II	III
試料 (g)	0.2132	0.1066	0.1171

94%酒精 (cc)	20.0	10.0	11.0
水 (cc)	30.0	15.0	16.5
N/10-KOH (cc)	40.0	20.0	22.0
H ₂ O ₂ (1Mol-Lös cc.)	10.0	5.0	5.5
反應液全量 (cc)	100.0	50.0	55.0
物質 1Mol: H ₂ O ₂	10Mol	10Mol	10Mol
物質の Mol 濃度	0.01	0.01	0.01
反應溫度及時間	室溫 2 時間	室溫 2 時間	室溫 2 時間
BaSO ₄	0.2257	0.1104	0.1266
S%	14.54	14.22	14.84

C₆H₅CSNHC₆H₅ (M. G. 213.166) として S%計算數 15.04

(10) Thioformanilid (自製品)

實驗番號	I. II.
試料 (g)	0.1371
95%酒精 (cc)	30.0
N/10-KOH (cc)	40.0
水 (cc)	20.0
H ₂ O ₂ (1Mol-Lös cc.)	10.0
反應液全量 (cc)	100.0
物質 1Mol: H ₂ O ₂	10Mol
物質の Mol 濃度	0.01
反應溫度及時間	20° 2 時間
BaSO ₄	0.2355 0.2333
S%	23.58 23.36

HCSNHC₆H₅ (M. G. 137.126) として S%計算數 23.38

(11) Thioacetanilid (自製品)

實驗番號	I. II.
試料 (g)	0.1511
N/10-KOH (cc)	40.0
水 (cc)	50.0
H ₂ O ₂ (1Mol-Lös cc.)	10.0
反應液全量 (cc)	100.0
物質 1Mol: H ₂ O ₂	10Mol
物質の Mol 濃度	0.01
反應溫度及時間	室溫 3 時間
BaSO ₄	0.2370 0.2350
S%	21.53 21.35

$\text{CH}_3\text{CSNHC}_6\text{H}_5$ (M. G. 151.15) として S% 計算數 21.22

第二 反應速度竝に容量分析

第一項にては 0.01 Mol 又は 0.1% の稀薄液に於ても H_2O_2 により容易く定量的に全 S を H_2SO_4 として分離する事を重量法により確證したり。従て H_2SO_4 は又容量的に一層簡単に測定し得べく考へ得るを以て本項にては先づ一定時間内に生成する H_2SO_4 を滴定して反應速度を検し反應の経過を窺ふと共に反應完結の時刻を實驗的に定め、之により定量分析を行ふ準備となし又構造との關係を知らんとせり。

其法可檢物を水(又は酒精)及 10% Alkali に溶かし一定量の H_2O_2 水を加へ全液を一定の Mol 濃度(例へば 0.01 Mol 溶液)となす。之を所定の溫度(恒溫槽中)に放置して或る時刻の經過後其の一部を採集し (1) 直接 $\text{N}/_{10}$ 酸にて殘存せるアルカリを滴定す, (2) 又は $\text{N}/_{10}$ 酸を最初使用せる $\text{N}/_{10}$ アルカリと同 cc を加へ酸性となしたる後 $\text{N}/_{10}$ アルカリにて滴定して反應により生成せる H_2SO_4 の量を決定す。以上兩法中後の方正確なり。(1) の如くアルカリ性のまま酸にて滴定する場合には滴定中にも時間を要し此の間に幾分反應進行する恐れあり。然るに先づ酸性となさば反應直に停止して進行せず。故に徐々にアルカリにて滴定し得べし。 H_2O_2 水は普通品(特に眞空蒸餾せざる普通市販品)を用ひ其の量を種々變更す。容量分析の時には豫め其の酸度を檢定し計算に入る事を要す。反應に要するアルカリは苛性アルカリ, 炭酸アルカリを用ひ又アルカリを加へず中性のまま及逆に酸を添加して酸性と爲せる時と比較せり。

標示藥は Methylorange, Methylrot 良好なり。以下特に記載せざる實驗は Methylorange を使用せるものなり。Phenolphthalein を使用せる際には終末稍明瞭を缺く。Rosorsäure 亦然り, 此の事實は H_2O_2 液を眞空蒸餾したるものを用ふるも同様にして單に夾雜物(安定劑として添加せる磷酸其他)のみに原因するに非ず。 H_2O_2 固有の微弱の酸性(解離恒數 2.4×10^{-12}) に基く。

前記可檢品の溶液に H_2O_2 水を加ふればかかる稀薄溶液にても最初の數分間多少溫度の上昇を來す場合間々あるも 2-3° 以内に止まり, 且數分後恒溫槽所定の溫度に復歸す。⁶⁾

物質の濃度は溶液 1L 中其の Mol 數を基とする事最合理的なり。然つ本實驗の半は都合により百分率を用ひたる爲不規律を免れず(但し Mol 濃度は算出記入

6) 其の後の實驗には便宜上 20° に統一せり。又第七報微量分析法參照。

せり)爲に比較の便宜上重複の嫌あるも一定の Mol 濃度のものと併記せり。物質の濃度種々の場合の實驗も無益に非ざれば暫く之をも掲げて他日整理の機を待たんとす。

總ての實驗には必ず對照實驗を施行せり、即ち H_2O_2 水の代りに同 cc の蒸餾水を用ひ他は本試驗と全く同一條件の下に定量を行ひ變化なき事を確めたり。

1. Thioharnstoff (歐文 Fig. 1 参照)

Thioharnstoff 0.01 Mol 水溶液の反應速度を検するに H_2O_2 液の増すに従つて速度早く物質の 1 Mol に對し 15 H_2O_2 にては僅に 21 分にて全 S を H_2SO_4 となし定量的に完結するを見る。(實驗 (I), (II), (III), V)は全液につき容量分析を行ひたる結果を示す。又 Na_2CO_3 の存在にては KOH の場合に比し速度稍遅し (IV)。

實驗番號	I	II
$\text{SC}(\text{NH}_2)_2$ (g)	0.0761	0.0761
水 (cc)	54.0	50.0
$\text{N}/_{10}$ -KOH (cc)	40.0	40.0
H_2O_2 1 Mol-Lös (cc)	6.0	10.0
反應液全量 (cc)	100.0	100.0
物質 1 Mol: H_2O_2	6.0 Mol	10 Mol
物質の Mol 濃度	0.01	0.01
反應溫度	21°	21°
反應完結所要時間(分)	150	30
測定法 可檢液 10cc に $\text{N}/_{10}$ -HCl 4cc. を加へ $\text{N}/_{10}$ KOH にて滴定す		測定法 (I) と同じ

時間(分)	消費 $\text{N}/_{10}$ -KOH(cc)	S→ H_2SO_4 (%)	時間(分)	消費 $\text{N}/_{10}$ -KOH(cc)	S→ H_2SO_4 (%)
5	0.40	20.0	5	0.87	43.5
15	1.10	55.0	10	1.50	75.0
30	1.55	77.5	15	1.80	90.0
45	1.75	87.5	20	1.90	95.0
60	1.80	90.0	25	1.95	97.5
75	1.85	92.5	30	2.00	100.0
95	1.94	97.0	35	2.00	„
110	19.7	98.5			
130	1.99	99.5			
150	2.00	100.0			

7) 檢體中の S が SO_4^{--} となりて分離せる%を示す。從て副反應無き時は $\text{CS}(\text{NH}_2)_2 \rightarrow \text{CO}(\text{NH}_2)_2$ の%に相當す。但し檢液の cc 少なき故幾分の誤差あるべく概數なり。以下皆同じ。

實驗番號	III	實驗番號	IV		
SC(NH ₂) ₂ (g)	0.0761	”	0.0761		
水 (cc)	45.0	”	50.0		
N ₁₀ -KOH (cc)	40.0	N ₁₀ -Na ₂ CO ₃	40.0		
H ₂ O ₂ (1Mol-Lös cc)	15.0	”	10.0		
反應液全量 (cc)	100.0	”	100.0		
物質の Mol 濃度	0.01	”	0.01		
物質 1Mol : H ₂ O ₂	15Mol	”	10Mol		
反應溫度	23°	”	20°		
反應完結所要時間(分)	21	”	35		
測定法 I) と同じ		測定法 (I) と同じ			
時間(分)	N ₁₀ KOH(cc)	S→H ₂ SO ₄ %	時間(分)	N ₁₀ KOH(cc)	S→H ₂ SO ₄ %
5	1.55	77.0	5	0.85	42.5
10	1.85	92.5	10	1.3	65.0
16	1.90	95.0	15	1.65	82.5
21	2.00	100.0	20	1.80	90.0
26	2.00	”	25	1.90	95.0
63	”	”	30	1.95	97.5
			35	2.00	100.0
			120	2.00	”
實驗番號	V 定量	實驗番號	V 定量		
SC(NH ₂) ₂ (g)	0.1000	反應液全量 (cc)	120.0		
水 (cc)	60.0	物質の Mol 濃度	0.0109		
N ₁₀ -KOH (cc)	40.0	物質 1Mol : H ₂ O ₂	ca. 14Mol		
H ₂ O ₂ (0.91Mol-Lös cc)	20.0	反應溫度及時間	室溫 2 時間		

本反應液全體を $\text{N}/_{10}\text{-HCl}$ にて滴定するに

所要 $\text{N}/_{10}\text{HCl}$ は 13.5cc 使用 H_2O_2 液の酸度は 10cc につき $\text{N}/_{10}\text{-KOH}$ 0.1cc.

∴ 反應に消費せる $\text{N}/_{10}\text{-KOH}$ は $40 - 13.5 - 0.2 = 26.3(\text{cc})$ $\text{SC}(\text{NH}_2)_2$ に換算 0.1001.

2. Allylthioharnstoff (歐文 Fig. 2 参照)

稍濃厚なる液 0.077Mol-Lös. (20°) にては $8\text{H}_2\text{O}_2$ 添加後、間もなく 38° に昇騰し僅かに 5 分間にて 99.6% 進行す。9 分目に測定するに已に 100% に達せるより見れば 5-9 分の間に完結せるものなり (IV), Na_2CO_3 の場合 (V) には KOH の場合に比し程遅き事 Thioharnstoff の時と同様なり (VI) は全液につき容量分析を行ひたる結果を示す。

實驗番號	I	實驗番號	II
$\text{SC} \begin{smallmatrix} \text{NHC}_3\text{H}_5 \\ \text{NH}_2 \end{smallmatrix}$ (g)	0.1162	”	0.1162
$\text{N}/_{10}\text{-KOH}$ (cc)	40.0	”	40.0
水 (cc)	54.0	”	50.0

H ₂ O ₂ (1Mol-Lös cc.)	6.0
反應液全量 (cc)	100.0
物質の Mol 濃度	0.01
物質 1Mol: H ₂ O ₂ .	6Mol
反應溫度	ca. 20°
反應完結所要時間(分)	186

可檢液 10cc に N/10HCl 4cc を加へた
 後 N/10-KOH にて滴定す

時間(分)	N/10-KOH(cc)	S→H ₂ SO ₄ %
16	1.15	57.5
30	1.55	77.5
45	1.75	87.5
60	1.83	91.5
80	1.89	94.5
110	1.97	98.5
142	1.99	99.5
186	2.00	100.0
215	2.00	„

實驗番號	III
SC<NHC ₃ H ₅ (g)	0.1162
N/10-KOH (cc)	40.0
水 (cc)	45.0
H ₂ O ₂ (1Mol Lös cc.)	15.0
反應液全量 (cc)	100.0
物質の Mol 濃度	0.01
物質1Mol: H ₂ O ₂	15Mol
反應溫度	Ca. 20°
反應完結所要時間(分)	15-20

測定法 (I) と同一

時間(%)	N/10KOH(cc)	S→H ₂ SO ₄ %
5	1.50	75.0
10	1.85	92.5
15	2.00	100弱
20	2.0強	„
240	„	„

實驗番號	V
SC<NHC ₃ H ₅ (g)	0.1162
N/10 Na ₂ CO ₃ (cc)	40.0

10.0
100.0
0.01
10Mol
ca. 20°
30
測定法 (I) と同様

時間(分)	N/10-KOH(cc)	S→H ₂ SO ₄ %
5	1.0	50
15	1.5弱	75.0
20	1.8	90
25	1.9強	95
30	2.0	100
40	2.0	„

實驗番號	IV
SC<NHC ₃ H ₅ (g)	0.2
1/2-HOH (cc)	14.0
水 (cc)	6.0
H ₂ O ₂ (5.74Mol-Lös cc)	2.4
反應液全量 (cc)	22.4
物質の Mol 濃度	0.077
物質 1Mol: H ₂ O ₂	8Mol
反應溫度	初め 20° の液發熱し て 5 分後 38° に昇る
反應完結所要時間(分)	5-9
檢液 2cc を直接 N/10-HCl にて滴定す	

時間(分)	N/10HCl (cc)	差引反應に消費せる N/10-KOH	S→H ₂ SO ₄ %
1	4.34	1.91	62
5	3.19	3.06	99.6
9	3.14	3.11	100.0
24	3.14	3.11	„

實驗番號	VI 定量
SC<NHC ₃ H ₅ (g)	0.040
N/10KOH (cc)	40.0

水 (cc)	50.0
H ₂ O ₂ (1Mol-Lös cc.)	10.0
反應液量 (cc)	100.0
物質の Mol 濃度	0.01
物質 1Mol: H ₂ O ₂	10Mol
反應溫度	19°
反應完結所要時間(分)	35

滴定法 (I) と同一

水 (cc)	60.0
H ₂ O ₂ (1Mol-Lös cc.)	20.0
反應液全量 (cc)	120.0
物質の Mol 濃度	0.0075
物質 1Mol: H ₂ O ₂	20Mol
反應溫度及時間	室溫 2 時間
全液を N/10HCl にて滴定す, 所要 N/10	
HCl 21.7cc 使用 H ₂ O ₂ 水の酸度は 10cc	
につき N/10KOH 0.1cc	
∴ 消費 N/10KOH 液 18.1cc	
SC<NHC ₃ H ₅ NH ₂	N/10KOH 液 18.1cc
	に換算 0.1051

時間(分)	N/10-KOH(cc)	S→H ₂ SO ₄ %
5	0.84	41.3
10	1.25	61.3
20	1.72	86.0

間時(分)	N/10-KOH(cc)	S→H ₂ SO ₄ %
31	1.93	96.5
35	2.00	100.0

3. Thiobenzamid (歐文 Fig. 3 参照)

IV によつて物質の濃度を高むれば非常に反應迅速となる事を知り得べし。

K₂CO₃ の存在にては KOH の場合に比し非常に緩慢にして物質の濃度 0.01 mol にて H₂O₂ 10 mol を用ひて漸く 4 時間後に完結す (V, VI). VIII は全液につきて容量分析を行ひたる結果を示す。

實驗番號	I
C ₆ H ₅ CSNH ₂ (g)	0.1371
N/10KOH (cc)	40.0
水 (cc)	54.0
H ₂ O ₂ (1Mol-Lös cc.)	6.0
反應液全量 (cc)	100.0
物質の Mol 濃度	0.01
物質 1Mol: H ₂ O ₂	6Mol
反應溫度	20°
反應完結所要時間 (分)	4 時間後 95% に達するも遂に完結せず H ₂ O ₂ の殘量 0.57mol にすぎず

檢液 10cc に N/10HCl 4cc を加へ N/10-KOH にて滴定す (標示藥 Methylrot)

時間(分)	N/10KOH(cc)	S→H ₂ SO ₄ %
2	1.1弱	55
10	1.50	75

II
0.1371
40.0
52.0
8.0
100.0
0.01
8Mol
20°
110
測定法 (1) と同一

時間(分)	N/10KOH(cc)	S→H ₂ SO ₄ %
2	1.35	67.5
10	1.62	81.0

15	1.60	80
25	1.6?	80?
45	1.70	85
1 時 15	1.75	87.5
1 時 45	1.85	92.5
2 時 40	1.9 弱	95 弱
4 時 00	1.90	95

15	1.75	87.5
25	1.80	90.0
45	1.90	95.0
1 時 15	1.95	97.5
1 時 50	2.00	100.0
2 時 30	2.00	„
3 時 30	2.00	„
4 時 10	2.00	„

重量分析との比較

同一條件にて 2 時 30 分目に HCl 酸性
となし BaCl₂ 液を加へ温を興へす一夜
靜置後濾過す。

物質=0.1371, BaSO₄=0.2317, S%=23.20

C₆H₅CSNH₂ として計算數 23.38

實驗番號	III
C ₆ H ₅ CSNH ₂ (g)	0.1371
N/10KOH (cc)	40.0
水 (cc)	50.0
H ₂ O ₂ (1 Mol-Lös cc.)	10.0
反應液全量 (cc)	100.0
物質の Mol 濃度	0.01
物質 1 Mol: H ₂ O ₂	10 Mol
反應溫度	20°
反應完結所要時間(分)	51
檢液 10cc に N/10HCl 4cc を加へ N/10-KOH にて滴定す (標示藥 Methylorange).	

實驗番號	IV
C ₆ H ₅ CSNH ₂ (g)	0.2
N/2KOH (cc)	11.7
水 (cc)	8.3
H ₂ O ₂ (5.74 Mol-Lös cc.)	2.2
反應液全量 (cc)	22.2
物質の Mol 濃度	0.0657
物質 1 Mol: H ₂ O ₂	8.6 Mol
反應溫度	ca. 17
反應完結所要時間(分)	8
檢液 2cc を直接 N/10HCl にて滴定す (標示藥 Methylorange).	

時間(分)	N/10KOH(cc)	S→H ₂ SO ₄ %
2	1.27	63.5
5	1.54	77.0
10	1.70	85.0
15	1.86	93.0
21	1.87	93.5
31	1.90	95.0
40	1.95	97.5
51	2.0 弱	100.0
75	2.0	„

時間(分)	N/10HCl(cc)	S→H ₂ SO ₄ %
2	2.8	94
4.5	2.7	98
8	2.6 強	100
12	2.6	100
120	2.6	„

實驗番號	V	VI
$\text{C}_6\text{H}_5\text{CSNH}_2$ (g)	0.1371	0.1371
$\text{N}/_{10}\text{K}_2\text{CO}_3$ (cc)	40.0	40.0
水 (cc)	52.0	50.0
H_2O_2 (1Mol-Lös. cc.)	8.0	10.0
反應液全量 (cc)	100.0	100.0
物質の Mol 濃度	0.01	0.01
物質 1 Mol: H_2O_2	8Mol	10Mol
反應溫度	20°	20°
反應完結所要時間	長時間	4-5 時間

滴定法、檢液 10cc に $\text{N}/_{10}\text{-HCl}$ 4cc を加へ水流ポンプにて吸引する事 1-2 分にて CO_2 は殆ど完全に逃遁す。之に Methylrot を加へ $\text{N}/_{10}\text{KOH}$ にて滴定したり。*)

時 間	$\text{N}/_{10}\text{KOH(cc)}$	$\text{S} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4\%$	時 間	$\text{N}/_{10}\text{KOH(cc)}$	$\text{S} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4\%$
5分	1.2	60	5分	1.1	55.0
20 „	1.6	80	15 „	1.53	76.5
40 „	1.73	86.5	30 „	1.75	87.5
1.0時	1.93	96.5	45 „	1.90	95.0
1.5 „	1.93	„	1.0時	1.90	„
2.5 „	1.93	„	2.0 „	2.93	96.5
翌日	2.03	100.0	3.0 „	1.95	97.5
			3.5 „	2.0弱	100弱
			4.0 „	„	„
			4.5 „	„	„
			5.0 „	2.03	100
			7.0 „	2.03	„

重量分析との比較
實驗 (V) と同様に行ふ

重量分析との比較
同一條件にて 2 時 30 分目に HCl 酸性となし反應を停止せしめ $\text{BaCl}_2\text{-Lös.}$ を加へ熱を與へず一夜靜置沈着せしめ濾過す。
物質
(I) 0.1372 BaSO_4 0.2235 S% 22.36
(II) 0.1371 0.2242 22.45
 $\text{C}_6\text{H}_5\text{CSNH}_2$ として計算數 23.38

時 間	物 質	BaSO_4	S%
2時間	0.1371	0.2250	22.53
3 „	„	0.2262	22.67
	„	0.2290	22.93
5 „	„	0.2350	23.53

以上により 4-5 時間にて完結せる事を知る。

*) 此法は CO_2 含有液の滴定に適し Methylorange より鋭敏にして良好なる事あり。Methylorange 不感性の時用ひ好成績を得つつあり。

即ち 2 時 30 分にては完結せざる事
容量、重量法共に一致し、長時間後漸く
完結す。

實驗番號	VII 容量分析
$C_6H_5CSNH_2$ (g)	0.0686
$N/_{10}KOH$ (cc)	20.0
水 (cc)	25.5
H_2O_2 (1 Mol-Lös cc.)	4.5
反應液全量 (cc)	50.0
物質の Mol 濃度	0.01
物質 1 Mol : H_2O_2	9

實驗番號	VII 容量分析
反應溫度	室温約 1 時間
全溶液を $N/_{10}HCl$ にて滴定す。	
所要 $N/_{10}HCl = 9.85$	
使用 H_2O_2 水の酸度は 4.5 cc につき	
0.05 cc なり。	
∴ 消費 $N/_{10}-KOH$	10.1 cc
$C_6H_5CSNH_2$ としての計算數	0.0693

4. Xanthogensaureskalium (歐文 Fig. 4 参照)

先づ自製貯藏せる C_2H_5OCSSK (I) に就て反應速度を検するに 0.5 時間にて恒數に達するも $S \rightarrow H_2SO_4$ は 91.7% (容量分析) なる成績を得。又他の貯藏 Präparat に就て検するに 97.33, 96.5% 等區々たる價を與ふ。即ち C_2H_5OCSSK が貯藏中幾分分解せるものと認め其の臭氣を検するに不快臭ある、之を熱酒精に溶解するに不溶分を残す。之を熱濾、冷後析出せる結晶を吸濾酒精、エーテルにて洗ひ硫酸乾燥器中に乾燥し得たる無臭品に付實驗を爲すに満足なる成績に達したり。0.01 Mol 液にて S 1 原子に對し $12.5H_2O_2$ にて 40 分に完結す (III)。測定の方法は (1) 檢液を直接 $N/_{10}HCl$ にて滴定したる場合も、(2) 先ず $N/_{10}HCl$ 4 cc を加へて酸性となし $N/_{10}KOH$ にて測定するも同一結果を得たり。重量分析結果も亦一致す (IIIb)。Phenolphthalein は標示薬として使用不可能なり。

次に炭酸アルカリを用ひたる時は $2Na_2CO_3$ にては 1 Atom S : $12H_2O_2$ にても僅微に白濁するのみにして反應完結せず (IV, V)。然るに $3.5K_2CO_3$ (又は Na_2CO_3) を用ふれば白濁せず 40 分にて完全す (VI)。中性の時には 25.5 時間にて漸く 30% ($S \rightarrow H_2SO_4$ と假定して計算) に過ぎず且著明の濁濁、強臭を發し明に他の反應の生起せるを知るべし。

實驗番號	I
物質(貯藏品のまゝ) (g)	0.1
$N/_{10}KOH$ (cc)	41.0
水 (cc)	89.0
H_2O_2 (1 Mol-Lös cc.)	20.0
反應液全量 (cc)	150.0
物質の Mol 濃度	0.0042
S 1 Atom : H_2O_2	16 Mol
反應溫度及時間	室温 1 時間
0.5 時間にて反應の進行止まるも完結點に達せざる故全液中に残溜せる KOH を $N/_{10}-HCl$ にて滴定したり。	

實驗番號	II
物質(精製品) (g)	0.1603
$N/_{10}KOH$ (cc)	40.0
水 (cc)	48.0
H_2O_2 (1 Mol-Lös cc.)	12.0
反應液全量 (cc)	100.0
物質の Mol 濃度	0.01
S 1 Atom : H_2O_2	6 Mol
反應溫度	ca. 17°
反應完結所要時間	完結せず
檢液 10 cc を $N/_{10}HCl$ にて滴定す。	

所要 $N/_{10}HCl$	23.4cc	時間(分)	$N/_{10}-HCl(cc)$	$S \rightarrow H_2SO_4\%$
H_2O_2 液の酸度は 10cc につき		10	3.20	26.6
$N/_{10}KOH$ 0.2cc		20	2.50	50.0
$\frac{160 \cdot 3}{3} (41-234-0.4)=0.0917$		30	2.05	65.0
即ち C_2H_5OCSSK の純度 91.7 %		40	1.84	72.0
に相當す.		50	1.60	80.0
		60	1.50	83.3
		80	1.35	88.3
		110	1.25	91.6
		170	1.15	95.0
		完結せず.		

實驗番號	III (a)	III (b)
物質(精製品) (g)	0.1603	容量分析
$N/_{10}KOH$ (cc)	40.0	IIIa と同一條件の下に 1 時間後 $N/_{10}$
水 (cc)	35.5	HCl にて全液を滴定す.
H_2O_2 (1Mol-Lös. cc)	24.5	物質
反應液全量 (cc)	100.0	所要 $N/_{10}HCl$
物質の Mol 濃度	0.01	H_2O_2 度の酸度は 10cc につき $N/_{10}$
SIAtom: H_2O_2	12.5Mol	KOH 0.1cc
反應溫度	ca.17°	∴ 消費 $N/_{10}KOH$
反應完結所要時間(分)	40	C_2H_5OCSSK として計算數 0.1606
檢液 10cc へ $N/_{10}HCl$ にて滴定す.		

時間(分)	$N/_{10}HCl(cc)$	$S \rightarrow H_2SO_4\%$
11	1.85	71.6
20	1.25	91.66
30	1.05	98.3

時間(分)	$N/_{10}HCl(cc)$	$S \rightarrow H_2SO_4\%$
40	1.00	100
50	1.00	„
25時間	1.00	„

實驗番號	IV	V
物質(精製品) (g)	0.1603	0.1603
$N/_{10}Na_2CO_3$ (cc)	40.0	40.0
水 (cc)	48.0	35.5
H_2O_2 (1Mol-Lös. cc.)	12.0	24.5
反應液全量 (cc)	100.0	100.0
物質の Mol 濃度	0.01	0.01
SIAtom: H_2O_2	6Mol	12.25Mol
C_2H_5OCSSK 1Mol: N_2CO_3	2Mol	2Mol
反應溫度	20°	20°
反應完結所要時間	完結せず	完結せず

檢液 10cc に $N/_{10}$ HCl 4cc を加へ $N/_{10}$ KOH にて滴定す。

時間(分)	$N/_{10}$ KOH(cc)	$S \rightarrow H_2SO_4\%$
3	0.00	0
5	0.30	10.0
10	1.10	36.6
15	1.52	50.6
20	1.75	58.3
30	2.00	66.6
45	2.15	71.6
60	2.22	74.0
150	2.45	81.6
1夜後	2.83	94.1

檢液 10cc を $N/_{10}$ HCl にて滴定。

時間(分)	$N/_{10}$ HCl(cc)	$S \rightarrow H_2SO_4\%$
10	2.2	60
20	1.6	80
32	1.45	85
42	1.45	85
52	1.45	„
52	1.45	„
62	1.45	„
72	1.45	„
82	1.46	86.6
24時間	1.10	96.6

〔反應の狀況〕 10 分頃より溜濁し、始め最後迄微蛋白石濁を呈す。

24 時間後も完結せず。

實驗番號	VI
物質(精製品) (g)	0.1603
$N/_{10}K_2CO_3$ (又は Na_2CO_3) (cc)	70.0
水 (cc)	5.5
H_2O_2 (1 Mol-Lös cc.)	24.5
反應液全量 (cc)	100.0
物質の Mol 濃度	0.01
1Atom S: H_2O_2	12.25Mol
C_2H_5OCSK 1Mol: K_2CO_3	3.5Mol
反應溫度	20°
反應完結所要時間	40

檢液 10cc を $N/_{10}$ HCl にて滴定するときも又檢液 10cc に $N/_{10}$ HCl 7cc を加へ $N/_{10}$ KOH にて滴定するときも同一の成績を得たり。

時間(分)	$N/_{10}$ HCl(cc)	$S \rightarrow H_2SO_4\%$
5	5.55	43.3
10	4.5	83.3
15	4.2	93.3
20	4.1	ca. 97.0
25	4.1	„

VII (中性)

0.1603
0
77.5
24.5
100.0
0.01
12.25Mol
0
ca. 20°

檢液 10cc を直接 $N/_{10}$ KOH にて滴定す。

時間(時)	$N/_{10}$ KOH(cc)	$S \rightarrow H_2SO_4\%$ (假定)
1	0.3	10
2	0.5	16.6
3	0.55	18.3
25.5	0.90	30.0

30	4.1	„	〔反應の狀況〕 強く渾濁且強臭を發し 他の反應の生起せるを認む。
40	4.05	100	
50	4.05	„	
60	4.05	100	
〔反應の狀況〕 (V) の場合に反し液は 終始透明にして 40 分にて完結す。			

5. Thiocumothiazon (歐文 Fig. 5 参照)

此物質に於ては僅に 20 分 (II) にて側鎖 $S \rightarrow SO_4^{2-}$ 完結す。反應溶液を長く放置せば更に過剰の Alkali を消費するを見る。此事に就ては後日報告すべし。

實驗番號	I	II
$C_6H_4 \begin{cases} NH-CS \\ \\ CH_2-S \end{cases} (g)$	0.1812	0.1812
$N/_{10}KOH (cc)$	40.0	40.0
水 (cc)	150.0	50.0
$H_2O_2 (1Mol-Lts cc.)$	10.0	10.0
反應液全量 (cc)	200.0	100.0
物質の Mol 濃度	0.005	0.01
物質 1Mol: H_2O_2	10Mol	10Mol
反應溫度	20°	20°
反應完結所要時間(分)	60	20

檢液 10cc + $N/_{10}-HCl$ 4cc を $N/_{10}-KOH$ にて滴定す。

時間(分)	$N/_{10}KOH(cc)$	側鎖 $S \rightarrow H_2SO_4\%$	時間(分)	$N/_{10}KOH(cc)$	側鎖 $S \rightarrow H_2SO_4\%$
10	1.76	88	Methylorange Phenolphthalein		
20	1.90	95	2	—	1.9
30	1.90	95	10	1.95	2.1 97.5
60	2.00	100	20	2.05	2.15 100.0
90	2.00	„	30	2.05	2.15 „
			60	2.08	2.21
			150	2.10	2.25
			300	2.15	„
			29時間後	2.35	2.58

實驗番號 III 定量

Thiocumothiazon 0.1000g, $N/_{10}KOH$ 20.0cc, 水 80.0cc, 局方 H_2O_2 液 9.2cc 反應液全量 109.2cc, 物質の Mol 濃度 0.05, 物質 1 Mol: H_2O_2 ca. 15.7 Mol 室温 87 分後 $N/_{10}HCl$ にて滴定す。

所要 $N/_{10}HCl$ 8.9cc

使用 H_2O_2 液の酸度は 10.0cc につき $N/_{10}KOH$ 0.1cc

∴ 消費 $N/_{10}-KOH$ 11.0cc.

$C_8H_7NS_2$ (側鎖の S のみ脱硫) として 0.0996g.

6. Thiobenzanilid (歐文 Fig. 6 の [I] 参照)

實驗番號	I	實驗番號	1
$C_6H_5NHCSNHC_6H_5$ (g)	0.2132	物質の Mol 濃度	0.01
94%酒精 (cc)	20.0	物質 1Mol: H_2O_2	10Mol
水 (cc)	30.0	反應溫度	室溫 (25-28°)
$N/_{10}KOH$ (cc)	40.0	反應完結所要時間(分)	60
H_2O_2 (1Mol-Lösec.)	10.0		

檢液 10cc + $N/_{10}-HCl$ 4cc を $N/_{10}-KOH$ にて滴定す.

時間(分)	$N/_{10}KOH(cc)$	$S \rightarrow H_2SO_4\%$	時間(分)	$N/_{10}KOH(cc)$	$S \rightarrow H_2SO_4\%$
10	1.75	87.5	60	2.00	100.0
30	1.91	95.5	70	2.00	„
50	1.95	97.5			

7. Thioformanilid (歐文 Fig. 6 の [II] 参照)

下記の条件にては 50 分に反應完結す. (I), 標示薬として Methylrot 又は Phenolphthalein を用ひたり. H_2O_2 の代りに水を用ひたる對照試験に於ても長時間後には KOH の爲分解するも本反應完結の時間には異状無きを見る (II).

實驗番號	I	II 對照
$HCSNHC_6H_5$ (g)	0.1371	0.1371
95%酒精 (cc)	30.0	30.0
$N/_{10}KOH$ (cc)	40.0	40.0
水 (cc)	20.0	30.0
H_2O_2 (1Mol-Lösec.)	10.0	0
反應液全量 (cc)	100.0	100.0
物質の Mol 濃度	0.01	0.01
物質 1Mol: H_2O_2	10Mol	0
反應溫度	20°	20°
反應完結所要時間(分)	50	

檢液 10cc + $N/_{10}-HCl$ 4cc を $N/_{10}-KOH$ にて滴定す.

時間(分)	$N/_{10}-KOH(cc)$	$S \rightarrow H_2SO_4\%$	時間(分)	$N/_{10}-KOH(cc)$
6	1.5	75.0	2	0.00
15	1.75	88.0	10	0.03
30	1.98	ca.99.0	30	0.03
40	2.02	100弱	60	0.03
45	2.05	„	42時間	0.21
50	2.10	100		

8. Thioacetanilid (歐文 Fig. 6 の [III] 参照)

實驗番號	I
$\text{CH}_3\text{CSNHC}_6\text{H}_5$ (g)	0.1512
$\text{N}/_{10}\text{KOH}$ (cc)	40.0
水 (cc)	50.0
H_2O_2 (1Mol-Lös cc.)	10.0
反應液全量 (cc)	100.0

實驗番號	I
物質の Mol 濃度	0.01
物質 1Mol: H_2O_2	10Mol
反應溫度	20°
反應完結所要時間(分)	110

檢液 10cc + $\text{N}/_{10}\text{HCl}$ 4cc 及び $\text{N}/_{10}\text{KOH}$ にて滴定す。

時間(分)	$\text{N}/_{10}\text{KOH}(\text{cc})$	$\text{S} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4\%$	時間(分)	$\text{N}/_{10}\text{KOH}(\text{cc})$	$\text{S} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4\%$
2	0.90	45.0	50	1.90	95.0
5	1.30	65.0	60	1.92	96.0
10	1.50	75.0	75	1.95	97.5
15	1.60	80.0	90	1.98	99.0
20	1.62	81.0	110	2.00	100.0
30	1.80	90.0			

9. 6-Methylthiouracil (歐文 Fig. 7 (I) (II) 参照)

本物質は水に難溶性なるも KOH 液に易溶、無色透明の液となり $10\text{H}_2\text{O}_2$ を加ふれば次の瞬間少しく乳濁するも直ちに透明となる。反應速度極めて迅速なる爲幾分の誤差は免れざるも可及的諸種の條件に注意し施行せり。

實驗番號	I
$\text{SC} \begin{array}{c} \text{NH} \text{---} \text{CO} \\ \text{NH-C(CH}_3\text{)} \end{array} \text{CH}$ (g)	0.1421
$\text{N}/_{10}\text{KOH}$ (cc)	40.0
水 (cc)	50.0
H_2O_2 (1Mol-Lös cc.)	10.0
反應液全量 (cc)	100.0
物質の Mol 濃度	0.01
物質 1Mol: H_2O_2	10Mol
反應溫度	20°
反應完結所要時間(分)	8
檢液 10cc + $\text{N}/_{10}\text{HCl}$ 4cc 及び $\text{N}/_{10}\text{KOH}$ にて滴定す。	

II
0.1421
40.0
200.0
10.0
250.0
0.004
10Mol
20°
12
檢液 25cc + $\frac{N}{10}$ HCl 4cc 及び $\frac{N}{10}$ KOH にて滴定す。

時間(分)	$\text{N}/_{10}\text{KOH}(\text{cc})$	$\text{S} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4\%$	時間(分)	$\text{N}/_{10}\text{KOH}(\text{cc})$	$\text{S} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4\%$
2	1.70	85.0	3	1.35	67.5
4	1.90	95.0	5	1.60	80.0
6	1.95	97.5	7	1.35	92.5
8	2.00	100.0	10	1.95	97.5

10	2,000	100.0	12	2.00	100.0
			15	„	„
			20	„	„

10. Thiocumazon (歐文 Fig. 7 (III) 参照)

實驗番號	I	檢液 10cc + N/10-HCl 4cc を N/10-KOH にて
$\text{C}_6\text{H}_4 \begin{cases} \text{NH-CS} \\ \\ \text{CH}_2\text{-O} \end{cases}$	0.1651	滴定す.
N/10-KOH	40.0	時間(分) N/10-KOH S→H ₂ SO ₄ %
水	50.0	4 1.12 56.0
H ₂ O ₂ (1Mol-Lös.)	10.0	5 1.27 63.5
反應液全 (cc)	100.0	20 1.70 85.0
物質の Mol 濃度	0.01	30 1.82 91.0
物質 1Mol: H ₂ O ₂	10Mol	45 1.92 96.0
反應溫度	20°	60 1.90 „
反應完結所要時間(分)	80	80 2.00 100.0
		標示藥 Methylrot

蟾酥の成分研究(第三報)

Des-Acetyl- ϕ -Bufotalinsäureamid 及其 Hofmann 分解に就て

近 藤 平 三 郎

井 川 俊 一

(東京帝國大學藥學科藥化學教室)

(昭和 9 年 2 月 5 日受理)

H. Kondo und S. Ikawa: Über Des-Acetyl- ϕ -Bufotalinsäureamid und dessen Hofmann'sche Umlagerung. [Untersuchung über die Bestandteile des „Senso“, III.]

著者等は嚮に第二報(本誌 614.385)に於て, ϕ -Bufotalin を鹼化して得たる Des-Acetyl- ϕ -Bufotalinsäure の水酸基(アセトキシル基の鹼化に由る)は直に分子内轉位を営みて不安定なるエノル型より安定なるケト型に變じ二重結合 1 箇を消失することを報告し, ϕ -Bufotalin 分子中に $\text{>C}=\text{C}-\text{O}-\text{COCH}_3$ 基の存在することを明かにしたりしが, 他の 1 箇の二重結合の位置に關しては果して Wieland 氏の推