C% 81,74 H% 10,99 M.G. 440,4

IX. Desoxyursolsäure (iso) lakton

VIII に誌す中性の物質, 即ちアルカリにて洗滌せるエーテルの蒸溜残渣を, メタノール-アルコールより結晶せしめ, 更にクロロホルム-メタノールより再結晶して針狀の結晶を得たり. Fp. 147-148° (Korr.) リーベルマン氏反應: 強紫色を呈し, 次で帶赤紫色となり, 永くその色調を保つ.

分 析

物質 44,2mg CO₂: 132,4mg H₂O: 43,3mg C% 81,70 H% 10,96

摘 定

物質 55,0mg 純アルコール 10cc に溶し, Bromthymolblau を標示薬となし, N/10 アルコール性カリを以て滴定するに毫もアルカリの消費量なし.

Desoxyursolsäure (iso) lakton を C₃₀H₄₈O₂ とすれば

C% 81,74 H% 10,99 COOH% 0,0

擧筆に當り恩師朝比奈先生の懇篤なる御教示を深謝し. 本研究資金の一部を援助せられたる日本學術振興會に謹んで謝意を表す.

(昭和 9 年 2 月 8 日 倉敷中央病院薬局にて稿)

デヨードチロジンの實驗的動脈硬化症に對する影響

緒 方 章

佐 野 十 九 一

三 井 圭 造

(東京帝國大學醫學部藥學科臓器藥品化學教室)

(昭和 9 年 2 月 1 日 受理)

Über den Einfluss von 3,5-Dijodtyrosin
auf die experimentellen Arteriosklerose

A. Ogata, S. Sano u. K. Mitsui.

Ignatowski¹⁾ の實驗にその端を發し Starokadmski 及び Ssoborew, Strecky, Chalato 等の實驗に依て確められた食餌性動脈硬變症については Wesselkin これを惹起せしむべき物

1). Virchow's Archiv, **192** (1909)

質はコレステリンであるだらうと考へて居つたが Anitschkow 及び Chalutow¹⁾ の實驗でそれが證明せられ、後 Wacker, Hueck, Landaw, Weltmann, Ashoff 等がこれを確めた。我國に於ても亦これに關する實驗者がある。殊に今及山田²⁾ は初めてラノリンを以て家兎を飼育し卵黃、肝臓粉末、腦を以て飼育せるものと等しく高度のアテローム様硬變が發生することを報告した。如斯きアテローム様硬變の發生はコレステリンが血中に吸收され所謂ヒペルコレステリネミーを惹起しその結果として大動脈其他の實質性臓器にコレステリン及脂肪等の沈着を來すものであるとせられて居る。又脂肪食に就て Bang は過多の脂肪はこれを燃化するに多量の酸素を要するが若し酸素が不足した時には中間產物として Acetone 體を生じそれが血管に作用して脂肪沈着を來し更に脂肪の滲透を容易ならしめて血管壁に生じた脂肪沈着は二次的に血管壁に作用して内膜の結締組織細胞及中膜の造結締組織細胞の増殖に依つて筋纖維の壓迫更に彈力纖維の變化を來すものであると云ふて居る。この變化は後に述べる所の一定の組織學的變化を現し動脈に出現するものをコレステリン型動脈硬變症と呼んで居る。然るに又副腎髓質ホルモンたるアドリナリンも血管内に注射すると血管に變化を現はす Anitschkow はこれをアドリナリン型動脈硬變症と名づけた。これは Josué³⁾ が初めて犬及び家兎にアドリナリンを注射し著しき血管の變化を認めたる事に端を發し爾來多くの研究者に依て研究せられた。而してアドリナリンのみならず幾多の血壓を亢進せしむ可き物質其他甲狀腺物質の飼食に依つても亦同一の變化を來すものであることが明となつた。

他面副腎、甲狀腺及生殖腺等の内分泌物質とコレステリン代謝に關する問題は多くの學者に依つて研究されている。

甲狀腺物質を動物に與へるときは一般新陳代謝機能を著しく亢進し動物の瘦削を來すことは周知の事實でその主因は酸化作用の亢進である。余等の一人及田中⁴⁾ の實驗によるとデョードチロジンの投與に依つては脂肪のみならず蛋白質も亦分解さるるものと考へられる。如斯く甲狀腺物質が酸化機能を旺盛にし動物體の瘦削を來すことからして本物質が肥胖病に屢々應用せらるる事は人の知る所である。

然るに大正6年村田等⁵⁾ は家兎にラノリンを與へて惹起せらる可きコレステ

1). Zentralbl. f. allg. Path. u. path. Anatomie, **24** Nr. 1. S. 1 (1913)

2). 日本病理學會雜誌, 第 6 卷 411 (大正 5 年),

3). Compt. rend. soc. biol. **55** p. 1374 (1903).

4). 未發表

5). 小出, 日本內分泌學會雜誌, 6 卷 S. 233 (昭和 5 年).

リン型動脈硬變症は同時に甲狀腺末を與へる事に依つて或る程度まで能く豫防し得られる事を認めた。然し乍ら甲狀腺中の如何なる物質が最も有效であるかは未だ明でない。小田¹⁾の實驗によるときはチレオグロブリンが最も有效であると云ふ。

又ヨード劑は從來臨牀上血管硬化に對しては好影響を與へるものとして用ひられて居り實驗的には Koräyi²⁾ Boveri,³⁾ Kleineberg⁴⁾ 香川⁵⁾等はこれを證明して居る。併し乍ら大量のヨード劑を與へると反つて症狀を増惡せしめる事は Hedinger 及 Loeb⁶⁾ 又同じく前記香川等がこれを證明して居る。殊に Hedinger 及 Loeb はヨードカリのみにては實驗的動脈硬化症が起ると云ふて居る。余等は前述したる如く甲狀腺物質がアドレナリン型硬變症を惹起すると云ふ事實があるがためデョードチロゲンナトリウム 1 日量 0.3 で體重 2kg の家兎數匹を數ヶ月に亙つて飼育して見たが著しき體重の減少を見たるのみで動脈硬變は起らなかった。

この甲狀腺の副ホルモンと考へられて居るデョードチロジンが如何なる生理的作用を有するものであるかは未だ明でない。或は緩和なるチロキシン作用を有するものであるとする人もあり又反對にチロキシンに對して反對作用を營むものであると考へて居る人もある。

さきに森及篠井⁷⁾は家兎をコレステリンにデョードチロジンを併用して飼育するときはある程度までコレステリン型動脈硬變症を豫防する作用があることを認めた。

余等は更に進んで豫めコレステリン型動脈硬變症を惹起せしめたる動物に對しデョードチロジンの投與が如何なる影響を與へるかを實驗し猶又アドレナリン型動脈硬變症に對して豫防的に作用するものであるかどうかを實驗した。

- 1). 日本病理學會會誌, 第 7 卷 (大正 7 年) 第 8 卷 (大正 8 年).
- 2). 日大外科學會雜誌, 第 28 回第 4 號 S. 393 (昭和 2 年).
- 3). Dtsch. med. Wochenschr. S. 179 (1906).
- 4). 同上 S. 878 (1906).
- 5). 日本藥物學雜誌, 第 15 卷第 4 號 S. 3098 (昭和 5 年).
- 6). Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmacol. **102** S. 62 (1907).
- 7). Klinische Wochenschrift, S. 2205 (1931.). Bioch. Zeitschr. **233** S. 483 (1931).
- 8). 東京醫學會雜誌, 第 46 卷第 2 號 S. 316 (昭和 7 年).

本實驗の動物飼育期間は昭和7年9月より同8年3月までの間である。

第1編 實驗的コレステリン型動脈硬變症に對する

デョードクロジンの影響

I. 實驗材料並方法

實驗には白色雄性の家兎體重 2kg 内外のもの 60 頭を選り1頭宛各別箱に入れ一定期間豆腐粕及麩糠及少量の野菜で飼育して略體重が一定するを待つて飼料中に日本藥局方無水ラノリンを混じ初めは少量に或は初めから1日量 3.0 を與へて 90 日間飼育した後5頭を剖檢して見た所がその4頭には明に1頭には輕度に肉眼的動脈硬變症を認めたからしてラノリン投與を廢し體重の如何に關らず 45 頭にデョードクロジンモノナトリウム鹽 0.3g 宛を飼料に混じて與へ残る 10 頭は對照として單に前記普通飼料で飼育し兩者を適宜の時機に剖檢して肉眼的並に顯微鏡的に檢査した。

無水ラノリンの投與方法はこれを熔融し麩糠を混じた後豆腐粕と混じて與へる。デョードクロジンナトリウム鹽を投與するときは最初屢々下痢の傾向を示すからデョードクロジン飼育のものは最初全部タンナルビン1日量 1.0g 宛を與へこの下痢の傾向を抑制し後徐々にタンナルビンの投與を廢した。これはこの實驗を行ふ以前即ち昭和7年2月から同年8月に亘つて行つた豫備試驗に於て多數の動物が下痢のために斃死したのに鑑みて行つたのである。

顯微鏡的檢査法としては從來硬變症の好發部位として認められて居る弓部及胸部大動脈を檢査した。而して此等は總てパラフィン包埋切片を作製しヘマドキシリンエオジン染色及彈性纖維染色法又脂肪染色は凍結切片を用ひズダン III に依つて染色した。而して動脈壁は横斷並に縦斷に區別して觀察した。横斷切片は冠狀動脈分岐點に隣接せる末梢部に於て又縦斷切片は上記の點を基本として末梢に向ひ動脈の長徑に並行して組織片を採ることに一定した。

血管壁類脂肪沈著の程度は横斷切片では全周, 半周, 局部等の語で示し内膜中膜(外膜には變化なし)特に彈力纖維變性の程度は最強度卅中等度卅輕度+を以て區別する事とした。

縦斷切片については大要肋間動脈の分布する胸部を中部として此より中心側を上部又は末梢側を下部として記載することとした。

II. ラノリン飼育家兎血中の脂肪及コレステリン含量に就て

ラノリンを以て家兎を飼育するときは血中脂肪及コレステリンの量が著しく増加する。1例を示せば第1圖及第2圖の様である。本例は毎日無水ラノリンを體重約 2kg の家兎に 3g 宛投與し1週毎に血液の脂肪酸量及コレステリン量を測り圖示したものである。

脂肪及コレステリンの定量法は大體中村氏法を塚崎¹⁾が改良した法に依つた。

即ち 1cc の血液に 95% アルコール 10cc エーテル 3cc 及 10% 苛性ソーダ 10cc を加へ還流冷却器を附し水浴中に 30 分間煮沸する。其後内容をベツヘルに移し通風の下にエーテル及アルコールを蒸發せしめ殘渣は飽和食鹽水でこれを完全に分液濾斗に移す。これに約 5cc のエーテルを加へ稀鹽酸 15cc を徐々に注加して強酸性にすると絮狀の沈澱を生じて来る。液が充分冷却した後エーテル 10cc を加へて約 100 度振盪する。暫時靜置するとエーテル層と水液層とは完全に分離し水液層は淡黃色を呈する透明層と黒褐色層とに分れる。故に先づ透明淡黃色液をベツヘル(I)内に完全に流し取り分液濾斗を 2-3 度振盪するとエーテルは黒褐色層から分離する。このエーテルは脂肪酸とコレステリンを含有するが故に損失なき様注意してベツヘル II)に移す。次で黒褐色層を毎回エーテル 5cc と共に約 50 度振盪すること 3 回、毎回のエーテルは再びベツヘル(II)にとる。ベツヘル(I)中の透明液は分液濾斗に入れエーテル 10cc を加へ再び 100 度振盪し、此エーテルもベツヘル(II)に入れる。如斯く前後 5 回の操作に依つて血液の脂肪酸及コレステリンは完全にエーテルに移行する。そこでベツヘルを(II)水浴上で通風の下に完全にエーテルを除き殘渣は石油エーテルに溶解し石棉濾過器(隅川, 須藤氏)を以て濾過する。かく石油エーテルにてベツヘルを洗滌濾過すること數回、總量約 30cc の石油エーテルを使用する。次に水浴上通風の下に石油エーテルを蒸發せしめ。然る後エーテル 5cc アルコール 10cc を加へてベツヘルの内容を溶解し 0.05% ロゾール酸 1-2 滴を加へ $N/250$ 苛性ソーダ液で濟定する。定規液消費量に 0.001108 を乗じたものを以て脂肪のグラム量とする。

コレステリン定量は前掲脂肪酸滴定に供したる溶液を水浴上通風の下にアルコール及エーテルを除きアルコール石油エーテル等量混和液(總量 10cc)の扶によつて分液濾斗内に移し更に $N/5$ 苛性カリ液 5cc を加へ約 50 回振盪する、然るときは石油エーテル層と赤色を呈するアルコール性カリ液層とに分れる。石油エーテル層をベツヘルに採取す、尙赤色を呈するアルコール性カリ液に石油エーテルを加へ振盪し石油エーテルは先きのベツヘルに集める。今1回この操作を繰り返すときは完全にコレステリンを採取し得る。かくして得たるコレステリン含有石油エーテルは水浴上通風下で乾燥し 5cc のクロロホルムに溶解し次で

1). 東北醫學雜誌, 第 9 卷 1, 2 冊 S. 8 (大正 15 年).

2cc の無水醋酸及び 0.1cc の濃硫酸を加へ室溫に暗所に 15 分間放置し生起したる綠色を Birkner 氏比色計を用ひて高田氏標準液¹⁾と比色した(第 2 圖)

これで見るときはラノリン飼育後 3 週の後には脂肪酸及コレステリン共に略一定の量即ち正常のものより約 10 倍内外の含量に増加することを認める事が出来る、

固よりここに掲げたのは一例に過ぎないが併し多少の差はあつても大多數の例に於てラノリン飼育に依て著明なる血液中脂肪及コレステリンの増量を來たすのを見た。

本例の家兎はラノリン飼育 90 日後に剖檢したとき大動脈に著明なるアテローム變性を見た。

III. ラノリン飼育家兎脂肪及コレステリン含量に及ぼすデョードチロジンの影響

森及篠井²⁾の實驗を見るにデョードチロジンの投與は脂肪及コレステリン代謝

第 1 圖

ラノリン 1 日量 3.0g 投與家兎血中脂肪酸量 1 週毎に測定, 血液 1cc 中の脂肪酸が消費したる n/250 アルカリのcc数

第 2 圖

ラノリン 1 日量 3.0g 投與家兎血中コレステリン量毎 1 週毎に測定, 血液 100cc 中の量を示す

1). Tohoku Journ. of exper. Med. I. S. 467 (1920) 2). 前出

第 3 圖

に影響を與へるものの様である。余等は前項に述べた様な ラノリンを以て飼育した家兎血液中の 脂肪及コレステ

リンが ラノリン飼育を廢してこれに ヨードチロジンを與へたるもの及び對照として單に ラノリン投與を廢したるものとの間に何如なる差異があるかを見るために 90日間 ラノリンを以て飼育し次で ラノリンを廢し直ちにデョードチロジンナトリウムを毎日 0.3g 宛投與したるもの 45 頭及對照たる單に ラノリン投與を廢したるもの 10 頭の中前者 3 頭後者 3 頭について前項と同じ方法で 1 週間殊に血中脂肪及コレステリンを定量した。第 3 圖は 3 頭から得た平均値を示すものである。

圖に於て見る如く ラノリン飼育に依て増加した血中脂肪及コレステリンは單に ラノリン投與を廢しただけでも日の経過と共に漸次減少して正常に近くなつて行く様であるが、今これにデョードチロジンを與へると 猶一層速かに減少することが分る。即ち脂肪に於てはデョードチロジンを與へたるものの 2 週間後に於ける含量に達するのには與へないものに於ては 6 週間以上を要し又コレステリンに於ても與へたるものの 3 週間後に於ける含量に達するのには與へないものに於ては 6 週間を要したのを見る事が出来る、殊に コレステリンに於ては 血中の含量低下率は脂肪のときより顯著である。如斯くデョードチロジンの投與は如上の分量及方法

では脂肪及コレステリンの代謝を亢進せしめるものであることが明である。

然るに最近 Silberstein, Gottdenker 及 Glaser¹⁾ は Jodgorgon(Promonta 製デョードクロジン液)の靜脈内注射がオレーフ油投與後の血中脂肪含量を強め且その期間を延長せしめると云ふて居るが同じく氏等が行ふた Roche 製のデョードクロジンでは如斯き現象を見なかつたと云ふて居る。氏等の實驗はデョートクロジン注射後8時間の経過を見たものであつて余等の如く長期に亘つたものでないからこれも比較することの出来ないのは勿論である。

IV. デョートクロジンの投與が動物の體重に及ぼす影響

豫備實驗で多數の動物が下痢の傾向を示したので本實驗では此點に留意したことは既に述べた所である。蓋し絶對的に下痢傾向を抑止して置かなければ體重の

減少がデョードクロジンの直接作用であるか或はそれによる下痢の結果であるかを判別することが出来ないからである。

第4圖に示すのはラノリン飼育後ラノリン投與を廢しデョードクロジンを與へたもの10例及びラノリン飼育後單にラノリン投與を廢止したもの10例の體重の變化を示すものであるがラノリン飼育中は對照のものに比べて體重の増加が著しく殊に脂肪の沈着を來し毛が光澤を帶び外觀的に甚だしき營養佳良の状態となる。これは多くの實驗者の既に經驗せる所である。然るに

第 4 圖

1). Klinische Wochenschr. S. 788 (1933).

今これにラノリン投與を廢しデョードクロジンを與へるときは漸次體重の減少を來すが次で又徐々に體重の増加して來るのを見る。この増加が如何なる原因に依るものであるかは説明し得ないが一定期間デョードクロジンを與へた後には習慣性を得るに至るのではあるまいか。

余等は又マウスを用ひてデョードクロジンの體重に及ぼす影響を實驗したが大體に於て著しき體重の減少と脂肪の減少を來すを見た。

實驗には體重 15.0g 内外の 雄性健康マウス 10 匹を用ひ日々體重を秤りつつ其 5 匹にはデョードクロジンナトリウムを普通飼料 (粉米及野菜) の中に 1 日量 0.003g を混じて與へ他の 5 匹にはデョードクロジンを與へず 實驗開始後 6 日目に未だ食餌を與へない前に屠殺し屍體を空氣乾燥器中で乾燥し粉末としソツクスレー浸出器でエーテルを以て浸出しエーテル可溶性物質を測定した。其結果を次表に示す。

對 照

日 動物番 附號	1	2	3	4	5	6	7	8	乾燥 重量 (g)	エーテ ルエキ ス(g)	エーテル エキ ス 乾燥 體 重
	體 重 (g)										
1	15.5	14.5	17.0	16.0	17.0	17.5	18.5	16.5	5.0	1.198	23.96%
2	14.5	14.5	16.5	17.0	17.5	18.0	19.5	17.5	5.2	1.576	30.31
3	15.0	16.0	18.0	19.0	19.0	20.0	21.5	19.0	5.25	1.082	20.61
4	13.5	15.0	17.0	18.0	18.0	19.0	20.5	18.0	5.15	1.184	22.98
5	11.0	9.5	10.0	11.0	12.0	13.5	14.0	13.0	3.52	0.748	22.27
平 均	13.9	13.9	15.7	16.2	16.7	17.6	18.8	16.8	4.82	1.169	24.25

デョードクロジンマウス

日 動物番 附號	1	2	デョ ード クロ ジン	4	5	6	7	8	乾燥 體 重	エーテ ルエキ ス	エーテル エキ ス 乾燥 體 重
	體 重 (g)										
1	15.0	15.0	17.0	14.5	15.5	15.0	12.5	12.0	3.22	0.250	7.76%
2	15.0	16.0	18.0	14.5	15.5	15.0	13.0	12.5	3.33	0.253	7.60
3	13.5	14.0	15.0	14.0	15.5	15.5	15.0	12.0	3.17	0.256	8.08
4	19.0	19.0	20.0	19.5	18.0	18.0	15.5	15.0	4.08	0.293	7.18
5	16.5	16.0	17.0	14.0	15.5	15.0	15.5	12.0	3.16	0.284	8.99
平 均	15.8	16.0	17.4	15.3	16.0	15.7	14.3	12.7	3.39	0.267	7.88

表に依て見ると對照動物は 7 日の経過に於て最初體重平均 13.9g のものが平均 18.8g 則ち 35.25% と云ふような著明なる體重の増加を來した 8 日目の體重の減

少は空腹時であるからである。而して8日目の平均體重は16.8gで乾燥重量4.82g エーテルエキス平均1,169gで乾燥體重に對し24.25%である。然るにチョードクロジンを與へた方は發育期であるにもかかはらず猶體重の減少を來した。即ち最初體重平均15.8gのものはチョードクロジンを與へるまでの3日の経過に於て平均17.4gに則ち約10%増加したものにかかはらずチョードクロジンを與へて5日の後には平均體重14.3gに則ち3日目の體重よりも17.8%減少した。對照動物のエーテルエキスが24.25%なるに對しチョードクロジンマウスに就ては7.88%實にその $\frac{1}{3}$ に減少したのを見る。而してこの間家兎に於て見るが如き下痢等の現象は全く認めることが出来なかつた。

如斯き家兎マウスに於ける體重の減少はチョードクロジンが又恐らく甲状腺物質の様に體内に於ける酸化作用を亢進するためであらう。後述の脂肪代謝及余等の一人及田中¹⁾の實驗による窒素代謝並に恐らく又含水炭素代謝亢進が其原因であるとも考へられる。反之單にラノリン投與を廢止した家兎では體重の減少を來すことなく尙徐々に増加して居るのを見ることが出来る。

V. 正常家兎の大動脈の所見

豫め余等は體重約2kgの雄性家兎4頭についてその大動脈壁を觀察して見たのに悉く正常光澤を放ち弓部及胸部大動脈壁等の内面は平滑である。又その横斷並に縦斷面について顯微鏡的所見は内面に附著物の沈著を認めない。又動脈壁各層の組織形態上に關しては排列は整然として何等の異狀を認めない。

番 號	ラノリン 投與日數	横 斷 面						縦 斷 面						概 評
		内面沈着物			内 膜 中 膜			内面沈着物			内 膜 中 膜			
		全	半	局	結締 織増殖	石 灰 沈 着	彈變 力性 纖維の	上	中	下	結締 織増殖	石 灰 沈 着	彈變 力性 纖維の	
		周	周	處				部	部	部				
71	90	+			+		+							+
72	〃				+									+
73	〃				+									+
74	〃		+				+		+					+
75	〃				+									+

(表中の空欄は變化なかりしもの)

1) 前出

VI. ラノリン飼育家兎の大動脈壁所見

ラノリン飼育 90 日後の家兎 5 頭に就てこれを剖検した. 熟れも弓部には動脈分岐部の周圍に灰白色丘狀のアテロームを形成し Nr. 71. Nr. 74 は特に著明 Nr. 73 及び 75 は中等又 Nr. 72 は軽度であつた. その内 Nr. 74 は胸部大動脈壁中心側に島嶼狀に羅列する微細な帶黃灰白色の斑點を認めた.

これを顯微鏡的に觀察すると Nr. 71. 74 はその變化が中等で特に Nr. 74 は中膜の變化をも伴ひ Nr. 72. 73. 75 の三頭はその變化が強度であつた. これを表示すると前頁の如くなる.

VII. ラノリン飼育後デョードチロジンを以て飼育した

家兎の大動脈所見

1) デョードチロジン飼育 22-45 日のもの

ラノリンで 90 日飼育した後 ラノリンの代りにデョードチロジンを 22-45 日間與へたもの 4 頭に就てこれを觀察した. その肉眼的所見は次表の様である.

大動脈内面の肉眼的處見

番號	デョードチロジン投與日數	弓 部 大 動 脈	胸 部 大 動 脈	變 化 程 度
99	22	著明灰白色膨隆斑點	島嶼狀に羅列するアテローム	++
100	23	散在性小なるアテローム	扁平丘狀のアテローム	+
79	35		微細なる帶黃灰白色斑點	+
120	45	著明長堤防狀のアテローム	微細なる帶黃灰白色斑點	++
(130) 對照	47	著明長堤防狀のアテローム	微細なる帶黃灰白色斑點	++

大動脈内面の顯微鏡的所見

番 號	デョード チロジン 投與日數	横 斷 面						總 斷 面						概 評
		内面沈着物			内膜. 中膜			内面沈着物			内膜. 中膜			
		全	半	局	結締 纖維 増殖	石 灰 沈 着	彈力 纖維 變性 の	上	中	下	結締 纖維 増殖	石 灰 沈 着	彈力 纖維 變性 の	
		周	周	處				部	部	部				
99	22		+		+		+				+		+	+
100	23			+										+
79	35													—
120	45	+			+		+	+			+		+	+
(130) 對照	47			+			+	+						+

今これ等變化の程度を肉眼的に觀察すると4頭中2頭は輕度他は中等度の附著物を認めたに過ぎぬが對照動物では中等度の附著物を認めた。

顯微鏡的所見は前表の様である。

表に示す様にジョードクロジンを投與した動物では沈著物陽性3例陰性1例であつたが、組織内部の變化殊に彈力纖維の伸展、鬆疎を示すもの2例のみでNr. 79,100の組織像に就ては變化を認めなかつた、則ちその變化の程度は概して對照と比較して輕度であつた。對照は沈著物、彈力纖維の狀況が高等の變化を示して居つた。

2) デョードクロジン飼育 82 日のもの

ラノリンで90日飼育した後ラノリンの代りにデョードクロジンを82日間與へたもの2頭に就て觀察したその肉眼的所見は次表の様である。

大動脈内面の肉眼的處見

番號	デョードクロジン投與日數	弓部大動脈	胸部大動脈	變化程度
85	82	灰白色板狀の肥厚		+
111	82	表面滑澤		-
(129) 對照	(84)	著明灰白色の膨隆 扁平丘狀のアテローム	鳥嶼狀に羅列する微細アテローム	++

動脈内面の變化は陽性竝に陰性各々1例で陽性のものを對照と比較すると内面變化は前者では輕度で後者では中等度であることを認めた。

前表に示す様にNr.85は微に沈著物を附著して居る。顯微鏡像は纖維排列正常縱斷面には中部に少許の沈著物を現はし彈力纖維正常Nr. 111は變化を呈して居ない。Nr. 129(對照)は沈著物、結締組織増殖、彈力纖維の變性等總て高度であることを認めた。

3) デョードクロゲン飼育 90-91 日のもの

ラノリンで90日飼育した後ラノリンの代りにデョードクロジンを90-91日間與へたもの15頭について觀察した。その肉眼的所見は次表の通である。

前表實驗家兎15例中陰性は2例であるが陽性の13例を見ると中等度4例、輕度9例の結果を示すにかかはらず對照家兎3例は中等度が2例輕度が1例を示した。

この實驗に於て陰性のもの2例を除外しても爾餘の13例と對照例3例とを比

大動脈内面の肉眼的所見

番號	デョードクロジン 投與日數	弓 部 大 動 脈	胸 部 大 動 脈	變化 程度
76	90	滑澤		—
78	〃	長堤防狀を呈するアテローム		+
80	〃	著明膨隆, 不正凹凸	島嶼狀に羅列する微細なるアテローム	廿
81	〃	灰白色膨隆又は斑點	島嶼狀に羅列する微細なるアテローム	廿
82	〃	著明丘狀をなすアテローム	粗大なる灰白色膨隆	廿
83	〃	長堤防狀の隆起		+
84	〃	灰白色不正の凹凸		+
86	〃	島嶼狀に羅列する隆起		+
87	〃	滑澤		—
88	〃	灰白色粗大の隆起		+
89	91	少數灰白色の隆起	島嶼狀に羅列する微細アテローム	+
90	〃	少數微細なる灰白色アテローム	島嶼狀に羅列する微細アテローム	+
91	〃	數大なる灰白色膨隆	少數の微細なるアテローム	+
92	〃			+
94	91	著明なる長堤防狀膨隆	少數島嶼狀に羅列するアテローム	廿
(126) 對照	(90)	著明灰白色の膨隆又は斑點	多數島嶼狀に羅列するアテローム	廿
(127) 〃	(〃)	著明灰白色の膨隆又は斑點		廿
(128) 〃	(〃)		微細島嶼狀に羅列するアテローム	+

較觀察して見ると對象家兎は中等度の變化を残しているが實驗例では輕度のものが多いと云ふ事が出来る。

大動脈内面の顯微鏡的所見

番 號	デョード クロジン 投與日數	横 斷 面						縦 斷 面						概 評
		内面沈着物			内膜. 中膜			内面沈着物			内膜. 中膜			
		全	半	局	結締 織増殖	石灰沈 著	弾力性 纖維の	上	中	下	結締 織増殖	石灰沈 着	弾力性 纖維の	
		周	周	處				部	部	部				
76	90						+						+	一
78	〃			+	+									廿
80	〃	廿			+		+	廿	廿	廿	+	+	+	廿
81	〃		+					廿		廿	+	+	+	廿
82	〃	廿			+		+		+	+	+	+	+	廿
83	〃	廿			+		+	+	+		+	+	+	+
84	〃		+		+		+	+			+	+	+	廿
86	〃		廿		+		+	+	+		+	+	+	一

87	90											—
88	90	+			+	+	+		+	+		+
89	91				+	+		+			+	+
90	91		+	+			+		+	+	+	+
91	91					+	+					+
92	91											—
94	91		+		+	+			+	+	+	+
(126)	91		+		+	+			+	+	+	+
對照	(90)			+	+	+	+	+	+	+	+	+
(127)	(90)	+			+	+	+	+	+	+	+	+
92	(90)	+			+	+	+	+	+	+	+	+
94	(90)	+			+	+	+	+	+	+	+	+
(128)	(90)	+			+	+	+	+	+	+	+	+
92	(90)	+			+	+	+	+	+	+	+	+

實驗家兎の中で Nr. 76, 87 は肉眼的竝に鏡檢的變化なく Nr. 92 は肉眼的内
膜面に僅かの沈著物を認めたが鏡檢上形態學的變化を示して居ない。爾餘 12 例
中輕度の變化を呈したのは 6 例、中等度の變化 6 例を認めた。然るに對照家兎は
3 例中輕度 1 例、中等度 2 例を表した。要するに實驗動物 15 例中 3 例を除外し 12
例について輕度及中等度の變化が相半して居る。然るに對照家兎については中等
度の變化を呈したものが多數であつた。

4) デョードチロジン飼育 92-95 日のもの

ラノリンで 90 日飼育した後ラノリンの代りにデョードチロジンを 92-95 日與
へたもの 20 頭について觀察したその肉眼的所見は次表の様である。

大動脈内面剖檢後の肉眼的剖見

番 號	デョード チロジン 投與日數	弓 部 大 動 脈	胸 部 大 動 脈	變化程度
95	92	滑澤		—
96	92	微細なる灰白色斑點		+
97	92	微細なる灰白色斑點		+
98	92	滑澤		—
101	92	著明廣汎なる隆起	著明扁平丘狀アテローム	+
102	93	島嶼狀に羅列するアテローム	微細なる灰白色の斑點	+
103	93	島嶼狀に羅列するアテローム	島嶼狀羅列するアテローム	+
104	93	島嶼狀に羅列するアテローム	少數の小なるアテローム	+
105	93	數個丘狀のアテローム		+
106	93		幽微なる長形灰白色隆起	+
108	94	扁平丘狀のアテローム		+
112	94	滑澤		—
113	94	島嶼狀に羅列する灰白色のアテローム	島嶼狀に羅する灰白色のアテローム	+
114	94	少數灰白色の隆起	長堤防狀のアテローム	+

115	〃	灰白色長堤防狀の隆起	島嶼狀羅列するアテローム	+
116	〃	長堤防狀の隆起		+
93	95	著明廣汎なる扁平丘狀隆起		廿
117	〃	滑澤		一
118	〃	扁平丘狀の隆起散在		+
119	〃	滑澤	灰白色斑點散在	一
(121) 對照	(94)	滑澤		一
(122) 〃	〃	著明長堤防狀のアテローム		廿
(123) 〃	〃	扁平丘狀のアテローム		廿
(124) 〃	(95)	島嶼狀に羅列する微細なるアテローム		+

大動脈顯微鏡的所見

番 號	デョード チロジン 投與日數	横 斷 面						縦 斷 面						概 評
		内面沈着物			内膜, 中膜			内面沈着物			内膜, 中膜 の變化			
		全 周	半 周	局 處	結 締 殖 織	増 殖 灰 沈	着 弾 力 變 性 維	上 部	中 部	下 部	結 締 殖 織	増 殖 灰 沈	着 弾 力 變 性 維	
95	92						+						+	+
96	〃						+		+				+	+
97	〃						+	+			+		+	+
98	〃						+	+			+		+	+
101	92	廿				+	+	廿	廿		+		+	+
102	〃		+			+	+	+	+				+	+
103	93			+			+	+	+				+	+
104	〃	廿				+	+	+	+		+		+	+
105	〃		廿	+		+	+	+	+		+		+	+
106	〃			+		+	+		+		+		+	+
108	94		+			+	+	+	+		+		+	+
112	〃					+	+	+	+		+		+	+
113	〃		廿			+	+	+	+		+		+	+
114	〃					+	+	+	+		+		+	+
115	〃		+			+	+				+		+	+
116	〃		廿			+	+	+	廿		+		+	+
93	95	廿				+	+	+	廿	+	+		+	+
117	〃													+
118	〃		廿			+	+	+						+
119	95													+
(121) 對照	(94)													+
(122) 〃	(〃)	廿				+	+	+	+		+		+	+
(123) 〃	(〃)		+			+	+	+	+		+		+	+
(124) 〃	(95)	廿				+	+	+	+	+	+		+	+

前表 20 例中陰性と認むるのは 5 例残餘 15 例中の變化は中等度 2 例輕度 13 例である。對照の方 4 例中に 1 例陰性があるが大體から云ふならば實驗例の多數は輕度であつて對照例は尙未だ中等度の變化を残していると云つてよい。

實驗家兎中 Nr. 98, 117, 119 の 3 例は肉眼的竝に鏡檢上に正常であつた, 又 Nr. 95, 112 の 2 例は肉眼的内膜面が滑澤であつたにもかかはらず鏡檢上前表に示す如く極めて輕度の變化を認めた。而して殘餘 15 例中 8 例は輕度, 7 例は中等度の變化を認め又對照家兎 4 例中の 1 例は陰性他の 3 例は中等度の變化示した。要するに實驗家兎に於ては變化の輕度のものが對照例に比べて多い。

VIII. ラノリン飼育後デョードチロジン投與家兎中肉眼的及顯微鏡
的共に輕度の變化を認めたるものの大動脈壁脂肪染色上の所見

番號	デョードチロジン 投與日數	表面脂肪沈着狀態				中膜内脂 肪沈着	脂肪球大さ		
		全 般	膨 隆	密	粗		大	小	不 同
100	23	+		+				+	
78	90	+		+				+	
84	"		廿		+				+
88	"		廿		+	+			+
89	91	+			+	+			+
90	"	+			+	+			+
91	"		廿		+				+
95	92		廿		+				+
96	"	+			+				+
102	"	+			+				+
103	93	-							
104	93	+			+		+		
105	"	+			+		+		
106	"				+			+	
108	94		+				+		
112	"				+			+	
114	"				+		+		
118	95	+						+	

前表に示す様に大動脈内面の脂肪染色上の所見はその表在するものと内部に存在するものとは自ら異なつた所見を呈するが大要その沈着の多寡及び脂肪球の形狀等を 18 例について區別して大體次に掲ぐる成績を得た。

- 1) デョードチロジン投與初期 (23 日間) のものについては大動脈内面全般に脂肪小滴が集合する。

2) デョードクロジン投與長期 (90 日間) のものでは.

- (i) 大動脈内面に表在する脂肪は小滴となつて鬆疎に撒布し内方に進むに従つて中等大となり且つ形態不同の脂肪球を表はす様になる.
- (ii) 大動脈内面に表在する脂肪小滴はこれを投與初期のものと比較すると僅少となつて居る.

IX. ラノリン飼育家兎肝臓の重量及デョードクロジン投與の影響

ラノリンを以て家兎を飼育し長期に互るときは多くの場合にその肝臓に灰白色の斑點を生じ甚しい時には全面が灰白黄色を呈するに至ることがある. 余等は豫試験でかくの如き例の多數を實驗した. 本實驗では 90 日間ラノリンで飼育したものの 5 例を剖檢した所が僅かに 1 例に於て肝臓の著明なる變化を見たのみであるが其後デョードクロジンを以て處置したものの内處置日數日 64 迄に死亡したものの 8 例中 5 例まで如斯き變化を見た. 處置日數 82-95 日のもの 37 例及對照動物 10 例では 1 例も如斯き變化を認めなかつた. 惟ふに 90 日ラノリン飼育のもの 5 例中 1 例陽性であつたにもかかはらず次の 8 例中 5 例迄陽性であつたのは第 8 圖で見る様にデョードクロジンを與へてもラノリン飼育廢止後一定時日中は血液内脂肪及コレステリン量が著しく過多なるがためその間これ等の蓄積に依て如斯き多數の陽性例を生じたものである可く 82 日以後のもの及對照例に於てこれを見ないのは血液内脂肪及コレステリンが正常若くはデョードクロジンを投與した場合にはそれ以下に低下したため肝臓に蓄積せられたものも漸次消費せられて正常の外見に復したものと考へられる.

正常なる肝臓のコレステリン含量は森田¹⁾によれば平均 0.61% 佐々木²⁾によると 0.74% 齋藤³⁾によると 0.254% であると云ふ. 然るに今ラノリンを 1 日量 3.0g 宛 137 日間飼育した 1 例を剖檢して見たのに體重 2.65kg 肝臓 115.0 で全く黄白色を呈して居つた. その 4.0g を秤取して水分を大體蒸發せしめたものをエーテルを以て 1 回浸出し更に残渣を乾燥粉末としエーテルでソックスレー装置で浸出し前のエーテル浸出物と合併しエーテルを蒸餾し去り乾燥して恒量を得るに至つたエーテル抽出物 0.6728g を得た. 更にこのものを鹼化して結晶性不鹼化物即ちコレステリンと思惟さるもの 0.328g を得た. 即ちコレステリンの含量

1). 齋藤, 兒科雜誌 357-9 號別刷第 40 頁 (昭和 5 年).

2). 日本微生物學雜誌, 第 16 卷第 5 號.

3). 兒科雜誌, 第 357-8 號 (昭和 5 年).

8.2%で正常家兎のコレステリン含量とは比較にならぬ多量を含んで居る。

コレステリンを以て飼育した家兎の肝臓重量に就て Anitshkow 及 Chaladow¹⁾ 又 Waeker 及 Hueck²⁾ は共にその重量が増加して居る事を報告して居る。Brown³⁾ は正常家兎に於て體重 2.0-2.2kg のものに於て平均 80.0g 關係重量 4.4%。佐々木⁴⁾ は 2.2kg の家兎にては 86.0g 關係重量 3.33%であつたと云ふて居る。余等の實驗結果は次表の通りである。

飼 育 方 法	體重 (k)	肝臓重量(g)	關係重量
90 日間ラノリン飼育せるもの (5 例の平均)	2.28	84.0	3.68%
90 日間ラノリン飼育後 46-95 日間通常食にて飼育せるもの (10 例平均)	2.47	89.3	3.12%
90 日間ラノリン飼育後 90 日間デョードチロジンにて飼育せるもの (10 例の平均)	2.395	73.0	3.04%

余等の實驗を観察すると 90 日間ラノリンで飼育し所謂ヒペルコレステリミネーの状態にあるものに於てはその肝臓の重量が最も重くデョードチロジンで處置したものに於て最も軽く對照例はデョードチロジンで處置したものに比へて稍重いのを見る。即ちこれを以て見るときはその外觀に依ても略明である様にラノリンで飼育したものでは脂肪及びコレステリンの沈着を來し。それがために重量の増加を來したるものである可く又ラノリンを廢しデョードチロジンを與へ或ひは單にラノリンを廢したのみのものは共に肝臓に沈着せる脂肪及コレステリンが徐々に減少しその重量を減するものであらうがデョードチロジンを與へたものでは猶幾分著明に肝臓の重量の減少を來したものであらう。余等が行ふた正常家兎に於ける 1 例に於ては體重 2.25kg 肝臓重量 55.0g 即ち關係重量 2.44% エーテル抽出物 3%であつた。

X. ラノリン飼育家兎副腎の重量及デョードチロジン投與の影響

正常家兎副腎の重量に就て Brown⁵⁾ は平均重量 0.358g 關係重量 0.0197% Majassnikow 及 Iljinsk.⁶⁾ は平均重量 0.3-0.5g, 佐々木⁷⁾ は平均重量 0.3g 關係重量 0.0131% 堀江⁸⁾ は左側 0.116g 右側 0.108g 關係重量左側 0.01% 右側 0.009% 齋藤⁹⁾ は 3 例の平均左側 0.26g 右側 0.24g 關係重量左側 0.0116% 右側 0.0104% 伊藤及三島¹⁰⁾ は 5 例平均に就て關係重量 0.01594% を得た。

以上掲げた文獻に依つて略正常家兎の副腎重量を伺ふ事が出来る。

- 1). 前出 2). Arch. f. exp. Path., **74** S. 416, 432 (1913-14). 3). J. of. biol. chem., **42** p. 69 (1925). 4). 前出 5). 前出 6). Zeitschr. f. g. exp. Med. **53**, S. 100 (1926). 7). 前出 8). 滿洲醫學會雜誌, 第 7 卷第 6 號 (1927). 9). 前出 10). 日本內分泌學會雜誌, 第 6 卷第 1 號 (昭和 5 年).

然るに余等がラノリン飼育した家兎はこれ等に比べて著しく其重量を増加し殊に皮質の肥厚して居るのを見た。即ち次表の如くである。

飼 育 方 法	體 重 (k)	副腎重量 (兩側) (g)	關係重量
90 日間ラノリンにて飼育せるもの(5 例の平均)	2.28	1.242	0.0546%
90 日間ラノリン飼育後 46-95 日間通常食に飼育せるもの (10 例の平均)	2.47	0.755	0.0310%
90 日間ラノリン飼育後 90 日間デョードチロジンにて飼育せるもの (10 例の平均)	2.395	0.7093	0.0292%

即ちこれで見るとラノリン飼育に依て副腎の重量は著しく増加するがラノリン飼育を廢めると漸次その重量を減じ、デョードチロジンを與へると猶幾分減少の度を増加するらしく恰も前節の肝臓の場合と類似した結果を得た。

XI. ラノリン飼育デョードチロジン處置家兎の副腎、
腎臓及肝臓の脂肪染色所見。

番 號	デョードチロジン投與日數	腎 臓		副 腎	肝 臓		
		絲毬體	血管壁	皮 質	小葉中 心部	グリソ ン氏鞘	膽 管
99	22	+	+	+	+	+	+
(130)	(47)(對)	+	+	+	+	+	+
120	45		+	+		+	
(129)	(84)(對)			+			
80	90			+	+		+
81	"		+	+	+		+
82	"	+		+		+	+
86	"		+	+		+	+
94	91	+		+	+		
(126)	(90)(對)		+	+		+	+
97	92		+	+		+	+
101	"			+		+	+
116	94			+			

大動脈壁に高度の變化を認めた實驗家兎 10 例及び對照 3 例の各腎臓、副腎、肝臓の脂肪染色狀態を觀察した成績は前表に示す様で

1. 對照家兎 3 例

- 1) 腎皮質血管周圍に僅かの脂肪を認める。
- 2) 副腎皮質には毎常著明の脂肪沈着がある。
- 3) 肝臓の中心靜脈の周圍、グリソン氏鞘内にある膽管に 著明の脂肪沈着がある。

2. 實驗家兎 10 例

- 1). 腎皮質血管周圍に 5 例僅かの脂肪を認めた.
- 2). 副腎皮質には毎常著明の脂肪沈着がある.
- 3). 肝臓の中心靜脈の周圍, グリソン氏鞘内にある 膽管に著明の脂肪沈着があるものが 4 例僅少のものが 4 例陰性のものが 2 例あつた.

以上 11 章に互つて述べた實驗家兎各個の實驗事項其他を一括して下に掲げる.

豫備試験 ラノリン飼育 90 日後剖檢したもの

肝臓重量の項の符合は脂肪沈着の有無を示すもので總て肉眼的所見である.

動物番號	ラノリン投與期間(日)	ラノリン投與日數	投與ラノリン量	最初體重 kg	最終體重 kg	肝臓 g	副腎 g	腎臓(一側) g	脾臓 g	睪丸 g	大動脈變化	一般脂肪沈着
71	90	77	235.0	1.90	2.49	90.0 — 65.0	0.94	6.05	0.57	4.95	卅	廿
72	90	77	230.0	2.00	2.45	— 65.0	0.71	5.71	0.98	4.06	+	+
73	90	77	235.0	1.90	2.15	96.0 卅	0.74	5.91	1.42	4.91	卅	卅
74	90	77	235.0	1.90	2.19	78.0 —	0.87	5.06	0.91	4.74	卅	+
75	90	77	231.0	1.97	2.11	91.0 —	1.86	7.11	1.63	1.98	卅	—

對照試験 ラノリン飼育 90 日後一定時日の間ラノリン投與を廢止して屠殺檢査したものである. 數字は其他の記載は豫備試験の項と同じである.

動物番號	ラノリン投與後の日數	ラノリン投與期間(日)	ラノリン投與日數	總投與ラノリン量	ラノリン最初體重 kg	ラノリン最終體重 kg	剖檢時體重 kg	肝臓 g	腎臓 g	副腎 g	脾臓 g	睪丸 g	大動脈變化	一般脂肪沈着	殺
130	46	90	77	238.0	2.03	2.61	2.67	79.0 —	13.71	0.63	0.67	4.49	卅	卅	殺
129	83	90	77	233.0	1.73	2.86	2.45	69.0 —	9.73	0.71	1.66	5.80	卅	+	殺
128	90	90	77	233.5	2.01	2.28	2.27	60.0 —	13.5	0.7	0.7	2.40	+	卅	殺
127	90	90	77	237.5	1.97	2.47	2.47	90.0 —	12.8	0.72	0.73	6.65	卅	卅	殺
126	90	90	77	233.5	2.63	3.01	3.09	77.0 —	12.8	0.74	1.00	8.3	卅	+	殺
125	93	90	77	232.0	1.62	2.29	2.44	79.0 —	11.56	1.07	1.71	5.36	卅	卅	殺
123	94	90	77	235.0	1.85	2.38	2.31	98.0 —	14.58	1.05	1.18	4.31	卅	卅	殺
122	94	90	77	232.0	1.92	2.58	2.52	90.0 —	13.70	0.61	1.25	5.54	卅	卅	殺
121	94	90	77	233.0	1.70	2.00	2.00	55.0 —	12.72	0.64	0.86	5.01	—	卅	殺
124	95	90	77	232.0	1.90	2.40	2.49	96.0 —	14.41	0.68	1.49	4.37	+	卅	殺

本實驗 ラノリン飼育 90 日後デョードチロジンを一定時日與へ剖檢したものである.

— 74 —

115	90	77	238.0	1.95	2.28	94	81	24.3	2.41	80.0	1.30	14.42	1.69	0.61	+	廿	殺
114	90	77	233.0	1.78	2.41	94	81	24.3	2.36	85.0	1.10	13.50	4.50	0.70	+	廿	殺
116	90	77	238.0	2.00	2.40	94	81	23.4	2.31	124.0	1.20	14.17	4.00	0.68	+	廿	殺
93	90	77	236.5	2.02	2.20	95	82	24.6	2.15	74.0	1.22	12.30	4.28	0.72	廿	+	殺
117	90	77	235.0	1.98	2.30	95	82	24.6	2.33	82.0	0.72	15.37	4.57	0.98	-	廿	殺
118	90	77	235.0	1.82	2.44	95	82	24.6	2.32	87.0	0.85	13.50	4.97	0.92	+	廿	殺
119	90	77	238.0	1.60	2.35	95	82	24.6	2.49	105.0	1.00	15.72	4.73	0.70	-	+	殺

上記の表で見る様に豫試験的に剖検したものでは大動脈變化著明のもの 40% 中等度のもの 40% 軽度のもの 20% となり對照のものは著明のもの無く中等度のもの 70% 軽度のもの 20% 陰性のもの 10% となりデョードチロジンを與へたものでは著明のものなく中等度のもの 22.2% 軽度のもの 58.8% 陰性のもの 20% となつて居る。元より例數が同數でないからこの數を以て直ちに正しい値とすることは出来ないであらうが併し大體に於てデョードチロジンを投與したるものは對照に比較して實驗的動脈硬化を認めるものが少數であると云ふことが出来ると思ふ。

XII. 第 1 編の總括及結論

總括 ラノリンで家兎を飼育(1 日量 3.0)すると多くの人の實驗と等しく血中の脂肪及コレステリン量が増加する。而して約 3 週の後には極點に達してその量は正常のものに比べて約 10 倍となる。

如斯く増加した血中脂肪及コレステリンはラノリン投與を中止すると漸次その量が減じて遂には正常のものに近くなつて行くがデョードチロジンを與へた場合にはその速度が一層速かである。即ちデョードチロジンは脂肪及コレステリン代謝に影響を與へ従て體重にも影響を與へるものである。併し體重減少は單に脂肪代謝の盛となるためにのみによつて顯れるものではあるまい。ラノリン家兎にデョードチロジンを與へると一旦減少した體重は後再び元に復せんとする傾向を見るがこれは習慣性を得たるためであらう正常マウスはデョードチロジンの投與で著しく體重の減少を來し正常マウスはその乾燥體重に對し脂肪量が 24.25% であつたのに對しデョードチロジンを與へたものに於ては約 $\frac{1}{3}$ の 9.88% となる。

先きに述べた様にラノリン飼育に依て血中脂肪及コレステリン量は著しく増加し 90 日飼育したものでは大動脈に著明なるアテローム變性を認める事が出来る。かくの如くして出來た所謂動脈硬化症に對してデョードチロジンは如何に影響す

るかを調べて見た。90 日間ラノリン飼育をしたものの 5 例は輕重の差こそあれ全部に變化を認めるが此動物にデョードクロジンを 22-95 日與へた 45 例では著明な變化を呈するもの無く約 20%が中等度の變化を示すに過ぎない。

以上は肉眼的所見であるが顯微鏡的検査に依ても亦さきのラノリン飼育 90 日のもの 5 頭には全部變化を認め對照例に於ては中等度の變化を示すもの 78% なるにかかはらずデョードクロジンを與へたもの 41 頭には約 44% に於て中等度の變化を認めるに過ぎぬ。即ち肉眼的にも亦鏡檢的にも明にデョードクロジンが動脈硬變症に關して好影響を與へて居ると見る事が出来る。

又大動脈壁の脂肪を染色して見るとラノリン家兎にデョードクロジンを與へた初期のものは大動脈内面全般に脂肪小滴が集合して居るが長期に亙つたものでは脂肪小滴が鬆疎に撒布し且つ内部に進むに従つて中等大且形狀が不同となつて現れる。

ラノリンで久しく家兎を飼育すると肝臓に脂肪及コレステリンが著明に蓄積して灰白色となる。その結果肝臓の重量は増加する。今ラノリン投與を廢止すると漸次其重量の減少を來すがデョードクロジンを與へると幾分か重量の減少が早くなる。即ち體重との肝臓の關係重量はラノリン飼育直後のものは 3.68% 一定期間ラノリン飼育を廢止したものでは 3.12% デョードクロジンを與へたものでは 3.04% であつた。

家兎副腎はラノリン飼育に依て著しくその皮質が肥厚して平均兩側副腎の重量は 1.242g であつた。而して肝臓の場合と等しくラノリン處置直後のものは體重との關係重量が 0.0546%一定期間ラノリン飼育を廢したものは 0.031%デョードクロジンを與へたものは 0.0292% でその關係は肝臓の場合と類似して居るが猶一層著明である。恐らくこれ等重量減少の機作は肝臓の場合と同じであらふ。猶肝臓、副腎等の脂肪染色を行ふて見ると肝臓ではデョードクロジン投與初期のものでは脂肪は主として中心性であつて長期に亙つたものは肝小葉グリソン氏囊内にある中小膽管上皮内にあつた。

副腎皮質には何れの場合にも著明の脂肪沈著を認め又肺臓血管壁も對照例も實驗例に於ても血管壁に僅少の脂肪出現を見た。

結論 11 日量 3.0g のラノリンで家兎を飼育すると血中脂肪及コレステリンが著しく増加して一定時期の後には一定量となる。

2. 其結果の一として大動脈に著明のアテローム變性を來す。
3. この際デョードチロジンを與へると單にラノリン投與を廢したのみのものに比べて前者の方が著明に大動脈壁の變化が減少し中には正常にまで復したものであるまいかと考へられるものがある。
4. 併し單にラノリン投與を廢したもののみにても大動脈壁の變化は減少する様であるがデョードチロジンを與へたものの方が其減少の度が著明である。
5. ラノリン飼育家兎は脂肪が沈著して體重が増加するがデョードチロジンの投與に依つて一時減少する様である。正常マウスでは著しき體重の減少を來す。
6. 副腎, 肝臓も亦ラノリン飼育に依つて脂肪, コレステリンの沈著のためその重量が増加するがデョードチロジンの投與に依て其重量が減少する。
7. これ等に依て見るならばデョードチロジンの投與は脂肪及コレステリンの代謝を亢進せしめるものであることが分る。

第 2 編

實驗的アドリナリン型動脈硬變症に對するデョードチロジンの影響

森及篠井¹⁾はコレステリン型動脈硬變症の發生はデョードチロジンを同時に與へる事に依て抑制されることを報告して居り, 余等は又前編に於て既に發生したコレステリン型動脈硬變症に對しても亦デョードチロジンが相當の效果ある事を實驗した。

更に進んば余等はデョードチロジンがアドリナリン型動脈硬變症に對して如何に作用するかを實驗することとした。而して先づ最初にはデョードチロジンの投與がアドリナリン型動脈硬變症の發生を抑制することが出来るかどうかを實驗した。

最近香川²⁾はアドリナリンに依る實驗的動脈硬變症に對してヨード及チロキシンの小量に抑制的に作用することを報告して居る。而してヨードは直接に作用するものでなくしてヨードの投與により甲狀腺ホルモンが產出せられ, その產出せられたホルモンが有効に作用するのだとして居る。して見ると甲狀腺の副ホルモンとまで考へられて居るデョードチロジンの作用を試みて見るものも強ち無益では無い譯である。

實驗には體重 2kg 近くの雄性家兎 10 頭を 2 分しその 5 頭には毎日デョードチロジンナトリウム 0.3g 宛を溶液として飼料に平等に混和して與へ又 10 頭全部に鹽酸アトリナリン液(三共製 0.1%液)を 1 日量 0.3cc より漸次に増量し動物の健康状態を考慮しつつ最大 1cc まで耳靜脈内に注射した。而して 8 日目にその内 2 頭が斃死したのでそれを機會に全部を剖檢して肉眼的觀察をした結果は次の

1) 前出

2) 前出及日本藥物學雜誌, 第 16 卷第 1 號 S' 1, (1933),

通りである。

	最 初 體 重	アドリナリン線量	デヨードチロジン線量	肉眼的動脈變化
	1.90	3.3cc	1.40	++ +
	1.67	"	1.60	—
	2.25	"	1.60	—
	1.98	"	1.85	—
	1.95	"	2.10	—
對 照	1.99	"	—	++ ++
	1.80	"	—	++ ++
	1.85	"	—	—
	1.76	"	—	++ +
	1.82	"	—	+

註 デヨードチロジン量に差違あるは全部の飼料を喰盡さざりしためなり

此表で見る様に對照動物は只1例を除く外最も著明なる變化を起したものの2例著明なるもの1例輕度のもの1例であつたにかかはらずデヨートチロジンを注射した例のものは著明なるもの1例の外は全部陰性であつた。この實驗は只1回のみで例數も少ないから非常に確實なものでないかも知れぬが兎に角如上の條件で行ふた實驗の結果は非常に好結果であつてデヨードチロジンは又アドリナリン型動脈硬變症の發生を防止する作用を持つて居るものと考えられる。但しこれがデヨートチロジン直接の作用であるか或ひは二次的のものであるかは更に精査を要する問題である。

會 務 報 告

○編輯主任會

昭和九年三月九日東京帝大藥學科緒方教室に於て 本會發行藥學雜誌編輯會を開く 本年三月號編輯の件に就て協議し更に來年度編輯豫算の件に就て協議せられたり當日の出席者下記の如し

編輯委員長 緒 方 章

編輯委員 高 木 誠 司 畑 忠 三 菅 澤 重 彦 北 川 順
平 野 四 郎 前 田 賛 郎 田 中 穰 石 黒 武 雄