油エーテルにて Pyrrolessigester と分離し混融試験により確認す, 目的物たる Pyrrolypyrrol 誘導體は得られず.

2,4-Dimethyl-5-pyrrolessigester と Aminoacetessigester との縮合

2,4-Dimethyl-5-pyrrolessigester 0.5g Aminoacetessigester 0.45g 醋酸ソーダ 0.35g, 75%の醋酸 2.5g とを 60° に3時間加熱し水にて醋酸をうすめるに Pyrrolessigester 0.3g を回収し尙母液よりは前述の Pyrazin (Fp. $85-86^{\circ}$) と Pyrrolessigester とを得 Pyrazin が石油エーテルに易溶なる事を利用して Pyrrol と分け別に合成品と混融するに融點降下せず.

他に種々の反應條件脱水劑を使用するも兩物質の縮合を見ざりき.

海藻中のヨードに関する研究 (第二報)

海藻及其の浸出液の透析

増 田 悦 男

西 田 欽 治

(大阪廣榮株式會社研究室)

(昭和9年4月30日受理)

E. Masuda und K. Nishida: Über Jodverbindungen in Seetamgen(II).

著者の一人(増田)は曩に第一報(本誌 623, 25. 1934) に於てカヂメ *Ecklonia cava* の藻體中には強き還元性を有する物質を含有し其の浸出液は假令 KJ の如き無機ヨード化合物を加ふるも硫酸々性に於て亞硝酸に依り充分にヨードを遊離せざる事を指摘せり. このものに就き高橋氏(東京工業試験所報告 26, 1. 1931)は昆布科海藻中カヂメ, アラメ, ツルアラメ等の表皮中に存在する黒褐色々素を得, 化學式を $C_{46}H_{38}O_8(OH)_{10}(CO)_2$ と推定し一種のタンニン性物質なりとせり. 無晶形にして高分子量を有するが故に水にて浸出する事に依り Kolloid Sol としてあるものと想像せらる. ヨード化合物も或は斯る物質として存在するに非ずやと思ひ透析に依りて無機のヨード及び他の Krystalloid 物質と分離せんと試みたり. 文獻に徴するに Pincussen 及 Roman 兩氏 (Bioch. Z. 216, 336-61. 1929) は動物體中に含む有機及無機のヨードを Electrodialyse に依りて分別し, Lieben 及 Eh-

rich 兩氏 (Bioch. Z. 222, 221-5. 1930) は Casein に化學的にヨードを附加せるもの, Thyrosin, Dijodtyrosin 及 Thyreoidin 等に水銀石英燈照射を行ひて其のヨードの幾分が無機化する事を認め其の分別に Dialyse を用ひたり. 著者は透析すべき Membran として牛の膀胱及び Collodium を用ひ實施方法は最も簡単に驗體を透析用膜より成る袋に入れ大なるビーカーに入れたる水中に浸漬し内外液面を常に同一に保たしめたり.

乾燥粉末カヂメのアルコール温浸に依りて得たる水溶液 (調製法實驗の部に記載) を使用して透析を行ひたるに還元性物質は透過せざれども, ヨード化合物は豫期に反して大部分透過す. 外部を流水にて透析するにヨードの透過速度は動物性膜にては 4 時間にして 70% を, 24 時間にして殆んど全部を透過しコロジウム膜にては 5 時間にして殆んど全部のヨードを透過す.

外部を一定量の蒸溜水にて透析を行ふに動物性膜にては外液常に無色透明にして還元性を有せざれどもコロジウム膜を使用せる時は褐色にして還元性を有す.

膀胱膜を使用しカヂメ水溶液を透析に附するに 53 時間にして透過せるヨードは全ヨードの 93% にして其の内無機ヨードとして 86%, 有機ヨードとしては僅に 7% を得たり. 然るに乾燥カヂメ粉末を蒸溜水と共に膀胱膜に入れ外膜を同じく蒸溜水にて透析するに 62 時間にして其の含有するヨードの 66% を透過し其内無機ヨードとして 26%, 有機ヨードとして 40% を得且つ其の透過の状態を見るに透析の初期には無機ヨードの方を多く透過すれども次第に其の透過量を減じ有機ヨードの割合を増加し 12-13 時間の後には無機ヨードの透過は全く認められざる様になり有機ヨードのみ尙透析されて出づ. 斯く温浸々出液及び原藻粉末の透析結果よりカヂメ原藻中に存在するヨード化合物が温浸其他の操作の際受くる影響の如何に大なるかを明かに認むる事を得. 昆布に於ても亦同じ.

カヂメ粉末に水を加へたるもの又は温浸々出液に少量の過酸化水素水を加へ膀胱膜中に入れ, 外部の蒸溜水中にも同様に過酸化水素を加へ, 内外の濃度を同一になして透析するにヨード化合物の透過甚だ少量にして且つ殆んど全部有機ヨードなり. 温浸々出液の場合は 18 時間にして 26% を原藻粉末の場合は 22 時間にして 12% を透過するに過す. 然るに過酸化水素の存在は有機ヨード化合物例へば Monojodessigsäure, Dijodaceton の如きものの透過には何等注目すべき障碍を與へざるが故に透過せずして残留するヨード化合物は Kolloid として存在すと考へら

る。膀胱膜内の液を濾別し残渣をよく水にて洗ひたる後残渣中のヨードを定量するに尙全ヨードの 45% を残留す。過酸化水素は細胞膜中のヨード化合物に作用して一部を水に難溶となすと云ふを得べし。過酸化水素の濃度は非常に稀薄なる場合に於ても同様にして 0.03% の過酸化水素を使用せるに無機ヨードを透過し來らず。

カヂメ粉末に少量のヨードカリを加へ 0.03% 過酸化水素水を以て透析を行ふに無機ヨードを透過すれども加へたるヨードカリの全部をば透過せずして有機ヨードの透過割合を増加す。

カヂメ昆布類の水及びアルコール温浸々出液に就き其の PH を測定するに共に微に酸性にしてカヂメの方稍強し。驗體 5g を 100cc の蒸留水を以て温浸して得たる液はカヂメに於て PH 5.07 昆布に於て 5.93 なり。故に微アルカリ性 (0.001 N. Na_2CO_3) 液にて過酸化水素の作用に就て實驗せるに差異なきを知りたり。此の事實よりして海藻が酸性なるが故に過酸化水素に依り Jodid のヨードを遊離し其のヨードが他の有機化合物に附加するには非ざる事を證すと云ひ得べし。

以上の事實を綜合して考察するに海藻の生體中には其の含有するヨードの大部分を分子量の大なる鎖狀不飽和化合物として保有し居るものなるも甚だ分裂し易く Enzym の如きものの作用又は乾燥、温浸等の操作に依りて小分子の有機ヨード化合物又は Jodid に分解變化すと思はる。

過酸化水素の反應機構、透析液及び残留物中のヨード化合物に就ては近く報告する所あらんとす。

此の實驗の動機は恩師朝比奈教授の與へ賜へる所なり。此所に御指導に對して深く感謝の意を表す。尙貴重なる文獻閱覽の自由を許し賜へる武田二郎博士に謹謝す。

實 驗 之 部

實驗に使用せるカヂメ *Ecklonia cava* は昭和八年九月朝鮮濟州島に於て採取せるもの、昆布は昭和八年七月北海道函館附近にて採取せるリシリコンブ *Laminaria ochotensis* M. にして共に直ちに乾燥し粉碎して第六號篩を通過せしめたるものなり。コロジオン膜は日本藥局方 Collodium を適當の大きさのピーカーに入れ内面に均等にコロジオンを分布し過剰のコロジオンを傾瀉したる後エーテルを自然に揮散せしめ薄き膜よりなる袋を得。此のものをピーカーより剝離し水にて善

く洗ひ使用せり。膀胱は市販の牛の膀胱なり。

浸出液の調製は粉末原藻を3容の94%アルコールを以て2回各3時間宛湯浴上にKühlerを附して温浸し浸液を集めて放冷しマンニット等を結晶析出せしめ濾過後アルコールを溜取し大部分を去りたる後再び放冷して夾雜物を結晶析出せしめ濾別後アルコール液を減壓にて溜去し残渣を少量の水に溶解, 不溶物を濾過して得たる濃褐色澄明の水溶液なり。

有機及無機のヨードの定量方法は第一報(文獻前出)に記載せし所に據る。唯海藻中のヨードを定量する際灰化溫度を第一報に於て450-470°とせるが灰化不充分的嫌あり此所に500°と訂正せんとす。

I カヂメ浸出液の時間 に依るヨード透析率

浸出液 100cc

(ヨード含量

0.7376g) 宛を

各膀胱及びコ

ロデオン袋に

入れ外部流水

中にて透析し

一定時間毎に

内部液のヨ-

ード量を定量せ

るもの第一表

の如し。(水

温 21°C).

II カヂメ浸出液の透析

浸出液 100cc (ヨード含量 0.37364g) を膀胱膜内に入れ外部は蒸溜水 500cc を入れたるビーカーとし一定時間毎に外部の液を他に移し新たなる蒸溜水 500cc

第 一 表

A

膀 胱 膜

時間(S)	液量(cc)	ヨード量(g)	ヨード透過率(%)
1	106	0.5812	21.2
2	110	0.4719	36.0
4	118	0.2247	69.5
6	123	0.1998	72.9
8	129	0.1768	76.0
13	135	0.1062	85.6
33	173	0.0088	98.8

B

コ ロ デ ウ ム 膜

時間(S)	液量(cc)	ヨード量(g)	ヨード透過率(%)
1	115	0.2058	72.1
2	137	0.0814	89.0
3	167	0.0428	94.2
5	200	痕 跡	100.0

を入れる。他に移したる液は其の量及びヨード含量を定量す。故に時間欄の数字は透析開始よりの累計時間にして第二回以後の實際透析時間は前回の時間との差なり。例へば第四回 6 とあるは始めよりの時間にして外部の液を交換せる後の實際透析時間は 2 時間なり。

第 二 表

透 折 時 間 (S)	外部液量 (cc)	無 機 ヨ ー ド		有 機 ヨ ー ド		全 量	
		(g)	原液中の ヨードに 對する比 率(%)	(g)	原液中の ヨードに 對する比 率(%)	(g)	原液中の ヨードに 對する比 率(%)
1	498	0.06105	16.3	0.00227	0.6	0.06332	16.9
2	500	0.02963	7.9	0.00253	0.7	0.03216	8.6
4	497	0.03971	10.6	0.00192	0.5	0.04163	11.1
6	495	0.03348	9.0	0.00234	0.6	0.03582	9.6
9	498	0.03580	9.6	0.00360	1.0	0.03940	10.6
14	499	0.03536	9.5	0.00515	1.4	0.04051	10.9
29	493	0.04765	12.8	0.00476	1.3	0.05241	14.1
53	488	0.03741	10.0	0.00566	1.5	0.04307	11.5
膀胱膜中の殘液 135cc						0.03301	8.0
合 計		0.32009	85.7	0.02823	7.6	0.37833	101.3

第 三 表

III. カヂメ粉末の透析

海藻粉末 20g (ヨード含量 0.0731g) を蒸留水 200cc と共に膀胱膜中に入れ外

部の液は蒸留水 500cc にして大なるビーカーに入る. 透析方法は II. の場合と同様なり.

第 四 表

時 間 (S)	外部液量 (cc)	無 機 ヨ ー ド		有 機 ヨ ー ド		全 量	
		(g)	(%)	(g)	(%)	(g)	(%)
2	493.	0.00589	8.1	0.00457	6.3	0.01046	14.4
4	495.	0.00492	6.7	0.00197	2.7	0.00689	9.4
6	492.	0.00392	5.4	0.00261	3.6	0.00653	9.0
10	480.	0.00382	5.2	0.00446	6.1	0.00828	11.3
14	474.	0.00031	0.4	0.00425	5.8	0.00456	6.2
19	475.	痕跡	—	0.00441	6.0	0.00441	6.0
38	430.	なし	—	0.00499	6.8	0.00499	6.8
62	417.	„	—	0.00249	3.4	0.00249	3.4
合 計		0.01886	25.8	0.02975	40.7	0.04861	66.5

第 五 表

IV. リシリコンブ粉末の透析

原藻粉末 20g. (ヨード含量 0.0799g) を III と同様の方法に依り透析す. (第六表)

V. カヂメの透析に依り得たる液の還元性に就て

カヂメ浸出液を膀胱膜及びコロヂウム膜を以て透析に附し外部の蒸留水中に透過し来りたる物質は膀胱又は其他の動物性膜を使用せる時は無色にして液は透明なれどもコロヂウム膜の時は褐色なり. この液中の無機ヨードを定量し置きて此の液に一定量のヨードカリ液を加へ尙比較液として蒸留水に同量のヨードカリ液を加へたるものを用ひ2時間静置せる後, 稀硫酸を以て酸性となし亜硝酸に依り

第 六 表

時 間 (S)	外部液量 (cc)	無 機 ヨ ー ド		有 機 ヨ ー ド		合 計	
		(g)	(%)	(g)	(%)	(g)	(%)
2	492	0.01501	18.8	0.00131	1.6	0.01632	20.4
4	500	0.00729	9.1	0.00034	0.4	0.00763	9.5
6	497	0.00725	9.1	0.00363	4.6	0.01088	13.7
9	497	0.00659	8.3	0.00165	2.1	0.00824	10.4
13	497	0.00461	5.8	0.00215	2.7	0.00676	8.5
23	483	0.00833	10.4	0.00221	2.8	0.01054	13.2
37	487	0.50323	4.0	0.00065	0.8	0.00388	4.8
76	449	0.00237	3.0	0.00329	4.1	0.00566	7.1
合 計		0.05468	68.5	0.01523	19.1	0.06991	87.6

ヨードを遊離せしめ二硫化炭素に振取して定量するに膀胱膜を使用せるものは殆んど影響なく加へたるヨードを驗出さるれどもコロヂウム膜を使用せるものは驗出量甚だ少く明かに還元性を有する事を認めらる。即ち第七表の如し。

第 七 表

膀胱膜透過液 50cc 中の無機ヨード 0.02518g

驗 液		液		驗液 10cc につ き費せる 0.1 N. Na ₂ S ₂ O ₃ (cc)	驗液全部につ き檢出されし ヨード (g)
透 過 (cc)	液	蒸 溜 (cc)	水 Ca 5% KJ 液 (cc)		
50	—	—	5.	3.65	0.25403
—	—	50	5.	3.40	0.23664

コロヂウム膜透過液 50cc 中の無機ヨード無し

驗 液		液		驗液 10cc につ き費せる 0.1 N. Na ₂ S ₂ O ₃ (cc)	驗液全部につ き檢出されし ヨード (g)
透 過 (cc)	液	蒸 溜 (cc)	水 Ca 1% KJ 液 (cc)		
50	—	—	50	0.05	0.00635
—	—	50	50	2.68	0.34017

VI. カヂメ浸出液及び粉末の 0.3%過酸化水素に依る透析

浸出液 100cc (ヨード含量 0.310g) に 3%過酸化水素水 10cc を加へて膀胱膜中に入れ外部の液は蒸溜水 500cc に同じく過酸化水素水 50cc を加へたるものとす。粉末の場合は 20g (ヨード含量 0.0731g) を蒸溜水 200cc 過酸化水素水 20cc と共に膀胱膜中に入れ外部は浸出液の時と同様なり。

第 八 表
浸 出 液

時 間 (S.)	外 部 液 量 (cc)	無 機 ヨ ー ド		有 機 ヨ ー ド	
		(g)	(%)	(g)	(%)
2	466	痕 跡	—	0.04510	14.5
4	468	な し	—	0.00882	2.8
6	470	”	—	0.00342	1.1
18	447	”	—	0.02188	7.6
合 計		痕 跡	—	0.07922	26.0

原 藻 粉 末

時 間 (S.)	外 部 液 量 (cc)	無 機 ヨ ー ド		有 機 ヨ ー ド	
		(g)	(%)	(g)	(%)
2	537	な し	—	0.00712	9.7
4	544	”	—	0.00054	0.8
9	539	”	—	0.00042	0.6
14	530	”	—	0.00050	0.7
22	536	”	—	痕 跡	—
合 計		な し	—	0.00858	11.8

第 九 表

VII. コンプ粉末の 0.3%過酸化水素水に依る透析

利尻昆布粉末 20g (ヨード含量 0.0799g) を VI の時と同様の方法に依りて透析す。

第 十 表

時 間 (S.)	外 部 液 量 (cc)	無 機 ヨ ー ド		有 機 ヨ ー ド	
		(g)	(%)	(g)	(%)
2	546	ナ シ	—	0.00254	3.2
5	545	„	—	0.00307	3.8
8	540	„	—	0.00265	3.3
23	526	„	—	0.00366	4.6
32	536	„	—	0.00267	3.3
合 計		„	—	0.01459	18.2

VIII. Monojodessigsäure 及 Dijod-aceton の水又は

0.3%過酸化水素水に依る透析

Monojod-essigsäure ($\text{CH}_2\text{J}\cdot\text{COOH}$) を水に溶解せる液を 50cc 宛採り A は其儘膀胱膜中に入れ外液蒸留水 500cc にて透析し B は 3%過酸化水素水 5cc を加へて膀胱膜中に入れ外液は蒸留水 500cc に 3% 過酸化水素水 50cc を加へたるものを以て透析を行ひたるもの第十一表の如くにして Dijod-aceton ($\text{CH}_2\text{J}\cdot\text{CO}\cdot\text{CH}_2\text{J}$) を以て行ひたる實驗は第十二表の如し。

第 十 一 表

Monojod-essigsäure 水溶液 (50cc 中ヨード 0.5339g)

A

時 間 (S.)	外 部 液 量 (cc)	無 機 ヨ ー ド		有 機 ヨ ー ド	
		(g)	(%)	(g)	(%)
2	502	ナ シ	—	0.3201	60.0
4	500	„	—	0.1161	21.8
6	500	„	—	0.0398	7.5
合 計		ナ シ	—	0.4760	89.3

B

時 間 (S.)	外 部 液 量 (cc)	無 機 ヨ ー ド		有 機 ヨ ー ド	
		(g)	(%)	(g)	(%)
2	547	ナ シ	—	0.2451	45.9
4	550	„	—	0.1260	23.6
6	547	„	—	0.0651	12.2
合 計		ナ シ	—	0.4362	81.7

第十二表

Dijod-aceton 水溶液
(50cc 中ヨード 0.03250g)

A

時 間 (S.)	外 部 液 量 (cc)	無 機 ヨ ー ド		有 機 ヨ ー ド	
		(g)	(%)	(g)	(%)
2	500	ナ シ	—	0.01170 _g	36.0
4	500	”	—	0.00849	26.1
6	499	”	—	0.00547	16.8
9	500	”	—	0.00332	10.2
合 計		ナ シ	—	0.02896	89.1

B

2	549	ナ シ	—	0.01247	38.4
4	550	”	—	0.00684	21.1
6	550	”	—	0.00456	14.0
9	549	”	—	0.00364	11.2
合 計		ナ シ	—	0.02751	84.7

IX. カデメ粉末及び粉末に少量のヨードカリを加へ

たるものの 0.03%過酸化水素水に依る透析

A. はカデメ粉末 20g.(ヨード含量 0.07305g) を B は粉末 20g にヨードカリ液 1cc(ヨード含量 0.15386g)を加へたるものを蒸溜水 200cc. 3%過酸化水素水 2cc と共に膀胱膜中に入れ, 外液は蒸溜水 500cc に 3%過酸化水素水 5cc を加へたるものを以てし各透析に附したるもの第十三表の如し.

第十三表

A. カデメ 20g (ヨード含量 0.07305g)

時 間 (S.)	外 部 液 量 (cc)	無 機 ヨ ー ド		有 機 ヨ ー ド	
		(g)	(%)	(g)	(%)
2	495	ナ シ	—	0.01117	15.3
4	497	”	—	0.00132	1.8
6	494	”	—	0.00049	0.7
8	498	”	—	Spur.	—
23	472	”	—	0.00110	1.5
32	478	”	—	0.00063	0.9
合 計		ナ シ	—	0.01471	20.2

B. カヂメ 20g (ヨード含量 0.07305g) ヨードカリ(ヨード含量 0.15386g)

時 間 (S.)	外部液量 (cc)	無 機 ヨ ー ド		有 機 ヨ ー ド		全 量	
		(g)	(%)	(g)	(%)	(g)	(%)
2	495	0.02167	9.6	0.03020	13.3	0.05187	22.9
4	496	0.00591	2.6	0.01185	5.2	0.01776	7.8
7	493	ナ シ	—	0.00392	1.7	0.00392	1.7
22	456	„	—	0.00605	2.7	0.00605	2.7
31	452	„	—	0.00270	1.2	0.00270	1.2
47	421	„	—	0.00168	0.7	0.00168	0.7
合 計		0.02758	12.2	0.05640	24.8	0.08398	37.0

X. カヂメ粉末及び粉末に少量のヨードカリを加へたるものの

0.03% 過酸化水素を含む $N/1000$ Na_2CO_3 液に依る透析

透析方法 IX の場合と同様なり。唯蒸溜水の代りに $N/1000$ Na_2CO_3 液を使用し液を常に微アルカリ性に保ちたり。

第 十 四 表

カヂメ 20g (ヨード含量 0.07305g)

時 間 (S.)	外 部 液 量 (cc)	無 機 ヨ ー ド		有 機 ヨ ー ド	
		(g)	(%)	(g)	(%)
2	495	ナ シ	—	0.00443	6.1
4	499	„	—	0.00132	1.8
6	498	„	—	0.00099	1.4
12	484	„	—	0.00145	2.0
23	482	„	—	0.00096	1.3
46	440	„	—	0.00190	2.6
合 計		ナ シ	—	0.01105	15.2

カヂメ 20g (ヨード含量 0.07305g) ヨードカリ(ヨード含量 0.15386g)

時 間 (S.)	外部液量 (cc)	無 機 ヨ ー ド		有 機 ヨ ー ド		全 量	
		(g)	(%)	(g)	(%)	(g)	(%)
2	496	0.01316	5.8	0.03026	13.3	0.04342	19.1
4	500	0.00464	2.0	0.01061	4.7	0.01525	6.7
6	496	ナ シ	—	0.00592	2.6	0.00592	2.6
20	480	„	—	0.00395	1.7	0.00395	1.7
44	476	„	—	0.00320	1.4	0.00320	1.4
68	460	„	—	0.00198	0.9	0.00198	0.9
合 計		0.01780	7.8	0.05592	24.6	0.07372	32.4

XI. カデメ及び昆布浸出液の P_{H_2} に就て.

板野式水素イオン濃度測定装置を使用し Quinhydrone 電池法に據り測定す. 5g の粉末驗體を蒸留水又は 94%アルコール 100cc 及び 200cc を以て還流冷却器を附し湯浴上に 2 時間溫浸し冷後濾過せる液を使用す. 測定時溫度 19° .

第 十 五 表

驗 體	溶劑の種類	溶 劑 の 量 (cc)	電 壓 (V.)	P_{H_2}
か ち め	水	200	0.192	5.36
		100	0.175	5.07
	アルコール	200	0.167	4.93
		100	0.147	4.58
りしりこんぶ	水	200	0.231	6.04
		100	0.225	5.93
ねこあしこんぶ	水	200	0.234	6.09

XII. 過酸化水素の作用に就て

カデメ粉末 5g (ヨード含量 0.01825g) を 0.3%過酸化水素水 100cc と共に膀胱膜に入れ外部は同じく 0.3%過酸化水素水 300cc とし浸漬して透析を行ひ途中外部の液を 3 回新しき液と交換し 32 時間後膀胱膜内の液を出し濾過したる後海藻殘渣を同濃度過酸化水素水にてよく洗ひ, 洗液は濾液と合したる後殘渣, 濾液及び外部透析液中のヨードを定量せるに次の如し.

	ヨード量 (g)	全ヨードに對する比率(%)
海 藻 殘 渣	0.00818	44.8
濾 液 及 洗 液	0.00702	38.5
透 過 液	0.00305	16.7
計	0.01825	100.0