8.

tobrenzcatechin, das aber sehr instabil ist und sich sofort in Thiazol umlagert.

L. C. Waung: On the Study of oily Products from Chinese Insect Drug, Chiu-Hsiang-chung (九香蟲) [Aspongopus Chinensis Dallas].

[From Dept. of Pharmaceutical Research Shanghai Science Institute]

(Received November 14th. 1934)

Dr. Nakao once got a lot of oily products with a peculiar smell from chinese drug, Chiu-hsiang-chung (九香蟲). I set out the study of the oil under his guidance.

According to the opinion of Dr. Ouchi, member of this institute (Biological department), this insect drug Chiu-hsiang-chung belongs to Aspongopus chinensis DALLAS, it is discribed in Southern China and Formosa.

The name Chiu-hsiang-chung (九香蟲) appears first on "Sheh-sheng-chung-miao-fang" (攝生衆妙方), and afterwards is introduced into "Pan-tsao-kan-mu" (本草綱目), one of chinese old Materia Medicas, being described as follows: "The insects live along the river Chih-shui (赤水河), Kuei-chow (貴州), it is large as the top of a little finger, and looks like a tortoise with a blue black colour. The insects hide themselves underneath the river stones during the winter time. The natives of these districts gather them for pressents to each other, and never use them after the time when they begin to fly out. The property of the drug is briny, warm and nonpoison-

ous. In medicine it is used to cure the stomachic uneasiness, kidney or spleen trouble, and to strengthen the sexual power. Wu-Lung pill (烏龍丸) [a pill described in "Sheh-sheng-chung-miao-fang" contains Chiu-hsiang-chung], is a remedy for those diseases which I just mentioned above. Besides if it is taken for a long time, it is very helpful to our health. General Ho-Ching (何卿) of Sze-huan province (四川省) used it for a long time and according to his experience he found it was a very efficient drug." In General Ho-ching's bibliography of the history of Min (明) dynasty, it was mentioned that he held a post at Sung-Pan (松潘), Szechuan (四川), for about 24 years since the 5th of Chia-chin (嘉靖) [1526], which shows the fact that the drug had come into medical use more than 400 years ago.

This oil is a ether extract. After standing for a long time a crystalline deposit was formed in the lower layer. The general characteristics of the oil separated from the precipitate are as follows:

Specific gravity	0,8766
Acid value	17,14
Saponification value	188,48
Ester value	171,34
Acetyl value	169,95
Iodine value	55,25
Reichert-meissl value	2,52
Polenske value	1,08

From the precipitate separated from original oil, white scaly crystals were obtained after repeated recrystallisation in alcohol, it has the following characteristics:

Soluble in any organic solvents	
No unsaponifiable substance	
Melting point	ca, 62°C
Reaction to alkali	Soap formation
Neutralisation value	194,22
Molecular weight	288,89

the neutralisation value seems to be identical with that of stearic acid (neutralisation value 197,33 molecular weight 284,29).

Lead acetate precipitation method was used to separate the fatty acid.

The ppt. formed, on hydrolysis with dilute acid yielded some crude acids (I). The filtrate was treated in the same way and crude acids in liquid state (II) were obtained.

From the solid acids (I), two different kinds of crystal with a M.P. 29,5°C and ca. 33°C respectively were obtained by adding an anhydrous methanol which contains 2,5% of HCl and heated on a water bath about 15 hours. The crystal with a M.p. 29,5°C was saponified as usual, and hydrolyzed by dilute acid, a crude fatty acid was obtained. By recrystallization from absolute alcohol, pure white crystal with a pearl luster and scaly form was obtained. (A)

Mp.	62,5°C
Neutralisation value	218,47
Molecular weight	257,23

Those values are identical with the palmitic acid (neutralisation value 218,92 molecular weight 256,25). The other crystal which has a M.p. ca. 33°C was treated in the same way, a white scaly crystal with the following characteristics was obtained. (B)

Mp.	64°C
neutralisation value	193,93
molecular weight	280,92

which are quite similar to the stearic acid (neutralisation value 197,33 molecular weight 284,29).

The result of elementary analysis of the crystal A (M.p. 62,5°C).

Sample	0,1192 g	CO ₂ =0,3273 g	H ₂ O=0,1354 g
found		C=74,88%	H=12,71%
calc. (palmitic acid)		C=75,00%	H=12,50%

Result of the crystal B (M.p. 64°C)

Sample	0,0968 g	CO ₂ =0,2690 g	H ₂ O=0,1100 g
found		C=75,78%	H=12,71%
calc. (stearic acid)		C=76,06%	H=12,68%

Although bromination method was used to separate the constitutional parts from the liquid acids (II), yet no crystal was separated out. After

debromination, a methylester prepared from methanol (which contains 2,5% of HCl) was added to the residue, then saponified as usual and hydrolized by dilute acid, the final liquid desidue gave the following constants:

Neutralisation value	195,21
Molecular weight	280,74

This is somewhat like oleic acid (which has a neutralisation value 198,75 and molecular weight 282, 27). From colour reaction test, it also showed the presence of the oleic acid with certainty.

In above we already separated out the stearic acid, palmitic acid and oleic acid. We also transfered the original oil to methylester and tried to separate out its constitutional parts by fractional distillation and salt out method.

62 g of methylester of the original oil was fractionally distilled under a diminished pressure of 2 mm. The following different parts were obtained.

	Tem. of distillation	Distillate	Appearance	
			original	after one night
(I)	—170°C	15,4 g	pale yellow (a small amount of crystal separated out)	complete crystalli ation
(II)	170—180°	23,0 g	very pale yellow (very small amount of white crystal)	complete crystallisation
(III)	180—185°	19,2 g	yellow	liquid state
(IV)	185°—(residue)	3,7 g	redish brown	solid state
	loss	0,7 g		

After the different parts of distillate obtained above were saponified respectively, alcoholic solution of lead acetate was added to the fatty acid layer and collected the solid acid which precipitated out. Regarding the filtrate part of the lead acetate precipitation, the alcohol was removed under a reduced pressure, and the residue was hydrolized with some dilute acid, it yielded a fatty acid in liquid state. The solid acid obtained gave the

following constants :

	M.P.	neutralisation value	molecular weight
No. I (ppt. 1)	64°C	215,18	260,71
„ (ppt. 2)	62,5°	217,60	257,81
No. II (ppt. 1)	67°	214,24	261,63
„ (ppt. 2)	63°	215,11	260,79
No. III (ppt. 1)	56°	—	—
„ (ppt. 2)	58,5°	220,61	253,84
„ (ppt. 3)	49°	205,70	272,24
No. IV (ppt. 1)	52°	—	—

In the above table, the Mp. of 1 of the No. III was much lower than the other parts, so it was purified by redissolving in a warm alcohol and repeatedly precipitated by magnesium acetate. The precipitate collected was hydrolized with acid. The different precipitates gave the following constants :

	M.P.	Neutralisation value	Molecular weight
(1)	58,5°C	211,27	265,53
(2)	59°	213,88	262,29
(3)	58°	211,77	264,92
(4)	61°	216,02	259,69

From the above result, we can see that the part 1 of the No. III is identical with the palmitic acid. Therefore we can made a conclusion that the solid fatty acid separated by the lead acetate precipitation method is palmitic acid.

The liquid acid obtained from the filtrate of the lead acetate precipitation was oxidized by Hazura's method, the crystal obtained had the following constants :

Mp.	130°C
Neutralisation value	181,58
Molecular weight	308,95

It is closely connected with the molecular weight of dioxystearic acid which melt at 132°C and has a molecular weight 316.

On standing a long time, a large amount of solid stearic acid was separated from Chiu-hsiang-chung oil. But it has been shown in our above

experiment it also contained palmitic acid. So the precipitates collected from different periods were examined.

	Mp.	neutralisation value	molecular weight
precipitation of 1st period	62°C	194,22	288,89
After remove the 1st precipitate			
precipitation of 2nd period	62°C	215,76	260,01
After remove the 2nd precipitate			
precipitation of 3rd period	64°C	218,97	256,19
After remove the 3rd precipitate			
precipitation of 4th period	64,5°C	224,07	250,36

From the above table we can see that the 1st precipitate is the stearic acid, and begins with the 2nd precipitate it gives the palmitic acid.

Cocclusion.

- (1) The oil contains two saturated acids, stearic acid and palmitic acid.
- (2) The main unsaturated acid is the oleic acid.
- (3) A part of the fatty acid exists in the free state.

Aldehyd content.

From the characteristic odor of the oil, it is expected to have some Ketone in it. The dilute alcohol solution of the oil clearly indicted in the Fuchsin reaction. Therefore first the oil was shaken with sodium hydrogen sulphite solution, but it gave a negative test when the substance which transfered to it was examined. Second the oil was treated with steam distillation, table salt was added to the distillate and shaken with ether. The oily residue had a aromatic odor when the ether was removed. Although it is positive in the Fuchsin reaction, yet the quantities is so small that it not allowed for me to make a close examination.

102 g of the original oil was distilleted under a diminished pressure of 2 mm. It gave the following different parts:

Reciever	temp. of distillation	weight	temp. of oil bath
(1)	-170°C	11,1 g	—
(2)	170—173°	24,5 g	220°C

(3)	173—178°	19,8 g	225°
(4)	178—180°	12,8 g	232°
(5)	180—185°	9,6 g	242°
	residue	14,5 g	—
	loss	9,7 g	—

The different parts obtained above all gave positive result in Fuchsin reaction. We shaken them with sodium hydrogen sulphite and extracted with ether, the final residues all gave negative result in the phenylhydrazon and oxim test. The following test however were positive.

(1) Fuchsin reaction	red
(2) Windish reaction	very strong fluorescence light
(3) Nessler's reaction	yellow—yellowish red
(4) Silver-Mirror reaction	Silver-mirror formation
(5) Indol reaction	red

It is quite possible there are some aldehyde or ketone present in the Chiu-hsiang-chung oil, but for many reasons it is unable for me to determine it in my experiment.

T. Kariyone and A. Majima: On the volatile constituents of *Cymbopogon Georingii*.

[From the Government Hygienic Laboratory, Tokio.]

(Received November 17th. 1934)

Cymbopogon Georingii Honda is a graminaceous plant, widely distributed in Japan, whose inflorescence has an aromatic odor. When distilled in a current of steam, a pale yellow oil was obtained in the yield of about 1%, which furnished the following constants: α_D^{13} -34.96°, d_4^{20} 0.9585, n_D^{17} 1.52128, acid value 0, saponification value 12, saponification value of acetylated oil 30.6, methoxyl group 25.42%, aldehydes and phenols estimated with cassia flask nearly none.

On distilling the oil under diminished pressure, the following fractions were obtained:

Dyckerhoff 氏の Rhodanacetophenon との比較

(D 氏 Rhodanacetophenon)		ω -Chloracetobrenzcatechin と KSCN との反應成績體
Fp.	72-73°	178°
Phenylhydrazon	+	-
Grote 氏反應	+	-
Sn + HCl にて還元	Merkaptan 臭	特異の臭氣を認めず

且つ D 氏 Rhodanacetophenon を濃鹽酸を以て Thiazol に Umlagern せしむれば Grote 氏反應陰性となる。

九 香 蟲 油 に 就 て

汪 良 寄

(上海自然科學研究所生藥學科)

(昭和 9 年 11 月 14 日受理)

L. C. Waung: On the Study of oily products from Chinese insect drug,
Chiu-hsiang-chung, (九香蟲) [Aspongopus Chinensis DALLAS]

(I) 九香蟲に關する考察

中尾博士は、嘗て九香蟲より異臭ある多量の油分を得られたるが、右の油に就き其指導のもとに、本實驗を開始せり。

九香蟲は、當所大内學士の鑑定によれば *Aspongopus chinensis* DALLAS ツマキクロカメムシにして、臺灣、南支等に産すと謂ふ。九香蟲の名は、攝生衆妙方に於て始めて見られ、その後李時珍が本草綱目を編修する時、始めて之れを收載し、綱目以前の本草に於ては、之れを收載したるものを未だ見ず。

綱目集解の條下に、時珍曰く、九香蟲は、貴州永寧衛の赤水の河中に産し、其大いさは、小指一端ほどにして、形狀は水龜の如く、身は青黑色を呈し、冬季は石下に蟄伏す、其地方民は多く取りて贈答品に用ひ、驚蟄節の後には飛びで出るを以て、その頃のものは用ひずと謂ひ。又氣味主治に就ては「鹹にして、溫、毒なし」、「脇腕の滯氣、脾胃の虧損、元陽を壯にする」と記し。「攝生方の烏龍丸は、前記病證を治し、久しく服すれば、健康を益す。四川の總兵何郷は、常服して效を得たるが、其方は

九香蟲一兩を半生に焙じ、車前子を微に炒り、陳橘皮と共に各四錢、白木の焙じたるもの五錢、杜仲を酥にて炙りたるもの八錢を用ゐ。此等を末にして、煉蜜で梧桐子大の丸とし、毎服一錢五分を鹽白湯或は鹽酒で朝夕一服す。此方の妙處は、全く九香蟲に在りと謂ふ。

按ずるに、何郷は成都衛の人にして、明史二百十一卷に傳あり。正徳年間に於て指揮僉事の世職を嗣ぎ、嘉靖五年の春（西紀 1526 年日本後柏原大永六年）副總兵に昇任し、松潘に駐在し、同所に在る事、前後凡そ二十四年間。嘉靖三十三年倭寇海上に出沒するを以て、卿及び沈希儀は命を受けて蘇松に行き、翌年又副總兵として、浙江及び蘇松の海防を司れり。卿は蜀中の名將なれども、海事に暗く、且つ年既に老い、又部下の將兵も、亦海道の知識に乏しく、爲に平定の效を奏せざりき。

攝生方烏龍丸の條下に、「四川何卿總兵常服」と記せるは、右何卿の傳により當然一五二六年後の二十餘年間の事とす。然れば九香蟲を藥用とせるは、今より約四百年以前に始まると稱す得べし。

又其產地赤水河に關しては、最近東京春陽堂發行の頭註國譯本草綱目矢野宗幹氏の說に、今の貴州省關嶺縣にありと言ふ。（同書第十冊一〇〇頁）。而して貴州通志の山川篇を見るに、赤水河は唯だ畢節縣にありて同縣の北を流れ、源を雲南の鎮雄に有し、赤水衛城の下より東流して、仁懷縣を經過し、四川の合江縣に於て、岷江に合流すと言ふ。又關嶺縣は、もと永寧州にして、同州は元の時代に於て、始めて此く呼ばれ、雲南省の普定路に屬せるが、後に廢除され、明の時に、復た同州を置き、貴州省の安順府に屬し、清の時代にも同様の名稱を以て呼ばれ、歷朝に衛の名を用ふる事なし。又同地の山川の條下に、「赤水河」は無く、唯だ城東北四十餘里に、白水河あるのみとす。

上により、矢野氏が九香蟲の原產地を以て、關嶺縣と爲すは誤れるが如く。若し關嶺縣なれば、白水河ならざるべからず。然るに綱目には、永寧衛の赤水河とす、殊に前述せる如く、關嶺縣を「衛」と稱する事なし、然れば赤水河の流る處は畢節縣とす。而して綱目に謂ふ貴州永寧衛の位置は、今の四川省叙永に當る。蓋し赤水河は、赤水衛城の下を東流し、四川の岷江に合流す。此の赤水衛は、貴州畢節縣の東北にありて、四川の叙永と接壤す、叙永は漢の犍爲郡にして、宋の時の江安合江の二縣に當る、元の至元二十五年、此を永寧路に改め、四川省に附屬し、明の洪武四年に、永寧衛を増設し、同衛は貴州に附屬せり。即ち綱目に於て貴州永寧衛の赤水

河と記す所以なり。而して清の康熙の初に、永寧路に同知を置き、四川の叙州府に附屬したるが、永寧衛は貴州の威寧府に附屬せり。永寧衛は康熙二十六年に縣に改め、なほ威寧府に屬せるが、雍正五年に合併して永寧縣とし、叙州府に附屬せり。(乾隆府廳州縣圖志卷三十七)(按、民國成立の後叙永縣に改め直接に四川省政府に附屬す)。

上記する如く、綱目に貴州永寧衛と云ふのは、今の四川の叙永縣を指し、貴州の關嶺縣にあらず。尙ほ地圖によりても、其位置明かにして、矢野氏が何によりて貴州關嶺縣となすやは甚だ知り難し。

何卿が九香蟲を用ひたる松潘は、四川の茂縣の北三百六十里にありて、龍安府に

上海市場の九香蟲
a, b—四川品；c, d—漢口品
a, d—背面；b, c—腹面
CHIU-HSIANG-CHUNG
(*Aspongopus chinensis* DALLAS)
in the Shanghai market.
a, b—from Szechuan;
c, d—from Hamkow
a, d—dorsal view;
b, c—abdominal view.

屬す、其地は岷江の附近にあり、故に九香蟲の分布は赤水河より、岷江に入り、松潘の邊りまで溯るものとす。

故に何郷は此れを使用するものにして、九香蟲の原産地が四川の叙永縣の赤水河なる事、此により、一層明かなりとす。

(II) 九香蟲油の検査

本油は九香蟲の エーテル抽出物なり、長く放置すれば、下層に沈澱を析出す、之

れを濾別して、二つに分け、液體の方は、油の一般性質を検査せるが、後に記す如く所謂鉛鹽アルコール法を施行せば、容易に固體酸と液體酸とに分別し得べし。

固體酸は、之れをエステルとなし、分割結晶すれば、ステアリン酸とパルミチン酸が、其の成分なる事を知れり。液體酸には、臭化法を應用して、其成分分離をなせるが、其結果、液體酸中には主として油酸を含有する事を知り得たり。

又原油に生ずる沈澱は、主として不純のステアリン酸なる事を確めたり。

1. 九香蟲油の一般性質

原油は帶褐黃色にして、特有の臭氣を有し、長時間放置するに、著量の固狀物質を析出す、此を活性炭素によりて、精製せば無色無臭となる、其の特數次の如し。

比 重	0.8766	アセチル數	169.95
酸 數	17.14	ヨード數(Hübl)	55.25
鹼 化 數	188.48	ライヘルト、マイスル數	2.52
エステル數	171.34	ボレンスケ數	1.08

2. 固體物質

原油より濾過分離せる固體物質を 75% 酒精より再結晶するに、白色鱗片狀結晶を得、其の一般性質次の如し。

有機溶劑……何れの溶劑にも可溶	不鹼化物……無し
融點………Ca62°	反應……酸性
中和價………194.22	アルカリに對する作用……石鹼を形成す
平均分子量……288.89	

此によりて見れば、右の結晶は、ステアリン酸(中和價 197.33 分子量 284.29)に相當す。

3. 脂肪酸類

固形物を濾去せる油に 3% アルコール性苛性カリ液を加へ常法に依り水浴上にて鹼化し、鹼化後蒸發し、アルコールを可及的に除去し多量の水に溶解し、其の溶液を稀硫酸を以て酸性となし、浮游し來れる酸をエーテルに振取り、エーテル溶液を蒸餾せる残渣に就き、一般の性質を検するに次の如し。

融點………45°C	中和價………199.41
ヨード數………49.73	平均分子量………281.33

上の粗脂肪酸に當るものに 95% アルコールを適量に加へ、溫めて溶解せしめ、

此に醋酸鉛を 95% アルコールに溶解したる溶液を加へ、水浴上に温め後、放置するに沈澱を生ず、冷後濾別して沈澱を稀鹽酸と共に、少しく温めて、鉛分を分ち、冷後二回多量のエーテルを以て振盪し、其エーテル液を水洗後、燒芒硝にて脱水し、エーテルを溜去する時は、固狀の粗製酸を残留す、此を(一)とす。

前の醋酸鉛の沈澱を濾去せる酒精溶液は、減壓下に酒精を餾去し、其殘渣に稀鹽酸を加へ、温めて鉛分を去り、多量のエーテルにて振盪し、エーテル液を水洗後脱水し、エーテルを餾去するに液狀の粗製酸を得、之を(二)とす。

(一)の固形酸の分離

固形酸を倍量の 2.5% 鹽化水素を含む無水メチル酒精と共に水浴上にて、約 15 時間加熱したるに、固結して、下層に沈澱したる部分 (Fp 29.5°C) と液中に浮游したる部分 (Fp 約 33°C) とを得たり Fp 29.5° のものを、5% 酒精カリと共に、水浴上にて、約一時間加熱し、黄色透明の溶液となるに及びて冷却し、稀鹽酸を加へて酸性となすに、淡黄色の脂肪酸を析出す、之をエーテルにて振取し、エーテルを蒸餾除去すれば、粗脂肪酸を得。之を無水酒精より再結晶すれば、純白色眞珠様光澤ある鱗片狀結晶となる Fp 62.5° 中和價 218.47 分子量 257.23 にして、此等の價はパルミチン酸(中和價 218.92 分子量 256.25)のそれと一致す Fp. 33°C のものを、同様に處理すれば Fp. 64°C の白色鱗片狀結晶を得。中和價 193.92 分子量 280.92 にして、ステアリン酸(中和價 197.33 分子量 284.29)の夫れに略ぼ一致す。

Fp 62.5° のもの元素分析

物質 0.1192g	CO ₂ =0.3273g	H ₂ O=0.1354g
實驗數	C=74.88%	H=12.71%
パルミチン酸として	C=75.00%	H=12.50%

Fp 64°C のもの

物質 0.0968g	CO ₂ =0.2690g	H ₂ O=0.1100g
實驗數	C=75.78%	H=12.71%
ステアリン酸として	C=76.06%	H=12.68%

(二)の液狀酸の分離

液狀酸の分離には、臭素法を應用せり、即ち液狀酸を約十倍量の無水エーテルに溶解し、-5°C に冷却し、次に臭素を一滴宛褐色を呈する迄添加し、-5°C に於て、三時間放置せるも、後に何等析出物なし、再び眞空硫酸乾燥器中に、四日間放置せしも、結晶を生ぜざり、故に此エーテル溶液をチオ硫酸曹達の水溶液と共に分液漏斗に

て振盪し、過剰の臭素を去り、水洗後エーテルを分離し、蒸餾し、其残渣を無水石油エーテルに溶解し、冷蔵庫中に放置するも、何等結晶を析出せず、故に此石油エーテル溶液を餾去して、其残渣に三倍量の 5N 鹽酸メチルアルコールと同量の亞鉛末とを加へ、水浴上に二時間煮沸し、後水中に注入し、エーテルにて振盪し、其エーテル液を分離して、之を溜去するに、液狀のメチルエステルを得。

此エステルを常法に従ひ鹼化し、稀硫酸にて分解したる後、析出せる脂肪酸をエーテルにて抽出し、エーテルを蒸發せば、液狀の殘留物を得、其中和價を測定するに 195.21 にして、分子量は 280.74 なるを以て、オレイン酸(中和價 198.75 分子量 282.27)と認定し得べし。

又上記油狀の殘留物を、硝酸竝に水銀と共に、廣口罎中に振盪し、25°以上の水浴中に放置し、二時間中十分毎に振盪するに、オレイン酸に特有なる牛酪狀の物質を生じたり、次に尙ほ右の油分がオレイン酸なる事を證する爲め、次の反應を試みたり。

(一)その酒精溶液に、ヨード丁幾を加へ、褐色を呈せしめ、此に昇汞の酒精溶液を加ふれば脱色す。

(二)その氷醋酸溶液に少量のクロム酸(氷醋酸に溶解したるもの)を加へ、更に硫酸を追加すれば、綠色液は漸々櫻實色に變ず。

これにより油酸の存在するは確實なりとす。

上文に於て、本油中よりステアリン酸パルミチン酸及び油酸を分離したりしが、更に原油より、固體成分を二回分離したる油に就き、メチル エステルを造り、割溫蒸餾及び鹽類沈澱法を應用して、此等の成分の分離を試みたり。

4. メチルエステルの製取及び分餾

油に 2.5% の鹽化水素を含有する メチルアルコールの同重量を加へ、水浴上に 15 時間加熱して、エステル化せるに橙黃色の液體 62g を得たり、之を 2mm の減壓の下に蒸餾するに、次の溜出物を得たり。

溜出溫度	溜出液量	外觀(溜出當時)	一夜放置後(室溫)
(I) 170°C迄	15.4g	微黃色(稍多量の白色結晶を析出す)	全部結晶
(II) 170-180°C	22.0''	極微黃色(少量の白色結晶を析出す)	全部結晶
(III) 180-185°C	19.2''	黃色	液狀
(IV) 185°C以上(残渣)	3.7''	赤褐色	固結

損 失 0.7'' — —

右各部の溜分を別々に鹼化し、其脂肪酸分 10g を 95% 酒精に溶かし、別に醋酸鉛 1.5g を 95% 酒精に溶解せるものを加へて煮沸し、振盪したる後、徐々に冷却せしめ 15°C に一週間放置し、前に析出せる沈澱を濾別して別に取り置き、其濾液に硫酸酒精溶液を加ふるに、沈澱を生ぜざる時は尙少量の醋酸鉛酒精溶液を加へて、沈澱を生ぜしめ、此を濾過して又別とし、更に此操作を繰返し、各回に生じたる沈澱を別々に稀硫酸を以て分離し、依て得る所の脂肪酸はエーテルにて分取し、エーテル層を水洗し、之を蒸餾して集む。

上の鉛鹽の沈澱を濾別せる濾液は酒精を減壓にて蒸餾し去り、其残渣に稀酸を加へて分解し、遊離せる脂肪酸をエーテルにて抽出して水洗し、エーテルを蒸發するに、液狀の脂肪酸を得。

先づ上の操作に依り、鉛の沈澱として得たる固體酸の融點中和價及び分子量を測定するに、次表の如くにして NoI の 2 NoII の 2 の示すが如く、主としてパルミチン酸よりなる事を知る。

	融點	中和價	分子量
NoI (沈澱 1)	64°C	215.18	260.71
同 (〃 2)	62.5°C	217.60	257.81
NoII (〃 1)	67°C	214.42	261.63
同 (〃 2)	63°C	215.11	260.79
NoIII (〃 1)	56°C	—	—
同 (〃 2)	58.5°C	220.61	253.84
同 (〃 3)	49°C	205.70	272.24
NoIV (〃 1)	52°C	—	—

上表に於て、NoIII の 1 は、其融點俄に低きを以て、試みに此部のものを精製する爲め、酒精に温めて溶かし、試料の $\frac{1}{40}$ 量の醋酸マグネシウムの酒精溶液を熱時に加へ、暫時放置し、依て生ずる沈澱を濾過し、濾液にアムモニアを加へて中和し、又此に上記醋酸マグネシウム液を加へて、沈澱を生ぜしめ、此を濾過し、此操作を反覆繰り近し、依て生じたる沈澱を集め、此等を酸にて分解し、依て得たる各回の沈澱の融點中和價及び分子量を計るに次の如し。

	融點	中和價	分子量
(I) 回	58.5°	211.27	265.53

(II) 回	59°C	213.88	262.29
(III) 回	58°C	211.77	264.92
(IV) 回	61°C	216.02	259.69

此等の結果によれば No.III の 1 の部も、他の部と等しく、主としてパルミチン酸なりと認め得べく、其の中に少量のステアリン酸の混在せるものと認め得べし、故に醋酸鉛にて沈澱し此より分離せらるる固状脂肪酸は、主としてパルミチン酸よりなる事を知る。

上記醋酸鉛にて沈澱せざりし濾液より得たる液状酸に就ては Hazura 氏の酸化法を次の如くに試みたり。

液状酸 15g を苛性カリ液(比重 1.27)にて中和し、水にて 1Li に稀釋し、攪拌しつつ此に 1.5% 過マンガン酸加里 1Li を細流として加へ、十分の後、亞硫酸曹達水溶液を加へ、二酸化マンガンが全部溶解するまで加ふるに、不溶性の酸化物を浮游す、依て此を濾過し、乾燥して石油エーテルにて處理し、此に溶解する未變化のものを除去したる後 Soxhlet 器中にエーテルにて抽出し、エーテルを蒸發して、其殘留物を數回アルコールより再結晶するに Fp. 130° 中和價 181.58 分子量 308.95 の結晶を得たり、此ものはデオキシステアリン酸の Fp.132° 分子量 316 に略ぼ一致す。故に原油中にはオレイン酸が存在するものと認め得べし。

本九香蟲油は上文に述る如く、帶褐色の液體にして、長時間放置するに、著量の固状物質を析出し、それがステアリン酸なること確め得たるが、尙ほ實驗によりて油中にパルミチン酸をも含む事を知りたるが、故に自然に放置して、生ずる沈澱を各期に亘りて採集し、夫等の融點中和價及び分子量を測定せり。

	融點	中和價	分子量
第一期沈澱	62°	194.22	288.89
第一期の沈澱を取り去りたる後に			
第二期沈澱	62°	215.76	260.01
第二期の沈澱を取り去りたる後に			
第三期沈澱	64°	218.97	256.19
第三期の沈澱を取り去りたる後に			
第四期沈澱	64.5°	224.07	250.36

上表により見れば、初めに生ずる沈澱は、ステアリン酸なるも、第二期より生ず

る沈澱は、主としてパルミチン酸なりとす。

(III) 概 括

- (一) 本油に存在する飽和酸は、ステアリン酸及びパルミチン酸にて、
- (二) 不飽和酸は、主としてオレイン酸を含有す。而して
- (三) 此等の脂肪酸の一部分は、遊離の状態に存在す。

(V1) アルデヒドの認知

九香蟲油は、特別なる臭ひを有するを以て、或種のケトンを含有し居るに非ずやと想像し、油の酒精稀釋液に就き亞硫酸フクシン反應を試みたるに、其反應著明なりとす。故に原油を酸性亞硫酸曹達液と共に振盪して、此に移行するものを驗するに、其成績は陰性なり。次に原油の水蒸氣蒸溜を行ひ、溜液に食鹽を加へ、此をエーテルにて振盪し、エーテル層を蒸溜するに、油狀の殘留物を得、此ものは、芳香を有して、其フクシン反應は陽性なりとす、但し此得量極めて微量なるを以て此を精査する事能はざりき、次に原油 102g を減壓 2mm. にて蒸溜し、次の各部分を得たり。

受器	溜出溫度	溜出量	油浴溫度
No. 1	170°C迄	11.1g	—
2	170-173°	24.5g	220°
3	173-178°	19.8g	225°
4	178-180°	12.8g	232°
5	180-185°	9.6g	242°
	殘 油	14.5g	—
	損 失	9.7g	—

それらの各部分は、皆フクシン反應に陽性なるも、酸性亞硫酸曹達液にて振盪し、此に移行するものをエーテルにて抽出し、其蒸發殘渣に就き、フェニルヒドラゾン並にオキシムの形成を計りたるも、結果陰性なりき。但し次の各反應は陽性なるを認めたり。

1. Fuchsin-schweflige Säure Reaktion	紅色
2. Windisch R.	強き綠色の螢光を發す
3. Nessler's R.	黃色—黃赤色
4. Silber-Spiegel R.	銀鏡を形成す

5. Indol R.

紅色

恐らく九香蟲油の内にアルデヒド或はケトンを含む如きも, 本實驗に於ては之を決定する事を得ざりき.

フガルカヤの精油成分

刈 米 達 夫

馬 島 淳 子

(内務省東京衛生試験所)

(昭和9年11月17日受理)

フガルカヤ *Cymbopogon Georingii* Honda は本邦に廣く分布する禾本科植物にして其の花穂は強き芳香を有す. 本植物は香料原料として重要なレモングラス, シトロネラグラス等と同屬なる事に興味を感じ其の精油を研究せり.

昭和8年9月採收せる花穂より水蒸氣蒸溜によりて得たる精油の收量・性状等次の如し.

採 收 地	收量%	α_D^{15}	D_4^{20}	n_D^{17}	酸數	鹼化數	アセチル後の鹼化數	アルデヒド%	フェノール%	メトキシル數%
東京府下	0.214	-34.96	0.9585	1.52128	0	12	30.6	0	2	25.42
粕 壁	1.120	-41.30	0.9609	1.51853	0	0	27.4	3	4	20.57
千 葉	0.814	-40.17	0.9565	—	—	—	36.5	2	—	—

其の 300g を取りて蒸溜し次の溜分に分ちたり.

No.	K _{P11}	原油に對する%	分 析 數			α_D^{16}	CH ₃ O%
			C%	H%	O%		
1	51-65°	6.0	86.04	11.14	2.82	-40.10	0
2	65-80°	5.5					0
3	80-110°	5.7	84.34	10.57	5.09	-26.84	—
4	110-125°	6.8	80.94	10.13	8.93	-67.40	9.97
5	125-143°	34.8					12.41
6	143-152°	37.0	69.12	7.49	23.39	- 2.23	44.40

ホルベン残渣 少量

溜分(1)及び(2)はカンフル様香氣を有し Camphen の存在を豫想せらるるを以