Kristall; *Ks* Kristallsand; *M* Mark; *Mb* Membran; *Mr* Markstrahlen; *Ot* Oltropfen; *Pl* Perikarp; *Ps* Pollenschlauch; *R* Runzel; *Rd* Rosanoffsche Drusen; *Rn* Rückennaht; *S* Siebteil; *Sb* Sekretbehälter; *Sc* Sekret; *Sch* Schleim; *SchZ* Schleimzelle; *St* Stigma; *Sta* Stärkekörner; *Stm* Staminodieu; *Sto* Stomata; *Stz* Steinzeile; *StzF* Steinzellige Faser; *Tu* Tüpfel; *Unr* Unreife Frucht.

Kaoru Miyake: Ueber ein neues Oxydationsprodukt des Camphers¹⁾.

[Aus dem Wissenschaftlichen Laboratorium der Firma
Takeda-Chôbei, Osaka]

(Eingegangen am 15. September 1935)

Bei der energischen Oxydation mittels Chromsäure in Gegenwart von Acetanhydrid liefert der *d*-Campher neben 5-Oxo-campher und Spuren Campherchinon noch ein dritter Oxo-campher, welcher sich in Form von seinem Dioxim isolieren lässt. Nach der Bildung der racemischen 2,3,3-Trimethylcyclopentanon-(1)-essigsäure-(4) (II) durch Hydrolyse ist das neue Oxydationsprodukt als der 6-Oxo-campher (I) anzusprechen. Bei der optischen Spaltung der Ketosäure (II) aus dem Oxydationsprodukt des *d*-Camphers erhielt ich früher¹⁾ die aktiven Säuren von $[\alpha]_D^{15} - 77,5^\circ$ und $+ 50,1^\circ$, während die aus *d*- α -Campholensäurenitril (III) über (IV) und (V) dargestellte Ketosäure ein Drehungsvermögen $[\alpha]_D^{15} + 79,17^\circ$ besass.

Es hat sich nun gezeigt, dass die letztere optisch noch unrein ist, indem sich daraus beim Impfen die racemische Säure reichlich ausscheidet. Wenn man aber Dioxydihydro- α -campholensäurenitril (IV) vorher mit Alkali verseift und die so erhaltene Dioxydihydro- α -campholensäure (VI) mittelst Säure der Umlagerung unterwirft, so erhält man die optisch einheitliche Ketosäure (II) von $[\alpha]_D^{21} + 182,20^\circ$ bzw. $- 181,91^\circ$. Diese aktive Säuren schmelzen bei $56-58^\circ$ und

¹⁾ Vergl. die vorläufige Mitteilung in Proc. Imp. Acad. Tokyo XI., 106-109 (1935); Chem. Zentr. 1935 II, 700.

und bildet beim Umlösen aus Benzol-Petroläther-Gemisch farblose, monokline Prismen vom Schmp. 56–58°. $[\alpha]_D^{25} = +182.20^\circ$ (0.1910 g Subst. im abs. Alkohol auf 10 cc gelöst, $l=1\text{ dm}$, $\alpha = +3.48^\circ$)

4.344 mg Subst. : 10.408 mg CO_2 , 3.411 mg H_2O .

$\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_3$. Ber. C 65.17 H 8.76. Gef. C 65.34, H 8.79.

Das Semicarbazon : farblose Krystalle vom Schmp. 230° ; das Oxim : farblose Prismen vom Schmp. 126–128°.

l-Dioxydihydro- α -campholensäure.

Die aus dem *l*- α -campholensäure-nitril ($[\alpha]_D^{27} = -8.89^\circ$) in gleicher Weise durch alkalische Verseifung erhaltene *l*-Dioxydihydro- α -campholensäure bildet farblose Prismen vom Schmp. 144–145°. $[\alpha]_D^{25} = -65.07^\circ$ (0.5716 g Subst. in abs. Alkohol auf 10 cc gelöst, $l=1\text{ dm}$, $\alpha = -3.72^\circ$).

4.700 mg Subst. : 10.267 mg CO_2 , 3.744 mg H_2O .

$\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}_4$. Ber. C 59.37 H 8.97. Gef. C 59.58 H 8.91.

l-2,3,3-Trimethylcyclopentanon-(1)-essigsäure (4).

Die aus der *l*-Dioxydihydro- α -campholensäure durch Erwärmen mit verd. Schwefelsäure dargestellte Ketosäure krystallisiert erst nach langem Aufbewahren im Eiskammer krystallinisch und bildet beim Umlösen aus Benzol-Petroläther-Gemisch farblose Prismen vom Schmp. 56–58° und besitzt $[\alpha]_D^{25} = -181.91^\circ$ (0.2012 g Subst. in abs. Alkohol auf 10 cc gelöst, $l=1\text{ dm}$, $\alpha = -3.66^\circ$).

3.411 mg Subst. : 8.171 mg CO_2 , 2.711 mg H_2O .

$\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_3$. Ber. C 65.17 H 8.76. Gef. C 65.33 H 8.89.

Das Semicarbazon : farblose Krystalle vom Schmp. 230° ; das Oxim : farblose Prismen vom Schmp. 126–128°.

Beim Mischen von gleichen Mengen *d*- und *l*-2,3,3-Trimethylcyclopentanon-(1)-essigsäure-(4) entsteht die racemische Ketosäure vom Schmp. 65–66°, deren Semicarbazon (bezw. Oxim) bei 240° (bezw. 184–185°) schmilzt.

化反應を呈することなし。果梗の内容物としては澱粉粒，粘液は之を含有せず。只往々皮部の柔組織中に約 15μ 内外の小なる碳酸石灰の簇晶を見るのみ。尙上皮の直下の一二層の厚角細胞中に特に多くの淡黄褐色の内容物を含有す。此の物質は皮部の柔組織及び篩管部の大なる細胞，髓線及び髓の所々に存し過クロール鐵液にて暗青色を呈し Vanillin 鹽酸液にて鮮赤色を呈する Phloroglukotannoid (Fig. 10; Gb) なり。

カンファーの一新酸化成績體に就きて

三 宅 馨

(株式會社武田長兵衛商店研究室)

(昭和 10 年 9 月 15 日受理)

K. Miyake: Über ein neues Oxydationsprodukt des Camphers.

Campher の直接酸化成績體に關する廣汎なる文獻中より其重なるものを摘記すれば發煙硝酸を以てなせる樟腦酸あり (A. 163, 323; B. 26, 3056) 又 v. Baeyer u. Billinger (B. 32, 3625, 1899) は過硫酸加里にて Campher を直接酸化して α -Campholid を得，Ballow (B. 12, 1598, 1897) はクロム酸カリと硫酸を以て Adipinsäure を得たりと云ひ。後に Kachler (B. 13, 487, 1880) は Ballow の酸は Camphoronsäure なることを證明し。猶同氏は Campher を硝酸にて酸化して Oxycamphoronsäure 及び Camphoronsäure (A. 159, 281, 1871) を得次で同じ方法に依りて Dinitroheptylsäure (A. 191, 143, 1878) を得たり。Riley (E. P. 354, 798; C. 1934, 1976) は、從來 Isonitrosocampher を經る間接酸化に依りて得られし Campherchinon を Selendioxyd を以てなす樟腦の直接酸化に依りて得たり。

Bredt (J. pr. [2] 106, 336, 1923) は Campher 及び Fenchon を氷醋酸中に於てクロム酸にて直接酸化し、夫々 *p*-Oxo-campher, *p*-Oxo-fenchon の生成を證明し、後に Bredt 及び Pinten (J. pr. [2] 119, 81, 1928) は Campher 及び Fenchon の外に Camphenilon を同じ方法にて酸化して *p*-Oxo-Camphenilon をも得、而して彼等は、Campher 類似の bicyclisch の Keton は直接酸化に依りて、

其二原子の水素は一原子の酸素に置換せられ、然も其酸素は原化合體の Carbonyl 基の para の位置に位することを證明したり。猶彼等は直接酸化に際し脱水劑として無水醋酸或は濃硫酸を添加して反應は非常に強化せらるることを觀察し、更に無水醋酸の使用量は氷醋酸の使用量の四分の一を超ゆべからず。然らざれば酸化反應進行中クロームの複鹽と見做さる灰綠色の沈澱を生じ惡結果を齎すと報告せり。

著者は無水醋酸の存在に於て、樟腦のクローム酸に依る強烈なる直接酸化をなし、酸化條件を種々に變じて p-Oxo-campher の收得量増加を期して研究を始めたり。酸化條件は大體 O. Fischer のなせる Triacetylenodin の酸化條件 (J. pr. [2], 84, 375) に倣ひ、多様に變化して (Bredt の無水醋酸使用量を遙に超へて氷醋酸と同量を探り) 操作せり、然れども結局 Bredt の發表せし p-Oxo-campher の收得量即ち樟腦に對して 5-6% 以上に上昇せしむること能はざりき。されど一方此際の酸化成績物として p-Oxo-campher の約三倍の得量にて、 $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}_2$ なる分子式を有し、然も現今迄の樟腦誘導體の何れの記載にも一致せざる一新中性物質と外に極微量の Campherchinon の生成することを認めたり、樟腦のクローム酸に依る酸化にて Campherchinon の生ずることも蓋し一新事實たるべし。

而して上記新酸化成績物は甚しく不安定にして粗製の儘にて空氣中に放置する

も既に變化し、取り扱ひ困難にして未だ純粹に分離し得ざるも、粗製の儘にて檢するにフェーリング氏液を還元せず又酸性亞硫酸ソーダと結合せざるを以てアルデヒドに非ること明なり又本物質は Dioxim を生成し然も容易に結晶するが故に *p*-Oxo-campher と完全に分離することを得、是れに依つて本物質の組成 $C_{10}H_{14}O_2$ を確定し且つ其光學的無力なることを確め得たり。

扱て本物質中、酸化に依りて新生せる Carbonyl 基の位置を案するに、下圖に於て 3, 5, 6 の三位置を考へ得べきも 3 に位する Campherchinon 及び 5 に位する *p*-Oxo-campher は共に已知のものにして且つ不齊炭素有するを以て光學的無力たり得べからず、且又本物質の Dioxim, Zp. 241-242° (酒精より再結晶) は *p*-Oxo-campherdioxim, Zp. 158-159°; Campherchinondioxim, Zp. 201° と全然其性質を異にす。故に旋光性を有せざる新物質に於ては對照的構造式を採るべく即ち新 Carbonyl 基は必ずや 6 位置を占むべく、茲に未知の 6-Oxo-campher を考慮する機會に遭遇したり。

酸化に依りて得たる粗製中性物質に Semicarbazid を作用せしめ、同時に生成せる *p*-Oxo-camphersemicarbazon を可及的除去したる新物質の Semicarbazon を分解して元の新物質を捕捉せんと試むるも、元の Diketon は得られずして一つの Monoketocarbonsäure を得たり。此酸を A-Ketosäure と假稱す、A-Ketosäure は $C_{10}H_{16}O_3$ なる組成を有し Fp 65-66° (水又はベンツォールと石油エーテルの混液より再結晶) にして光學的無力なれども、之をキニーネ鹽となし旋光性の兩成分に略分離し得、然してキニーネ鹽の難溶性なるは左旋性にて $[\alpha]_D^{15} = -116.2^\circ$ なる酸を與へ、又比較的易溶性なる左旋性鹽より分解したる酸は右旋性にして $[\alpha]_D^{20} + 90.61^\circ$ を示し前者より純度稍劣れり。¹⁾

A-Ketosäure に就きて Menschutzkin 氏法を施行して、Pinonsäure (第一級酸), Isoketopinsäure (第三級酸) を對照に採りエステル化速度を測定して第一級のカ

¹⁾ Proc. Imp. Acad. Tokyo XI., 106-107 に發表せる豫報には -77.5° 及 $+50.1^\circ$

ルボン酸なることを確めたり。

又粗製酸化中性物質を 2% の硫酸或は 5% のソーダ溶液を以て 50–60° に數時間加熱せしむれば中性なる *p*-Oxo-campher と一種の酸性油狀物質を得、而して後者の得量は前者の約三倍を示す。此酸性物質は結晶せしむること困難なれども其石灰鹽又は Semicarbazon を經て精製せば無色柱狀にして Fp. 65–66° なる結晶として得られ、前記 A-Ketosäure と全く同一の Monoketocarbonsäure なることを知りたり。

A-Ketosäure を炭酸曹達液に溶解し常溫に於てカメレオンにて酸化して無色稜柱狀結晶 Fp. 133–134° (醋酸エステルより再結晶) なる B-Ketosäure を得たり。B-Ketosäure をアルカリ性に於てブロームを以て更に酸化して Fp. 165–168° なる無色柱狀結晶 Isocamphoronsäure を得たり。

上記酸化の徑路及び生成物の誘導體につき圖示すれば下表の如し：

一方 Wallach (O. Wallach : Terpen u. Campher, 2. Aufl. s. 564) の行ひたる方法に従ひ α -Campholensäurenitril (III) をカメレオンにて酸化して Dioxydihydrocampholensäurenitril (IV) を作り、之を硫酸にて處理して Ketonitril (V) となし、次にアルカリにて鹼化して Ketosäure となしたるものは其 Semicarbazon

及び Oxim が A-Ketosäure の光學的分割を行へるものの誘導體と殆ど一致し、猶他方 F. Tiemann (B. 29. 3007. 1896) の報告に依り、 α -Campholennitril (III) より別途を取り、之を先づアルカリにて鹼化して α -Campholensäure (VII) を作り、進んではをカメレオンにて酸化して得たる Iso-Keto-camphersäure (VI) を製し、之を B-Ketosäure と比較し、且つ兩者の Semicarbazon, Zp. 198° に於ても全く同一物質なることを確め、B-Ketosäure は Iso-Ketocamphersäure なることを認めたり。

是に依りて著者の Campher を酸化して得たる新中性物質 $C_{10}H_{14}O_2$ は 6-Oxo-campher (I) なることを確認したり。かくて Diketocamphan の存在し得べき三種の異性體は既知の 5-Oxo-campher, Campherchinon と共に總て判明したりと謂ひ得べし。

而して 6-Oxo-campher の如き β -Diketon は Campher 分子内に於て殊に緊張度の強き状態にあるが故に、輕微なる化學的影響をも受け易く 1 と 2 の間、1 と 6 の間に加水分解を起し然も兩分解物は同量に生成せられて不旋光性の Monoketocarbonsäure (II+II') を生ずるものと思考せらる。

此點に關しては前述の如く A-Ketosäure をそのキーネ鹽を経ることに依りて旋光性兩成分に分たとせしも Ketosäure は結晶生成困難なる爲め完全に分

離し得ざりしを以て後記の如くして右旋性及び左旋性の兩 Säuren を合成し、其各同量を混じたるものは光學的全く無力なるを知り、その Semicarbazon, Oxim を作りて夫等の性質を検し、A-Ketosäure と全く同一物なることを確め、かくして A-Ketosäure は生成に際し (II+II') となり、ラセミ形を取りたることを確定したり。

此合成に當り Wallach の方法に従ひて *d*-Campher より得たる Dioxidyhydrocampholensäurenitril (IV) に硫酸を作用せしめて得たる Ketosäurenitril (V) を鹼化し Ketosäure (II) を作らば、此場合反應行程中多量の非旋光性物質を生ずるが如く、生成せる酸は其儘にては $[\alpha]_D^{15} = +79.17^\circ$ を示し、A-Ketosäure より分離せる右旋光性酸の旋光度即ち $[\alpha]_D^{25} = +90.61^\circ$ よりも低く、純粹なる *d*-Ketosäure を得るの目的を達し得ざるを以て、著者は *d*-Campher より出發して得たる Dioxidyhydrocampholensäurenitril (IV) を豫め鹼化して Dioxidyhydrocampholensäure (VIII) を作り、然る後之を硫酸にて處理して Ketosäure (II) となし、之をその Semicarbazon を經て精製し氷室中に長日月放置し析出せる結晶を猶ベンツォール及び石油エーテルの混液にて再結晶して Fp. $56-58^\circ$ にして、 $[\alpha]_D^{25} = +182.20^\circ$ なる右旋性酸を得たり。一方 *l*-Campher (Fp. 175° , $[\alpha]_D^{25.5} = (-41.6^\circ)$ より出發し右旋性 Ketosäure の合成の場合と同じく Dioxidyhydrocampholensäure (VIII) を硫酸にて扱ひ Ketosäure (II) となし、精製して得たる結晶は Fp. $56-58^\circ$, $[\alpha]_D^{25} = -181.91^\circ$ を示し、此 *d*, *l* 兩者を同量に混合せる時は常溫に於て液化し、且つ全く非旋光性なり。又此 *d*-, 及び *l*-Ketosäure の

同量混合物の Semicarbazon は Zp. 240°, その Oxim は Zp 184-185° にして, *d*-Campher をクロム酸にて酸化して得たる A-Ketosäure の Semicarbazon 及び Oxim の分解點と全く一致し混熔するも變化せず.

而して *d*-Ketosäuresemicarbazon, *l*-Ketosäuresemicarbazon, の Zp は夫々 230° にして (*d+l*)-Ketosäure の Semicarbazon の Zp 240° とは異り, *d*-Ketosäureoxim 及び *l*-Ketosäureoxim は熔融に際して分解すること無く, 夫々 Fp 126-128° を示し (*d+l*)-Ketosäure の Oxim の Zp 183-185° とは甚しく異なることを發見したり. 猶 *d*-, *l*-Ketosäure 及びその各の Semicarbazon, Oxim を同量宛取り種々に組み合わせ混熔して次の如き興味ある結果を得たり.

d-Ketosäure (Fp 56-58°) + *l*-Ketosäure (Fp 56+58°).....32° (當時の氣温)

に於て液化

d-, od. *l*-Ketosäure (Fp 56-58°) + rac.-Ketosäure (Fp 65-66°).....同上

d-Ketosäuresemicarbazon (Zp 230°) + *l*-Ketosäuresemicarbazon

(Zp 230°)Zp 237°.

d-Ketosäuresemicarbazon (Zp 230°) + rac.-Ketosäuresemicarbazon

(Zp 240°)Zp 235°.

d-Ketosäureoxim (Fp 126-128°) + *l*-Ketosäureoxim

(Fp 126-128°).....Zp 170° (150° にて收縮)

d-Ketosäureoxim (Fp 126-128°) + rac.-Ketosäureoxim

(Zp 184-185°).....Zp 166° (120° に於て收縮)

上記の表に於て觀るに *d*-Ketosäure, *l*-Ketosäure の融點は各 56-58° にして rac.-Ketosäure の Fp 65-66° とは異り, 又 *d*-Ketosäuresemicarbazon と *l*-Ketosäuresemicarbazon とを混熔せる際の分解點は rac.-Ketosäuresemicarbazon の分解點と異り, *d*-Ketosäureoxim と *l*-Ketosäureoxim とを混熔せる場合の分解點は rac.-Ketosäureoxim の分解點とは異なるを知る, 是に依りて rac.-Ketosäure は單に *d*-Ketosäure と *l*-Ketosäure との混合物に非ずして兩旋光性酸の互に分子結合をなせるものなる事を推理し得べし.

次に Campher の直接酸化により得たる物質及び其誘導體と合成に依り造りたる物質及び其誘導體とを對照して熔融點, 分解點を示して列擧すれば下記の如し (對照的に造らざる誘導體は表示せず).

樟腦の直接酸化に依る		合 成 に 依 る	
A-Ketosäure	Fp. 65-66°	rac.-2,3,3. Trimethylcyclopentanon(1)-essigsäure(4)	Fp. 65-66°
		d- „	Fp. 56-58°
		l- „	Fp. 56-58°
„ -Oxim	Zp. 184-185°	rac.- „ -Oxim	Zp. 184-185°
		d- „ - „	Fp. 126-128°
		l- „ - „	Fp. 126-128°
„ -Semicarbazon	Zp. 240°	rac.- „ -Semicarbazon	Zp. 240°
		d- „ -	Zp. 230°
		l- „ - „	Zp. 230°
B-Ketosäure	Fp. 133-134°	Iso-Ketocamphersäure	Fp. 132-133°
„ -Semicarbazon	Zp. 198°	„ -Semicarbazon	Zp. 198°
Camphersäureanhydrid	Fp. 221°	Camphersäureanhydrid	Fp. 221°
Camphersäure	Fp. 187°	Camphersäure	Fp. 187°
p-Oxocampherdioxim	Fp. 158-159°	p-Oxocampherdioxim	Fp. 158-159°
p-Oxocampherdisemicarbazon	Zp. 295°	p-Oxocampherdisemicarbazon	Zp. 295°

猶著者は α -Campholensäurenitril より α -Campholensäure, Dioxydihydrocampholensäure を造り、進んで Iso-Ketocamphersäure となし、之を醋酸エステルより再結晶して融點 133° なるを確め、その Semicarbazon は分解點 198° なるを認め F. Tiemann 記載 [B. 29. 3007, (1896)] の Iso-Ketocamphersäure Fp 128-129°, その Semicarbazon Zp 187° を訂正せんとす。

本研究に際しても、恩師朝比奈教授は始終懇切なる御指導を賜りたり、茲に謹みて先生に深甚なる謝意を表し、併せて常に熱心なる御鞭撻と便宜を與へられたる武田二郎博士に謹謝し、實驗に助力せられたる渡邊正年君、佐野恒一君微量分析を行はれたる今井見君に深謝す。

實 験 の 部

I d-Campher の酸化

(1) 6-Oxocampher の生成

日本藥局方樟腦 50 g を氷醋酸 200 cc 及び無水醋酸 100 cc の混合液に溶解し、之を豫め 60° 附近に加温し強く攪拌しつつ無水クローム酸 50 g 及び無水醋酸 100 cc を少量づつ交互に注加す、反應熱は自ら強く發生するを以て外部より冷水を以て冷却し、60-80° に於て反應せしめ約 1 時間にして酸化を終へ、次で減壓

の下に大部分の醋酸を蒸溜除去したる後蒸溜殘渣に 1.5-2 L の溫湯を加へてよく攪拌し茲に析出する未反應の Campher を濾別し、濾液は短時間 (10-15 分間) 水蒸氣蒸溜に附して尙殘存せる Campher を驅逐し殘液は冷後エーテルにて數回振盪し、分液せるエーテル分を曹達液にて洗滌して酸性物質を除き脱水後エーテルを溜去すれば稍々黃色を帯びたる結晶性物質 10-15 g を得、回收 Campher は 30-35 g なり。

此中性酸化成績體は Fp 180° 附近にして、多くの有機溶剤に極めて易溶なれども唯ベンチン (Kp $50-60^{\circ}$)、リグロイン (Kp $80-120^{\circ}$) には冷時稍難溶なり。粗製の儘空氣中に長時間放置すれば漸時油狀に變化し且酸性を呈するに到るも 1-2 回ベンチン或はリグロインより再結晶したる物は空氣中にて殆んど變化せず。フーリング氏液に對する還元性は陰性にして、そのエーテル溶液は酸性亞硫酸ソーダ液にて振盪するも全く變化せず。

(2) 酸化成績體にヒドロキシラミンの作用

(5-, 及び 6-Oxo-campher-dioxim の生成)

酸化成績體 4.5 g を少量の酒精に溶解し、鹽酸ヒドロキシラミン 4.5 g、無水醋酸ソーダ 5.5 g の水溶液を加へ、水浴中に於て 2 時間加熱し一夜放置して析出せる結晶 (2.5 g) を酒精より再結晶して Zp $241-242^{\circ}$ の無色單斜柱體晶を得。

本物質 0.4 g を 25 cc の無水酒精に溶解し $l=2$ にて旋光性を觀測するに全く無力なり。

6-Oxo-campher-dioxim

結晶記載

對稱群: Monoklin hemimorph C_2

結晶軸の恒數: $a : b : c = 0.6420 : 1 : 1.0556$

$$\beta = 122^{\circ}30'$$

主なる面角: 測定値 計算値

$$100 : 001 = 57^{\circ}30' \quad \text{—}$$

$$100 : 010 = 90^{\circ}01' \quad 90^{\circ}00$$

$$0\bar{1}0 : 0\bar{1}1 = 48^{\circ}19' \quad \text{—}$$

$$100 : 0\bar{1}1 = 66^{\circ}13' \quad 66^{\circ}21'$$

$$001 : 010 = 90^{\circ}00 \quad \text{—}$$

$$\bar{1}\bar{1}2 : 0\bar{1}0 = 63^{\circ}26' \quad 63^{\circ}26'$$

$$\bar{1}\bar{1}2 : 100 = 73^{\circ}15' \quad 73^{\circ}22'$$

分析 物質	4.380 mg	CO ₂	5.820 mg	H ₂ O	2.940 mg
„	4.260 „	„	9.540 „	„	2.895 „
„	0.0958g	N ₂ Vol.	12.05 cc	(15° 765 mm)	
C ₁₀ H ₁₆ O ₂ N ₂ としての理論數		C%	61.18	H%	8.22 N% 14.28
實驗數	„	„	61.15	„	7.51
	„	„	61.08	7.60	„ 14.68

此結晶を除きたる母液を更に濃縮すれば初め飴狀に後に固結する物質を析出す、之を先づ稀酒精より次で醋酸エステルより再結晶するに無色單斜柱體晶となり、其 $F_p=165-166^\circ$ なり、0.2428 g を 10 cc 無水酒精に溶して旋光度を測定せば、 $l=1$ $\alpha_D^{20}=-0.41^\circ$ $[\alpha]_D^{20}=-16.89^\circ$ なり。

分析 物質	4.088 mg	CO ₂	9.197 mg	H ₂ O	2.934 mg
„	3.688 „	N ₂ Vol.	0.46 cc	(19° 765 mm)	
C ₁₀ H ₁₆ O ₂ N ₂ としての理論數		C%	61.18	H%	8.22 N% 14.28
實驗數		C%	61.13	H%	8.03 N% 14.30

之を Bornylacetat より合成したる 5-Oxo-campher (J. Bredt u. A. Goeb, J. pr. [II] 101, 1921) の Dioxim (F_p 164-165,5°) $[\alpha]_D^{20}=-16.41^\circ$ と混熔するに融點降下せず。

(3) 酸化成績體にセミカルバチドの作用 (5-, 及び 6-Oxo-campher-disemicarbazone の生成)

酸化成績體 8 g を少量の酒精に溶解し、之に鹽酸セミカルバチド 16 g, 無水醋酸ソーダ 16 g を水溶液となし加へ 1 時間水浴中に加熱す、加熱中既に多量の結晶析出す、粗製の Semicarbazone 11 g を得。之を 70% の醋酸より數回再結晶し、比較的醋酸に難溶なるを精製したるものは $Z_p=295^\circ$ にして 5-Oxo-campher-disemicarbazone ($Z_p=295^\circ$) と混熔するに融點降下せず。

此母液中には 5-, 及び 6-Oxo-campher-disemicarbazone 混在すべきにより、之より後者を純粹に分離せんと試みたるも容易に單一の物質として得る能はず、然れども兩者其組成は全く同一なるべきにて混合物の分析の結果はよく Oxo-campher-disemicarbazone に一致す。

分析 物質	4.300 mg	N ₂ Vol.	1.15 cc	(23° 756 mm)
C ₁₂ H ₂₀ O ₂ N ₆ としての理論數		N%	30.00	
實驗數	„	„	30.06	

此 Disemicarbazone の混合物 (Z_p 274°) 0.5 g を 15% 鹽酸 20 cc を以て 1,5

時間水浴中にて加熱したる後ソーダ液にて弱アルカリ性となしエーテルに取るに中性物質 0.1 g を得たり、石油エーテルより再結晶するに $F_p=210^\circ$ にして $[\alpha]_D^{15}=+101^\circ$ (0.0466 g を 10 cc 無水酒精溶液とし、 $l=1$ dm, $\alpha^{15}=+0.47^\circ$) なり、5-Oxo-campher に一致す。

5-Oxo-campher を除きたる母液を硫酸にて酸性となしエーテルに取るに油狀の酸性物質 0.2 g を得たり、之を少量のメタノールに溶解し、鹽酸セミカルバチド 0.2 g と無水醋酸ソーダ 0.2 g との水溶液を注加し稍加温して振盪するに結晶析出す、得量 0.2 g なり、酒精より再結晶するに $Z_p=240^\circ$ にして此酸性物質は次記の A-Ketosäure なるを知る。

II 4-Ketosäure (2.3.3-Trimethylcyclopentanon

(1)-essigsäure (4))

(1) A-Ketosäure 及び 5-Oxo-campher の分離

粗製酸化成績體 10 g を 2% 鹽酸 1 L を以て數時間 50–60° に加温し冷後炭酸曹達アルカリ性となしエーテルに取れば 2.5 g の中性物質を得、次で母液を硫酸々性となしエーテルにて振盪し、エーテルを乾燥後溜去すれば褐色油狀の酸性物質 (A-Ketosäure) 7.5 g を得。此際 5% の硫酸に代ふるに 5% の炭酸ソーダ液を使用し加温して同様に 2.5 g の中性物質と 7.5 g の酸性物質を得たり、猶酸化成績物を單に水溶液として加温したる場合も此變化を認むれども反應完了容易ならず。

生成せる中性物質はベンチンより再結晶するに $F_p=210-211^\circ$, $[\alpha]_D^{15}=+105^\circ$ (0.240 g を 10 cc の純酒精に溶解, $l=1$ $\alpha^{15}=+2.52^\circ$) にして其 Disemicarbazon は $Z_p=295^\circ$ を示し Bredt の方法に依り合成せる 5-Oxo-campher 及び其 Disemicarbazon と夫々一致し、混溶すれど融點降下せず、又その Dioxim は F_p 165–166° にして之亦合成品と一致す。

分析 物質	4.538 mg	CO ₂	10.133 mg	H ₂ O	3.225 mg
C ₁₀ H ₁₆ O ₂ N ₂ としての理論數		C%	61.18	H%	8.22
實驗數		„	60.90	„	7.91

(1) に於て得たる油狀の酸性物質はその儘永く氷室中に放置するも結晶せず、然るに之を一度石灰鹽となして精製し稀硫酸にて分解再生せしむるか又は其 Semicarbazon より再生せしめ氷室中に放置し數週間を経過せば徐々に結晶性に固

(3) A-Ketosäure のエステル化速度測定

Menschütkin 氏方法に依り A-Ketosäure のエステル化速度を測定するに、その對照として第一級酸の Pinonsäure と、第三級酸の Iso-Ketopinsäure とを撰び各 1 g を取りて 5 cc の Isobutylalkohol に溶し (Iso-Ketopin 酸は 10% 溶解せざる故に飽和溶液を以て行ふ) 先づその 1 cc を N/10 バリット水にて滴定し次に各溶液を閉管中にて 150-160° に 1 時間加熱したる後各 1 cc を同じく N/10 バリット水にて滴定してエステル化の Anfangsgeschwindigkeit を検するに次の如くにして A-Ketosäure は第一級カルボン酸なることを知りたり。

	加熱前バリツ ト水所要量	加熱後バリツ ト水所要量	エステル%
Pinonsäure	10.1 cc (a)	7.1 cc (b)	$\frac{a-b}{a} \times 100 = 29.7$
Iso-Ketopinsäure	4.0 „ „	3.8 „ „	„ = 5.0
A-Ketosäure	9.6 „ „	6.8 „ „	„ = 29.1

(4) A-Ketosäure-semicarbazon

A-Ketosäure 1 g をメタノールに溶解し鹽酸セミカルバチド 1 g, 結晶醋酸ソーダ 1.4 g の水溶液を加へ僅かに加温しつつ振盪すれば直ちに結晶析出す、粗製 Semicarbazon の收量は 1 g なり、粗製品を 70-80% の醋酸或は酒精より再結晶すれば單斜細長なる板狀結晶を得、融點測定に際し豫め 290° 附近に熱したる硫酸浴中にて比較的速に溫度を上昇せしむれば Zp 240° を示す。

分析 物質	4.513 mg	CO ₂	9.087 mg	H ₂ O	3.282 mg
„	2.440 „	N ₂ Vol.	0.353 cc (14° 763 mm)		
C ₁₁ H ₁₉ O ₃ N ₃ としての理論數 C% 54.77 H% 7.94 N% 17.43					
實驗數 „ 54.91 „ 8.14 „ 17.28					

滴定 (標示藥 フェノールフタレイン)

物質	0.1062 g	N/10 KOH	4.6 cc
C ₁₁ H ₁₉ O ₃ N ₃ としての理論數 M = 241.15			
一鹽基性酸としての實驗數 M = 230.9			

(5) A-Ketosäure-oxim

A-Ketosäure 1 g を酒精に溶解し、鹽酸ヒドロキシラミン 0.5 g と結晶醋酸曹達 1.2 g との水溶液を注加し 1 時間水浴中に加熱す、放冷すれば Oxim は初め油狀に析出し漸次結晶形に變ず、一夜放置し粗製結晶 0.8 g を得たり、之を稀酒精より再結晶すれば斜方細長なる柱狀結晶となり Zp 184-185° を示す。

分析 物質	4.237 mg	CO ₂	9.349 mg	H ₂ O	3.220 mg	
„	3.750 „	N ₂ Vol	0.220 cc		(15° 762 mm)	
C ₁₀ H ₁₇ O ₃ N としての理論數						
	C%	60.26	H%	8.61	N%	7.00
實驗數						
	„	60.18	„	8.50	„	6.97

(6) A-Keto:säure-methylester

A-Ketosäure 10 g を對應量より稍々過剰の苛性カリ液に溶し冷時に於て攪拌しつつ 20 g のデメチル硫酸を約 1 時間内に添加し次いで水浴上に約 30 分間加温し、冷後苛性カリ液を加へて弱アルカリ性となしエーテルに取り、乾燥後エーテルを除去せば無色油狀の Methylester 8 g を得、之を減壓に於て蒸溜精製するに 1 mm 126° に於て大部分溜出す、收量 6.8 g なり、Kp_{60mm}=223°, 7% 無水酒精溶液として旋光性を檢するに全く無力なり。

分析 物質	4.840 mg	CO ₂	11.763 mg	H ₂ O	3.983 mg
C ₁₁ H ₁₈ O ₃ としての理論數					
	C%	66.63	H%	9.16	
實驗數					
	„	66.28	„	9.22	

Methoxy 基定量

物質	3.515 mg	AgJ	4.571 mg
C ₁₀ H ₁₅ O ₂ ·OCH ₃ としての理論數			
	OCH ₃ %	15.66	
實驗數			
	„	16.04	

(7) A-Ketosäuremethylester-semicarbazon

A-Ketosäuremethylester 0.5 g 分析をメタノールに溶解し、鹽酸セミカルバチフ 0.35 g と結晶醋酸ソーダ 0.5 g との水溶液を加へ僅かに加温し振盪すれば Semicarbazon* は容易に結晶析出す、粗製品の得量 0.5 g なり、之をメタノールより再結晶すれば單斜柱體無色の扁平結晶を得、Fp 185-186°

分析 物質	4.870 mg	CO ₂	10.057 mg	H ₂ O	3.483 mg	
„	0.0882 g	N ₂ Vol.	13.3 cc		(23.5° 755 mm)	
C ₁₂ H ₂₁ O ₃ N ₃ としての理論數						
	C%	56.43	H%	8.29	N%	16.47
實驗數						
	„	56.32	„	8.00	„	16.78

(8) A-Ketosäure の石灰鹽

A-Ketosäure をアンモニア水にて中和し鹽化石灰の濃厚水溶液を加ふれば白色の沈澱を生ず、水より再結晶すれば單斜柱體無色の結晶を得、125° 附近にて結晶水を放出して分解す、本物質は 1.9% 水溶液にて旋光性を檢するに全く無力なり。

結晶水の定量

物質 0.1382 g を真空, 110° に於て乾燥するに
減量 0.0227 g 實驗數 H₂O% 16.06
(C₁₀H₁₅O₃)₂·Ca·4H₂O としての理論數 H₂O% 15.06

Ca の定量

物質	3.987 mg	CaSO ₄	1.290 mg
(C ₁₀ H ₁₅ O ₃) ₂ Ca	數としての理論數	Ca%	9.84
	實驗數	„	9.52

(9) A-Ketosäure の光學的活性體への分割

Δ-Ketosäure を苛性ソーダ液にて中和し鹽酸ヒニン溶液を加へ析出する白色塊狀のヒニン鹽を乾燥後醋酸エステルにて十數回再結晶す、溶劑に難溶性の部分アンモニア水にて分解し遊離析出するヒニンをエーテルにて除き、母液を硫酸酸性となしエーテルにて振盪す、エーテル溶液は乾燥して蒸溜すれば油狀の酸殘留す。此酸は $[\alpha]_D^{15} = -77.5^\circ$ を示し (0.7667 g を 15 cc の純酒精に溶解し、 $l=1$, $\alpha^{15} = -3.96^\circ$) 永く氷室中に放置するも結晶析出せず、試みに rac.-Ketosäure の結晶を接種したるに漸く結晶出現したり、然れども數日間之を氷室中に放置し時々刺戟を與ふるも完全に結晶化するに到らずして尙少量の油狀物を止む、吸引濾過して油狀物を去りたる結晶を猶ほ素燒板上に壓し充分油分を除きたる後リグロインより再結晶したるに Fp $65-66^\circ$ を示す、然るに此結晶の旋光性を檢するに全く無力なるを知りたり、依りて結晶せざりし油分につき旋光度を檢したるに $[\alpha]_D^{15} = -116.2^\circ$ (0.5454 g を 10 cc の純酒精に溶解、 $l=1$, $\alpha^{15} = -6.36^\circ$) を示したり、而して油狀分に再び rac.-Ketosäure を接種したれども結晶は既に析出せず。

一方溶剤に易溶性なる部分のヒン鹽を分解して得たる酸は $[\alpha]_D^{18.5} = +33.03^\circ$ (1.0897 g を 10 cc の純酒精に溶解, $l=1$, $\alpha^{18.5} = +3.60^\circ$) にして油狀なり、之に前述左旋性酸の場合と同様に rac.-Ketosaure を接種し氷室中に放置したるに結晶を析出せり、尚油分を止むるを以て之を分離し、結晶の旋光度を測るに無力にして $F_p = 65-66^\circ$ なり。油分は $[\alpha]_D^{19.5} = +71.7^\circ$ (0.7843 g を 10 cc の純酒精に溶解, $l=1$, $\alpha^{19.5} = +5.62^\circ$) にして之に再び rac.-Ketosaure を imphen し結晶を除きたる母液は $[\alpha]_D^{20} = +82.5^\circ$ (0.6550 g を 10 cc の純酒精に溶解, $l=1$, $\alpha^0 = +5.40^\circ$) にして僅に褐色を帯ぶ、此油分を Semicarbazon ($Z_p 240^\circ$) となし 15% の鹽酸にて分解して再生せし酸は無色となりたり、之に三度 rac.-Säure を接種して數十日間放置したるに少量の結晶(光學的無力)析出せり、之を除きたる油狀酸

は $[\alpha]_D^{20} = +90,61^\circ$ (0,2455 g を 10 cc の純酒精に溶解, $l=1$, $\alpha = +2,22^\circ$) にして, 四度 rac-Säure を接種せるも結晶未だ顯れず.

$[\alpha]_D = +52,2^\circ$ の Ketosäure を 15% の鹽酸と共に 6 時間水浴中に加熱せるに尙 $[\alpha]_D = +51,8^\circ$ を示し, 又 10% 苛性カリ液と同様に處理するも同じく旋光性の變化を來さず, 是れに依りて觀るに Ketosäure は酸或はアルカリに依る racemization は比較的容易ならざるものの如し.

III B-Ketosäure (Iso-ketocamphersäure)

(1) A-Ketosäure の KMnO_4 に依る酸化

A-Ketosäure 1 g を對應量より少々過剰の曹達溶液に溶解し常溫に於て 2% カメレオン溶液を少量づつ注加するにカメレオンは容易に脱色せらる, 此際僅かに發熱するを以て時々氷塊を加へて反應液を $15-20^\circ$ に保持す, 暫時放置するも紅色の尙殘存するに到り, 生成せる褐色を濾去し濾液を硫酸にて酸性となし反復エーテルを以て抽出す, エーテル溶液を乾燥後蒸溜すれば白色結晶性物質を得, 之を醋酸エステルより再結晶すれば無色の三斜桌面體晶となり, 其 $\text{Fp} = 133-134^\circ$ にして再結晶を反復すれど既に融點上昇せず, 而して一度熔融して固化せるは尙元の融點を保つ. 本品は酒精アセトンに易溶, エーテル, 醋酸エステル, ベンツオールに少々難溶, ベンチンは殆んど不溶なり, 水には少々易溶なり.

分析	物質	3,938 mg	CO_2	8,003 mg	H_2O	2,620 mg
	„	3,535 „	„	7,135 „	„	2,300 „
	$\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_5$ としての理論數		C%	55.53,	H%	7.46
	實驗數		„	55.42	„	7.44
	„		„	55.06	„	7.28

滴定 (標示藥 フェノールフタレイン)

物質	0,1050 g	$\text{N}/_{10}$ KOH	9.6 cc
$\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_5$ としての理論數		M = 216.13	
二鹽基性酸としての實驗數		M = 217.6	

之を F. Tiemann (B. 29, 3006, 1896) の記載に従ひ α -Campholensäure より合成したる Iso-Ketocamphersäure ($\text{Fp } 133^\circ$, Tiemann に依れば $\text{Fp } 128-129^\circ$) と混熔するも融點降下せず, 之を B-Ketosäure と命名す.

(2) B-Ketosäure-semicarbazon

B-Ketosäure 0,5 g を鹽酸セミカルバチド 0,35 g, 結晶醋酸曹達 0,5 g の水溶

液に加へ1時間水浴中に加熱し放置するに翌朝美麗なる三斜柱體無色の結晶集團して析出せるを見る、得量 0.5 g, 酒精より再結晶するに Zp 198° を示す。本物質は冷水に難溶、熱湯に易溶なり。

之を後述する合成 Iso-Ketocamphersäure-semicarbazon (Zp 198°) と混融するも融點降下せず。

分析 物質	4.888 mg	CO ₂	8.680 mg	H ₂ O	3.015 mg
„	3.120 „	N ₂ Vol.	0.405 cc (15° 762 mm)		
C ₁₁ H ₁₉ O ₅ N ₃ としての理論數		C%	48.30	H%	7.01
		N%	15.33		
實驗數		„	48.43	„	6.90
		„		„	15.43

滴定 (標示藥 フェノールフタレイン)

物質	0.1426 g	N/10 KOH	10.5 cc
C ₁₁ H ₁₉ O ₅ N ₃ としての理論數		M	= 273.15
二鹽基性酸としての實驗數		M	= 271.6

(3) B-Ketosäure にブロームの作用 (Iso-camphoronsäure の生成)

B-Ketosäure 0.8 g を稀ナトロン液に溶解しブローム 1.5 g を加へ更にブロームの脱色する迄苛性曹達液を加ふ、此際既にブロモフォルム (CHBr₃) 臭を發し液は僅かに白濁す、約1時間 50-60° に加温したる後硫酸々性となし遊離する少量のブロームをベンチンを以て除き次いでエーテルを以て反復抽出す、乾燥後エーテルを去れば白色結晶を止む、之を温クロロフォルムを以て數回洗滌して殘存する未反應の B-Ketosäure を除けば粗製酸化成績體 0.5 g を得、これを醋酸エスル及びクロロフォルムの混液より再結晶すれば Fp 166-167° を示す。ベンツォール、クロロフォルム、リグロインに不溶、エーテル、酒精、醋酸エステルに易溶、水には稍易溶なり。

分析 物質	4.400 mg	CO ₂	7.986 mg	H ₂ O	2.585 mg
C ₉ H ₁₄ O ₆ としての理論數		C%	49.52	H%	6.47
實驗數		„	49.50	„	6.57

滴定 (標示藥 フェノールフタレイン)

物質	0.1065 g	N/10 KOH	14.5 cc
三鹽基性酸としての實驗數		M	= 220.5
C ₉ H ₁₄ O ₆ としての理論數		M	= 218.11

本酸は、合成に依る Iso-camphoronsäure (B. 26, 3055; A. 314, 395) と混融するも融點降下せず。

IV d-Ketosäure (2.3.3-Trimethyl-cyclopentanon

(1)-essigsäure (4)) の合成 (其一)

(1) α -Campholensäure-nitril の製造

d -Campher より Campher-oxim (Fp 118-119°, $[\alpha]_D^{20} = -41,01^\circ$) を作り, この 65 g に 25% 硫酸 250 cc を加へ還流冷却器を附して金網上に加熱沸騰せしむるに次第に Oxim は溶融し油層を分離し來る, 約 20 分間沸騰せしめたる後冷却してエーテルを加へ振盪して水層と分別し, エーテル液は稀硫酸, 溫苛性ソーダ液を以て順次洗滌し未反應の Oxim, 副生する Amid, Lacton 等を除去し乾燥後エーテルを溜去し次いで Metalbad 中にて蒸溜すれば常壓にて大部分 224-226° に於て溜出す, 收量 47 g, $[\alpha]_D^{20,5} = +7,96^\circ$

(2) Dioxydihydrocampholen-nitril の製造

α -Campholen-nitril 20 g に約 300 cc の水を加へ烈しく攪拌しつつ 0-0,5° に於て, カメレオン 27 g を 2% の水溶液となし之を徐々に滴下するにカメレオンは瞬時に脱色せらる, 全酸化劑を滴下するに約 1,5 時間を要す. 褐色を濾過し, 澄明の濾液に CO_2 を飽和し加温して濾過す, 褐色は熱湯にて洗滌し, 洗液は濾液と併せて鹽析し, 後エーテルを以て反復抽出すエーテル液は乾燥してエーテルを蒸溜すれば Dioxydihydro-campholen-nitril は褐色油狀の物質として得らる, 收得量 15,3 g なり.

(3) Ketonitril の製造及びその Semicarbazon

粗製 Dioxydihydro-campholen-nitril を温水に溶し不溶分を除去し, その 25 g を 20% 硫酸 500 cc と共に 2 時間水浴中にて加温するに次第に褐色油狀物を析出し來る. 此油狀物はセミカルバチドに作用せざるを以て濾去し, 濾液は多少濁する故に少量の活性炭を加へて全く澄明に濾過し, 反復エーテルを以て抽出し, エーテル液は乾燥して蒸溜すれば褐色油狀の粗製 Ketonitril 15 g を得.

粗製 Ketonitril 0,5 g をメタノールに溶解し, 鹽酸セミカルバチド 0,5 g, 結晶醋酸ソーダ 0,8 g の水溶液を加へて 1 時間水浴中に加熱して 1 夜放置せば粗製 Ketonitril-semicarbazon 0,3 g を得, 之を醋酸エステルより再結晶せば Fp 170° の結晶となる. (Wallach は 152° と記載す)

醋酸エステルより Semicarbazon の析出するに際し, 微細なる針狀晶の集團と稜柱狀晶との兩様に出現するも兩者共に Fp 170° にして混融するも變化なし.

而して前者を溶媒より、稀薄濃度に於て徐々に析出せしむれば後者の晶狀に結晶す。稜柱狀晶は無色澄明なるも眞空除湿器中に放置すれば漸次白色不澄明となる。是れ恐らく結晶醋酸エステルを含むものにして、素焼板上に壓して粉末となす際に醋酸エステルを放先し融點に變化を來さざるものと思惟せらる。

分析 物質	5.013 mg	CO ₂	10.963 mg	H ₂ O	3.670 mg
„	1.460 „	N ₂ Vol.	0.313 cc (15° 761 mm)		
C ₁₁ H ₁₈ ON ₄ としての理論數					
		C%	59.41	H%	8.17
		N%	25.20		
實驗數					
		„	59.64	„	8.19
				„	25.44

(4) Ketosäure の製造及び其 Semicarbazon

粗製 Ketonitril 14 g に 10% 苛性カリ液 150 cc を加へ、振盪しつつ水浴中に加熱するに最初完全に溶解せざりし Nitril は 1 時間後には全く澄明に溶解し、葡萄酒紅色を呈し、強きアンモニア臭と別にテルペン様刺戟臭を放つ。未鹼化物の殘存するを慮り、冷後アルカリ性の儘エーテルにて振盪するに移行せるもの殆んど無し。次に硫酸々性となしてエーテルに取り、溶液を乾燥してエーテルを溜去すれば粗製 Ketosäure は褐色油狀物として得らる。

此粗製 Ketosäure 12 g に鹽酸セミカルバチド 12 g, 結晶醋酸ソーダ 17 g を水溶液に於て作用せしむるに Semicarbazon は容易に析出す。得量 6.5 g, Zp 230° にして、70% 醋酸より再結晶すれば得量 2.6 g, Zp 240° となる。(Wallach は Zp 210-211° と記載せり)。此 Semicarbazon を Campher の直接酸化物より得たる A-Ketosäure の Semicarbazon (Fp 240°) と混融するも分解點の降下を認めず。

分析 物質	3.930 mg	CO ₂	7.900 mg	H ₂ O	2.635 mg
„	2.170 „	N ₂ Vol.	0.317 cc (18°, 755 mm)		
C ₁₁ H ₁₉ O ₃ N ₃ としての理論數					
		C%	54.77	H%	7.94
		N%	17.43		
實驗數					
		„	54.82	„	7.50
				„	17.40

此 Semicarbazon 2.5 g を 15% 鹽酸 20 cc と 30 分間水浴中に加熱し一旦曹達にて中和し後再び硫酸にて酸性となしエーテルに取り、乾燥後エーテルを溜去して 1.5 g の油狀 Ketosäure を得たり。[α]_D¹⁵ = +79.17° [0.7794 g を 10 cc の純酒精に溶解, l=1, α¹⁵ = +6.17°)

此 Ketosäure は永く氷室中に放置するも結晶せず、依つて樟腦酸化成績物より得たる Ketosäure の結晶を接種したるに初めて結晶析出せり、吸引濾過に依り

て結晶物と油状分を分離し、結晶は素焼板上にて充分油分を除去しリグロインより再結晶す。本結晶は Fp 65-66° にして全く旋光性を有せず。

分析 物質	4.038 mg	CO ₂	9.682 mg	H ₂ O	3.129 mg
C ₁₀ H ₁₆ O ₃ としての理論數					
	C%	65.17	H%	8.76	
	實驗數	„	65.42	„	8.67

油状分は 0.6311 g を 10 cc の純酒精に溶解し $l=1$ にて $\alpha^{19.5}=+6.74^\circ$, $[\alpha]_D^{19.5}=+106.8^\circ$ を示す。之に再びラセミ體を接種するも結晶析出せず。

此結晶 rac.-Ketosaure を Campher 酸化成績物より得たる rac.-Ketosaure と混融するに融點降下せず。又其 Semicarbazon は Zp 240°, Oxim は Zp 183-184° にして、樟腦酸化成績體より得たる rac.-Ketosaure の Semicarbazon 及び Oxim と各混融するに融點降下せず。

合成 rac.-Ketosaure (Fp 65-66°) の Oxim の分析は次の如し、

分析 物質	3.370 mg	CO ₂	7.480 mg	H ₂ O	2.505 mg		
„	3.245 „	N ₂ Vol.	0.196 cc (18° 754 mm)				
C ₁₀ H ₁₇ O ₃ N としての理論數							
	C%	60.26	H%	8.61	N%	7.00	
	實驗數	„	60.53	„	8.32	„	7.03

V 合成 Ketosaure より Iso-ketocamphersäure の製造

合成 Ketosaure 2.5 g を稍過剰の曹達液に溶解し冷時カメレオンを以て酸化すること、前述 A-Ketosaure を酸化して B-Ketosaure を得たる如くせば粗製 Iso-ketocamphersäure 2.2 g を得、之を醋酸エステルより再結晶せる物は Fp 132-133° を示す。

分析 物質	4.165 mg	CO ₂	8.512 mg	H ₂ O	2.875 mg
C ₁₀ H ₁₆ O ₅ としての理論數					
	C%	55.53	H%	7.46	
	實驗數	„	55.74	„	7.72

Wallach の方法に従ひ Ketosaure をクロム酸を以て酸化するも同じく Iso-Ketocamphersäure を得らる、然れども著者の行ひたるアルカリ性に於てカメレオンにて爲せる方法に依れば反應遙かに圓滑にして得量も亦良好なり。Wallach は Iso-Ketocamphersäure の融點を Tiemann と同様に 128-129° と記載せり。

Iso-Ketocamphersäure に、B-Ketosaure の場合と同様にしてセミカルバチドを作用せしめ Semicarbazon を得。Zp=198° (Wallach は 187° と記載せり)

分析 物質	4.810 mg	CO ₂	8.580 mg	H ₂ O	3.07 mg
C ₁₁ H ₁₉ O ₅ N ₃ としての理論數					
	C%	48.30	H%	7.01	
	實驗數	„	48.65	„	7.23

此 Semicarbazon を B-Ketosäure-semicarbazon と混融するも Zp 降下を來さず。

VI α -Campholen-nitril より Iso-Ketocamphersäure

の製造及び其誘導體

大體 F. Tiemann (B. 29, 3007, 1896,) の文獻に依りて合成實驗を行へり。

(1) Campholensäure の製造

IV の (1) に於て述べたる Campholen-nitril 20 g を 15% の酒精性カリ 400 cc と共に 50 時間加熱す、次いで減壓にて大部分の酒精を去り、更に少量の水を加へて蒸溜しアルコールを完全に除去す。液は殆んど澄明にして、之をアルカリ性の儘エーテルにて振盪して未鹼化の Nitril を除き、母液を硫酸々性としてエーテルにて抽出す。エーテル溶液を乾燥して、乾燥アンモニアを通すれば白色結晶性沈澱を析出するを以て之を濾過し、エーテルにて洗滌して後乾燥すれば Campholensäuresammonium 23 g を得、之を少量の水に溶解し脱色炭を加へて振盪、後濾過し硫酸々性となしてエーテルにて抽出し微帶黄色の油狀の酸 20 g を得、之を常壓にて蒸溜し 250-257° にて溜出する部分を取れば 14.5 g を算す。その儘次の原料となす。

(2) α -Dioxydihydrocampholensäure の製造

前記 α -Campholensäure 14 g を對應量より稍過剰の炭酸曹達に溶解し 0° に冷却しつつ攪拌下に、カメレオン 16.5 g を 2% の水溶液となせるを滴下す。カメレオンは瞬時に脱色せられ 1.5 時間にて全反應は終了す。反應液に炭酸を飽和せしめ、褐石を濾去して、母液を低壓に於て濃縮し、硫酸々性と成してエーテルに取る、エーテル蒸溜殘渣は帶褐色油狀物質にて收得量 10 g なり。之にクロロフォルムを加へて攪拌すれば結晶を析出す、醋酸エステルより再結して Fp 144-145° の Dioxydihydrocampholensäure 3 g を得、Tiemann の記載 Fp 144° と一致す。

(3) Iso-Ketocamphersäure の製造

α -Dioxydihydrocampholensäure 1 g を約 5 cc の水に溶し、之に重クロム酸ソーダ 1.5 g と濃硫酸 2.5 g とを 10 cc の水に溶したるものを少量づつ注加すれば 40-50° に於て反應は徐々に進行す。全部のクロム酸溶液を注下したる後 30 分間沸騰せる水浴上にて加熱し、冷後エーテルにて抽出し、無色油狀のエーテル殘渣

0.9 g を得、之にベンツオールを加へて攪拌すれば大部分結晶に化す。此結晶を濾別してベンツオールに溶解し（此際ベンツオール不溶分を止めざる故に Iso-camphoronsäure の副生は無きが如し）、放冷するに扁平なる柱體晶を析出す。Fp 128°. 更に醋酸エステルより再結晶するに Fp 132-133° に上昇す。収量 0.2 g. 之を B-Ketosäure (Fp 133-134°) と混融して融點降下を認めず (Tiemann は Fp 128° と記載す).

分析 物質	3.710 mg	CO ₂	7.510 mg	H ₂ O	2.380 mg
C ₁₀ H ₁₆ O ₅ としての理論數					
C%	55.53	H%	7.46		
實驗數	„	55.21	„	7.18	

(4) Iso-Ketocamphersäure-semicarbazon

Iso-Ketocamphersäure 0.1 g, 鹽酸セミカルバチド 0.1 g, 醋酸ソーダ 0.2 g を水溶液となし、1 時間水浴上に加熱し冷室に放置す、翌朝微細なる結晶少量析出、Fp 230° にしてセミカルバチドの重合體と認めらる、之を濾去して更に 2 日放置せしに美麗なる無色三斜柱體晶を得たり、Zp 196°, 稀アルコールより再結晶せしめて Zp 198° に上昇せり。之を B-Ketosäure-semicarbazon (Zp 198°) と混融して Zp 降下を來さず。

分析 物質	3.630 mg	N ₂ Vol.	0.472 cc	(17°, 751 mm)
C ₁₁ H ₁₉ O ₅ N ₃ としての理論數				
N%	15.38			
實驗數	„	15.12		

VII d-Ketosäure の合成 (其の二)

(1) Dioxydihydrocampholensäure の製造

d-Ketosäure の合成其の一の場合と同様にして得たる粗製 Dioxydihydrocampholen-nitril 40 g を 15% 苛性カリ液 650 cc と共に、時々振盪しつつ 1 時間水浴中に加熱鹼化す。然る後先づアルカリ性の儘エーテルにて振盪するに移行するもの殆んど無し、次いで硫酸々性となし鹽析して反復エーテルを以て抽出し、エーテル液を乾燥後蒸溜せば初め褐色の油狀にして後徐々に結晶析出し殆んど固化する物質を得、之にクロロフォルムを加へて振盪、濾過し更にクロロフォルムを以て洗滌すれば殆んど白色の結晶となる。得量 16.6 g. 此結晶を醋酸エステルより再結晶すれば無色細長の柱狀晶 14 g を得、Fp 144-145° なり。而して本結晶 0.5912 g を 10 cc の純酒精に溶解し、 $l=1$ にて旋光度を検するに $\alpha^{26}=+3.82^\circ$ $[\alpha]_D^{26}=+64.61^\circ$.

(2) *d*-Ketosaure の製造及びその誘導體

Dioxydihydrocampholensäure 8 g を 20% の硫酸 250 cc と共に 1 時間水浴中にて加熱す。少々黄褐色を呈する反應液に少量の脱色炭を加へて濾過し、無色澄明の濾液をエーテルにて振盪し、分別したるエーテル溶液中の酸性物を重曹液に移行せしむ。此際エーテルは乾燥後蒸溜して殆んど認むべき物質を残さず。重曹液は硫酸々性としてエーテルにて振盪し、エーテル液を乾燥蒸溜せば油狀の酸性物 7 g を得、之を常法に依りてその Semicarbazon となせば Z_p 229° のもの 5.4 g を收得す。酒精より再結晶すれば Z_p 230° (豫め 200° 附近に熱したる硫酸浴中に於て比較的速かに溫度を上昇せしむ) となる。

此 Semicarbazon 4.2 g を 15% の鹽酸 100 cc を以て 2 時間水浴中に加熱分解せしめ、冷後外部より冷却しつつ苛性曹達液にて一旦中和し、再び稀硫酸を以て酸性となしエーテルにて振盪して分液す。エーテル液は水洗後乾燥してエーテルを溜去して油狀の Ketosaure 3 g を得たり。此酸の 0.5134 g を純酒精 10 cc に溶解し旋光度を検するに、 $l=1$ にて $\alpha_{D}^{27.5} = +7.92^\circ$ 。即ち $[\alpha]_D^{27.5} = +154.27^\circ$ なり。

油狀の Ketosaure を 2-3° の冷室中に永く (二ヶ月) 放置するに漸次結晶析出す。結晶に附着する微量の油狀分を素燒板上に充分吸引除去し、ペンツオール及び石油エーテルの混液にて再結晶すれば無色單斜柱體晶を得、 $F_p = 56-58^\circ$ 。結晶 0.1910 g を 10 cc の純酒精に溶解し旋光度を検するに $l=1$ にて $\alpha^{31} = +3.48^\circ$ 、 $[\alpha]_D^{31} = +182.20^\circ$ なり。

分析 物質	4.344 mg	CO ₂	10.408 mg	H ₂ O	3.411 mg
C ₁₀ H ₁₆ O ₃ としての理論數		C%	65.17	H%	8.76
實驗數		„	65.34	„	8.79

此結晶狀 *d*-Ketosaure の Semicarbazon は Z_p 230° にして油狀の Ketosaure の Semicarbazon と全く差異なし。而して Semicarbazon の分析は次の如し。

分析 物質	4.878 mg	CO ₂	9.842 mg	H ₂ O	3.545 mg
„	4.300 mg	N ₂ Vol.	0.675 cc	(31°, 768 mm)	
C ₁₁ H ₁₉ O ₃ N ₃ としての理論數		C%	54.77	H%	7.94
實驗數		„	55.02	„	8.13
				„	17.45

d-Ketosaure 0.5 g を酒精に溶解し、鹽酸ヒドロキシラミン 0.4 g 及び結晶醋酸ソーダ 0.7 g の水溶液を加へ 1 時間水浴中に加熱す。冷後飴狀物質を析出し來るを以て時々硝子棒にて攪拌し氷室中に放置すれば飴狀物質は全部結晶に化

す。即ち *d*-Säure-Oxim なり。之は rac 體の Oxim に比し結晶し難く又酒精共他の溶劑に對して遙かに溶解し易く。精製には、最初水より再結晶し次いで少量の醋酸エステルに溶解しリグロインを加へて放置すれば徐々に柱狀結晶を析出す。Fp 126–128°.

分析 物質	4.789 mg	CO ₂	10.600 mg	H ₂ O	3.700 mg
„	4.445 mg	N ₂ Nol.	0.280 cc	(28° 759 mm)	
C ₁₀ H ₁₇ O ₃ N とする	の理論數	C%	60.26	H%	8.61
		N%	7.00		
實驗數	„	60.37	„	8.64	„ 6.99

VIII *l*-Ketosäure の合成

樺太産榧松葉部精油より *l*-Borneol (Fp 204°, $[\alpha]_D^{25} = -35.9^\circ$) を分溜し、之を酸化して得たる *l*-Campher (Fp 175°, $[\alpha]_D^{25.5} = -41.6^\circ$) より出發して *d*-Ketosäure の合成(其の二)と全く同様にして製す。

(1) *l*-Campheroxim

Fp 118–119°, $[\alpha]_D^{25} = +41.12^\circ$ (0.5934 g を 10 cc の純酒精に溶解して *l*=1 にて測定, $\alpha^{26} = +2.44^\circ$)

(2) *l*- α -Campholen-nitril

l-Campheroxim に 25% の硫酸を作用せしめて得たる *l*-Campholen-nitril は Kp 223–225°, $[\alpha]_D^{25} = -8.89^\circ$ なり。

(3) *l*-Dioxydihydrocampholensäure

l-Campholen-nitril にカメレオン液を作用せしめて得たる *l*-Dioxydihydrocampholen-nitril を 15% の苛性カリ液と共に水浴中にて加熱し、硫酸々性となしてエーテルに取り、エーテルを溜去すれば目的の酸は初め油狀として残り、後結晶性に固化す。此粗製酸をクロロフォルムにて洗滌し次に醋酸エステルにて再結晶すれば無色細長なる柱狀晶となりその Fp は 144–145° なり。 $[\alpha]_D^{25} = -65.07^\circ$ (0.5716 g を 10 cc の純酒精に溶解, *l*=1, $\alpha^{26} = -3.72^\circ$)

分析 物質	4.700 mg	CO ₂	10.267 mg	H ₂ O	3.744 mg
C ₁₀ H ₁₈ O ₄ とする	の理論數	C%	59.37	H%	8.97
實驗數	„	59.58	„	8.91	

(4) *l*-Ketosäure

l-Dioxydihydrocampholensäure を *d* 體の場合と同様にして、20% の硫酸にて處理し得たる粗製 Ketosäure を Semicarbazon (Zp 230°, 酒精より再結晶)とな

し、之を 15% 鹽酸にて分解して再生したる Ketosäure は初め油狀にして $[\alpha]_D^{27.5} = -154.88^\circ$ (0.5172 g を 10 cc 純酒精に溶解, $l=1$, $\alpha_D^{27.5} = -8.00^\circ$) なれど *d*-Ketosäure の如く之を永く寒冷中に在らしめ、析出せる結晶をベンツォールと石油エーテルの混液より再結晶せるものは $Fp = 56-58^\circ$ にして $[\alpha]_D^{21} = -181.91^\circ$ (0.2012 g を 10 cc の純酒精に溶解, $l=1$, $\alpha^{21} = -3.66^\circ$), 即ち本 *l* 體は *d* 體の全く Antipod なり.

分析 物質	3.411 mg	CO ₂	8.171 mg	H ₂ O	2.711 mg
C ₁₀ H ₁₆ O ₃ としての理論數	C% 65.17			H% 8.76	
實驗數	„ 65.33			„ 8.89	

d 體と同様にして作りたる *l*-Ketosäure-semicarbazon は *d* 體の Semicarbazon と同じく $Fp = 230^\circ$ なり.

分析 物質	3.900 mg	CO ₂	7.845 mg	H ₂ O	2.800 mg
„ 3.833 „		N ₂ Vol.	0.600 cc	(30° 760 mm)	
C ₁₁ H ₁₉ O ₃ N ₃ としての理論數	C% 54.77	H% 7.94	N% 17.43		
實驗數	„ 54.86	„ 8.03	„ 17.28		

l-Ketosäure-oxim も亦 *d* 體の時と同様にして得られ Fp も $126-128^\circ$ なり.

分析 物質	4.244 mg	CO ₂	9.400 mg	H ₂ O	3.300 mg
„ 4.745 mg		N ₂ Vol.	0.300 cc	(30° 759 mg)	
C ₁₀ H ₁₇ O ₃ N としての理論數	C% 60.26	H% 8.61	N% 7.00		
實驗數	„ 60.41	„ 8.70	„ 6.97		

附記

合成せる *d*-Ketosäure と *l*-Ketosäure との同量を混じたる (*d+l*)-Ketosäure の Semicarbazon は $Zp 240^\circ$ にして、その Oxim は $Zp 184-185^\circ$ なり. 即ち樟腦の酸化に依りて得たる rac.-Ketosäure の Semicarbazon の $Zp 240^\circ$, その Oxim の $Zp 184-185^\circ$ と一致し又夫々混溶するも Zp に變化を認めず. (*d+l*)-Ketosäure の Semicarbazon 及び Oxim の分析は次の如し.

分析 (Semicarbazon)

物質	4.244 mg	CO ₂	8.554 mg	H ₂ O	3.078 mg
„ 4.466 mg		N ₂ Vol.	0.720 cc	(31°, 759 mm)	
C ₁₁ H ₁₉ O ₃ N ₃ としての理論數	C% 54.77	H% 7.94	N% 17.28		
實驗數	„ 54.97	„ 8.11	„ 17.31		

(Oxim)

物質	4.077 mg	CO ₂	9.035 mg	H ₂ O	3.122 mg
„ 3.544 „		N ₂ Vol.	0.230 cc	(31° 759mm)	

$C_{10}H_{17}O_3N$ としての理論數 C% 60.26 H% 8.61 N% 7.00

實驗數 „ 60.44 „ 8.57 „ 7.14

IX 樟腦酸化成績體中の Campherchinon の存在

黄色を帯びたる粗製酸化成績體 35 g を水溶液となし炭酸ソーダを以てアルカリ性となし 30% 過酸化水素液 2-3 滴を加ふるに直ちに液は無色となる, アルカリ性のままエーテルにて振盪し中性物質を除き母液を硫酸々性となしエーテルを以て振盪し, エーテル溶液より約 12 g の油狀物質を得たり. 之を減壓蒸溜するに 6 mm 190° に於て大部分溜出す. 溜液をソーダ液にて溶解するに不溶性の結晶を析出す, 此物質は 0.4 g 得られ Fp 218° , 酒精より再結晶すれば Fp 221° となり, 之を Camphersäureanhydrid と混融するに融點降下せず.

分析 物質 3.850 mg

CO_2 9.312

H_2O 2.752

$C_{10}H_{16}O_4$ としての理論數 C% 65.89, H% 7.75

實驗數 „ 65.96 „ 8.09

此 0.1 g を炭酸ソーダ液と約 1 時間水浴中に加熱するに全く溶消す, 冷後濾過し濾液を硫酸々性となし析出する結晶を水より再結晶せば Fp 187° にして Camphersäure と混融するも融點降下せず.

又樟腦酸化成績體の粗製物をソーダ液と數時間加温して得たる粗製 Ketosäure を Chinin 鹽となし, 此 Chinin 鹽をアセトンにて處理するに之に難溶性の物質少量を得たり. Fp 190° にして Camphersäure の Chinin 鹽に一致す.

即ち, 樟腦酸化成績體中に Campherchinon の存在を示すものなり.