$C_{32}H_{50}O_4 \cdot H_2O$	Ber.	C 74,36%	H 10,15%
	Gef.	C 74,73%	H 9,87%
			(Autoref.)

H. Nakamura, T. Ohta and G. Hukuti: Note On Isoquercitrin.

[From the Chem. Labor. of Sankyo & Co.]

(Received Dec. 15 th. 1931)

Isoquercitrin, which the authors had isolated from the leaves of *Aretostaphylos Uva Ursi* Spi. and *Vaccinium Vities Idaea* L. [The Journal 55, 158, 1935], had the formula $C_{21}H_{20}O_{12} \cdot 4H_2O$, when recrystallized from boiling water or alcohol. In the air, however, it easily loses a part of water of crystallization, giving a compound $C_{21}H_{20}O_{12} \cdot 1\frac{1}{2}H_2O$ melting at $242-3^\circ$, while an anhydrous substance melted at $252-3^\circ$.

Correction: During the course of the present investigation [loc. cit.], it was found that the compound which had been understood to be "Tetracetylisquercitrin" (m. p. 194°) in the last paper, was in reality pentaacetylquercetin: the sugar residue of the original substance being replaced by an acetyl group during acetylation.

利尿生薬の成分研究(第一報)訂補

中 村 晴 吉

太 田 達 男

福 地 言 一 郎

(三共株式会社研究課)

(昭和 10 年 12 月 5 日受理)

H. Nakamura, T. Ohta and G. Hukuti: Note on Isoquercitrin

最近我々は『利尿生薬の成分研究(第一報)』で、ウワウルシ葉及びコケモモ葉から $C_{21}H_{20}O_{12} \cdot 4 H_2O$ (Fp. $234-6^\circ$) の黄色結晶を分離して、この兩物質が Isoquercitrin である事を報告して置いた(本誌 55, 800 昭和 10 年 8 月)。

その際に兩生薬から得た黄色物質が同一物である事を證明する一助として、冷時 Essigsäureanhydrid と 1 滴の濃硫酸によつて Fp. 194° の Acetat を作り兩者を混融して降下しない事を認めた。然し、ここに得た“Tetra-acetyliisoquercitrin”と考へた物質は、その後原 Präparat について再檢した結果その誤である事を知つた。即ち稀鹽酸と煮煮した後 Fehling 液と加熱しても全く還元しないので糖を保持して居ない。更に Penta-acetylquercetin と混融した所、融點降下を來さない。従つて當時“Tetra-acetyliisoquercitrin”であると思つた物質は Pentacetylquercetin に外ならないので茲に前報告を訂正する。

Isoquercitrin は沸湯或は Alkohol から再結晶したものは $C_{21}H_{20}O_{12} \cdot 4 H_2O$ に一致する事は前報告の通りである。このものは容易に風化して $C_{21}H_{20}O_{12} \cdot 1\frac{1}{2} H_2O$ に相當するものとなる。これの Fp. $242-3^\circ$, 尙これを 120° で恒量に乾燥すると無水物となつて Fp. $252-3^\circ$ となる。(いづれも測定の遲速によつて多少の相違がある)。無水物は放置すれば再び $1\frac{1}{2} H_2O$ を吸収する。

風乾物質の結晶水定量 物質 0.2020 g 減失量 = 0.0121 g

Gef. $H_2O = 5.99\%$, Ber. $[C_{21}H_{20}O_{12} \cdot 1\frac{1}{2} H_2O] H_2O = 5.50\%$

無水物質の吸水定量 無水物質 0.0769 g を 1 日間放置したるに 0.0044 g の増量を示した

Gef. $H_2O = 5.72\%$, Ber. $[1\frac{1}{2} H_2O \text{ として}] H_2O = 5.81\%$