Y. Asahina, M. Ishidate und T. Momose: Über Tere-santalsäure und Iso-teresantalsäure.

(B. **68**, 83 [1935])

H. Kondo, Z. Narita und S. Uyeo: Die Konstitution des Dauricins, IV. Mitteil. (XXXIX. Mitteil. über die Alkaloide von Sinomenium- und Cocculus-arten von H. Kondo.)

(B. **68**, 519 [1935])

Yasuhiko Asahina und Fukuziro Fuzikawa: Über Salazininsäure und Nor-stictininsäure: Untersuchungen über Flechtenstoffe, XLIV. Mitteil.

(B. **67**, 1789 [1934])

に溶解せず。濃硫酸により直ちに赤紫色を呈し柱狀結晶は炭酸ソーダ液に溶解し濃硫酸により最初は無色乃至微黄色に溶解し之を放置すれば次第に赤褐色に變ず依つて上記混合結晶を炭酸ソーダ液にて洗滌して可溶性物質と不溶解物質とに分離し可溶性物質は Piperonylsaure なることを知れり。又不溶解物質をアルコールより再結晶し板狀結晶, Fp 116-117° の物質 0.05g を得たり。又エーテル溶液 C を蒸留し残留物をアルコールより再結晶し未反應の Himokimin 少量及 Fp 116-117° の結晶 0.1g 弱を得たり 本品は $C_{20}H_{18}C_6$ なる分子式を有し Himokimin の Isomer に相當するものなり 其性質に就ては次回に報告すべし

サラチニン酸及びノルスチクチニン酸に就きて

(地衣成分の研究 第四十四報)

朝 比 奈 泰 彦

藤 川 福 二 郎

(東京帝國大學醫學部藥學科生藥學教室)

(昭和 10 年 4 月 4 日受理)

Zopf (A. 317. 113 [1901] 352, 11 [1907].) はサラチン酸に苛性加里液を添加するに直ちに分解してサラチニン酸に移行し, このサラチニン酸がアルカリによりて煉瓦色より血紅色を呈せる微小なる放射狀に集合せる細長き板狀晶となる鹽を形成するものなることを唱へたり。彼は遊離のサラチニン酸は只無晶形の狀態に得たるのみにして其の物に就きては何等定説なし Hesse (Journ. prakt Chem [2] 63 536 [1901]) の説によればサラチニン酸(彼自身はルヒゲン酸と稱す)はサラチン酸より 二分子の炭酸が分解放出され 其の結果生成されるものとせり, 然して Hesse 自身の分析せしサラチニン酸が化學的に純粹なりしや否や大いに疑問とする所なり

著者等は其の地衣成分研究中サラチン酸のみならずノルスチクチン酸 (B 67, 801, 964 [1934]), 及び α -メチルエーテルサラチン酸(B 67, 964 [1934]) も亦同じく赤色を呈する鹽(ノルスチクチニン酸カリ及び α -メチルエーテルサラチニン酸カリ)を作り得べき事を知れり, 以上の三つの酸のカリウム鹽の顯微鏡下における研究は曩に (Acta, phytochim (Tokyo) 8 47 [1934]) 著者等の一人朝比奈は詳論

せし所なり。

遊離のサラチニン酸の無晶形なる事及び著しく著色せる事はサラチン酸がアルカリの作用によりて徹底的に變化せしものとも考へ得らるるも之とは反對にサラチン酸及び其の類似化合物より冷時に於て稀苛性アルカリを注ぐが如き實に緩和なる操作によりても尙既に赤色の結晶の析出する點より見て色素の形成は分解に非ずして單なる鹽(場合によりては著色せる錯鹽に變化す)を形成するものなりやとも考へらる此兩點を決定する事が先決問題ならんと思惟す。果して吾々は注意して處理する事によりサラチニン酸カリ及びノルスチクチニン酸カリの赤色結晶より各々元の酸を回収する事を得たり。これ鹽形成の證明に好都合の事實なり。而も容易に純粹に得らるるノルスチクチニン酸カリの分析の結果2原子のカリウムが1分子のノルスチクチン酸と結合して存する事を知れり、サラチニン酸カリに於ても同一の結果を得たるもサラチニン酸カリの精製は甚だ困難なるを以て分析數は唯近似の値を示すに止る、著者等は材料の少量の爲 α -メチルエーテルサラチニン酸カリの分析は行はざりき、然れ共 α -メチルエーテルサラチン酸より得らるるアルカリ鹽(α -メチルエーテルサラチニン酸カリ)はサラチニン酸カリ並にノルスチクチニン酸カリの吸収スペクトルの曲線と殆んど同一の曲線を示す事實より上述の二つの酸のカリウム鹽と同一の形を採るものなる事は一點の疑ひ無き所なり。

デブシドーン系 (Acta phytochim. Tokyo 8. 33 [1934]) に屬する上述の酸の有する重要な共通の性質はアルデヒド基に對してオルト位に存在する 遊離のフェノール性水酸基の存在なり、此のフェノール性水酸基がメチル化されるは最早其の酸は赤色の結晶を形成せず、其の例はスチクチン酸及び β -メチルエーテルサラチン酸に於て見る事を得べし、此の著色せる鹽の形成に對して更に他の一つの條件は此のフェノール性水酸基の外に第二の糖にラクトール基が存在せざる可からず、プロトセトラール酸はサラチン酸等と同じくオルト-オキシ-アルデヒド基を有するも何等赤色の鹽を形成せず此れ即ち第二の糖に於てラクトール基を有せざればなり。

これを以てサラチン酸等にアルカリを作用せしめて得らるる最初の成績體は鹽なる事明らかなり、而も此の鹽は恐く錯化合物を作り従て著しく著色せる化合物に移行せるものならん。その最も簡單なる形は II なる構造式により表はす事を得べし。是等の赤色鹽に更に濃厚なるアルカリを作用せしむれば此の赤き結晶より

暗赤色乃至褐色を呈せる樹脂を得, 此の物質の構造説明は目下の所見込みなきが如し.

吸収スペクトル

Fig. 1. ... Norstictinsäure. — Norstictinsaures Kalium.

Fig. 2. 1. Salazinsäure. — II α-Methyläther-salazinsäure — III Salazinsaures Kalium. — IV α-Methyläther-salazinsaures Kalium.

問題の物質の吸収スペクトルは Hilger の Quarz-Spektrograph を以て撮影せり, 此の場合遊離の酸はアルコールに溶解し, 赤色の鹽は水に溶解せり.

實 驗 之 部

ノルスチクチニン酸カリウム

純粹なるノルスチクチニン酸に同量のアルカリ溶液(1Vol.5%苛性加里液+1Vol.20% 炭酸加里液)を加へ硝子棒を以て攪拌し顯微鏡下に於て檢し遂に全部赤色の針狀結晶になるに至りて止む次で吸引濾過しアルコール次でエーテルにて洗滌し, 少量の水に溶解し酒精を注意して加へ行き沈澱せしむ. 斯の如くにして精製したる物質は塊では血紅色を呈するも顯微鏡下に於て見るに個々の結晶は黄赤色を呈するのみ. 水に易溶性, アルコール, アセトン及びエーテルに殆んど不溶なり, 此の鹽は結晶水を含有し, 110° に於て乾燥するに失はる. 空氣中に於て無水の物質は直ちに再び同量の水を攝取す.

元素分析には重クローム酸加里を加へて行へり.

5.00mg 物質(結晶水含有物質);	7.77mg CO_2 ,	1.75mg H_2O	C% 42.38, H% 3.92
$\text{C}_{18}\text{H}_{10}\text{O}_9\text{K}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ としての理論値			„ 43.00, „ 3.21

カリウムの定量

3.05mg 物質(結晶水含有物質);	1.03mg K_2SO_4	K% 15.16.
$\text{C}_{18}\text{H}_{10}\text{O}_9\text{K}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ としての理論値		„ „ 15.57.

結晶水の定量(110° に於て減壓にて乾燥す).

0.0790g 物質(結晶水含有);	0.0088g の減失量	$\text{H}_2\text{O}\%$ 11.14.
$\text{C}_{18}\text{H}_{10}\text{O}_9\text{K}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ としての理論値		„ „ 10.76.

ノルスチクチニン酸加里よりノルスチクチニン酸への移行: 0.35g のノルスチクチニン酸加里を水に溶解し注意し氷冷しつつ稀鹽酸を滴加す. 析出せし橙色の絮狀物質を濾過し水にてよく洗滌し80%のアセトンより再結晶す. 斯くして得たる無色の針狀晶は 260° 附近より着色し 280° 附近に於て分解す. 得量約0.15g. 0.1g の斯くして得たる針狀晶を 5ccm の無水醋酸に浮遊せしめ1滴の濃硫酸を加へ4時間放置後澄明になりたる液を水中に傾入し析出物を稀アセトンより再結晶す. 此のアセートは $\text{Fp. } 212^{\circ}$ の無色の柱狀晶にして純粹なるペンターアセチルノルスチクチニン酸と混融するも Fp. の降下を示さず.

サラチニン酸加里

細碎せるサラチン酸をノルスチクチニン酸の場合と同じく苛性加里含有の炭酸加

里溶液を適量に加へ攪拌す斯くして得たる赤色の結晶を吸引濾過しアルコールにて洗ひ次でエーテルにて洗滌す, 次で水に溶解し注意してアルコールを加へ沈澱せしむ, 斯くして得たる物質は赤色の柱狀晶或は小板狀晶にして水に易溶, アルコール, アセトン及びエーテルに殆んど不溶性なり. 此の物質は結晶水を含有し. 110° に於て乾燥するに失わる. 空氣中に於て無水の物質は直ちに再び同量の水分を攝取す.

元素分析(結晶水含有物質)

5.40mg 物質	8.61mg CO_2 ,	1.72mg H_2O	C%43.49	H% 3.56
$\text{C}_{18}\text{H}_{10}\text{O}_{10}\text{K}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ としての理論値			„ 41.67	„ 3.11

カリウムの定量(結晶水含有物質)

2.68mg 物質	0.96mg K_2SO_4 ,	K%16.08
$\text{C}_{18}\text{H}_{10}\text{O}_{10}\text{K}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ としての理論値		„ 15.09

結晶水の定量(結晶水含有物質; 減壓にて 110° に於て乾燥す)

0.0404g 物質	0.0040g 減失量	$\text{H}_2\text{O}\%$ 9.90
$\text{C}_{18}\text{H}_{10}\text{O}_{10}\text{K}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ としての理論値		„ „ 10.43

サラチニン酸加里よりサラチニン酸への移行; 0.35g のサラチニン酸加里を水に溶解し氷冷しつつ注意して稀鹽酸を加へ析出せし橙色の絮狀物質を吸引濾過し80%のアセトンより再結晶す, 斯くして得たる物質は 240° 附近に於て着色し始め 260° 附近に於て炭化する無色の針狀晶なり. 0.1g の針狀晶を 5ccm の無水醋酸に浮游せしめ1滴の濃硫酸を加へ4時間放置す次で澄明となりたる液を水中に投入し析出物をアセトンより再結晶す. 斯くして得たる物質は無色の針狀晶にして 178° に於て熔融しヘキサアセチルサラチニン酸と混融するも Fp の降下なし.