auf den Dehydrierungsprocess suchen könnte, so würde man sich die Bio-Synthese des Trilobamins aus zwei N-methylierten Coclaurin nach folgendem Schema vorstellen können, evt. den letzteren Hydroxyl in der Stelle 7.

K. Fujii, H. Shimada und T. Sasaki: Ueber eine Säure aus den Blättern von *Epigaea asiatica* Maxim. (Untersuchung über Saponine. III. Mitteil.)*)

[Aus der Pharmaceutischen Hochschule zu Kyoto]

(Eingegangen am 20. Mai 1935)

Iwanashi (*Epigaea asiatica* Maxim. (Ericaceae)) ist eine im nördlichen Teil von Honshu (Hauptinsel Japans) sowie in Hokkaido wild wachsende Pflanze, die auch in der Gegend von Kyoto viel vorkommt. Verff. haben die Ende November gesammelten Blätter von Iwanashi untersucht und

* I. und II. Mitteilung: Ueber die Bestandteile der Wurzel von *Sanguisorba officinalis* L. (Jour. of Pharmaceut. Soc. Japan Vol. 53, 120-122 (1933) und Vol. 54, 129-132 (1934)).

darin die Ursolsäure entdeckt und dies durch Herstellung einiger ihrer Derivate bestätigt.

Zur Abscheidung der Ursolsäure wird das Pulver trockner Blätter mit Aether extrahiert, der Aetherextrakt mit 1% iger alkoholischer Kalilauge extrahiert, dieser Extrakt mit Wasser verdünnt und gleichzeitig angesäuert und die ausfallende Substanz abfiltriert, mit Wasser ausgewaschen, wieder in Aether gelöst, mit 10% iger Kalilauge geschüttelt und nur die zwischen Aether- und Kalilaugeschicht abgeschiedene Seife isoliert, dieselbe angesäuert, mehrmals aus Alkohol umkristallisiert, wodurch grosse Kristallnadeln vom Fp. 282–284° erhalten werden. Macht man die Mischprobe mit der aus Bärentraubenblättern in üblicher Weise erhaltenen Ursolsäure, so wird der Schmelzpunkt nicht herabgesetzt. Die Liebermannsche Reaktion ist stark positiv und gibt eine purpurrote Färbung.

3,849 mg Sbst. : 11,140 mg CO₂, 3,730 mg H₂O.

C₃₀H₄₈O₃ Ber. C 78.86, H 10.58. Gef. C 78.94, H 10.85.

Acetyl-Ursolsäure.

Durch Acetylierung oben erwähnter Ursolsäure mit Essigsäureanhydrid und Natriumacetat erhält man farblose, grosse Kristallnadeln vom Fp. 264°. S. Kuwada und T. Matsukawa (Jour. of Pharmaceut. Soc. Japan Vol. 53, 55–58 (1933)) geben Fp. 295–296° an, Sando (J. biol. Chem. 90, 477 (1931)) gibt den Fp. 289–290° an, während Dodge (Am. Soc. p. 1917 (1917)) Fp. 264° angibt, auch Verff. haben denselben Schmelzpunkt gefunden. Wie beim Methylester scheinen auch beim Acetat Isomere zu bestehen.

3,647 mg Sbst. : 10,294 mg CO₂, 3,399 mg H₂O.

C₃₀H₄₇O₃·COCH₃ Ber. C 77.05, H 10.11. Gef. C 76.98, H 10.42.

Ursolsäuremethylester.

Durch Methylierung der Ursolsäure mittels Diazomethan werden farblose, grosse Kristallnadeln vom Fp. 173° erhalten. S. Kuwada und T. Matsukawa (loc. cit) haben Methylester (I) vom Fp. 230° und (II) vom Fp. 172° erhalten. Verff. haben dagegen nur eine Art Methylester (II) vom Fp. 173°

erhalten. Diese Tatsache stimmt mit der Erfahrung von S. Kuwada und T. Matsukawa (Jour. of Tharmacent. Soc. Japan Vol. 53, 222-223 (1933)) ueberein, wonach letztere Ursolsäure aus den Blättern von *Rhododendron Hymenanthes* Makino erhalten und vom Methylester nur den vom Fp. 170-172° bekommen haben.

3,859 mg Subst. : 11,142 mg CO₂, 3,820 mg H₂O.

C₂₉H₄₇O·COOCH₃ Ber. C 79.08, H 10.71. Gef. C 78.75, H 11.07.

Acetyl-Ursolsäuremethylester.

Durch Acetylierung des obigen Methylesters mit Essigsäureanhydrid und Pyridin werden farblose, grosse Kristallnadeln vom Fp. 244-246° erhalten.

3,694 mg Sbst. : 10,474 mg CO₂, 3,556 mg H₂O.

C₂₉H₄₆(O·COCH₃)(COOCH₃)₂ Ber. C 77.28, H 10.23. Gef. C 77.33, H 10.77.

Yasuhiko Asahina und Fukuziro Fujikawa: Ueber die Bestandteile von *Parmelia perlata* Ach. (Untersuchungen über Flechtenstoffe; L. Mitteil.)

Ber. **68**, 634 [1934]

Yasuhiko Asahina and Morizo Ishidate: Über die Konfiguration von Borneol und Isoborneol.

B. **68**, 555, [1935]

Yasuhiko Asahina, Morizo Ishidate und Tutomu Momose: Über das Müllersche Lacton aus Hydrochlor-teresantalsäure.

B. **68**, 559, [1935]

イハナシ葉の一成分

サポニン類の研究(第三報)¹⁾

藤 井 勝 也

嶋 田 玄 彌

佐 々 木 豊 作

(京都薬學専門學校)

(昭和 10 年 5 月 20 日受理)

K. Fujii, H. Shimada und T. Sasaki Ueber eine Säure aus der
Blätter von *Epigaea asiatica* Maxim. (Ericaceae) Untersuchungen
über Saponine III. Mitteil.

植物成分としてウルソール酸(舊名ウルソン)の證明されたるは其例甚だ多し殊
に Ericaceae に多きものの如く *Arctostaphylos* (ウワウルシ葉), *Vaccinium* (コ
ケモモ葉),²⁾ *Epigaea*, *Gaultheria*, *Rhododendron* (石南葉)³⁾ の各屬に互る.

Epigaea 屬中に於ては北米産 *Epigaea repens* L.⁴⁾ に證明されたる 1 例ある
のみ.

著者等は漢藥地榆の成分研究に際しその一成分たる Sanguisorbin のアグリコ
ン Sanguisorbigenin がオキシポリテルペン酸なるを以て之の構造の研究を行ふ
に當り比較研究のため Ursolsäure, Oleanolsäure, Hederagenin を扱ふ必要を認め
先づ Ursolsäure を得んとしてイハナシ葉を選定せり. 本品を殊に選びたるは本
邦産植物を以て Ursolsäure 製造の好原料たらしめんと希ひしに依る.

幸にもイハナシ葉より Ursolsäure を得且之の誘導體を製して是を確證し得た
るを以て茲に其の實驗を報告せむとす.

イハナシ *Epigaea asiatica* maxim. (Ericaceae) は本邦本州中北部及北海道に野
生し⁵⁾ 春日淡紅色小鐘狀花を開き扁球形の小果を結ぶ. 此の果實は子供等の喜び
採集し食ふものにして味甘酸なり. 京都地方は特にイハナシの野生多く嵯峨, 龜
岡にはイハナシ酒なるものあり. 本果實を醸造せるものなりと稱す.

著者等は昭和 9 年夏自ら比叡山に採集し乾燥葉として 300g を得て豫試験を行
ひ Ursolsäure の存在を認めたるを以て更に同年秋鞍馬にて約 5kg を採集し之よ

り約 2kg の乾燥葉を得て本実験の原料とせり。

Ursolsäure の分離法としては粉末乾燥葉を Äther にて抽出し Ätherextrakt を酒精性 1% KOH にて扱ひ酸性物質即ち Ursolsäure を抽出し水にて稀釋すると同時に鹽酸々性とし析出する物質を石油エーテルにて取扱ひ樹脂質を除去したるに尙結晶形宜しからず依つて再び Äther に溶解し 10% KOH 液にて振盪し Äther と KOH 液との中間に析出する石鹼體のみを分取し酸性とし酒精より再結晶したるに初めて美麗なる鍼狀晶を得るに至れり Fp. 282-284° 又一方法として最初に石油エーテルにて脂肪及樹脂等を豫め除去したる材料を Äther にて取扱ひ後前記と略々同様に處理せるに同じく Fp. 282-284° の Ursolsäure を得たり。得量及抽出製造の難易は兩者間に殆んど差異を認めざりき。

嘗て桑田, 松川氏³⁾ は本邦産石南葉より Ursolsäure を抽出したるが其 Fp. 290-291° にしてウワウルシ葉より得たる Ursolsäure⁶⁾ は Fp. 284-5° と兩者 Fp. に可成りの隔りあり然るに後者 Fp. 284-5° の Ursolsäure を醋化して Acetat を製し之を鹼化して得たる Ursolsäure は Fp. 289-290° となり茲に石南葉より得たる Ursolsäure の Fp. は是と一致すと報告されたり。

著者等は桑田, 松川氏が石南葉より Ursolsäure を得られしと殆んど同様の操作を行ひたるにも拘らずイハナシ葉より得たる Ursolsäure が Fp. 282-284° にして決して Fp. 290-291° には非ず。又常法に依てウワウルシ葉より製したる Ursolsäure Fp. 282° と比較するに呈色反應全く同じく兩者の混融に於ても Fp. の降下を認めざりき。

されば植物界より抽出さるる Ursolsäure も其原料植物を異にするに依り斯く異性體を得。従てその Fp. も多少異なるものなりと謂ふべし。

Ursolsäure の誘導體中その Acetat に就ては研究者に依りその Fp. を異にす桑田, 松川氏は Fp. 295-296°, Sando 氏は Fp. 289-290° にして殆んど相同じく Dodge 氏は Fp. 264° を與へ前二者に比し遙かに低し, 著者等は無水醋酸曹達に依る醋化にて Fp. 264° の Acetat を得 Dodge と相同じ分析の結果も亦 Acetat として満足なる結果を與へたり。著者等は Sanguisorbigenin の研究中⁷⁾ その Acetat に數種のものを生ずることを報じたるが今又 Ursolsäure に於てもその Acetat に異性體あるものの如き結果を得たり。但著者等は Fp. 264° のもののみを得 Fp. 295-296° のものは之を捕捉すること能はざりき。

又 Methylester に於ても異なる事實を認めたり即桑田, 松川氏⁶⁾ はウワウルシ葉より得たる Ursolsäure を Diazomethan 或は $\text{CH}_3\text{J} \cdot \text{Ag}_2\text{O}$ にてメチル化し之を Aceton にて取扱ふ事により之に難溶部より Methylester (I) Fp. 230° 之に易溶部より Methylester (II) Fp. 172° に分離し得たり然るに著者等は Diazomethan にてメチル化せるものを Aceton にて取扱ひたるも二種の Ester に分離すること能はず常に一種 Fp. 173°, 上記 Methylester (II) に當るもののみを得たり, 此事實は桑田, 松川氏が石南葉より得たる Ursolsäure をメチル化するに當り Fp. 170—172°, Methylester (II) に相當するもの一種のみを得られし経験と全く一致す。

Acetylmethylester は Fp. 244—246° にして全く文獻に一致せり。

尙誘導體各種の相互間の關係に就きての研究及びイハナシ葉中 Ursolsäure 以外の成分に就ては他日に報告せんとす。

Ursolsäure 及其誘導體に就て各研究者の成績を一括して表記し参考に供せん。

	桑 田, 松 川 (ウワウルシ葉)	桑 田, 松 川 (石 南 葉)	藤井, 嶋田, 佐々木 (イハナシ葉)
Ursolsäure	284—285°	290—291°	282—284°
Acetat	295—296°	294—295°	264° (Dodge, 264°)
Methylester { I II	230°	—	—
	172°	173°	173°
Acetylmethylester	246—247°	243—245°	244—246°
Benzoylmethylester	217—218°	215—216°	—

本實驗に當り終始鞭撻を賜り且又本稿の御校閲を得たる恩師朝比奈泰彦先生竝に實驗に際し御懇篤なる御指導を賜りたる中尾萬三博士に感謝の意を表す。

文 獻

- 1) 著者等は此機會に從來の研究業績を一括し「サポニン類の研究」と題し従つて本研究を第3報となす,
第1報 地榆の成分に就きて(第一報)本誌; 第53巻 634 (昭和8年)
第2報 地榆の成分に就きて(第二報) Sanguisorbigenin の研究(其一)
本誌; 第54巻 735 (昭和9年)
- 2) 刈米, 渥美 本誌 461 號, 639 (大正9年)
- 3) 桑田, 松川 本誌 第53巻, 1065 (昭和8年)
- 4) C. Wehmer Die Pflanzenstoffe 910 (II Aufl.) に依る
- 5) 牧野, 根本 日本植物總覽に依る
- 6) 桑田, 松川 本誌; 第53巻 368 (昭和8年)
- 7) 藤井, 島田 本誌; 第54巻 735 (昭和9年)

實 驗 の 部

昭和 9 年 7 月下旬比叡山八瀬口にて採集, 全草 1.8kg 莖, 根, 枯葉を除き緑色葉 865g を得之を乾燥器にて充分乾燥するに 330g となる (風乾状態の時秤量せざりき), 昭和 9 年 11 月下旬, 鞍馬薬王坂附近にて採集, 全草 5.3kg (内緑色葉 2.765kg, 枯葉及莖 1.815kg, 鬚根及土砂 0.710kg) 緑色葉を風乾して 1.910kg となり之を乾燥器にて充分乾燥すれば 1.736kg となる (風乾状態の緑葉中水分 9.1%に當る).

I. イハナシ葉より Ursolsäure の抽出.

A. 乾燥粉末とせるイハナシ葉を Äther にて溫浸し浸液を濃縮して残渣を酒精性 1% KOH にて溫浸濾過し浸出液を少しく濃縮し攪拌しつつ冷水中に注入し同時に鹽酸々性としれば夥しき緑色の沈澱を生ず加溫して酒精の大部分を去り沈澱を濾取アドソルビンと捏和し粒状となし充分に乾燥す之を ソックスレー 浸出器に納め石油エーテルを以て充分に浸出し樹脂, 蠟様物質等を除去す, 是の石油エーテル浸出残渣を酒精性 1% KOH にて溫浸, 濾過してアドソルビンを去る, 浸液を脱色炭にて脱色し再び水中に攪拌して注入, 鹽酸々性とし析出する沈澱を濾集, 水洗素焼板上に乾燥して粉末となす是を Äther に溶解し 10% KOH 溶液を加へて振盪し Äther, KOH 液の兩層間に析出する石鹼體のみを分取し酒精に溶解, 鹽酸々性とし濃縮して粗製結晶を析出せしむ.

B. 乾燥粉末とせる材料を大型ソックスレー 浸出器に納め石油エーテルにて充分浸出し樹脂, 蠟様物質, 其他の夾雜物を除去す. 殊渣を乾燥して残れる石油エーテルを揮散せしめ次に Äther にて充分に浸出し浸出エーテルを濃縮し 10% KOH と共に振盪し析出する石鹼體のみを分取し酒精に溶解し鹽酸々性とし濃縮して粗製結晶を得.

A, B 兩法に依る得量及操作の難易大差なし, 乾燥原料 1.736kg より粗製 Ursolsäure 23.5g を得たり.

粗製結晶は是を數回 95% 酒精にて再結晶を行ひ, 最後に 1 回純酒精より結晶析出せしむ. 無色の鍼狀晶 Fp. 282–284° (Korr. 以下同様) ウワウルシ葉より製したる Ursolsäure と混融を行ふに Fp. 降下を認めず.

リーベルマン氏反應. 強陽性, 鮮紅紫色.

元素分析 (CaCl₂ 上 Xylol 浴 5mm 減壓 5 時間乾燥)

物質: 3.849mg CO₂: 11.140mg H₂O: 3.730mg C% 78.94 H% 10.85

$C_{29}H_{47}O \cdot COOH$ とすれば

C% 78.86 H% 10.58

II. Acetyl-ursolsäure.

前記 Ursolsäure 1g, 無水醋酸 3g, 無水の醋酸曹達 0.5g を取り砂浴上に 1 時間静かに沸騰を保たしむ. 冷後冷水中に攪拌して注入し析出せる物質を濾集, 充分に水洗し乾燥, 酒精より數回再結晶を行ふ, 無色長鍼狀晶 Fp. 264°

I) リーベルマン氏反應 強陽性, 鮮紫紅色.

原素分析 ($CaCl_2$ 上, Xylol 浴, 5mm 減壓, 3 時間乾燥)

物質: 3.647mg CO_2 : 10.294mg H_2O 3.399mg C% 76.98 H% 10.42

$C_{30}H_{47}O_3 \cdot COCH_3$ とすれば C% 77.05 H% 10.11

III. Ursolsäure-methylester.

Ursolsäure 2g を乾燥 Äther 100cc に溶解し氷冷しつつ之に 6cc の Nitrosomethylurethan より發生せしめたる Diazomethan の Äther 溶液を滴下し一夜放置, Äther を蒸散せしめ残渣を再び Äther に溶解し 10% KOH にて振盪し酸性物質を去り Äther 溶液を分取し乾燥, 濾過, 蒸發して残渣を Aceton にて取扱ひ比較的之に難溶と易溶の部分に分つ然るに其の各々より Methanol にての再結晶に依り Fp. 173° の鍼狀晶のみを得たり.

リーベルマン氏反應 強陽性, 紫紅色.

原素分析 ($CaCl_2$ 上, Xylol 浴, 5mm 減壓, 5 時間乾燥)

物質: 3.859mg CO_2 : 11.142mg H_2O : 3.820mg C% 78.75 H% 11.07

$C_{29}H_{47}O \cdot COOCH_3$ とすれば C% 79.08 H% 10.71

IV. Acetyl-Methylester.

前記 Methylester 0.35g を取り Pyridin 5cc に溶解し無水醋酸 6cc を加へ 30 分間アスベスト板上に靜かに沸騰を保たしむ. 冷後多量の水の中に注入し一夜放置析出物を濾過, 水洗し Äther に溶解し約 2% KOH 溶液にて振盪し酸性物質を除き Äther 層を分取し水洗, 乾燥, Äther を餾去し残渣を 95% 酒精より 3 回再結晶せしめたるものは無色の細鍼狀晶 Fp. $244-246^{\circ}$ ウワウルシ葉より得たる Ursolsäure より製したる Acetyl-methylester と混融を行ふに Fp. の降下を認めず.

リーベルマン氏反應 強陽性, 紫紅色.

原素分析 ($CaCl_2$ 上, Xylol 浴, 3-5mm 減壓, 5 時間乾燥)

物質: 3.694mg CO_2 : 10.474mg H_2O : 3.556mg C% 77.33 H% 10.77

$C_{29}H_{46} \begin{cases} O \cdot COCH_3 \\ COOCH_3 \end{cases}$ C% 77.28 H%, 10.23

(昭和 10 年 5 月 15 日. 京都藥學專門學校生藥學教室)