gut überein. Verf. gibt daher als Schmelzpunkt des α -Bromisovalerianylharnstoffs 153–154° an.

Yasuhiko Asahina und Fukuziro Fuzikawa: Über das Vorkommen von Norstictinsäure in *Parmelia acetabulum* Ach. (Untersuchungen über Flechtenstoffe, LI. Mitteilung)

[Ber. 68. 946. (1935)]

H. Kondo u. K. Takeda: Ueber die Katalytische Hydrierung von n-Propyl- α -furylcarbinol,

[Aus d. Pharmazeut. Chem. Labor. d. Univers. zu Tokio]

(Eingegangen am 22. Juni 1935)

Im Jahre 1923 haben W. E. Kaufmann u. R. Adams (Am. Soc. 45, 3029) über die katalytische Hydrierung von Furfurol berichtet. Dabei erhielten sie Tetrahydrofurylalkohol, Pentandiol-(1,2), Pentandiol-(1,5) u. n-Amylalkohol. Nach zwei Jahren haben J. S. Pierce u. R. Adams (Am. Soc. 47, 1098) es gezeigt, dass eine solche Reaktion auch bei der Hydrierung des n-Butyl- α -furylcarbinols stattfindet.

Um diese Beziehung näher zu studieren, kondensierten wir zuerst Furfurol mit n-Propylmagnesiumjodid, wobei das gewünschte Carbinol (I) in guter Ausbeute erhalten wurde. Das n-Propylfurylcarbinol gibt ein Phenylurethan vom Smp. 79.5°.

Das so erhaltene Carbinol wurde dann mit Platinoxid der Skita'schen Druck-Hydrierung unterworfen; da absorbierte es 2.5 Mol Wasserstoff u. nach dem Aufarbeiten desselben lieferte hauptsächlich zwei Fraktionen A u. B:

A.	K _{P12}	84–88°
B.	K _{P12}	115–125°

Fraktion A, ein schwach riechendes, farbloses Öl, hat eine Zusammen-

論の部に述べたる再結晶法によりて得たる Fp. 153-4°C とを同量秤取しよく混合したる後その熔融點を測定するに 153-4°C にして混融によりてその熔融點の降下を示さず。

Parmelia acetabulum Ach. の成分に就きて

(地衣成分の研究第五十一報)

朝 比 奈 泰 彦

藤 川 福 二 郎

(東京帝國大學醫學部藥學科生藥學教室)

Zopf は (Zopf, Flechtenstoffe, S. 191-192 [1907]) サラチン酸を含有する地衣として次の十三種を挙げたり。この中には本邦に於ても亦産する *Parmelia conspersa* Ach. もその中に含まる。

<i>Stereocaulon salazinum</i> Bory.	<i>Parmelia perforata</i> Ach.
<i>Stereocaulon virgatum</i> Ach.	<i>Placodium alphoplacum</i> Wahlbg.
<i>Lecidea sudetica</i> Körb.	<i>Placodium radiosum</i> Hoffm.
<i>Parmelia acetabulum</i> Ach.	<i>Phlyctis argena</i> Ach.
<i>Parmelia conspersa</i> Ach.	<i>Ramalina angustissima</i> Anzi.
<i>Parmelia Kamtschadalis</i> Esch.	<i>Graphis scripta</i> Ach.
<i>Parmelia Nilgherrensis</i> Nyl.	

朝比奈及び浅野(順)氏は(本誌昭和 8 年 1154 頁)サラチン酸の構造決定に際して *Parmelia conspersa* Ach. のみならず Lettau が (*Hedwigia*, 55, 1-78 [1914]) 既にサラチン酸含有の地衣と見做したる *Parmelia cetrata* var. *sorediifera* も亦材料として使用せり。この二つの地衣はただ一種、同一の酸 $C_{18}H_{12}O_{10}$ を含有しこの酸に朝比奈及び浅野氏はサラチン酸なる名稱を附せり。その後朝比奈及び棚瀬氏は (B. 67, 1434 [1934]) サキサチール酸はサラチン酸と同一物なる事を證明せり。その後従前迄はサラチン酸に對して唯一獨特の反應の如く思はれたる苛性加里によりて赤色の針狀晶の析出する反應はノルステクテン酸並びに α -メチルエーテルサラチン酸に於ても亦適用され得る事明らかとなり、Zopf 及び Hesse 等の稱するサラチン酸のうちにはノルステクテン酸及び α -メチルエーテルサラチン

酸の混同されゐる事を了解するに難からざるべし。最近朝比奈は(*Acta phytochimica* (Tokyo) 8, 47 [1934]) 顕微鏡下に於て赤色を呈せるサラチニン酸カリとノルスチクチニン酸カリ及び α -メチルエーテルサラチニン酸カリとを明瞭に區別する事を得たり。Bachmann (*Flora*, Jg. 70, S. 292 [1887]) は *Parmelia acetabulum* Ach. の地衣體に苛性加里を點加するに最初黄色次で赤色の溶液となりこの赤色の溶液よりやがて多數の顯微鏡的針狀晶の析出する事を發見せし最初の人なり。その後 Zopf (*A.* 300, 347 [1898]) 並びに Hesse (*Journ. prakt. Chem.* (2) 63, 537 [1901]) はこの地衣を詳しく研究し何れもサラチン酸を含有する事を唱へたり。著者等の一人朝比奈は(*Acta. phytochimica* [Tokyo] 8, 47 [1934]) この *Parmelia acetabulum* Ach. は成る程苛性加里を添加すれば赤色の結晶を析出するもこの結晶の形狀より推定すればサラチニン酸の形成するカリウム鹽のそれにあらずして α -メチルエーテルサラチニン酸或は ノルスチクチニン酸のカリウム鹽の形狀に一致する事を指示せり。今回著者等は歐洲産 *Parmelia acetabulum* Ach. の標本 2,3 を犠牲に供しこれより一種の地衣酸を分離しこの酸がノルスチクチン酸と同一なる事を確證せり。斯く決定せし今日 Zopf がサラチン酸なる名稱を附せし基本地衣たる *Stereocaulon salazinum* の成分が果して何たるかが問題なるも惜むらくはこの地衣は非常に得難きものにして A. Zahlbruckner 博士の好意によりて始めてその 2,3 片を得たり。この *Stereocaulon salazinum* の細碎せる髓組織に苛性加里液を注ぐに直ちに黄赤色の結晶析出するもこの結晶はサラチン酸特有の α 狀に集合せる針狀晶に非ずして單に星形に集合せる細き針狀晶なる事を知り、朝比奈個人の考へにてはこの *Stereocaulon salazinum* に含有せらるる地衣酸はサラチン酸に非ずして確實に α -メチルエーテルサラチン酸か或はノルスチクチン酸なりと思惟す。

サラチン酸: $R=CH_2OH$. α -メチルエーテルサラチン酸:

$R=CH_2OCH_3$. ノルスチクチン酸: $R=CH_3$

微量分析を施行せられたる笠原榮三氏に對して厚く感謝す。

Nar-stictinsäures Kalium aus *Parmelia acetabulum* Ach.

Norstictinsäures Kalium aus *Lobaria pulmonaria* aus Sachalin

Salazininsäures Kalium aus *Parmelia cetrata* var. *sorediifera*

Rotes Kaliumsalz aus dem Markgewebe von *Stereocaulon salazinum*

實 験 之 部

Parmelia acetabulum Ach. の抽出.

ノルステクチン酸

Lösch がバーデンに於て採集せし地衣 14g をソクシレットの浸出器を以てエーテルを以て徹底的に浸出す。エーテル浸液を蒸發するに無色の結晶性物質 0.1g を得。少量混在せるアトラノリンは少量のクロロフォルムを加へ洗滌する事により除く。クロロフォルムに不溶性の殘渣 (0.08g) は 80% のアセトンより再結晶するに 260° 附近より着色し始め 285° 附近に於て炭化分解する無色の針狀晶を得。アルコール、エーテル及びアセトンに難溶性、ベンツォール、クロロフォルム及び石油エーテルに殆んど不溶性なり。その酒精溶液は過クロール鐵液によりて葡萄紅色を呈す。苦味を有す。微量の物質を物體硝子上にとりこれに一滴の炭酸加里含

有の苛性加里液を加へ顕微鏡下に於て檢するに速かに赤色の放射狀に集合せる微小なる針狀晶となる。その形狀はノルスチクチニン酸加里の形狀と全く一致す。

分析 物質: 3.750mg CO₂, 8.010mg H₂O 1.075mg C 58.25, H 3.21.

C₁₈H₁₂O₉ としての理論値 C 58.06, H 3.22.

アセチル誘導體: 0.03g の上記の酸性物質に 2cc の無水醋酸を加へ此に一滴の濃硫酸を加へ放置するに不溶の儘残れる物質も全部溶解するに至る。4 時間の後液を水中に投入して無水醋酸を分解するに結晶性物質析出す。稀アセトンより再結晶せしものは Fp. 212° の無色の柱狀晶なり。酒精溶液は過クロール鐵液によりて呈色せず。これと純粹なるペンタアセチルノルスチクチン酸と混融するも Fp. の降下なし。

n-Propyl- α -furylcarbinol の接觸還元不就

近 藤 平 三 郎

武 田 健 一

(東京帝大藥學科藥化學教室)

(昭和 10 年 6 月 22 日受理)

H. Kondo u. K. Takeda: Über die katalytische Hydrierung
von *n*-Propyl- α -furylcarbinol.

Furan 核の還元及之に依る核開裂に關しては 1923 年に W. E. Kaufmann 及び R. Adams (Am. Soc. **45**, 3029) が Furfural を酸化白金を用ひて接觸還元して Tetrahydrofuryl-alkohol, Pentandiol-(1,2), Pentandiol-(1,5) 及び *n*-Amyl-alkohol を得たる旨を發表せり。次で 2 年後に J. S. Pierce 及 R. Adams (Am. Soc. **47**, 1098) は *n*-Butylfurylcarbinol に同じく酸化白金を用ひて還元を行ひて前記の場合と全く同様の結果を得たる事を報告せり。されど Furan 核の開裂を起したるものは還元成績體の約 10 % に満たず大部分は Tetrahydrofuran 核を構成するに止まれり。

依つて我々は Skita 法による加壓接觸還元を行ひて Furan 核の還元及開裂の狀態を知らんと欲して、先 Furfural に常法により *n*-Propylmagnesiumjodid を作