das p-Rhodonphenylhydrazin [als neue Reagenz auf Aldehyden, Ketonen und Zuckern] benutzt werden kann.

Ferner durch die Einwirkung von Isocyanate und Senföle auf p-Rhodonphenylhydrazin erhielt der Verfasser die einigen neuen Semicarbazid- und Thiosemicarbazid-derivaten, wie die Tabelle 2 und 3 angaben.

Schon Marckwald (B. 32. 1081) hat behauptet, dass zuerst die labile Formen der Thiosemicarbazide bildeten, und dann umlagerten in stabilen Formen, wenn man auf Phenylhydrazin oder *p*-substituierten Phenylhydrazinen Senföle einwirken liess, aus dem folgenden Experiment konnte der Verfasser die labilen Formen der Thiosemicarbaziden nicht erhalten.

Method. 1, Einwirkung von *p*-Rhodonphenylhydrazin und Senföle in alkoholischer Lösung (od. Benzollösung) bei Zimmertemperatur.

Method. 2, Einwirkung von beiden unter Eiskühlung.

Method. 3, Einwirkung von beiden ohne Lösungsmittel.

T. Kariyone und A. Majima: Ueber das ätherische Oel von *Torilis Anthriscus*.

[Aus dem Hygien. Laborat. des Innenministeriums zu Tokio.]

(Eingegangen am 1. September 1935.)

Die Verfasser haben aus der Früchte von *Torilis Anthriscus* Gmel. (Umbelliferae) ein ätherisches Oel in einer Ausbeute von 1.4% gewonnen. Die Konstanten sind: d_{20}^{20} 0.8974, α_D^{20} -95.04°, n_D^{20} 1.5243, S. Z. 0, E. Z. 8.23, J. Z. 70.7, Methoxyl 0.

Beim Fraktionieren ergaben 100 g Oel:

No.	Kp ₆	Ausbeute (g)	C%	H%	O%	d_{20}^{20}	$[\alpha]_D^{20}$	n_D^{20}	J.Z.
1.	40-70°	1.7							
2.	70-100°	4.2	87.73	11.61	0.66	0.8836	-74.93°		
3.	100-109°	35.0	87.21	10.95	1.84	0.8959	-100.20°	1.50295	
4.	109-110°	24.0	87.72	12.05	0.23	0.8980	-107.21°	1.50429	148.2
5.	110-120°	7.0	86.83	11.31	1.83	0.9069	-87.13°		

In den Fraktionen 3 und 4 wurden die Anwesenheit von Cadinen und ein

neues Sesquiterpen, das die Verfasser Torilen nannten, angewiesen. Torilen gibt ein krystallinisches Schwefelsäureadditionsprodukt $C_{15}H_{24} \cdot H_2SO_4$, das bei 145° schmilzt. Durch Verseifen mit alkoholischem Kali, entsteht Torilenhydrat $C_{15}H_{26}O$ vom Fp. 55° .

Die Früchte von *Torilis Anthriscus* enthält 10% des fetten Oels, dessen Fettsäure bis 65% aus Petroselinssäure besteht. Daneben wurden auch Myristinsäure, Oelsäure und Linolsäure nachgewiesen.

Beschreibung der Versuche.

Cadinen

Eine ätherische Lösung des Oels (Fraktion 3) wurde mit trockenem Chl. wasserstoffgas gesättigt. Beim Abdampfen des Lösungsmittels krystallisiert das Chlorhydrat in feiner Nadeln vom Fp. 116° . Mischschmelzpunktbestimmung mit reinem Cadinenchlorhydrat aus Cubebenöl zeigte keine Depression.

Torilen

10 g des Oels (Fraktionen 3 und 4) wurden in eine gut gekühlte Lösung von 3 cc Schwefelsäure im 8 cc Aether vorsichtig eingetropft. Dabei achtet man darauf, dass die Temperatur des Gemisches nicht über 5° steigt. Nach einigen Stunden beginnen die Krystalle auszuscheiden. Die Krystalle wurden abgesaugt, mit Wasser gewaschen und aus Methanol umkrystallisiert. Ausbeute 0.9 g Fp. 145° . $[\alpha]_D^{17} = -54.70^\circ$ ($c=1.192$, Chloroform).

10.64mg Subs.: 23, 31mg CO_2 und 8.07mg H_2O

3.960mg Subs.: 2.994mg $BaSO_4$

$C_{15}H_{24} \cdot H_2SO_4$ Ber. C 59.55, H 8.69, S 10.16

Gef. C 59.75, H 8.49, S 10.38

Torilenhydrat

Torilensulfat wurde mit 10% alkoholischem Kali verseift und ausgeäthert. Kleine Nadeln aus Methanol, Fp. $51-55^\circ$.

10.02mg Subs.: 29.83mg CO_2 10.59mg H_2O

$C_{15}H_{26}O$ Ber. C 81.01, H 11.79

Gef. C 81.19, H 11.82

Molekulargewichtsbestimmung (nach Rast)

Subs.	9.3mg, Campher	126.6mg, Δ	13°, M.G.	226
	Ber. für	$C_{15}H_{26}O$		222

Petroselinssäure

Die Früchte enthält 10% Fett. Die durch Verseifung des Fettes gewonnene Gesamtfettsäure wurde in Bleisalz übergeführt und mit Alkohol behandelt. Die aus dem in Alkohol unlöslichen Bleisalz in Freiheit gesetzte Säure (Fp. 33°, 65% der Gesamtfettsäure) erwies sich als identisch mit der Petroselinssäure, indem die Mischschmelzpunktbestimmung mit der reinen Petroselinssäure keine depression zeigt. J.Z. 88.8 (Ber. 90.0), S.Z. 198.6 (Ber. 198.9).

0.0735g Subs.:	0.2059g CO_2 und	0.0798g H_2O
$C_{15}H_{34}O_2$	Ber. C	76.52, H 12.14
	Gef. C	76.40, H 12.15

Aus dem in Alkohol löslichen Bleisalz erhielten die Verfasser durch Oxydation nach Hazura Dioxystearinsäure und Sativinsäure, wodurch die Anwesenheit von Oelsäure und Linolsäure bewiesen ist.

Heisaburo Kondo und Ichiro Keimatsu: Bemerkung zur Konstitution des Phaeanthins.

[B. 68, 1503, (1935)]

Masao Tomita: Ueber die phenolische Alkaloide von Cocculus trilobus, DC. (III); die Konstitution des Normenisarins. (XLIV. Mitteilung über die Alkaloide von Sinomenium- und Cocculus-arten von Heisaburo Kondo.)

[Aus dem chemischen Laboratorium „Itsuu“, Tokio.]

(Eingegangen am 10. Juli 1935.)

Früher hatte der Verfasser (diese Zeitschrift, Vol. 51, 461 [1931]; Arch. Pharmaz. 269, 441 [1931]) einer phenolischen Base vom Fp. 223°, dem vierten

せしむ。反應成績體は Benzol にてよく洗滌して未反應の Isocyanat を除去し、アルコールより精製す。

此處に得たる結果を表示すれば第二表の如し、

p-Rhodanphenylthiosemicarbazid 類の合成

p-Rhodanphenylhydrazin に計算量の Senföf 類 (Phenyl-, *o*-, *m*-, *p*-Tolylsenföf) を反應せしむ。反應の條件は次の如し、

- i) アルコールを溶媒として室溫にて反應せしむ。
- ii) アルコールを溶媒として氷にて冷却しつつ反應せしむ。
- iii) ベンツォールを溶媒とし i) ii) 同様に反應せしむ。
- iv) 溶媒を用ひず兩者をその儘反應せしむ。

以上何れの場合にも第三表の如き物質を得たり、熱アルコールより再結晶せしむ再結晶に際し數滴の鹽酸を加ふるも何等の變化なし。

p-Rhodanphenyl semi carbazid を合成するには次の方法によれり。即ち *p*-Rhodanphenylhydrazin の鹽酸鹽 1T 及ロダンアンモン 1T を純アルコール 4-5 T に溶解し 12 時間水浴上に煮沸し、後 12 時間放置し析出せる結晶を水にて充分洗滌したる後アルコールより再結晶す。Zp 187° の針狀結晶なり。

ヤブジラミ實の成分

刈 米 達 夫

馬 島 淳 子

(内務省東京衛生試験所)

(昭和 10 年 9 月 1 日受理)

T. Kariyone und A. Majima: Über das ätherische Öl von
Torilis Anthriscus.

ヤブジラミ *Torilis Anthriscus* Gmel. (繖形科) の果實は本邦に於て蛔蟲驅除藥として民間藥に供する地方あり。辻治雄氏 (Tohoku Jour. exp. Med. 24, 174, 1934) は其の果實を石油エーテルにて浸出し、10% カリ鹼液及び 2% 硫酸にて振

蓋し可溶分を除去し残留物を減壓蒸溜に附し其の約 150° に蒸溜する溜分は蚯蚓・
 蛔蟲等に對する麻痺作用最も強く, 同氏は其の溜液に Torilol なる名稱を附し種
 々の藥理作用を研究せるも, 其の化學的組成又は純否に就ては全く報告する處無
 し.

余等は先づ本生藥の揮發油成分を研究せんとし之を水蒸氣蒸溜に附せるに揮發
 油 1.4%を得たり. 其の諸恒數次の如し. d_{20}^{20} 0.8974, $\alpha_D^{20} -95.04^{\circ}$, n_D^{20} 1.5243,
 酸數 0, エステル數 8.24, ヨード數 70.7, メトキシル基 0, カシア壘によりフェ
 ノール及びアルデヒド檢出せず. 果實の水蒸氣蒸溜は甚だ長時間を要するを以て
 以後研究材料としては果實のガソリン浸出液よりガソリンを回收したる後水蒸氣
 蒸溜に附し揮發油を製せり. 水蒸氣蒸溜残留物は主として脂肪油より成り原料の
 10%に相當す.

揮發油 100g を減壓蒸溜に附し次の溜分に分ちたり.

No.	Kp.°	收量(g)	分 析			d_{20}^{20}	$[\alpha]_D^{20}$	n_D^{20}	J.Z.
			C %	H %	O %				
1	40-70°	1.7							
2	70-100°	4.2	87.73	11.61	0.66	0.8836	-74.93°		
3	100-109°	35.0	87.21	10.95	1.84	0.8959	-100.20°	1.50295	
4	109-110°	24.0	87.72	12.05	0.23	0.8980	-107.21°	1.50429	148.2
5	110-120°	7.0	86.83	11.31	1.83	0.9069	-87.13°		

蒸溜残渣 28.0g

第3及4溜分は主溜分にして沸點並に分析數はセスキテルペン (C%88.2, H%
 11.8) に略々一致し其の比旋は Cadinen ($[\alpha]_D -105.5^{\circ}$) の存在を豫想せしむ, 依
 て鹽化水素を作用せしめたるに Fp. 116° の附加物を生じ, 混融法に依り Cad-
 inenchlorhydrat なる事を確め得たり. 其分析數及比旋も Cadinenchlorhydrat に
 一致す.

以上の如く主溜分たる3及4溜分は主として Cadinen より成る事を確め得た
 るも其の比重及ヨード數 Cadinen (d_{20}^{20} 0.918, J.Z. 248)に比し著しく低き點に疑
 問を有し他の混有成分檢索の爲, 種々の誘導體の製出を試みたり. 其内, 本溜分
 を 5° 以下の溫に於てエーテル硫酸混液中に滴下するに白色板狀結晶を生じ, 之
 を充分水洗後メタノールより再結晶するに Fp. 145° となる. 分析の結果は C_{15}
 H_{24} . H_2SO_4 に適し即ちセスキテルペンの硫酸附加物なる事を知る. 純粹なる Ca-

dinen に就て同様の操作を試みるも結晶を生ぜず, 故に此の硫酸附加物は第 3, 4 溜分中 Cadinen 以外のセスキテルペンに基因すること確實にして, 其の本體たるセスキテルペンを未だ純粹に分離し得ざるも假に Torilen と命名す. Torilensulfat をアルコール製カリにて鹼化すれば Fp. 51-55°, 分析竝に分子量測定の結果 $C_{18}H_{26}O$ に一致する針狀結晶を得. 即ち Torilenhydrat に相當する物質なり.

3, 4 溜分以外の溜分は極めて僅少にして未だ精査せず. ヤブジラミ揮發油中 70% 以上をなすものは Cadinen 及び Torilen なる二種のセスキテルペンなり.

副産物として得たる脂肪油は葉綠素により濃綠色を呈し冬期半ば固結す. 鹼化によりて得たる脂肪酸をメチルエステルを経て精製し, Twitchell 法に依り鉛鹽を製しアルコールに不溶なるものと可溶なるものとに分離するに其量約 2: 1 の比をなす. アルコールに不溶なる鉛鹽より遊離せしめたる酸は殆ど純粹なるペトロセリン酸 $CH_3-(CH_2)_{10}-CH=CH-(CH_2)_4-COOH$ より成り, パセリー種子より製したるペトロセリン酸と混融するも融點 (33°) 降下せず. 又これより誘導せる酸アミド (Fp. 76.5°) 及び Taririnsäure $CH_3-(CH_2)_{10}-C\equiv C-(CH_2)_4-COOH$ (Fp. 52°) は何れも文獻に一致し, 又接觸還元によりてステアリン酸を生ず.

アルコールに可溶なる鉛鹽より遊離して得たる液狀脂肪酸を Hazura 法により酸化し, 9.10 デオキシステアリン酸及び Sativinsäure を得, 依て油酸及びリノール酸の存在を證明し得たり. 又其際に酸化を受けざりし部分より少量のミリスチン酸を得たり.

之を要するに本生藥の揮發油は殆ど全く Cadinen 及び Torilen なる二種のセスキテルペンより成り, 脂肪油はペトロセリン酸を主とし其他ミリスチン酸, 油酸及びリノール酸のグリセリドより成る. 本生藥中, 驅蟲藥として有效なるべき特殊の成分を検出せず. 本揮發油に就てビーカー内に於て豚蛔蟲に對する殺蟲試験を試みたるに, 藥物を加へざる對照試験に比し著しく衰弱するも死に至らず. 蛔蟲保有犬に對する經口的投與に就ては目下實驗中なり.

本研究の費用の一部は日本學術振興會の補助を得たり. 又原料の供給に就ては株式會社藤澤友吉商店より大なる便宜を得たり. 併せて茲に謹謝す.

實 驗 の 部

Cadinen

3 溜分 5g を倍量の無水エーテルに溶解し強冷しつつ乾燥鹽化水素を飽和せし

むるに直に結晶を析出す. 一夜放置後減壓下にエーテルを溜去し結晶を濾取す. 得量 1.7g. 純アルコールより再結晶するに Fp. 116° にして Cadinendihydrochlorid と一致し, ヒノキ油より得たる Cadinendihydrochlorid と混融し融點降下せず.

$[\alpha]_D^{17} = -37.67^\circ$ (クロロホルム, $C=2.867$) (文獻記載 -37.17°)

分析 物質	4.720mg	AgCl	4.780mg	Cl%	25.05
	$C_{15}H_{26}Cl_2$ 理論數			Cl%	25.59

又 3 溜分 1.5g にブロム水素飽和氷醋酸を加へ暫時振盪後, Hydrobromid の結晶 0.75g を得. アルコールより再結晶すれば Fp. 122-123° にして Cadinendihydrobromid と混融し融點降下せず.

分析 物質	4.988mg	AgBr	5.100mg	Br%	43.51
	$C_{15}H_{26}Br_2$ 理論數			Br%	43.67

4 溜分も同様に處理して Cadinen の兩誘導體を得, その得量も 3 溜分と等し.

Torilen

3 及 4 溜分 10g を, 無水エーテル 8cc 濃硫酸 3cc の冷混液中に反應溫度 5° 以上とならざる様に注意しつつ滴加するに少量の結晶を生ず. 得量 0.9g. アルコール, エーテル, 醋酸エチル, ペンゾールに易溶, 水, 熱湯に不溶なり. この結晶を溫湯にて數回洗滌後メタノールより再結晶すれば Fp. 145° となる.

$[\alpha]_D^{17} = -54.70^\circ$ (クロロホルム, $C=1.192$)

分析 物質	10.64mg	CO ₂	23.31mg	H ₂ O	8.07mg	C%	59.75	H%	8.49
物質	3.96mg			BaSO ₄	2.99mg			S%	10.38
	$C_{15}H_{24}H_2SO_4$ 理論數			C%	59.55			H%	8.63
								S%	10.16

鹼化數測定

物質	0.0833g	N/10 苛性カリ消費量	2.51cc	鹼化數	167.9
	$C_{15}H_{24}H_2SO_4$ が苛性カリ分子を消費するとして				139.3

Torilenhydrat

Torilensulfat 0.5g を 10%アルコール製カリ 15cc と共に 20 分間煮沸し冷後稀鹽酸々性となしエーテルにて振盪しエーテル層より少量の結晶を得. これを稀メタノールにて再結晶するに Fp. 51-55°.

分析 物質	10.02mg	CO ₂	29.83mg	H ₂ O	10.59mg	C%	81.19	H%	11.82
	$C_{15}H_{26}O$ 理論數					C%	81.01	H%	11.79

分子量測定(ラスト氏法)

物質	9.3mg	Campher	126.6mg	Δ 13°	M.G. 226
	$C_{15}H_{26}O$ 理論數				222

脂 肪 油

ヤブジラミ果實のガソリン浸出液よりガソリンを回収し水蒸氣蒸溜により揮發油を採取せる殘留物は主として脂肪油より成る。本物質 100g を 10% アルコール製カリ 4 倍量にて鹼化して製せる粗製脂肪酸を 4 倍量のメタノールに溶解し乾燥鹽化水素を飽和しメチルエステルとなし減壓蒸溜に附す。

No.	Kp 1.5	得量 (g)	V. Z.	J. Z.	粗製脂肪酸 得量 (g)
1	145~180°	14.1	189.1	92.47	11.0
2	180~183°	23.1			18.0
3	183~185°	55.5	191.6	95.07	42.0
	$C_{18}H_{34}O_2$ として		190.5	85.80	

各溜分を別々に鹼化して脂肪酸を製し Twitchell に従ひ鉛鹽として分離す。即ち脂肪酸を 5 倍量のアルコールに溶解し醋酸鉛飽和アルコール溶液(約 3%) 15 倍量を加へ一夜放置し沈澱を濾取し數回アルコールにて洗ひ 70% アルコールより

No.	得量(g)	Fp.	S. Z.	J. Z.
1	3.0	34-36°	201.1	86.24
2	8.0	33-34°	200.2	82.24
3	21.0	32°	198.6	88.75
ペトロセリン酸		33°	198.9	90.07

再結晶す。斯くして分離せるアルコール不溶鉛鹽と濾液に溶存せる鉛鹽を各別に稀硝酸にて處理して脂肪酸を遊離せしむ。前者より得たる脂肪酸は常溫に於て固形にして、後者より得たるものは液狀なり。各溜分より得たる固形脂肪酸の性質表の如く皆ペトロセリン酸に一致するを以て合併し再結晶す。

ペトロセリン酸

前項固形脂肪酸を 60% アルコールより 3 回再結晶すれば Fp. 33° に一定す。これをパセリー *Petroselinum sativum* Hoffm. 種子より製したるペトロセリン酸と混融するに融點下降せず。

分析 物質	0.0735g	CO_2 0.2059g	H_2O 0.0798g	C% 76.40	H% 12.15
	$C_{18}H_{34}O_2$ 理論數			C% 76.52	H% 12.14

ペトロセリン酸 2g を醋酸エチル 10cc に溶解しパラジウム化硫酸バリウムを觸媒とし接觸還元する時は Fp. 71° のステアリン酸を生ず。

分析 物質	0.0729g	CO_2 0.2035g	H_2O 0.0818g	C% 76.23	H% 12.55
-------	---------	----------------	----------------	----------	----------

$C_{18}H_{36}O_2$ 理論數

C% 75.98 H% 12.76

ペトロセリン酸アミド

ペトロセリン酸 3g, メタノール 30cc, 硫酸 1g を煮沸し, メチルエステル (K_{p45} 177-179°) 2.6g を得たり. これをアルコール 10cc に溶解し乾燥アンモニアを飽和し 3 日間放置後アルコールを回収しアルコール及水より再結晶すれば Fp. 76. 5° の白色結晶を得たり.

分析 物質 6.08mg

27° 764mm

 N_2 0.2686cc

N% 5.05

 $C_{18}H_{35}NO$ 理論數

N% 5.00

タリリン酸

ペトロセリン酸 3g をクロロホルム 10cc に溶解し, ブロム 2g, クロロホルム 10cc の溶液を氷冷しつつ徐々に加へ少時の後クロロホルムを回収し残留物を苛性カリ 5g, エタノール 20cc の溶液と共に融閉管内に 100° に 18 時間加熱後, 水を加へ稀硫酸々性としエーテルにて振盪す. エーテル回収後稀アルコールにて再結晶し Fp. 52° の結晶を得たり. 諸性状タリリン酸に一致す.

分析 0.0747g

 CO_2 0.2110g H_2O 0.0774g

C% 77.04

H% 11.59

 $C_{18}H_{32}O_2$ 理論數

C% 77.07

H% 11.51

液状脂肪酸

アルコール可溶性脂肪酸鉛(總量 35g) より粗製液状脂肪酸 18g を得たり. 之を 30%カリ液 30cc にて鹼化し水 1.5 L に溶解し, 1.5%過マンガン酸カリ溶液 1.8L にて酸化し. 反應終了後褐石を濾別し濾液を約 $\frac{1}{3}$ 量に濃縮, 稀硫酸々性となし此處に生ぜし沈澱(甲)を濾別し濾液を中和後更に濃縮し, 酸性となし少量の沈澱(乙)を得たり.

(甲)を石油エーテルにて浸出し其可溶分より粗製脂肪酸少量を得. 稀アルコールにて再結晶し Fp. 51° 混融によりミリスチン酸なる事を確めたり.

上記石油エーテル不溶物をソキシレット浸出器を用ひてエーテルにて浸出し浸出液を放置中生ぜる析出物はアルコールより數回再結晶後 Fp. 122° 及 Fp. 134° の Dioxystearinsäure を得たり.

分析 (Fp. 134° の物質)

物質 0.0753g

 CO_2 0.1876g H_2O 0.0775g

C% 67.95

H% 11.52

 $C_{18}H_{36}O_4$ 理論數

C% 68.29

H% 11.47

即ち本物質は, 9,10. デオキシステアリン酸にして従て原油中油酸の存在を示す.

エーテル溶液を回収して得たる淡黄色物質を稀アルコールにて再結晶すれば Fp. 99-102° なり. Fp. 122° の物質は 6, 7, デオキシステアリン酸に一致し, Fp. 99-102° の物質は恐らく其の Diastereomere Form にして共にペトロセリン酸の酸化により生ぜしものなり.

(甲)の内エーテルに不溶の酸は Fp 160° にして, アルコールより數回再結晶するに α -Sativinsäure (Fp. 161°) 及 β -Sativinsäure Fp. 172°) を得たり. これに依り Linolsäure の存在を證明せり.

(乙)をエーテルにて浸出し少量の Azelainsäure (Fp. 106°) を得たり. 本物質は油酸の酸化により生成せるものなるべし.

ビーカー内に於ける豚蛔蟲に對する作用

物質 0.2g, アラビアゴム 0.2g, ブンゲ液 100cc を加へ乳化液を製し 200cc のビーカー中に豚蛔蟲 3 匹宛を投入し孵卵器中に 37° に保ち觀察せり.

	10分後	30分後	1 時間後	2 時間後	20 時 間 後
ヤブジラミ油	不活潑に運動	”	”	”	著しく衰弱し僅に運動す.
カヂネン	不 變	”	”	”	”
對 照	不 變	”	”	”	”