artige Wirkung hat oder nicht und festgestellt, dass ihm diese Wirkung zukommt.

Ich habe nämlich aus 1 g Moschus dessen Methanolextrakt hergestellt, denselben mittels Olivenöl auf 10 ccm gebracht und 0,2 cc d. h. eine Dosis, die 20 mg Moschus entspricht, nur einmal zur Bepinselung des Kapaunenkamms angewandt und vom nächsten Tage an täglich einmal die Grösse des Hahnenkamms gemessen. Was diese Messung anbetrifft, so handelt es sich um die Feststellung des Produkts aus Länge und Höhe und die folgende Tabelle gibt den Prozentsatz seiner Vergrößerung.

Kapaun Nr.	1. Tag	2. Tag	3. Tag	4. Tag	5. Tag	6. Tag	7. Tag	8. Tag	9. Tag
Nr. 5	0	8,7	17,8	13,4	13,4	6,6	4,3	4,3	
Nr. 4	0	18,0	31,8	33,3	27,9	25,7	23,7	19,8	13,9
Nr. 81	0	7,0	21,8	17,9	17,9	10,5	10,5	4,0	
Nr. 10	0	6,0	19,0	30,9	23,1	15,4	9,9	8,0	

Die folgende Tabelle gibt die Resultate der Bepinselung mit 0,2 cc einer Olivenöloesung an, in der nach derselben Methode 100 γ trans-Dehydroandrosteron gelöst worden sind.

Kapaun Nr.	1. Tag	2. Tag	3. Tag	4. Tag	5. Tag	6. Tag
Nr. 41	0	12,8	19,0	24,1	27,4	20,7
Nr. 3	0	10,6	18,0	16,0	12,4	10,6

Man sieht hieraus, dass nach dieser Methode 100 γ trans-Dehydroandrosteron mit 20 mg Moschus fast ähnliche Resultate geben. Versuche sind momentan im Gange, um festzustellen, ob der Moschus auf den Samenblase wirkt oder nicht und er ob die weiblich brunsthormonartigen Wirkung hat oder nicht.

Ueber die pharmakognostische Untersuchung der Droge "Hikai."

von

N. FUJITA und T. HARADA

[Aus dem pharmazeutischen Institut der Kaiserlichen Universität zu Tokyo]

(Eingegangen am 18. Oktober 1936.)

Die Droge "Hikai" stammt aus *Dioscorea Tokoro* Makino. Sie vermischt sich manchmal mit anderen *Dioscorea*-Arten, die liegende Wurzelstöcke besitzen, da beide

- Fig. 10. *D. septemloba*, A: Droge $\times \frac{2}{3}$, B: Lupenbild des Querschnitts.
 Fig. 11. A: Querschnitt von *D. septemloba*, B: Querschnitt von *D. quinqueloba*.
 Fig. 12. *D. quinqueloba*, A: Droge $\times \frac{2}{3}$, B: Lupenbild des Querschnitts.
 Fig. 13. *D. nipponica*, A: Droge $\times \frac{2}{3}$, B: Lupenbild des Querschnitts.
 Fig. 14. „ „ , Querschnitt.
 Fig. 15. „ „ , Haare am Rhizom.
 Fig. 16. „ „ , Längsschnitt.
 Fig. 17. *D. bulbifera* f. *spontanea*, Drogen $\times \frac{2}{3}$.
 Fig. 18. „ „ „ „ , Querschnitt.
 Fig. 19. „ „ „ „ , A: Parenchym, B: Gefäße, C: Stärkekörner.

Cut: Cuticula, *Ep*: Epidermis, *Es*: Erdspross, *F*: Faser, *Gbs*: Gefäßbündelscheide, *Gel*: Geleitzelle
Gfb: Gefäßbündel, *Gg*: Grundgewebe, *Grb*: Gerbstoff, *H*: Haar, *Hgf*: Hoftüpfelgefäß, *Hp*: Holzparenchym, *Htr*: Hoftüpfeltracheide, *K*: dünnwandige Korkzelle, *K'*: dickwandige Korkzelle, *Kr*: Raphidenbündel von Ca-Oxalat, *Ks*: Korkschicht, *Ngf*: Netzgefäß, *Ot*: Oeltropfen, *Qb*: Querbalken, *Rgf*: Ringgefäß, *S*: Siebröhren, *Seh*: Schleim, *Sgf*: Spiralgefäß, *Spl*: Siebplatte, *Sta*: Stärkekörner, *Stg*: Stengel, *Trg*: Treppengefäß, *W*: Wurzel.

日本産蓴蓴の生薬學的研究

藤 田 直 市

原 田 利 一

(東大醫學部藥學科生薬學教室)

(昭和 11 年 10 月 18 日受理)

N. Fujita u. T. Harada; Ueber die pharmakognostische
Untersuchung der Droge „Hikai“.

總 論

蓴蓴は古來使用せらるる和漢藥の一にして、本草和名(900 年頃)以來の我國本草書、皆ヤマノイモ科(*Dioscoreaceae*)のオニドコロ(一名トコロ) *Dioscorea Tokoro Makino* を原植物として收録し、その後ヤマノイモ屬(*Dioscorea* sp.)の他の數品をも併用するに至れり。即ち本草綱目啓蒙(1803 年)に「春時舊根より苗を生す藤蔓甚延長葉互生す形橢にして尖りあり堅すぢのみにして山藥葉の如くにして大なり根も亦山藥に似たり蒸煮て食へばオニドコロより柔にして味甘く微く蒞し是川蓴蓴なり本經逢原曰産川中大塊色白而鬆脆者爲蓴蓴一種オニドコロあり一名キドコロ山野甚多し〔中略〕又一種葉邊に淺缺あるものあり又圓大なる者あり又菊葉のものありその餘品類多し」と、又岩崎常正は本草圖譜(1828 年)第 25 卷の蓴蓴の目に、ヤマノイモ屬の蔓草 5 種を登載したり、尙ほ又草木圖説(1832 年)に於いては山蓴蓴にオニドコロを、川蓴蓴にニガガシュウを充當したり。

著者等はニガガシュウ *Dioscorea bulbifera* L. f. *spontanea* (Makino), タチドコロ *D. gracillima* Miq., ウチハドコロ *D. nipponica* Makino, カヘデドコロ *D. quinqueloba* Thunb., キクバドコロ *D. septemloba* Thunb., ヒメドコロ *D. tenuipes* Franch. et Sav., オニドコロ *D. Tokoro Makino* の 7 者を剖見し、市場品と比較して、その據る所を明かにするを得たり。

其結論を概括すれば、オニドコロとヒメドコロの根莖は、内部構造にては判然たる區別困難にして外形に依り識別するを可とす、即ちヒメドコロは外面赤褐色乃至黒褐色を呈し、皺紋を有し、精粗種々なる淺き縦皺を現し節間短く略 1 cm 内外にして分岐多きを常とすれども、オニドコロは節間長く 4 cm に至り分岐する事稀なり、又その横截面をルーベにて檢すればオニドコロは脈管束が點在するに對し、ヒメドコロは多くは 1 乃至數箇の小圈輪をなす、又其味オニドコロはヒメドコロより遙に苦し、尙ほこの兩者の柔細胞は共にツェルローゼ反應を呈すれども、他の 5 者の夫れは膜壁稍木化し孔斑明瞭なり。タチドコロとキクバドコロとは、前者は地上

莖の附着する部分が隆起分出するに對し後者は地上莖の附着點が凹入するか或は皿狀を呈する以外は、根莖の外觀酷似すれども、顯微鏡的に、前者の厚壁性杓層は後者の夫れに比して多層且つ厚膜なる事に依りて容易に區別せらる。ウチハドコロは甚だ長き根莖を有するものなれど、其の短く切斷せるものはオニドコロと稍類似するも、その表面には略平行せる長き縦皺存在し、顯微鏡的構造に於いては毛茸を有し、橫梁細胞が薄壁性杓層中に混在する事に依りオニドコロと容易に區別せられ、又内部構造上稍類似せるキクバドコロとは前記毛茸並びに橫梁を有する事及實體組織の外邊に存在する數層の柔細胞はその膜壁が木化せざる事に依り判然と區別せらる。カヘドコロはその形狀、構造が稍タチドコロ、キクバドコロに類似すと雖も、外形的にはその粗大なる皺に依り、又内部構造上は厚膜性杓細胞が大形且つ略等徑性なる事に依り識別せらる。ニガガシユウはその形狀が塊狀にして、更に内部構造的には網目様の膜質ありて澱粉粒を包圍する等の差異を以つて、他の6者と確然と辨別せらる。尙ほ本屬が單子葉類に屬するに拘らず、一般單子葉植物の根莖に比較し解剖上稍特異なるは、7者共薄壁性杓層の内方に更に厚壁性杓層を有する事、内上皮を認めざる事等なり。有效成分なるサポニンの反應は7者共に陽性なり、而して現今市場品中には、オニドコロ、タチドコロ、ウチハドコロの根莖に形狀並びに構造全く一致するもの混在するを知れり、又稀にニガガシユウの塊莖も販賣せらる。

此機に於いて種々御教示を賜りたる牧野富太郎先生、並びに材料を惠與せられたる緒方正資、岸田松若、山岸晃、藤田路一の諸氏に深甚の謝意を表す。

草薺及オニドコロ *Dioscorea Tokoro Makino*

材料は東京市場に於ける生藥草薺、並びに神奈川縣の諸處、群馬縣伊香保、同縣谷川岳山麓、静岡縣熱海、同縣湯ヶ島、鹿児島市及び櫻島にて自ら採集せる根莖の乾燥品並びにホルマリン液浸標本に依れり。

形狀 生藥草薺 (Fig. 1) は通常長さ約 3—9 cm 徑 0.4—1.4 cm にして、殆んど圓筒狀をなし分枝せるものあり、外面は淡黃褐色又は黃褐色にして、細大深淺種々なる縦溝を有し稀に横裂を表す。諸處に小圓盤存在し、中央に黃褐色の突起あり、之鬚根の殘痕 (Fig. 1: W) にして燒却せるため其長さ通常約 1 cm なれども、往々約 10 cm に至る事あり、何れも外部は剝離し内部のみ殘存し黃褐色を呈す。又處々に稍大なる淡黃色の小皿狀をなせる地上莖の痕 (Fig. 1: Stg) を有し、其中に脈管束に因る小突起あり、通常節間極めて延長すれども、稀に著ちるしく短縮せるもの存在す。土芽 (Fig. 1: Es) は不規則且つ細微なる皺を具有す。質硬く、破折し易し。破折面は赤褐色、緻密にして稍凹凸を表す。香氣を有せず、之を嚙めば稍粘液性にして澁苦なり。

構造 ルーペを以つて横斷面を覗ふに、外周には非薄にして黃褐色を呈する杓層 (Fig. 2: Ks) ありて膨大なる實體組織 (Fig. 2: Gg) を圍む、實體組織中には帶黃褐色の點として脈管束 (Fig.

2: Gfb) の不規則に散在するを認む。該脈管束は縦断面にて根莖長軸の方向に殆んど平行せるため、横断面にては、唯分枝部、地上莖 (Fig. 2: Stg) 及根 (Fig. 2: W) の分出點に於いて斜縦

Fig. 1. オニドコロを原植物とする市場品の全形圖×2/3.

断面として現るるのみにして、その周囲は稍暗褐色なり。
顯微鏡を以つて檢するに、上皮 (Fig. 3: Ep) は通常剝離すれども稀に残存し、其の各細胞は著しく横徑に延長し、四圍の膜壁は殆んど厚さを等しくシズダン III にて染色し、其兩側膜及内面の膜壁は往々波濤狀に皺縮せり、而して外層には強き枳化反應を呈する表皮膜 (Fig. 3: Cut) 存在す。上皮下には略等徑性にして不整且不規則に配列せる 2—4 層の淡黃褐色の枳細胞より成る薄壁多角性枳層 (Fig. 3: K) あり、其膜壁は菲薄にして、枳化反應を呈すれども木化反應を表さず。之に次ぐ厚壁性枳層 (Fig. 3: K') は 2—8 層の大小形狀を異にし、且つ半徑性方向に稍規則正しく配列せる枳細胞を以つて構成せられ、その膜壁は淡黃黄色にして厚く、孔斑を具有す、木化反應並びに枳化反應は共に初生膜層に於いて特に強し。實體組織の柔細胞にして、外邊のものは稍横徑に延長せるも、内部に至るに従ひ漸次等徑性の柔組織に移行す、其膜壁稍厚つく孔斑を具有すれども木化反應を呈せず。然れども極めて稀に單獨又は 2—3 箇集合せる石核細胞嵌在す。

Fig. 2. オニドコロを原植物とする市場品の横断面ルーペ圖。

脈管束 (Fig. 3: B, C, D, E, F, G) は横断面上に全く秩序なく散在するを常とす、個々の脈管束は、篩管部を根莖周縁の方向に、脈管部を中心の方向に存せる側立性脈管束にして、屢々原本部を共有し、之より 2 乃至數方向に放射狀に發達せるものあり (Fig. 3: F, G), 又側面に於いて癒合せるものあり (Fig. 3: E). 脈管束の周圍は一般柔細胞より直徑小にして、木化反應を呈する細胞に依りて通常完全に圍匝せらる、是所謂脈管束鞘 (Fig. 3: Gbs) なれども往々篩管部の外方には之を認めざる事あり (Fig. 3: C), 又斷續して存在する事あり (Fig. 3: D, E, F), 又厚

膜なれども木化反應を呈せざる事あり。尙ほ篩管部の外方には纖維束 (Fig. 3: F) の發達せる事稀ならず。然れども往々實體組織の外邊に嵌在する脈管束は脈管部のみより構成せらる (Fig. 3: B)。篩管部と脈管部との境界には直徑小にして膜壁木化せる木細胞 (Fig. 3: Hp) 介在し、通常平坦なれども、脈管部が凹面をなす事あり、又木細胞が篩管部中に突入し甚だしきは之を左右に 2 分せるあり。脈管部は淡黃色を呈し光線を屈折し強き木化反應を表す、原木部の脈管は密に肥厚せる螺旋紋 (Fig. 3: Sgf, Fig. 4: A の Sgf) なり、之に次いで断面多角形を呈し口徑小なる擬脈管 (Fig. 3: Htr), 及び之より直徑大なる脈管 (Fig. 3: Hgf) あり、擬脈管の孔紋 (Fig. 4: A の Htr) はレンズ形又は稍多角形なれども、脈管の孔紋 (Fig. 4: A の Hgf)

Fig. 3. オニドコロ: 横斷檢鏡圖, 説明本文中.

は小形にして、上下縦横に稍規則正しく密に配列せるため著しく多角性なり。木細胞 (Fig. 4: A の Hp) は縦断面にて檢すれば、少しく長軸に延長し稍大なる孔斑疎に存在し、其隔壁は多少又は著しく傾斜せり。篩管部は殆んど無色なる細胞より成り、篩管 (Fig. 3: S, Fig. 4: A の S) は稍大形にして、通常横隔壁及び縦壁に篩板を有し、或者にはカルス板を認め、或者には之を認めず。伴存細胞 (Fig. 3: Gel, Fig. 4: A の Gel) は直徑篩管より遙に小なり。脈管束鞘 (Fig. 4: A の Gbs) を形成せる柔細胞は、縦断面にて檢すれば、隔壁多少傾斜し細微なる孔斑を具有す。纖維 (Fig. 4: A の F) は口徑小にして強く木化し、裂隙狀の斜孔紋を有し、其兩端は鋭尖なり。

内容物 澱粉粒 (Fig. 3: Sta, Fig. 4: B) は實體組織中に汎く充盈すれども外邊には稍少量

なり。其形状球圓形, 卵圓形橢圓形の單粒又は通常 2 箇, 稀に 3—5 箇よりなる複合粒にして層紋不明なり, 臍點は稀に裂隙狀を呈すれども通常は之を認めず, 大きさ單粒は $2-46\mu$, 複合粒は $12-26\mu$ にして, 外邊の柔細胞中に含有せらるる澱粉粒は小形にして 12μ を越えず通常 7μ なれども, 内部の實體組織中に充填せるものは $10-46\mu$ なり, 纖維, 木細胞中には主として球圓形にして $2-19\mu$ を算する澱粉粒包藏せらる。市販生藥中に充盈せる澱粉粒は糊化せり, 油滴 (Fig. 3: Ot) は 5μ 内外にして實體組織中に散在し, 淡黃色, 球圓形にして光線を屈折す。又主として外邊の柔細胞中に塊狀をなせる黃色の内容物ありて澱粉粒を被包す,

Fig. 4. オニドコロ: 縦斷及内容物檢鏡圖, 説明本文中.

サボニンの反應は特にこの部に顯著なり、即ちアルコールと濃硫酸の同容混和液にて加温せる切片は赤紫色を呈し、又 1 晝夜水酸化バリウムの飽和液に浸漬せる切片を消石灰の溶液にて充分洗滌し、10% クロム酸カリ液を注加し檢鏡するに、クロム酸バリウムの結晶を検出するを得。蔞酸石灰の束針晶 (Fig. 3: Kr, Fig. 4: C の Kr) は主として實體組織の外方にして一般柔細胞より稍大形なる柔細胞中に横徑的に或は長軸に沿ひて存在し、束幅 26—62 μ なり、尚ほ周圍に粘液 (Fig. 4: C の Sch) ありて之を圍繞す、この粘液はコンゴローート、コラリン、ヨードグリセリンに夫々染色するラフィーデン粘液なり。尚ほホルマリン液浸標本にて柔細胞中に淡黄色顆粒狀の塊狀物の沈着せしを認めたり。

ヒメドコロ *Dioscorea tenuipes* Franch. et Sav.

實驗材料には岸田松若氏の惠與せられたる千葉縣清澄山及山梨縣三ツ峠産のもの、並びに神奈川縣神武寺、同縣大山、同縣登戸、静岡縣天城山に於いて自ら採集せる根莖を乾燥したるものと及びホルマリンに浸漬したるものを用ひたり。

既に總論に於いて詳記せし如く本品とオニドコロの根莖とは外觀的 (Fig. 5: A, B) に辨別するを可とし、下に摘記する内部構造上の差異は常套的のものに非ざるため、之等に依りて兩種を確然と區別する事は困難なり。

Fig. 5. ヒメドコロ: A は全形圖 $\times 2$ 。B は横断面ルーペ圖。

厚膜及薄膜性兩胞細胞共、オニドコロの夫れに比して横徑に延長し、且つ厚膜性胞細胞の膜壁は稍菲薄なるを常とす。又實體組織の柔細胞にして、外邊より 5—6 層稀に 10 數層のものはオニドコロに於ける如く横徑に延長すれども、之より内部に續く凡そ 10 層位の柔細胞は往々半徑性方向に稍延長せるものあり。尚ほ實體組織中に石核細胞の出現する事は絶えてなし。脈管束はオニドコロの夫れより少數且小形にして、篩管部の外側にある纖維束の發達せるもの稀なり。内容物としては澱粉粒は、單粒は 2—60 μ 、複合粒は 5—36 μ を算し、オニドコロの根莖中に充滿せるものより稍大形なり、尚ほ實體組織の外邊に、屢々不定形にして紅紫色を呈するアントチアンの塊の含有せらるる事は、オニドコロに視ざる所なり、

萆薢及タチドコロ *Dioscorea gracillima* Miq.

實驗材料は東京市場より購入せる生薬草薺、並びに群馬縣谷川岳山麓、茨城縣筑波山に於いて自ら採集せる根莖を乾燥したるものと及びホルマリンに浸漬したるものに依れり。

形状 生薬草薺 (Fig. 6) は通常長さ約 8—12 cm に切斷し、徑約 1—3 cm なり。外面は赤褐

色, 黄褐色乃至淡黒褐色を呈し, 往々鬚根焼却のため 黒色の焼痕を認む, 通常浅くして比較的細微なる縦皺並びに網目様の皺紋を現し, 又處々に全周を圍繞し又は半圓狀を呈して陷凹せる横溝あり, 根は通常その基部に於いて 焼却し去るも, 屢々残存し, 其長さ約 10 cm に及ぶ事あり, 何れも外部は根痕の基部にわづかに視るのみにして 内部のみ挺出し, 其外面は淡黄褐色を呈し 強韌且滑澤にして 細根の残基を認め, 先端は焼却のため 黒色を呈す. 根莖の上面には隆起極めて多く, 其基部に鱗片様のもの存在し, 數箇の圓形或は橢圓形をなし多くは淡明なる痕痕ありて地上莖の殘基 (Fig. 6: Stg) この上に着生す, 地上莖は帶白褐色又は黄褐色にして縦線を表し, 通常除去すれども稀に残存し長さ約 5 cm に達す, 土芽 (Fig. 6: Es) は黒褐色にして網目狀に皺縮せり. 質硬く, 破折面は帶黄白色にして緻密なり. 香氣なく, 味少しく若し.

構造 ルーベを以つて横断面を検するに, 外周の袍層 (Fig. 7: Ks) は黒褐色を呈し菲薄なり, 實體組織は極めて膨大にして帶黄白色を呈し, 淡黄色の脈管束は不規則に散在し, 斜縦断面として出現する事稀ならず, 又分岐部, 地上莖 (Fig. 7: Stg) 及び根 (Fig. 7: W) の分出點に於いては總べて縦断面又は斜縦断面として現はる.

顯微鏡下に檢視するに, 上皮 (Fig. 8: Ep) は小形にして淡黄色の細胞よりなり往々横徑に延長す, 外面に表皮膜 (Fig. 8: Cut) を被わり, 孔斑を有すれども木化反應なく 袍化反應を呈し, 袍細胞との間に胞間を表はす. 薄壁性袍層 (Fig. 8: K) は 1—5 層の略等徑性なる袍細胞よりなり, 其膜壁は淡黄色にして稍厚く, 屢々大形の孔斑を表し胞間存在す. 之に次いで 2—5 層に至る厚壁性袍層 (Fig. 8: K') ありて實體組織を圍擁す. 屢々根莖の外部は剝離し, 厚壁性袍層が最外層をなす

Fig. 6 タチドコロを原植物とせる市場品の全形圖×2/3.

Fig. 7. タチドコロを原植物とせる市場品の横断面ルーベ圖.

を視る. 其各胞細胞は小形にして横徑に延長し且半徑性方向に規則正しく配列すれども, 外邊のものは略等徑性なり, 其膜壁は極めて厚く, 顯著なる孔斑並びに層紋を表し, 木化反應, 胞化反應は共に初生膜層に於いて特に強し. 實體組織の外邊には略等徑性又は觸線性方向に延長せる淡黃色を呈し稍厚膜にして粗大なる孔斑を具有する柔細胞 6—7 層存在し, 之より内方の柔細胞は略等徑性にして不規則に配列し, 其膜壁は厚く淡黃色を呈し孔斑を具へ, 何れも第二期膜層のみ ツェルローゼ反應を呈し, 又初生膜層のみ稍弱き木化反應を表す, 又この部柔細胞にして外邊に存する凡そ 10 層の細胞は著しく半徑性に延長する事稀ならず. 脈管束は實體組織中に不規則に散在す, 而して個々の脈管束は篩管部を根莖周縁の方向に, 脈管部を中心の方向に配置せる側立性脈管束なれども, 内部には通常 2—3 箇の脈管束相反對せる位置を取り原本部を共有し, 又は其側面に於いて癒合せるもの等存在す, 尙ほ屢々内方には兩管性の構造を有す

Fig. 8. タチドコロ: 横斷檢鏡圖, 説明本文中.

るものを交ふ. 脈管束の周圍には一般柔細胞より直徑小にして, 木化反應を呈する細胞ありて完全に圍匝す, 是所謂脈管束鞘 (Fig. 8: Gbs) なれども, 往々篩管部の外方には斷續して存在する事あり, 又篩管部の外方に纖維束 (Fig. 8: F) の發達せるもの稀に存在す. 然れども稀に根莖の外邊に存する脈管束は脈管部のみを以つて構成せらるる事あり, 脈管部と篩管部との接面には直徑小にして稍強き木化反應を呈する木細胞 (Fig. 8: Hp) 介在し脈管部が凹面をなすを常とすれども, 屢々木細胞が篩管部内に突入せるものあり, 又平坦なるものあれども稀なり. 脈管部は大部分淡黃色にして光線を屈折し強き木化反應を呈し, 上下に稍規則正しく配列せる多角性有縁孔紋を有する脈管 (Fig. 8: Hgf, Fig. 9: A の Hgf), 及口徑前者より小且短くして, 橢圓形の有縁孔紋を疎に表す擬脈管 (Fig. 8: Htr, Fig. 9: A の Htr) にして, 原本部の脈管は常に螺旋紋脈管 (Fig. 8: Sgf, Fig. 9: A の Sgf) なれども其數少し. 木細胞 (Fig. 8:

Hp, Fig. 9: A の Hp) は縦断面にて檢すれば, 長軸の方向に延長し粗大なる孔斑を具有す。篩管部は殆んど無色の細胞よりなり, 稍厚膜にして初生膜層は往々弱き木化反應を呈す。篩管 (Fig. 9: A の S) は横隔壁並びに縦壁に篩板を有し, カルス板を認むる事稀ならず。脈管束鞘 (Fig. 9: A の Gbs) を形成する柔細胞は縦断面にては隔壁は多少又は著しく傾斜し稍大なる孔斑を具ふ。纖維 (Fig. 9: A の F) は口径小にして斜孔紋を有し, 其先端は鋭尖なり。

Fig. 9. タチドコロ: 縦断及内容物檢鏡圖, 説明本文中。

内容物 澱粉粒 (Fig. 8: Sta, Fig. 9: B) は實體組織中に汎く存在すれども, 外邊の觸線性方向に延長せる柔細胞中には小形なるもの少量包有せらる, 又纖維, 木細胞中に包藏せらるるものは主として球圓形なり, その他の部位に存する澱粉粒は半月形, 球圓形又は橢圓形にして, 臍點の明瞭なる者あり, 然らざるものあり, 中心性又は偏心性にして層紋明ならず, 單粒又は2箇より成る複合粒にして, 大きさ單粒は $5-36\mu$, 複合粒は $17-48\mu$ なり。尙市販生薬中に充填せらるる澱粉粒は種々の程度に糊化せり。油滴 (Fig. 8: Ot) は 5μ 内外にして, 實體組織中に散在す。又實體組織は汎くサボンの反應を表す。碳酸石灰の束針晶 (Fig. 8: Kr) は外邊の觸線性に延長せる柔細胞にして, 稍大形なる柔細胞中に横徑的に含有せられ, 束幅約 $31-36\mu$ にして周圍には粘液を認めず。タンニン質 (Fig. 8: Grb) は上皮及薄壁性胞細胞中に顆粒をなして存在し, 稀に厚壁性胞細胞中にも出現す。篩管並びに伴存細胞中には蛋白質の反應を呈する淡黄色の不定形の團塊存在す。尙ほホルマリン液浸標本の實體組織中には淡黄色の塊狀物の沈着せるを認めたり。

キクバドコロ *Dioscorea septemloba* Thumb.

實驗材料には 岸田松若氏の惠與になる埼玉縣伊豆嶽産のもの, 並びに神奈川縣程ヶ谷, 茨城縣筑波山及び群馬縣谷川岳山麓にて自ら採集したる根莖の乾燥品並びにホルマリン液浸標本を供用せり。

總論に於いて概略記せしが如く、本品とタチドコロの根莖とは外觀的 (Fig. 10: A, B) には辨別する事困難にして、唯本品がタチドコロの根莖に比して、節間稍延長し、根莖の上方に向へる隆起部にして地上莖の附着すべき部分少く、又その破折面は多くは黄色を呈する事以外には兩者の間には差異を認めざれども、顯微鏡によりては判然と類別する事を得。今内部構造上の差異のみを列記すれば、薄壁性柎層 (Fig. 11: A の K) はタチドコロの夫れより多層にして往々 8 層に至る事あり、又厚壁性柎層 (Fig. 11: A の K') は通常 1—2 層存在し、タチドコロの夫れに比し薄膜にして略等徑性且不整の配列をなす、更に之より内方に續く觸線性方向に延長せる柔組織の最内層の 1—2 層のものは稀に膜壁肥厚し石核細胞となる、又タチドコロに於いては柔細胞は總べてその第二期膜層はツェルローゼ反應を呈すれども、本品にはこの性狀なく全部木化する。澱粉粒はその外形は異らざれどもタチドコロの夫れに比して小形にして、大きさ單粒は 2—29 μ 、複合粒は 20—38 μ なり、尙ほ蓆酸石灰の束針晶 (Fig. 11: A の Kr) は束幅 17—29 μ なり。

Fig. 10. キクバドコロ: A は全形圖 $\times 2/3$. B は横断面ルーベ圖。

Fig. 11. 横断檢鏡圖, A はキクバドコロ, B はカヘドコロ。

カヘドコロ *Dioscorea quinqueloba* Thunb.

實驗材料は 鹿兒島市内及び櫻島、長崎縣稻佐山、佐賀縣多良嶽に於いて自ら採集せる根莖を乾燥したるもの、並びにホルマリンに浸漬したるものを用ひたり。

形状 本品の外觀はタチドコロ及びキクバドコロに類するも、彼等の如く分岐する事少く、粗大なる縦皺を表し、皮部は鱗片狀に附着す (Fig. 12)。

構造 剖見するに、上皮は稀に残存するのみにして、通常薄壁性柎層 (Fig. 11: B の K) 之に代る。其柎細胞は大約 9 層にして、膜壁は黄褐色非薄にして波濤狀を呈し、孔斑を具有し胞間を表し、柎化反應を呈すれども、木化反應を表さず。次いで通常 8 層なるも多きは 20 層に及

ぶ略等徑性にして不整に配列せる杓細胞を以つて構成せらるる厚壁性杓層 (Fig. 11: B の K') あり, 該杓細胞の膜壁は餘り厚膜ならずして孔斑を有し胞間存在せず, 杓化反應は初生膜層に於いて特に強く, 木化反應は初生膜層のみに現る. 實體組織は大小不同, 不整の配列をなせる柔細胞よりなり, 外邊のものは觸線性方向に稍延長せり, 其膜壁は稍厚く孔斑を有し, ツェルローゼ反應を呈すれども, 初生膜層のみは木化反應を表す, 縦断面に於いて内方のものは長軸の方向に延長し先端少しく尖れり. 脈管束の配列の狀態並びに之を構成せる要素の種類, 性狀, 形狀及び配置の様式等, オニドコロの夫れと撰ぶ所なし.

Fig. 12. カヘドコロ:
A は全形圖×2/3.
B は横断面ルーペ圖.

内容物 澱粉粒 (Fig. 11: B の Sta) は柔細胞中に少量宛包藏せられ, 單粒又は複合粒にして, 其形橢圓形又は球圓形にして, 著明なる馬蹄形又は裂隙狀を呈する偏心性臍點を具有し, 層紋は不明なり, 而して大きさ單粒は $3-43\mu$, 複合粒は $19-31\mu$ なり, 脈管束鞘, 木細胞並びに纖維中に充填せるものは主として球圓形なる單粒にして, 其大きさ $5-22\mu$ なり. 油滴 (Fig. 11: B の Ot) は 5μ 内外にして球圓形をなし柔細胞中に汎く含有せらる. サボニンの反應も亦柔組織中に現る. 蓴酸石灰の束針晶 (Fig. 11: B の Kr) は稍大形となれる柔細胞中に通常長軸に沿ひて粘液中に嵌入せり, この粘液も亦ラフィーデン粘液にして, ヨードグリセリン, コラリン, コンゴローートにて

染色す. タンニン質は薄壁性杓層中に稀に顆粒狀をなして存在す. 尙ほホルマリン液浸標本の切片を検するに柔細胞中に淡黄色にして顆粒狀を呈する物質存在せり.

蓴蓴及ウチハドコロ *Dioscorea nipponica* Makino

實驗材料は東京市場に於ける生薬蓴蓴, 並びに群馬縣谷川岳山麓に於いて自ら採集せる根莖の乾燥せしものと及びホルマリン浸とせしものに依れり.

形狀 生薬蓴蓴 (Fig. 13: A) は通常長さ約 $8-9\text{cm}$ に切断し, 徑約 $0.6-0.9\text{cm}$ なり, 棒狀にして外面赤褐色乃至黒褐色を呈し, 略平行せる精粗種々なる縦皺を有す, 處々に地上莖 (Fig.

Fig. 13. ウチハドコロを原植物とせる市場品: A は全形圖×2/3. B は横断面ルーペ圖.

13: A の Stg) の殘基及び根癢 (Fig. 13: A の W) を着生せり。地上莖殘基の基部は隆起し、玆に數箇の小皿狀をなせる莖痕あり、其の凹面は赤褐色又は黄褐色にして脈管に因る數箇の突起輪列す。根癢は根莖長軸の方向に稍長き橢圓形の凹窪にして、之より通常約 0.1 cm の小突起突出せり、之根の内部の殘存せるものにして燒痕のため先端黑色を呈す。破折面は淡黄白色稍粗鬆にして殆んど平坦なり。香氣なく、味稍澁苦なり。

構造 ルーペに依りて横斷面を視ふに、袍層 (Fig. 13: B の Ks) は黒褐色にして處々剝離せり、内部 (Fig. 13: B の Gg) は淡黄白色又は帶褐黄色にして、黄色の脈管束 (Fig. 13: B の Gfb) 均等に分布し、脈管部を明視するを得、縦斷面にて脈管束は長軸に平行して存在する故、地上莖 (Fig. 13: B の Stg) 及び根 (Fig. 13: B の W) の分出部に於いてのみ縦斷面又は斜縦斷面として出現し、其周圍は一般に暗褐色を呈す。

顯微鏡を以つて檢するに、上皮は稀に壓縮せられて殘存するのみにして、横徑に延長し不規則に配列せる 3—6 層の袍細胞よりなる薄壁性袍層 (Fig. 14: K) 之に代る、其膜壁黄褐色にして稍厚く、孔斑並びに橫梁 (Fig. 14: Qb) を具有し胞間を現す、袍化反應は初生膜層に於いて特に強し、又屢々毛茸 (Fig. 14: H) を外部に突出するも其基部は往々深く袍細胞中に潛入す、該毛茸は根毛様の形態を具へズダン III にて染色し、往々分歧し稀に螺旋狀の肥厚をなす (Fig. 15)。更に其の内部には 1—3 層の厚壁性袍層 (Fig. 14: K') ありて實體組織を圍む。各袍細胞は略等徑性にして不規則に配列し胞間を具有し、膜壁淡黄色にして左程厚膜ならず、孔斑を有し、木化反應、袍化反應は共に初生膜層に於いて特に強し。厚壁性袍層と實體組織との境界面は往々袍生組織様の配列をなし、之より内方に續く數層の柔細胞は薄膜にして孔斑を有せず、ツェルローゼ反應を現し、胞間を有し

Fig. 14. ウチハドコロ: 横斷檢鏡圖, 説明本文中。

横徑に延長す、この部には脈管束を認めず。次いで略等徑性の柔細胞ありて之に連なる、其膜壁は極めて厚く孔斑を有し第二期膜層のみツェルローゼ反應を呈し、初生膜層のみ木化反應を表す、縦斷面に於いては稍長軸に延長し先端少しく尖れり。脈管束は總べて根莖外周の方向に篩管部の存在する側立性脈管束なれども、内部には通常 2—3 箇の脈管束相反する位置を取り、

原木部を共有し, 又は脈管束の側面に於いて癒合せるものを混在す。脈管束の周囲には一般柔細胞より口徑小にして稍強き木化反應を呈する壓扁せられたる細胞 (Fig. 14: Gbs) 存在す, 是所謂

Fig. 15. ウチハドコロ: 根莖の毛茸, 説明本文中.

脈管束鞘なり。尙ほ屢々篩管部の外方に纖維束 (Fig. 14: F) の發達せるを視る, 然れども根莖の外邊には脈管部のみよりなる脈管束嵌在す。脈管部と篩管部との接界面には直徑小にして稍強き木化反應を呈する木細胞 (Fig. 14: Hp) 介在し, 其接界面は平坦なるを常とすれども, 脈管部が凹面をなす事あり, 又木細胞が篩管部内に突入し, 甚だしきは之を左右に 2 分せるあり。脈管部は淡黃色を呈し光線を屈折し強き木化反應あり, 其の多くは上下, 縦横に稍規則正しく密に配列せる多角形の有縁孔紋脈管 (Fig. 16: Hgf) 及び橢圓形又は稍多角形にして, 不整且つ疎に配列せる有縁孔紋を有する擬脈管 (Fig. 16: Htr) にして, 擬脈管は脈管に比し口徑小にして短し,

尙ほ極めて稀に網紋脈管 (Fig. 16: Ngf) 混在す。原木部の脈管は常に螺旋紋脈管 (Fig. 16: Sgf) なり。木細胞 (Fig. 16: Hp) は縦斷面にてその隔壁稍傾斜すれどもわづかに長軸の方向に延長するのみ。篩管部は殆んど無色の細胞よりなり稍厚膜にして, 稀に木化反應を呈する部分を混有する事あり, 篩管 (Fig. 16: S) はその口徑稍大にして隔壁及び縦壁に篩板を有し, 或者にはカルス板を認め, 或者には之を認めず。伴存細胞 (Fig. 16: Gel) は直徑篩管より遙に小なり。脈

管束鞘(Fig. 16: Gbs)を形成せる柔細胞は、縦断面にて一般柔細胞とその形状大差なけれども、口径小にしてその隔壁稍傾斜する事により判別せらる。纖維(Fig. 16: F)は相集りて束状となり篩管部外方に存在し、口径小にして強く木化し、縦断面に於いて圓形又は橢圓形の單孔斑を現し、其の兩端は尖鋭なり。

Fig. 16. ウチハドコロ: 縦断檢鏡圖, 説明本文中.

内容物 澱粉粒(Fig. 14: Sta)は實體組織中に汎く含有せられるけれども、外邊の薄壁性柔細胞中にはその量少く、球圓形又は橢圓形の單粒にして、臍點及び層紋を認めず、 $2-22\mu$ の大きさを有す、又木細胞、脈管束鞘、纖維中に存在するものは、主として小形、球圓形なり。尙ほ市販生薬中に包含せらるるものは通常糊化せり。油滴(Fig. 14: Ot)は 5μ 内外にして汎く實體組織中に散在す。サボニンの反應は實體組織の外邊に於いて特に強く、グリセリンを媒介として檢鏡するに淡黄色の塊として認むべし。蓴酸石灰の束針晶(Fig. 14: Kr)は等徑性なる厚膜性柔細胞の外邊の稍大なる細胞中に存在し束幅 $22-72\mu$ にして周圍には粘液ありて之を包有す。この粘液も亦性質オドコロの夫れと同一なり。尙ほホルマリン液浸標本の切片を檢するに柔細胞中に淡黄色顆粒狀の塊狀物存在す。

蓴蓴及びニガガシュウ *Dioscorea bulbifera* L. f. *spontanea* (Makino)

福岡市の藥舗に於いて自ら購入せる蓴蓴及び緒方正資氏の惠與せられたる沖縄縣西表島産のもの、及び鹿児島縣櫻島、同縣屋久島、奈良縣上市町、静岡縣熱海、神奈川縣溝之口並びに東京府下五日市町にて自ら採集せる塊莖の乾燥品及びホルマリン液浸標本を用ひて鏡檢したり。

乾燥せる塊莖の外表面は赤褐色乃至黒褐色にして、粗大なる皺紋を現し多數の根(Fig. 17: W)を附著すれども、塊莖の底部(Fig. 17: B)は收縮して大なる凹窪となり少數の根を着生せるを

視る, 又上部 (Fig. 17: A) は著しく隆起して地上莖 (Fig. 17: A の Stg) に連り, 稍太き根を疎に附着し, 又その横面には前年の地上莖の附着せし痕 (Fig. 17: A の Stg') を認む. 尚ほ

Fig. 17. ニガガシユウ: 全形圖 $\times 2/3$.

膜壁は黒褐色を呈し菲薄にして孔斑を有し, 胞化反應を呈すれども, 木化反應を表さず. 之に次ぐ厚壁性胞層 (Fig. 18: K') も亦觸線性方向に著しく延長し不規則に配列せる 3—7 層の胞細胞よりなり, 其膜壁は淡黄色にして厚化し細長なる孔斑を具有し, 木化反應, 胞化反應は共に初生膜層に於いて特に強し. 然れども厚膜性及薄膜性兩胞細胞共に, 上下兩部に至るに従ひ略等徑性となり, 下面に於いては膜壁稍菲薄なり, 尚ほ縦斷面に於いては兩胞細胞は共に略等徑性なり. 實體組織の外邊に存する 3—4 層の柔細胞は通常觸線性方向に延長すれども, 内部に至るに従ひ漸次略等徑性の柔組織に移行す, 其の膜壁は稍厚く, 或る部分はツェルローゼ反應のみを呈すれども, 他の部分は木化反應のみを表す. 又處々に無色又は淡黄色の網目様 (Fig. 19: A) の膜質ありて澱粉粒を包圍す, この膜質は部分に因り木化反應又はペクチン質の反應の何れか一方のみを現す. 脈管束は總べて側立性脈管束にして全く秩序なく散在し, 其走向不規則なるを以つて或は横斷せられ, 或は縦斷せられて出現す, 脈管は其横斷面稍多角形にして, 主として螺旋紋 (Fig. 19: B の Sgf) 又は環紋 (Fig. 19: B の Rgf) の模様を有すれども, 稀に階紋 (Fig. 19: B の Trg) を表す, 脈管の周囲の柔細胞は一般柔細胞より少しく延長せり, 又纖維束を認めず,

澱粉粒 (Fig. 18: Sta, Fig. 19: C) は柔細胞中に充満し, 屢々網目様の膜質を以つて被包せ

福岡市にて購入せる市場品は砂中に貯へありし故, 東京にて移植しニガガシユウなる事をたしかむるを得たり.

剖見するに, 直徑約 2 cm の塊莖に於いても既に外部は剝離し, 薄壁性胞層 (Fig. 18: K) の一部分殘存するを視るのみにして, 塊莖の中部の横斷面に於いて, 其各胞細胞は觸線性方向に延長し不規則に配列し,

Fig. 18. ニガガシユウ: 横斷檢鏡圖, 説明本文中.

られ, 外邊の柔細胞中に包藏せらるるものは主として球圓形にして少量なれども, 一般に其形球圓形, 橢圓形, 馬蹄形等にして, 通常臍點並びに層紋は不明にして, 單粒又は通常 2 箇より

Fig. 19. ニガガシユ: A は柔細胞, B は脈管の縦斷檢鏡圖, C は澱粉粒, 説明本文中。

なる複合粒なり, 其大きさ單粒は 2—36 μ , 複合粒は 7—19 μ を算す。油滴 (Fig. 18 : Ot) は 5 μ 内外にして實體組織中に散在せり。又實體組織は總べてサボニンの反應を呈し, 澱粉粒の少き外方にては淡黄色の顆粒狀をなして存在するを視るべし。蓆酸石灰の束針晶 (Fig. 18 : Kr) は特に實體組織の外邊に多く存在して, ルテニウムロート, ヨードグリセリン, コンゴロート, メチレンブラウに染色する粘液中に嵌在し, 縦斷面, 斜縦斷面及横斷面として現る。ホルマリン液浸標本の切片を検するに, 柔細胞中には淡黄色にして不定形なる顆粒狀の團塊の沈着せるを認めたり。

略 字 解

Cut; 表皮膜. Ep; 上皮. Es; 土芽. F; 纖維. Gbs; 脈管束鞘. Gel; 伴存細胞. Gfb; 脈管束.
Gg; 實體組織. Grb; タンニン質. H; 毛茸. Hgf; 有緣孔紋脈管. Hp. 木細胞. Htr; 有緣孔紋環脈管.
K; 薄壁性細胞. K'; 厚壁性細胞. Kr; 蓆酸カルチウムの束針晶. Ks; 胞層. Ngf; 網紋脈管. Ot; 油滴.
Qb; 橫梁. Rgf; 環紋脈管. S; 篩管. Sch; 粘液. Sgf; 螺旋紋脈管. Spl; 篩板. Sta; 澱粉粒.
Stg; 地上莖. Stg'; 前年の地上莖痕. Tig; 階紋脈管. W; 根.