Durch Oxydation von Cholesterin nach der üblichen Methode wie Ruzicka und andere Forscher wurde trans-Dehydro-androsteron dargestellt. Dasselbe zeigt den Fp. 147° (korr). Durch Einwirkung von Benzyl-magnesiumchlorid auf dessen wasserfreie aetherische Lösung wurde $\Delta^{5,6}$ -Androsten-3, 17-diol-17-benzyl erhalten. Diese Substanz schmilzt bei 216° (korr) und bildet Nadeln der Zusammensetzung $C_{26}H_{36}O_2$. Dann wurde die Hydroxylgruppe der Stellung 3 des Dibromids dieser Verbindung durch Oxydation mit Chromsäure in Keton übergeführt; durch Entbromung wurde 17-Benzyl-testosteron hergestellt. Fp. 225° (korr.). Blättchen der Zusammensetzung $C_{26}H_{34}O_2$.

Was die physiologische Wirkung anbetrifft, so wurde beim Aufpinseln einer kleinen Menge 17-Benzyl-testosteron auf den Hahnenkamm ein deutlicher Kammwachstum festgestellt.

(Autoref.)

Untersuchungen über Saponine und Sterine. (VIII. Mitteilung) Über das Saponin aus der Wurzel von Dioscorea Tokoro Makino. (I. Teil).

von

K. FUJII und R. MATSUKAWA

[Aus der pharmaceutischen Hochschule zu Kyoto]

Vor langen Jahren hat Dr Honda zwei Saponine aus der Wurzel von Dioscorea Tokoro Makino gewonnen (Arch. exp. Pharmacol, Path. **51**, 221 (1904)), von denen das eine Kristalle vom Fp. 247-250° ($C_{24}H_{38}O_9$), während das andere, dem die Formel $C_{26}H_{38}O_{10}$ zukommt, amorph ist.

Auch wir haben aus dieser Wurzel wie Dr Honda ein Saponin nach üblicher Methode erhalten. Wir haben diesem amorphen Pulver, das in Wasser schäumt, den Namen Dioscorea-Saponin gegeben. Das durch Hydrolyse in 5% iger alkoholischer

Schwefelsäure entstandene Sapogenin (Dioscorea-Sapogenin) wurde in Petroläther aufgenommen und der Petroläther-Rückstand aus Methanol umkristallisiert. Durch Umkristallisieren aus verschiedenen Lösungsmitteln haben wir dieses Sapogenin in einigen Fraktionen getrennt, konnten aber aus jeder Fraktion nur dieselben Kristalle gewinnen.

Wahrscheinlich ist das eine der Hondaschen Saponine ein Ausgangssaponin, während das andere sog. Prosapogenin ist; es mag sein, dass beide Prosapogenine sind.

Das reine Dioscorea-Sapogenin löst sich in Äther, Petroläther und in allen anderen organischen Lösungsmitteln und kristallisiert aus Methanol in feinen Nadeln vom Fp. 198–200° (korr) und von der Zusammensetzung $C_{27}H_{43}(40)O_3$. Es hat eine Hydroxylgruppe und eine Doppelbindung. Dieses Sapogenin zeigt die Liebermannsche Phytosterinreaktion und analoge Farbreaktionen wie Cholesterin und andere Sterine, aber es ist nicht mit Digitonin fällbar. Die optische Drehung beträgt in Chloroform ($\alpha_D^{10} = -119,7^\circ$). Das mit Essigsäureanhydrid hergestellte Acetat schmilzt bei 190° (korr) und hat die Bruttoformel $C_{27}H_{41(38)}O_2 \cdot O \cdot COCH_3$. Das Benzoat schmilzt bei 237° (korr) und die Analyse stimmt mit der Formel $C_{27}H_{41(38)}O_2 \cdot O \cdot COC_6H_5$ überein. Das Dioscorea-Sapogenin addiert 1 Mol Brom in Eisessiglösung und bildet das Dibromid $C_{27}H_{42(40)}O_3Br_2$ vom Fp. 127° (korr. unter Zers). Die in Eisessiglösung mit Hilfe von Platinschwarz hydrierte Substanz (Dihydro-Dioscorea-Sapogenin) vom Fp. 190° (korr) und von der Zusammensetzung $C_{27}H_{44(42)}O_3$ wird in 95% iger alkoholischer Lösung mit Digitonin gefällt. Diese Dihydroverbindung enthält das Monoacetat $C_{27}H_{43(41)}O_2 \cdot O \cdot COCH_3$ vom Fp. 102° (korr). Aber das in Methanollösung unter Zusatz von Palladium-Magnesia hydrierte Produkt ist durch Digitonin nicht fällbar und hat die Zusammensetzung $C_{27}H_{44(42)}O_3$ vom Fp. 205° (korr) und wir haben es Epi-dihydro-Dioscorea-Sapogenin genannt. Dieses Acetat hat die Formel $C_{27}H_{43(41)}O \cdot O \cdot COCH_3$ (Fp. 206° (korr)).

検体量	検体中 Bi の含量	沈澱の重量	沈澱中 Bi の重量	誤差
Bi ₂ O ₃ 0.0392 g	0.03516 „	0.1910 „	0.03534 „	+0.00008
„ 0.0740 „	0.06638 „	0.3599 „	0.06660 „	+0.00022
„ 0.0928 „	0.08324 „	0.4511 „	0.08347 „	+0.00013
„ 0.0946 „	0.08486 „	0.4582 „	0.08479 „	-0.00003
„ 0.0516 „	0.04629 „	0.2502 „	0.04635 „	+0.00006

文 献

- 1) R. Berg und O. Wurm: Ber **60**, 1664 (1927).
- 2) Spacu und Suciu: Fr. **79**, 198 (1929).
- 3) G. Spacu und P. Spacu: Fr. **93**, 261 (1932).
- 4) Léger: Fr. **28**, 374 (1889).
- 5) Hecht und Reissner: Fr. **103**, 261 (1935).
- 6) Mannich und Krösche: Ar. **250**, 653 (1912).

サポニン類及びステリン類の研究 (第八報)

「おにどころ」のサポニンに就て (其一)

藤 井 勝 也

松 川 泰 三

(京都薬學専門學校)

(昭和 11 年 4 月 20 日受理)

K. Fujii und T. Matsukawa: Untersuchungen über Saponine und Sterine.

VIII. Mitteil.

Über das Saponin aus der Wurzel von Dioscorea Tokoro Makino. 1 Abteil.

おにどころ *Dioscorea Tokoro Makino* は薯蕷科 *Dioscoreaceae* に屬する多年生蔓草なり。嘗て本田氏 (京醫 **1**, 19. [明治 37 年]; Arch. exp. Pharmacol. Path. **51**, 221 [1904]) は本草の根をアルコール浸出する事により, Dioscin と稱する結晶性の Fp. 247-250°, C₂₄H₃₈O₉ のサポニンと *Dioscoreasapotoxin* なる無晶形の C₂₆H₃₈O₁₀ なるサポニンを抽出し, 其の生理的作用を詳細に報告せり。

著者等は本草のサポニンが, 植物學上其の部門を同じくする他の單子葉植物, 殊に百合科, 蘭科等によく發見せらるる, 所謂 Herz-glucosid と, 恰もデギタリス中のサポニンと Herz-glucosid

との如く、其の化學構造上密接な關係を有するに非ざるや、甚だ興味ある事と考へ本研究を開始せり。

先づ原料として東北地方にて採集せられたる、乾燥生藥を使用し、之を剉切して粗末となし、常法によりメタノールの溫浸出を行ひ浸出液を濃縮、純アルコール、エーテルを用ひてサポニン質のみを集む。此處に得たる粗サポニンは無晶形の黃色、吸濕性の粉末なり。エーテルには全く不溶。其の水溶液はよく泡沫を發す、

次に此の粗サポニンをアルコール溶液となし、5-10% の硫酸にて數十時間水浴上に煮沸し、加水分解を行ふ事により、サボゲニンを生成す。本品はエーテル、石油エーテルに可溶性にして全く zuckerfrei なり。之を種々の溶媒を用ひ分割結晶を行ふも常に同一の結晶のみを得たり。

想ふに本田氏の結晶性及び非結晶性の二種のサポニンは恐らく生體中同一物質なるも、其の製造行程中又は、植物の枯死せる後、其の有する Enzym の作用による、一部分、分解を起し生ぜしものなるべく。未だサポニンを純粹の状態に抽出し得ざれば、之を確定する能はざるも、現在著者等が研究中の或種の結晶性サポニン (近日發表の豫定) の如く、それを人工的に種々の状態にて分解を行はす事により、種々なる結晶性又は無晶形の所謂プロサボゲニンを生成する事實に鑑み、本田氏の二種のサポニンは、其の何れか一方が元のサポニンにして、他はその一部分、分解して生ぜしものなるか、又は共に、其の分子量の少さき點より考へ、一部分、分解して生ぜしプロサボゲニンなり、と推測し、敢て大過なかるべし。

著者等はサポニンを純粹に取り出し得ざるも、其の得たる無晶形の粉末に對し Dioscorea-saponin なる名稱を與ふ。Dioscorea-saponin に就ての研究は今後に譲り、これより加水分解して得たる Aglykon Dioscorea-sapogenin に就き報告す。

前述の如く Dioscorea-sapogenin は Dioscorea-saponin を加水分解する事により生成せるものにして、此の加水分解は非常に困難にして、5% 硫酸にて數時間沸騰を保たしむるも、其の一少部分のみ分解を受けるに過ぎず。更に酸を濃厚となし 10% にて分解を行へば反應は速に起るも樹脂様物質の生成するを以て、此の方法は不適なり。故に數回 5% 硫酸による分解を反覆し、粗 Dioscorea-sapogenin を得たり。

roh-Dioscorea-Sapogenin は一度之を石油エーテルにて溫浸を行ひ不溶性の物質を除去し、石油エーテル溜去、殘渣をメタノールより結晶に導く更に同溶媒より再結晶を反覆す。本品は美麗なる光澤を有する針狀結晶にして、エーテル、ペンツオール、石油エーテル、アルコール、メタノール等殆ど總ての有機溶媒に溶解す。アルコール溶液は全く中性にして、又 Oxim, Semicarbazon を構成せず。即ち Carbonylgruppe を有せず。Fp.=198-200° (korr.) にして、サルサ根のサボゲニン Sarsa-sapogenin (J. of Bio. Chem. 109, 573, 1935), デギタリス葉中の一サボゲニン Tigogenin (B. 68, 1412, 1935) の Fp. とよく類似す。[α]_D²⁰ = -119.7° にして

Sarsa-sapogenin の $[\alpha]_D^{18} = -76.5^\circ$, Tigogenin の $[\alpha]_D^{18} = -6.72^\circ$ とは何れも一致せず, 尙原素分析の結果其の數回の平均より $C_{27}H_{42}O_3$ なる組成式を以て最も充く説明し得べく, 本式は恰も Sarsa-sapogenin, Tigogenin の組成式 $C_{27}H_{44}O_3$ より水素2個又は4個少き式に相當す. リーベルマン氏のフィトステリン反應陽性なるも其の色調 Oleanolsäure, Hederagenin 等の如き5環性, オキシトリテルペン酸とは全く相異り, Cholesterin 其他の Sterin 類と同様の色調を現す. アルコール溶液中 Digitonin により沈澱を起さず Wijs 氏法により原子のヨードの消費せらるるを見たり. アルコール溶液中過マンガン酸カリを消費す. 本品のアルコール又は氷醋酸溶液中ブローム溶液を滴下すれば冷時直に約2原子に相當せる量を吸収す. 少量の水を加へ放置すれば針狀結晶析出す. メタノールより再結晶を行ふ. Fp. 127° (korr. unter Zers.) にして分析結果 $C_{27}H_{40}O_3Br_2$ 即ち Dibromid なり. 本品は其の氷醋酸溶液中亜鉛末にて脱ブロームを行へば元の Dioscorea-sapogenin に復歸す. 即ち1個又は數個の二重結合の存在を認む.

Dioscorea-sapogenin を常法により無水醋酸, 醋酸ソーダにてアセチル化を行へば Fp. 190° (korr.) の Monoacetat を生成す $C_{27}H_{41}O_2 \cdot O \cdot COCH_3$ なり. 又無水安息香酸にてベンツォイル化すれば $C_{27}H_{41}O_2 \cdot O \cdot COC_6H_5$ Fp. 237° (korr.) なる Monobenzoat を生ず. 即ち Sapogenin 中一個の水酸基の存在を認む. 他の2個の酸素の性状明らかならざるも恐らく橋狀に結合せるものなるべし.

Dioscoreasapogenin を氷醋酸に溶解し白金黒を觸媒として水素氣流中にて接觸還元を行ふに, 徐々に水素を吸収し, 約2原子に相等せる量を消費の後反應は止む. 白金黒を濾別し, 濾液を水中に注入, 析出せる物質をメタノールより結晶に導く, 再三同溶媒より再結晶を反覆するも融點は一定せず, 最初非常に不鋭敏に $140-150^\circ$ にて熔融し, 再結晶により徐々に Fp. は上昇するも常に不鋭敏なり, 尙又本物質はメタノール其他の有機溶媒に非常に易溶性にして, 再結晶による精製困難なり. 故に粗製のまま直に無水醋酸, 醋酸ソーダにてアセタートとなし, 反覆メタノールより再結晶を行ふ. Fp. 102° (korr.), の針狀結晶にして $C_{27}H_{43}O_2 \cdot O \cdot COCH_3 \cdot H_2O$ なり, Dihydrodioscorea-sapogenin-monoacetat に相當す. 本品をアルコール製苛性加里溶液にて數時間煮沸, 鹼化を行ひ, 冷水に注入, 析出物をメタノールより再三再結晶を行へば Fp. 190° (korr.) にて一定せる針狀の Dihydro-dioscorea-sapogenin, $C_{27}H_{44}O_3$ を得. 本品はアルコール又は氷醋酸溶液中全くブロームを吸収せず, 又過マンガン酸カリを消費せず. 即ち二重結合は水素により飽和せられたるを知る. 本物質の95% アルコール溶液にデギトニンのアルコール溶液を滴下し, 少時放置すれば沈澱を析出す.

Dioscorea-sapogenin をメタノールに溶解しパラジウム・マグネシヤを觸媒として水素氣流中にて接觸還元を行ふ. 約2原子の水素を吸収し反應を止む. 觸媒を除き, メタノール溶液を濃縮放置すれば結晶析出す. メタノールより再結晶を行ふ. 本品は Fp. 205° (korr.), $C_{27}H_{44}O_3$ (4.2)

にして、アルコール又は氷醋酸溶液中ブロームを吸収せず又 KMnO_4 を消費せず。即ち二重結合は全く水素により飽和せられたるなり。本品の 95% アルコール溶液にデギトニンのアルコール溶液を注入し暫時放置するも沈澱は起らず。又先に得たる Dihydro-dioscorea-sapogenin とは溶媒に対する性質全く相異なれり。今本物質に Epi-dihydro-dioscorea-sapogenin なる名称を與ふ。斯く二種のデヒドロ化合物體を生成せるを以て、其の構造上に著者等は種々なる推論を有せりと雖も實驗未だ不備のため之を論ずるは早計なりと考ふ。故に本報告に於ては唯絃上の事實を報告するに留む。

Epi-dihydro-dioscorea-sapogenin を無水醋酸にてアセチル化すれば Fp. 206° (korr.), $\text{C}_{27}\text{H}_{43}\text{O}_2 \cdot \text{O} \cdot \text{COCH}_3$ なる針狀結晶の Monoacetat を生成す。
(41)

實 験 の 部

I. Dioscorea-saponin

乾燥せる生藥を剉切粗末となし、朝比奈式浸出器に納めメタノールにて溫浸を行ふ。浸出液を濃縮エキス狀となし多量の冷アルコールを加へ析出せる物質を集め、減壓にて水分を除きアルコールを加へ煮沸して之に溶解し再三獸炭末にて脱色濾過、濾液を濃縮エーテルを加へ析出物を集め、速に減壓にて乾燥す。

本品は淡黄色の吸濕性を有する粉末にして、その水溶液はよく泡起す。

II. Dioscorea-sapogenin

粗サポニンを適量量の 60% アルコールに溶解し、5% に相當せる硫酸を加へ水浴上に 20 時間沸騰を保たしめ後減壓にてアルコールを約半量に迄濃縮し後水中に注入す。析出し來る物質を集め水洗、乾燥、粉末となし、浸出器に納め石油エーテルを以て溫浸を行ふ。浸出液を濃縮放置すれば結晶析出す。結晶を集め少量の石油エーテルにて洗滌後乾燥、メタノールより數回再結晶を行ふ。本品は Fp. $198-200^\circ$ (korr.) の美麗なる針狀結晶にしてエーテル、石油エーテル、アルコール、クロロホルム等殆ど總ての有機溶媒に可溶性なり。

リーベルマン氏反應：最初赤褐色を呈し微に青色を帯び後、褐色、茶褐色を経て汚褐色となりて褪色す。

分析 (I)	物質; 3,733 mg,	CO_2 ; 10,777 mg,	H_2O ; 3,235 mg,	C% 78,73:	H% 9,70
(II)	„ ; 3,470 mg,	„ ; 10,000 mg,	„ ; 2,964 mg,	„ 78,59:	„ 9,56
(III)	„ ; 3,251 mg,	„ ; 9,355 mg,	„ ; 2,816 mg,	„ 78,41:	„ 9,69
	$\text{C}_{27}\text{H}_{42}\text{O}_3$ とすれば	C% 78,20,	H% 10,21	M.-G.=414,3	
	$\text{C}_{27}\text{H}_{40}\text{O}_3$ とすれば	„ 78,58,	„ 9,77	„ =412,3	

分子量測定 (ラスト氏法)

物質; 3,50 mg, カンフル; 34,50 mg, Δ ; $10,5^\circ$ $\therefore$ M.-G.=386,5

二重結合の測定

物質 0,1000 g をクロロホルム 10 cc に溶解し Wijs 氏液 10 cc を加へ室温 (10°) に 24 時間放置の後 10% KJ 液 10 cc, 水 20 cc を加へ $N/10 Na_2S_2O_3$ ($F=0,986$) にて滴定を行ふに 13,3 cc を要せり. 尙盲検にて $Na_2S_2O_3$ 液 23,9 cc を消費せり.

故に $J. Z.=132,6$

旋光度測定

物質 142 mg を 10 cc クロロホルムに溶解し, 1 dm 管を用ひて測定. $\alpha_D^{10} = +1,7^\circ$ ($\alpha_D^{10} = -119,7^\circ$)

III. Dioscorea-sapogenin-monoacetat.

Sapogenin 0,2 g を無水醋酸 1 cc に溶解し醋酸ソーダ 0,2 g 加へアスベスト銅網上に 2 時間沸騰を保たしめ, 冷後約倍量の冷水を注加し, 放置すれば結晶析出す. 結晶を集め充分水洗, 乾燥しメタノールより反覆再結晶を行ふ. 本品は $Fp. 190^\circ$ (korr.) の針狀結晶なり.

リーベルマン氏反應: 初め淡赤褐色を現はし, 次第に汚赤色となり後赤味を失ひ汚褐色となりて褪色す.

分析 物質;	3,457 mg,	CO_2 ;	9,661 mg,	H_2O ;	2,836 mg,	C%	76,22:	H%	9,33
	$C_{27}H_{41}O_3 \cdot COCH_3$	とすれば				C%	76,26:	H%	9,71
	$C_{27}H_{39}O_3 \cdot COCH_3$	とすれば				„	76,60:	„	9,31

IV. Dioscorea-sapogenin-monobenzoat.

Sapogenin 0,3 g をアセチルコルペンに取り無水安息香酸 1,5 g を加へ金屬浴中に 140–150° に 2 時間保たしめ, 冷後結晶塊に少量の冷水を加へ, 一夜放置し過剰の無水安息香酸を完全に分解せしめ, エーテルを加へ充分振盪, エーテルに移行し水洗後カリ濾液にて洗滌, 充分水洗, 乾燥後エーテルを餾去す. 残渣をメタノールに溶解, 脱色, 精製, 濃縮, 放置すれば結晶析出す. メタノールより再結晶を行ふ. $Fp. 237^\circ$ (korr.) の無色針狀晶なり.

リーベルマン氏反應: 淡汚赤色を呈し暫時色調を失ひ遂に褪色す.

分析 物質;	3,490 mg,	CO_2 ;	10,049 mg,	H_2O ;	2,759 mg	C%	78,54:	H%	8,97
	$C_{27}H_{41}O_3 \cdot COC_6H_5$	とすれば				C%	78,70	H%:	8,95
	$C_{27}H_{39}O_3 \cdot COC_6H_5$	とすれば				C%	79,01	H%:	8,59

V. Dihydro-dioscorea-sapogenin-monoacetat

0,2 g のサポニンを 30 cc の氷醋酸に溶解し白金黒を觸媒として, 水素氣流中にて振盪を行ふ. 徐々に水素は吸収せられ, 約 10 cc 吸収の後反應は止む. 約 20 時間を要せり. 白金黒を濾別し, 濾液に水を注加す. 析出せる物質を集め水洗, 乾燥, メタノールに溶解, 脱色, 濃縮放置すれば微細なる針狀結晶析出す. 再三メタノールより再結晶を反覆するも $Fp.$ は不鋭敏にして

一定せず 尙メタノール其他の有機溶媒に易溶性にして精製困難なり。故に直に之に無水醋酸を加へ砂浴上に数時間煮沸し冷後析出し来る結晶を集め水洗, 乾燥メタノールより反覆再結晶を行ひ針狀の Fp. 102° (korr.) のモノアセタートを製せり。

リーベルマン氏反應: 最初淡青色を現し, 暫時赤色を帯び淡青紫となり, 後淡青色となり褪色す。

分析 物質; 3,612 mg,	CO ₂ ; 10,065 mg,	H ₂ O; 3,203 mg,	C% 76,01:	H% 9,92
C ₂₇ H ₄₃ O ₃ ・COCH ₃ とすれば			C% 75,92	H% 10,12
C ₂₇ H ₄₁ O ₃ ・COCH ₃ とすれば			C% 76,26	H% 9,71

VI. Dihydro-dioscorea-sapogenin

上述の Dihydro-genin-acetat (可及的純粹なるもの) 0,1 g を 1% アルコール製カリ滴液 10 cc に溶解し, 水浴上に一時間沸騰を保たしめ, 冷後, 水少量を加へ析出し来る物質を濾集し, 稀アルコールにて洗滌後, 充分水洗, 乾燥を行ひ, メタノールに溶解, 獸炭にて精製, 濃縮放置すれば結晶析出す。メタノールより再結晶を行ふ。Fp. 190° (korr.) の針狀結晶にして有機溶媒の殆どに易溶性なり。本品のアルコール又は氷醋酸溶液はブローム及 KMnO₄ を消費せず。デギトニンにより沈澱す。

リーベルマン氏反應: 初め淡青紫色を呈し, 後淡汚赤色に變じ淡褐色を経て褪色す。

分析 物質; 3,629 mg,	CO ₂ . 10,456 mg,	H ₂ O; 3,351 mg,	C% 78,58	H% 10,33
C ₂₇ H ₄₄ O ₃ とすれば			C%: 77,82	H%: 10,64
C ₂₇ H ₄₂ O ₃ とすれば			C%: 78,20	H%: 10,21

VII. Epi-dihydro-dioscorea-sapogenin

Dioscorea-sapogenin を適當量のメタノールに溶解し, パラジウムマグネシヤを加へ水素氣流中に振盪を行ふ。約 2 原子の水素を吸収し反應は止む。次に觸媒を濾別し, 濾液を濃縮放置すれば結晶析出す。メタノールより再溶晶を行ふ。Fp. 205° (korr.) の針狀結晶なり。そのアルコール溶液はデギトニンにより沈澱を生ぜず。又 Brom, KMnO₄ を消費せず。

リーベルマン氏反應: 最初淡黄褐色を示し暫時にして淡汚黄色となり後褪色す。

分析 物質; 3,444 mg,	CO ₂ ; 9,821 mg,	H ₂ O; 3,123,	C% 77,77	H% 10,15
C ₂₇ H ₄₄ O ₃ とすれば			C%: 77,82	H% 10,64
C ₂₇ H ₄₂ O ₃ とすれば			C%: 78,20	H% 10,21

VIII. Epi-dihydro-dioscorea-sapogenin-monoacetat

上述の Epi-dihydro-genin を常法により無水醋酸にてアセチル化を行ふ。メタノールより再結晶を行ふ。Fp. 206° (korr.) の針狀結晶なり。

リーベルマン氏反應: 初め淡黄色を呈し次第に淡汚黄色となり徐々に褪色す。

分析 物質; 3,381 mg,	CO ₂ ; 9,424 mg,	H ₂ O; 3,035 mg,	C% 76,02	H% 10,02
	C ₂₇ H ₄₃ O ₃ ·COCH ₃ とすれば		C%: 75,92	H% 10,12
	C ₂₇ H ₄₁ O ₃ ·COCH ₃ とすれば		C%: 76,26	H% 9,71

IX. Dioscorea-sapogenin-dibromid

サポゲニン 0,5 g を氷醋酸 50 cc に少しく加温溶解し, 冷後振盪しつつ 0.2 g のブロームを 10 cc の氷醋酸に溶解せる液を tropfenweise に加ふ, ブロームは直に脱色せらるるを見る。ブロームの吸収殆ど止り, 少しく黄色を残す程度となれば之に少量の水を加へ放置すれば結晶析出す。本結晶を集め, 少量の氷醋酸にて洗滌, 苛性加里乾燥器中に乾燥後メタノールより再結晶を行ふ。Fp. 127° (korr. unter Zers.) の針狀結晶なり。

リーベルマン氏反應: 最初褐色を呈し暫時汚黄褐色となり長く其の色調を保ち徐々に褪色す。

分析 物質, 3,985 mg,	CO ₂ ; 8,262 mg,	H ₂ O; 2,547 mg,	C% 56,54	H% 7,15
	C ₂₇ H ₄₂ O ₃ ·Br ₂ とすれば		C%: 56,44	H%: 7,37
	C ₂₇ H ₄₀ O ₃ ·Br ₂ とすれば		C%: 56,63	H%: 7,05

(稿於京都藥專生藥學教室)