Die beide Phosphorsäureester sind schwer löslich in Wasser und meisten organischen Lösungsmitteln; löslich in Alkalien. Sie zeigen die blaue Farbenreaktion durch Salpeterschwefelsäure.

(Autoref.)

Die Friedel-Craftssche Reaktion auf o-Alkyloxydiphenyläther.

von

Masao TOMITA

[Aus dem chemischen Laboratorium „Itsuu“, Tokio.]

(Eingegangen am 16. März 1936)

Vor einiger Zeit hat der Verfasser gezeigt, dass bei der Kondensation von 2 Mol. Chloracetylchlorid oder Acetylchlorid mit 2-Methoxy-diphenyläther oder 2,2'-Dimethoxydiphenyläther im Gegenwart von Aluminiumchlorid die Stellungen der substituierten Chloracetyl- (od. Acetyl-) -reste nicht in 4,4' (vgl. O. v. Schickh, D. R. P. 492321; C. 1929 II, 1430) sondern in 5,4' (I) bzw. 5,5' (II) bevorzugt sind (vgl. M. Tomita, diese Zeitschrift, Vol. 54, 897 [1934]; C. 1935 I, 1054); d. h. die Methoxylgruppe und die Chloracetyl- (od. Acetyl-) -gruppe in para-Stellungen gebunden sind.

Kürzlich hat Otto v. Schickh (B. 69, 242 [1936]) darüber eine Bemerkung veröffentlicht, worin er nicht nur meine Berichtigung anerkennt, sondern das 4,4'-Dichloracetyldiphenyläther aus Diphenyläther durch Chloracetylchlorid dargestellt hat.

Nun wurde es vom Verfasser untersucht, auf 2-n-Propyloxy- (IIIa) bzw. 2-iso-Amyl-

oxy-diphenyläther (IIIb) die Friedel-Craftssche Reaktion anzuwenden. Dabei erhält man auch auf dieselbe Weise wie bei den Methoxy-diphenyläthern das 2-n-Propyloxy- (IVa) bzw. das 2-iso-Amyloxy-5,4'-diacetyl-diphenyläther (IVb).

Die Konstitutionen derselben wurden durch Oxydation mit Unterchlorigensäure als die entsprechenden 2-Alkyloxy-diphenyläther-5,4'-dicarbonsäure (V) nachgewiesen, indem diese mit den auf anderem Wege synthetisierten Dicarbonsäuren verglichen wurden.

So ist es sichergestellt, dass das früher vom Verfasser angegebene Satz auf Methoxy-diphenyläther bei der Friedel-Craftsschen Reaktion weiterhin auf allgemeinen Alkyloxy-diphenyläther ausgedehnt werden kann.

Die physikalischen Konstanten der vom Verfasser dargestellten noch nicht in der Literatur angegebenen Verbindungen ergeben sich in folgender Tabelle.

	R = CH ₃ CH ₂ CH ₂ -	R = $\begin{matrix} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \end{matrix} > \text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{-}$
Farblose Flüssigkeit K ₃ 128-131° C ₁₅ H ₁₆ O ₂	Farblose Flüssigkeit K ₃ 145-6° C ₁₇ H ₂₀ O ₂
Farblose Nadeln K ₂ 203-5°; Fp. 99° C ₁₉ H ₂₀ O ₄	Farblose Blättchen K ₂ 227-230°; Fp. 56-9° C ₂₁ H ₂₄ O ₄
Disemicarbazon	Farblose Prismen Fp. 205° u. Zers. C ₂₁ H ₂₆ N ₆ O ₄	Farblose Prismen Fp. 192° u. Zers. C ₂₃ H ₃₀ N ₆ O ₄
Farblose lange Prismen Fp. 237° C ₁₇ H ₁₆ O ₆	Farblose Nadeln Fp. 230-1° C ₁₉ H ₂₀ O ₆

(Autoref.)

物質: 3.636 mg.	CO ₂ : 9.211 mg.	H ₂ O: 1.726 mg.	C: 69.09%	H: 5.32%
C ₁₄ H ₁₂ O ₄ として理論數			C: 68.8%	H: 4.9%

(5) 1,5-Dioxy-3,7-dimethyl-diphenylendioxyd 酸性磷酸エステル.

Dioxy 化合物 0.5 g, 酸鹽化磷 10 g, 五鹽化磷 0.05 g, Chinolin 0.1 g を加へて直火にて煮沸すれば遂に褐色油狀物質を析出す。反應時間 3 時間。反應成績體は酸鹽化磷の過剰を減壓にて蒸溜し去れば殘渣は油狀物質をなす。冷却すれば固化す。之を更に 10 cc の水と水浴上に 80-90° にて 30 分間加熱して Chlorid を分解すれば褐色樹脂狀物質を析出す。これを冷所に放置すれば淡褐色柱狀結晶となる。Fp. 198°。一般有機溶媒に難溶にして水に不溶、苛性アルカリ、炭酸アルカリに可溶なり。ハロゲンを含まず。硫酸によりて青色を呈す。得量 0.7 g.

分析:—

物質: 0.1102 g. $\text{Mg}_3\text{P}_2\text{O}_7$: 0.0608 g. P: 15.38%
 $\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{O}_{10}\text{P}_2$ として理論數 P: 15.37%

o-Alkyloxy-diphenyläther に対する
Friedel-Crafts 反應に就て

富田 真雄

(乙 卯 研 究 所)

(昭和 11 年 5 月 16 日受理)

Masao Tomita: Die Friedel-Craftssche Reaktion auf
o-Alkyloxy-diphenyläther.

2-Methoxy-diphenyläther (I) 或は 2,2'-Dimethoxyd-phenyläther (III) に対して AlCl_3 の存在の下に 2 分子の Acetylchlorid 或は Chloracetylchlorid を作用せしむる時は 2-Methoxy-4,4'-diacetyl-(或は-dichloracetyl)-diphenyläther 及び 2,2'-Dimethoxy-4,4'-diacetyl-(或は-dichloracetyl)-diphenyläther を生ずるとの Otto v. Schickh の報告 (D. R. P. 492321; C. 1929 II, 1430) は誤りにして生成物質は 2-Methoxy-5,4'-diacetyl-(或は-dichloracetyl)-diphenyläther

(II) 及び 2,2'-Dimethoxy-5,5'-diacetyl-(或は-dichloroacetyl-)-diphenyläther (IV) なることの正しきこと即ち Methoxy-diphenyläther に於てはその Methoxyl 基の *para* に置換基なきときは acetyl 基は Phenoxy を形成する橋狀酸素の *para* に結合せずして Methoxy 基の *para* に結合せる Diacetyl 誘導體を生ずる事實はすでに著者の各 Acetyl 誘導體を酸化してその對應する酸となしその置換位置を證明決定せるところなり (本誌, Vol. 54, 897 [1934]; C, 1935 I, 1054),

又 Diphenyläther に AlCl_3 の存在の下に Acetylchlorid を作用せしめて本反應を行ふときは 4,4'-Diacetyl-diphenyläther を生ずることもすでに W. Diltthey, H. Bath, H. Grünter und H. Hansdörfer (J. prakt. Chem. [2] 117, 337 [1927]) によりて證明せられたり。

更に最近 Otto v. Schiekh (B. 69, 242 [1936]) は著者に Bemerkung を寄せ Diphenyläther に Chloracetylchlorid を作用せしむる時も 4,4'-Dichloroacetyl-diphenyläther を生ずることを證明し、同時に著者がさきに Methoxy-diphenyläther に對して同反應を行ひたる場合の彼の誤謬を訂正したるに對し承認の意を表せり。

著者は更に或る合成の目的のために (V) 或は (VI) なる型式の化合物を得んと欲し R を

Methyl 以外の更に炭素数多き Alkyl 基即ち *n*-Propyl 或は *iso*-Amyl 等にかへたるもの即ち *o*-Alkyloxy-diphenyläther に對して Friedel-Crafts 反應を行ひしも何れも Methoxyl 基の場合と同様 Phenoxy の *para* に置換せずして Alkyloxy の *para* に結合することを認めたるを以て前報の補遺としてここに報告する次第なり。

終りに臨み恩師近藤教授の終始懇篤なる御指導を謹謝す。

	$R = -CH_2CH_2CH_3$	$R = -CH_2CH_2CH \begin{smallmatrix} CH_3 \\ CH_3 \end{smallmatrix}$
無色液體 K ₃ 128-131° C ₁₅ H ₁₆ O ₂	無色液體 K ₃ 145-6° C ₁₇ H ₂₀ O ₂
無色針狀結晶 K ₂ 203-5°; Fp. 99° C ₁₉ H ₂₀ O ₄	無色菊花狀板狀結晶 K ₂ 227-230°; Fp. 56-9° C ₂₁ H ₂₄ O ₄
Disemicarbazon	無色柱狀結晶 Fp. 205° u. Zers. C ₂₁ H ₂₆ N ₆ O ₄	無色柱狀結晶 Fp. 192 u. Zers. C ₂₃ H ₃₀ N ₆ O ₄
無色長柱狀結晶 Fp. 237° C ₁₇ H ₁₆ O ₆	無色針狀結晶 Fp. 230-1° C ₁₉ H ₂₀ O ₆

— 36 —

(2) 2-*n*-Propyloxy-5,4'-diacetyl-diphenyläther.

2-*n*-Propyloxy-diphenyläther 3 g, Acetylchlorid 3.5 g を硫化炭素 10 cc に溶解せるものを冷却しつつ AlCl_3 6 g 中へ滴下す。冷時に於ては反應し難く少しく水浴上に加温すれば烈しく鹽酸瓦斯を放ちて反應す。30 分の後氷片を投入分解しここに析出する黄色樹脂狀物質をクロロホルムにて抽出す。クロロホルム溶液は脱水乾燥後溶媒を去り殘渣を減壓蒸溜に附す。2-*n*-Propyloxy-5,4'-diacetyl-diphenyläther は K_2 203-5° にて蒸溜する粘稠性無色液體にして放置すれば結晶固化す。メタノールより無色針狀結晶として得られ Fp. 99° なり。本物質は苛性アルカリに不溶、濃硫酸に依りて橙黄色を呈す。

元素分析:—

物質: 3.538 mg.	CO_2 : 9.494 mg.	H_2O : 2.240 mg.	C: 73.19%	H: 7.08%
$\text{C}_{19}\text{H}_{20}\text{O}_4$ として理論數			C: 73.1%	H: 6.4%

Disemicarbazon.

物質 0.05 g, Semicarbazidhydrochlorid 0.1 g, 醋酸ソーダ 0.15 g をアルコール 3 cc に溶解せしめ 2 時間水浴上に加温反應せしむ。冷後溶媒を蒸溜し去り水を加ふれば結晶を析出す。更にメタノールより再結晶すれば Fp. 205° u, Zers. の無色柱狀結晶を得。

元素分析:—

物質: 3.286 mg.	N: 0.595 cc (755.7 mm, 28°C)	N: 20.02%
$\text{C}_{21}\text{H}_{26}\text{N}_6\text{O}_4$ として理論數		N: 19.72%

(3) 2-*n*-Propyloxy-5,4'-diacetyl-diphenyläther の酸化 (2-*n*-Propyloxy-1,1'-diphenyläther-5,4'-dicarbonsäure の生成),

物質 0.1 g を Chlorkalk 飽和水溶液 10 cc に浮遊せしめ置き炭酸ソーダ少量を加へ水浴上に 15 時間加熱反應せしむ。時々 Chlorkalk を追加す。反應成績體は鹽酸々性となしここに析出する沈澱を 5% 炭酸ソーダに溶解し更に鹽酸々性となす。沈澱を濾過乾燥之をメタノールより再結晶すれば Fp. 237° の無色長柱狀結晶を得。

本物質を後述合成せる 2-*n*-Propyloxy-diphenyläther-5,4'-dicarbonsäure Fp. 237° と混融するにその融點降下せず同一物質なるを知る。

元素分析:—

物質: 2.992 mg.	CO_2 : 7.010 mg.	H_2O : 1.514 mg.	C: 63.90%	H: 5.66%
$\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{O}_6$ として理論數			C: 64.5%	H: 5.1%

(4) 2-Oxy-diphenyläther-5,4'-dicarbonsäure.

2-Methoxy-diphenyläther-5,4'-dicarbonsäure の脱メチル化に依る。(本誌, Vol. 48, 670 昭和三年; Vol. 50, 1042 昭和五年),

最も得量よき方法次の如し。即ち物質 3.5 g ブローム水素酸氷醋 15 cc を閉管中 150° にて 1.5 時間反應せしむ。冷後析出する結晶をメタノールより再結晶す。Fp. 280-5° の無色長柱狀結晶なり。得量 3 g.

(5) 2-*n*-Propyloxy-diphenyläther-5,4'-dicarbonsäure.

カリウム 0.43 g をメタノール 5 cc に溶解し (4) の物質 1 g を加へ溶媒を蒸發乾涸す。更に *n*-Propyljodid 2 g を加へ 120° の油浴中に 2 時間反應せしむ。反應成績體は乾涸せしめた後 *n*-酒精製加里 20 cc を加へ 1.5 時間加熱鹼化する。次に溶媒を蒸溜し去り殘渣を水に溶解し鹽酸々性となしここに析出する沈澱をメタノールより再結晶すれば 2-*n*-Propyloxy-diphenyläther-5,4'-dicarbonsäure は Fp. 236-7° の無色長柱狀結晶として得らる。

(II) 2-Isoamyloxy-diphenyläther に Acetylchlorid の作用.

(1) 2-Isoamyloxy-diphenyläther.

カリウム 2.1 g をメタノール 20 cc に溶解せしめ 2-Oxy-diphenyläther 10 g を加へたる後溶媒を減壓にて蒸溜乾涸、次に Isoamyljodid 11 g を加へ 120-130° の油浴中に 3 時間反應せしむ。反應成績體は 2-*n*-Propyloxy-diphenyläther の場合と同様に處分して K₂ 145-6° の無色液體として 2-Isoamyloxy-diphenyläther 10 g を得たり。

元素分析:—

物質:	4.277 mg.	CO ₂ :	12.438 mg.	H ₂ O:	3.170 mg	C:	79.33%	H:	8.29%
	C ₁₇ H ₂₀ O ₂ として理論數					C:	79.7%	H:	7.8%

(2) 2-Isoamyloxy-5,4'-diacetyl-diphenyläther.

2-Isoamyloxy-diphenyläther 3 g, Acetylchlorid 3 g を硫化炭素 10 cc に溶解せしめ置き AlCl₃ 5.3 g 中へ滴下す。30 分加温反應せしむ。冷後水を加へて分解、クロロホルムにて抽出す。脱水後溶媒を去り殘渣を減壓蒸溜に附す。K₂ 227-230° の無色粘稠性液體を得。本物質は放置すれば結晶固化す。Fp. 56-5° 苛性アルカリに不溶、濃硫酸に依りて橙黄色を呈す。

元素分析:—

物質:	3.503 mg	CO ₂ :	9.452 mg	H ₂ O:	2.412 mg	C:	73.60%	H:	7.70%
	C ₂₁ H ₂₄ O ₄ として理論數					C:	74.1%	H:	7.1%

Disemicarbazon.

物質 0.05 g Semicarbazidhydrochlorid 0.1 g, 醋酸ソーダ 0.15 g をアルコール溶液となし 2 時間水浴上に加温反應せしむ。メタノールより無色柱狀に結晶する Disemicarbazon を得。Fp. 192° u. Zers.

元素分析:—

物質:	2.815 mg.	N:	0.455 cc (755.8 mm, 28°C)	N:	17.87%
	C ₂₁ H ₃₀ N ₆ O ₄ として理論數			N:	18.50%

(3) 2-Isoamyloxy-5,4'-diacetyl-diphenyläther の酸化.

(2-Isoamyloxy-diphenyläther-5,4'-dicarbonsäure の生成).

物質 0.1 g を常法によりアルカリ性にて Chlorkalk にて酸化すればメタノールより無色針状に結晶する Fp. 230-1° の酸を得たり. 本物質を後述合成の 2-Isoamyloxy-diphenyläther-5,4'-dicarbonsäure と混融するにその融點降下せず同一物質なり.

元素分析:—

物質: 3.236 mg.	CO ₂ : 7.826 mg.	H ₂ O: 1.790 mg.	C: 65.96%	H: 6.19%
C ₁₉ H ₂₀ O ₆ として理論數			C: 66.3%	H: 5.8%

(4) 2-Isoamyloxy-diphenyläther-5,4'-dicarbonsäure.

2-Oxy-diphenyläther-5,4'-dicarbonsäure をカリウム 0.43 g をメタノール 5 cc に溶解せるものに加へ減壓にて溶媒を去り殘渣に Isoamyljodid 2.3 g を加へて 120-130° の油浴中に 2 時間反應せしむ. 反應成績體は *n*-酒精製加里 20 cc にて鹼化すれば 2-Isoamyloxy-diphenyläther-5,4'-dicarbonsäure は Fp. 230-1° の無色針狀結晶として得らる.

Benzhydrylamin 及び Benzyl-phenäthyl- amin 系化合物の局所麻醉性と構造 との關係について (第一報)

緒 方 章
新 延 信 吉

(岐阜藥學專門學校)

(昭和 11 年 6 月 1 日受理)

本研究の一部は東京帝國大學醫學部藥學科臟器藥品

化學教室に於て行つたものである.

化學構造と局所麻醉性との關係については從來幾多の研究が行はれたが今尙色素に於ける Chromophor, Chromogen, Auxochrom 等の如き明快な説明がない. 其の原因の一は從來この方面の研究の對照となつた化合物は殆ど全部が炭素水素酸素窒素よりなり夫等原子殊に酸素が種々雜多な型式で分子構成に與つてゐるため, 局所麻醉性發顯の原因を探究するに當つて考慮すべ