Journal of the Pharmaceutical Society of Japan

VOLUME 56

September 1936

NUMBER 9

Untersuchungen über Sterine. III. Mitteil. Ueber das Vinyl-und Allyl-testosteron.

von

S. KUWADA und M. YAGO

(Vgl. I. Mitteil. Die Chromsäureoxydation von epi-Dihydrocholesterinacetat.

Über die epi-Oxy-allocholansäure. Diese Ztschr. Bd. 55, S. 183 (1935)

II. Mitteil. Eine neue Oxydationsprodukt von Dibromcholesterinacetat.

Über 3-Oxy- $\Delta^{5,6}$ -ätiobiliensäure. Diese Ztschr. Bd. 56, S. 14 (1936)).

(Aus dem Wissenschaftlichen Laboratorium des Firma Takeda-chobei, Osaka)

[Eingegangen am 1. July, 1936]

Von den kürzlich dargestellten Testosteronderivaten: Methyltestosteron nach Ruzicka (Helv. 18, 1487 [1935]), Aethyltestosteron nach Butenandt (B. 69, 448, 882 [1936]) und Benzyltestosteron nach Fujii und Matsukawa (Diese Ztschr. 650, 224 [1936]) besitzt das Methylderivat die stärkste, physiologische Wirksamkeit, ja bei Samenblasentest der Ratten stärker als das Testosteron selbst. Aber es scheint, dass das Aethyltestosteron viel schwächer als das Methyltestosteron oder Testosteron wirkt. Es fehlt die genaue Beschreibung über die Wirksamkeit des Benzyltestosterons, aber man kann vermuten, dass je grösser die Seitenkette am C_{17} des Testosterons desto schwächer wirkt.

Es schien uns nun von Interesse den Einfluss einer ungesättigten Seitenkette an derselben Stellung des Testosteron zu prüfen.

Durch Einwirkung von Vinyl-, sowie von Allyl-magnesiumbromid auf trans-Dehydroandrosteron in absolutem Aether wurde das 17-Vinyl-(bzw. Allyl-) $\Delta^{5,6}$ -androstendiol-(3,17) dargestellt.

Die Tetrabromide der beiden Diolverbindungen wurden mit Chromsäureanhydrid bei Zimmertemperatur oxydiert, das Oxydationsprodukt noch einmal im Eisessig gelöst und mit Zinkstaub entbromiert.

Das so resultierende 17-Vinyltestosteron ist von dem nach Butenandt dargestellten 17-Aethyltestosteron verschieden, indem es bei der Mischprobe eine deutliche Schmp.-Depression beobachten lässt.

Mit der 17-Vinyl- und 17-Allyl-testosteron wurden die physiologische Auswertung nach Korenchevsky (Samenblasentest der Ratten) durchgeführt. Vorläufig haben wir gefunden dass beiden Testosteronderivaten eine Ratten-Einheit von 30-40 γ zuzuschreiben ist.

17-Vinyl- $\Delta^{5,6}$ -androstendiol-(3,17), $C_{21}H_{32}O_2$, Fp. 148-149° (korr.), Nadeln aus Hexan.

„ -monoacetat, $C_{23}H_{34}O_3$, Fp. 167-169° (korr.), Nadeln aus Hexan.

17-Vinyltestosteron, $C_{21}H_{30}O_2$, Fp. 168,5-670,5° (korr.), Tafeln aus Aceton-Hexan.

17-Aethyl- $\Delta^{5,6}$ -androstendiol-(3,17), $C_{21}H_{34}O_2$, Fp. 200,5-201,5° (korr.), Nadeln aus Methanol.

Mischschmelzpunkt mit 17-Vinyl- $\Delta^{5,6}$ -androstendiol-(3,17) liegt bei 160-170°,
sintert ungefähr bei 130°.

17-Aethyltestosteron, $C_{21}H_{32}O_2$, Fp. 136-137° (korr.), feine Nadeln aus Hexan.

Mischschmelzpunkt mit 17-Vinyltestosteron liegt bei 113° (unkorr.).

17-Allyl- $\Delta^{5,6}$ -androstendiol-(3,17), $C_{23}H_{34}O_2$, Fp. 153-154,5° (korr.), Tafeln aus Aether.

„ -monoacetat, $C_{24}H_{36}O_3$, Fp. 154-156° (korr.), flache Tafeln aus Hexan.

17-Allyltestosteron, $C_{23}H_{32}O_2$, Fp. 150-153° (korr.), feine Nadeln aus Aether.

(Autoref.)

Untersuchungen über Sterine. IV. Mitteil. Zur Kenntnis der 3-Oxy- $\Delta^{5,6}$ -ätiobiliensäure.

von

S. KUWADA und M. MIYASAKA :

(Aus dem Wissenschaftlichen Laboratorium der Firma Takeda-chôbei, Osaka)

[Eingegangen am 20. Juli, 1936]

Beim Sublimieren (ungefähr bei 240-250°) unter vermindertem Druck liefert die 3-Oxy- $\Delta^{5,6}$ -ätiobiliensäure (I) (vergl. Kuwada, diese Zeitschr. Bd. 56, p. 14 [1936]) farblose Säulen vom Schmp. 215° (korrigiert) (aus Aether), die die Zusammensetzung $C_{19}H_{24}O_3$ besitzen und 2 Doppelbindungen (nach Jodzähl) aufweisen. Also geht die genannte Dicarbonsäure (I) dabei unter gleichzeitiger Verlust von der sec. Alkohol-Gruppe in das Säureanhydrid über. Die Lage der neu gebildeten Doppelbindung ist vielleicht in der Stellung C_3-C_4 , wie die Strukturformel (II) zeigt. Vff. nannten dieses Anhydrid

藥 學 雜 誌

第五十六卷 第九號

昭和十一年九月發行

報 文

ステリン類の研究 (第 III 報)¹⁾ ヴィニル-及びアリルテストステロン

桑 田 智
矢 後 政 信

(株式會社武田長兵衛商店研究部)

(昭和 11 年 7 月 20 日)

S. Kuwada, und M. Yago: Untersuchungen über Sterine. III. Mitteil.
Über das Vinyl-und Allyl-testosteron.

Testosteron の合成後, その誘導體についても 2-3 の研究報告が現れた. 就中, Ruzicka²⁾ の Methyl-testosteron は, 天然に検出されない物質であるに拘らず, 之が精囊に及す作用の強さは, Testosteron そのものを凌ぐとさへ報ぜられて居る. 其後 Butenandt^{3) 4)} によつて Äthyltestosteron が合成され, 藤井, 松川⁵⁾ によつて Benzyltestosteron が作られた. Äthyl 化合物の生理的効力は Methyl 化合物に遙に及ばない.⁴⁾ Benzyl 化合物については生理的検定成績が殆んど掲げられてないので, その強さを前二者に比較する譯に行かぬが, Methyl- 及び Äthyl- 化合物の比較から想像して, 17- 位についた或る殘基の分子が, 大きくなればなる程, その効力は急激に減退して行くものと思はれる.

そこで, Methy 基の代りに, 少々分子は大きくなるが, その中に二重結合を持つて居り, 化學的にも, 又恐くは生理的にも著しく能動的であるべき群族を以てしたならば, 果してどんな作用が現れるであらうか. 我々が Vinyl- 及び Allyl-testosteron の合成を企圖し, この小報告を行ふ所以は, 實にこの動機に據るのである.

原料としては, Dibromcholesterinacetat の CrO_3 -酸化によつて得られる trans-Dehydroand-

rosteron を用ひたが, Androsteron についても同様の實驗を試みる用意をして居る.

Grignard 試藥を作るには, Vinylbromid 或は Allylbromid を absl. Äther 中, Jod 微量の存在に於て Magnesium に作用させた.

Vinyl-magnesium-bromid に trans-Dehydroandrosteron を反應させて得た 17-Vinyl- $\Delta^{5,6}$ -androstendiol-(3,17) は Hexan から, Fp. 148-149°(Korr) の美麗なる針狀結晶となり, その醋酸體は, 分析の結果, Diol 化合物の Monoacetat に一致し, Fp. 167-169°(korr.), Hexan から美しい針狀晶となつて現れる.

Diol 化合物の持つ第二級水酸基を CrO_3 で酸化し Oxo 型にするためには, 在來の方法, 即ち, 二重結合を Brom で閉ちて置いて, 室温で酸化した. 酸化體の Entbromung には, 氷醋酸中亞鉛末で處理する方法を行つたが, 本法によると, Cholesterin 固有の二重結合は $\text{C}_{5,6}$ の位置から $\text{C}_{4,5}$ 即ち Keton 群に近い方へ轉位する.⁴⁾ Vinyl 基に入つた Brom が, 上の方法で, 容易に entbromieren されるや否やが重要な疑問であつたが, 實驗の成績によると, 本法で Brom は完全に除去される. さうして Halogen frei の酸化體は Aceton-Hexan の混液から再結晶することによつて, Fp. 168,5-170,5°(korr.)の厚みある特異の板狀結晶となる. ところがこの物質の分析結果は, 我々の期待を充分満足させて呉れなかつたので, 次の疑問を生じた. 即ち, 側鎖である Vinyl 群に入つた Brom が, $\text{C}_{5,6}$ に入つた Brom と同じやうに entbromieren されて二重結合を眞に恢復したかどうか, 或は Brom が水素によつて置換され, Halogen frei の物質となつたのではなからうか. この點を明瞭にするため 17-Äthyl- $\Delta^{5,6}$ -androstendiol-(3,17) 及び Äthyltestosteron の合成に關する Butenandt の追試を行つた. 同氏によれば, Diol 化合物は Fp. 198°(unkorr.). 我々の試製品は, Butenandt の如く,³⁾ Aceton 或は稀 Dioxan からいい結晶が出ないので, Methanol から再結晶させたが, Fp. 196-197° (unkorr.), 200,5-201,5° (korr.) の針晶である. これを上記の Vinyl diol 化合物に較べると著しく異なることが解る. しかるに混融を試ると, 130° 前後から收縮するが, 全熔するには 160-170° に加熱するを要する. 即ち Mischschmelzpunkt は兩者の中間に在る. 次に, Äthyl-testosteron は Butenandt⁴⁾ によると Petroläther から Fp. 139° (unkorr.) の小針狀晶となつて現れるといふ. 我々の試製したものは, Hexan から細い針狀晶が星狀に集合して現れたもので, Fp. 134-135°(unkorr.) 136-137°(korr.) を示し, Butenandt の記載よりも可成低いが, 分析の結果は Äthyltestosteron に極めてよく一致する. このものと, Vinyl diol 化合物の酸化物を混融すれば, 113° (unkorr.) で既に融解を終り, 兩者が明に異種の物質であることを示す. これらの結果から推して, Vinyl 基に入つた Brom は $\text{C}_{5,6}$ に入つたものと同様, 氷醋酸中亞鉛末の作用によつて entbromieren せられ, 二重結合を回復したものと信ぜられる. 即ち, 本品は 17-Vinyltestosteron として誤らないと思ふ.

従つて、上述の反應を式で示せば、

上述の反應中、Vinylbromid の代りに Allylbromid を用ひて Grignard 試薬を作り、trans-Dehydroandrosteron に作用させると、17-Allyl- $\Delta^{3,6}$ -androstendiol-(3,17), Fp. 153-154, °5(korr.) が生成される。本品は Aether から再結晶して美しい板狀晶となる。その Acetat は C_3 の OH のみが醋化された Monoacetat で Hexan から再結晶され、Fp. 154-156° (korr.)、無色、扁平な板狀晶で紡錘形を呈する特異の結晶である。元の Diol 化合物と Fp. は殆んど異らぬが、結晶の外観著しく相違するのみでなく、分析數を異にし、混融すれば約 40° の融點降下を起す。Diol 化合物の臭化、 CrO_3 -酸化、脱臭素等總て Vinyl 化合物に於けると同様に行へば、目的の 17-Allyl-testosteron が得られる。本品を Aether から再結晶すれば、Fp. 150-153° (korr.) の細針狀晶となる。

叙上の Vinyl- 及び Allyl- の Diol 化合物並に Testosteron 誘導體はいづれも新物質であつて、それらの生理的效力檢定については、別の機會に詳報し度いと思ふ。茲には唯、Vinyl- 及び Allyl-testosteron が、そのまゝを油溶液とし、Korenchevsky 法により、鼠の精囊及び攝護腺の肥大試験に附したる結果 30-40r を以て一鼠單位と認定し得られたことのみを誌して置くに留める。

實 験 の 部

trans-Dehydroandrosteron.

Dibrom-cholesterin-acetat の CrO_3 -酸化によつて得られる trans-Dehydroandrosteron-acetat

を Semicarbazon として分離し, 30 倍の Alcohol, 15 倍の 25% 硫酸と共に 5 時間水浴上に加熱, 減壓下に Alcohol を大部分溜去し, Aether と共に振盪, Aether の蒸溜残渣を再び Aether 若くは Hexan から再結晶した. Fp. 146° (unkorr.) となつた結晶を約 80° 減壓下に乾燥し. 爾餘の研究に於ける原料に用いた.

17-Vinyl-4-^{5,6}androstendiol-(3,17)

Natrium 片を投じ蒸溜して得た absolut Aether 約 300 cc に, 研磨した Magnesiumband 1,34 g を入れ, Vinylbromid を滴下しつつ水浴上に攪拌した. この時使用した Vinylbromid は貯藏久しきに互り, 可成重合を起して居る様子があつたので, 理論量に數倍する 大量を使用して初て Magnesium は溶解した. Grignard 試薬の生成を促進するため. Jod の一小片を添加したこと勿論である.

Magnesium の溶解後, 約 150 cc の absolut Aether に溶した trans-Dehydroandrosteron 2g を滴下し, 冷時盛に攪拌しつつ, 30 分間で滴下を終る. 更に水浴上, 軽く煮沸し乍ら 6 時間攪拌を續行する. 白色不溶性の反應體を生じた Aether 溶液に氷片と稀鹽酸とを加へて加水分解を行ひ, Aether と共に振盪する. Aether 層を分離し, 水, Hypo 液にて交互に洗滌し, 乾燥後 Aether を溜去する. その残渣を Semicarbazid-acetat の Alcohol 溶液と共に水浴上約 15 分間加温し, 反應液を水に投じ, Aether と共に振盪し, Aether 可溶部を集める.

Aether の蒸溜残渣を Hexan で抽出し, 更に同一溶媒で再結晶を反覆すれば, 美麗なる針狀晶を生じ 90° 減壓下に 6 時間乾燥したものは 133° (unkorr.) で收縮し, $145-146^{\circ}$ (unkorr.) $148-149^{\circ}$ (korr.) で完全に熔融する. 本品は Chloroform, Methanol, Aether, Essigester 等に易溶, Hexan, Petrolaether には熱時溶解し, 冷時難溶である,

分析 物質	3.600 mg	CO ₂ : 10,475 mg	H ₂ O: 3,200 mg	C % 79,36	H % 9,95
„	3,145 „	„ 9,185 „	„ : 2,795 „	„ 79,65	„ 9,94
	C ₂₁ H ₃₂ O ₂ (316,27) とすれば			„ 79,67	„ 10,20

17-Vinyl-4^{5,6}-androstendiol-(3,17)-monoacetat.

上記の Diol 化合物 0,1 g を 5 cc の無水醋酸と共に 30 分間軽く煮沸し, 一夜放置後, absolut Alcohol を加へて水浴上に蒸發乾涸し, Hexan に溶して脱色, 結晶させる. Fp. $167-169^{\circ}$ $\frac{1}{2}$ (korr.) の針狀晶で, Chloroform, Aceton, Alcohol には易溶, Hexan には少々難溶である.

分析 物質	4,215 mg	CO ₂ : 11,835 mg	H ₂ O: 3,440 mg	C % 76,63	H % 9,13
	C ₂₃ H ₃₄ O ₃ (358,27) として			„ 77,04	„ 9,57

17-Vinyl-testosteron.

Diol 化合物 0,7898 g を 16 cc の氷醋酸に冷時溶解し, N/2 Brom 氷醋酸溶液 (F. 0,955) 20,8

cc (Br 4 原子に相當す) を滴下し. 更に 0.2485 g の CrO_3 (1.5 原子の酸素に相當す) を氷醋酸 12 cc に溶解して添加し. 16 時間室温に放置する. 過剰の CrO_3 を Methanol で還元し, 反應液を水中に傾瀉し, 析出物を濾取, 磁板上に乾燥し, 100 cc の氷醋酸に溶し, 5 g の亜鉛末と共に 20 分間沸騰水浴上加温, 冷後氷醋酸液を水に投じ, 生成した沈澱を濾取, Aether に溶し, Kalilauge, 水で順次洗滌後乾燥し蒸溜に附する. Aether の蒸溜殘渣を Hexan で抽出し, 濃縮結晶させ, 更に Aceton-Hexan の混液で再結晶を繰返せば, Fp. 168,5–170,5° (korr.) の無色透明, 特異の厚い板晶結晶となる. Aether, Chloroform, Methanol, Aceton に易溶, Hexan には難溶である.

分析 物質	3,130 mg	CO_2 : 9,125 mg	H_2O : 2,585 mg	C % 79,51	H % 9,24
		$\text{C}_{21}\text{H}_{30}\text{O}_2$ (314,24) として		„ 80,19	„ 9,62

この分析成績は豫期の數字に比較して甚だ不満足であるが, 物質僅少のためより以上再結晶を繰返し得なかつた. ところが $\text{C}_{21}\text{H}_{30}\text{O}_2$ の代りに, $\text{C}_{21}\text{H}_{32}\text{O}_2$ の式から C % を算出して見ると 79,68 となり, 實驗値に甚だ近接する. (但し. H % には増々距離を生ずる). 故に Vinyl 基に入つた Brom が H によつて置換され, Äthyl 基に變じたのではなからうかとの疑問を生じ, Butenandt による 17-Äthyl-androstendiol-(3,17) 及び 17-Äthyltestosteron の合成を追試し, Vinyl 化合物と比較することとした.

17-Äthyl- $\Delta^{5,6}$ -androstendiol-(3,17).

Äthylbromid を用ひて Grignard 試薬を作り, trans-Dehydroandrosteron に作用させるときは, Vinyl-diol 化合物を得た場合と同一の操作で 17-Äthyl- $\Delta^{5,6}$ -androstendiol-(3,17) が得られる. 本品は Methanol から再結晶することにより, 美しい針狀晶となり Fp. 196–197° (unkorr.) 200,5–201,5° (korr.) を示し, Butenandt の Fp. 198° (unkorr.) といふのによく一致する.

分析 物質	3,170 mg	CO_2 : 9,185 mg	H_2O : 3,135 mg	C % 79,02	H % 11,06
		$\text{C}_{21}\text{H}_{34}\text{O}_2$ (318,27) として		„ 79,18	„ 10,77

本品と 17-Vinyl- $\Delta^{5,6}$ -androstendiol-(3,17) Fp. 148–149° とは明に異つた物質であることが認められる. しかるに兩者の混融を試みると, 130° 前後から收縮を始めるが, 160–170° に至つて全溶する.

17-Äthyltestosteron.

上述の Äthyldiol 化合物を氷醋酸中 2 原子の Brom で飽和し, 3 原子の酸素に相當する CrO_3 で酸化し, 氷醋酸中亜鉛末で脱臭素を行ひ, 17-Äthyltestosteron を得た. 本品は Hexan から再結晶することにより細い針狀晶の集合體を生じ, Fp. 134–135° (unkorr.) 136–137° (korr.) を示す. Butenandt の 17-Äthyltestosteron は Fp. 139° (unkorr.)

分析 物質	3,835 mg	CO ₂ : 11,215 mg	H ₂ O: 3,565 mg	C% 79,76	H% 10,40
	C ₂₁ H ₃₂ O ₂ (316,26) として			„ 79,67	„ 10,20

17-Vinyltestosteron, Fp. 168,5-170,5° (korr.) と本品とを混融すれば, 113° (unkorr.) で既に全熔し, 両者が明に異物質であることを示す.

17-Allyl-4^{5,6}-androstendiol-(3,17).

先づ Magnesiumband 2,01 g, absolut Aether 約 450 cc, Allylbromid 13 g 竝に Jod の一小片によつて Grignard 試薬を作る. 之に absolut Aether 約 200 cc に溶解した trans-Dehydroandrosteron 3 g を滴下し, 冷時 0,5-1,0 時間で滴下を終る. 水浴上更に 5 時間加温攪拌し, 一夜放置後, 酸によつて Magnesium の結合を離し, Aether. に振取, その蒸溜残渣を Semi-carbazid-acetat で処理し, Aether と共に振盪, 之に可溶の部分を集める. Aether の蒸溜残渣を再び Aether から再結晶を繰返させると, Fp. 153-154,5° (korr.) の美しい板状結晶が得られる. 本品は Aether に少々難溶, Aceton, Essigester 等には易溶である.

分析 物質	3,485 mg	CO ₂ : 10,193 mg	H ₂ O: 3,095 mg	C% 79,77	H% 9,94
„	4,180 „	„ : 12,185 „	„ : 3,865 „	„ 79,50	„ 10,34
„	3,853 „	„ : 11,245 „	„ : 3,380 „	„ 79,60	„ 9,82
	C ₂₂ H ₃₄ O ₂ (330,27) として			„ 79,93	„ 10,88

17-Allyl-4^{5,6}-androstendiol-(3,17)-monoacetat.

上記の Allyldiol 化合體 0,5g に無水醋酸 10 cc を加へ, 30 分間煮沸, absolut Alkohol 少量と共に蒸發乾涸し, 残渣を Hexan から再結晶させる. Fp. 154-156° (korr), 扁平なる板状結晶で特異な紡錘状を呈する. 元の Diol 化合體 Fp. 153-154,5° (korr.) と Fp. が殆んど變らぬが, 兩者を混融して見ると, 115° で既に熔融を始め, 125° で全熔する.

分析 物質	4,252 mg	CO ₂ : 12,065 mg	H ₂ O: 3,700 mg	C% 77,39	H% 9,74
	C ₂₄ H ₃₆ O ₃ (272,29) として			„ 77,86	„ 9,75

17-Allyltestosteron.

前記の Diol 化合體 2,6045 g を 50 cc 氷醋酸に溶し, N-Brom 氷醋酸溶液 31,55 cc (F. 1,003, 物質に對し Br 4 原子) を滴下, 續いて CrO₃- 氷醋酸溶液 0,7992 g (物質に對し 1,5 原子の酸素に相當す) を加へ, 13-15 時間室温に放置. 水へ傾瀉して生成した沈澱を濾取し, 200 cc の氷醋酸に溶し, 12 g の亜鉛末を加へ, 水浴上に 20 分間加温して Brom を除去する. 之を再び水中に投じ, 析出物を Aether にとり, Kalilauge 等にて洗滌する. その蒸溜残渣を Hexan で抽出し, Aether から再結晶させる. 本品は Fp. 150-153° (korr.), 細い短い針晶が星状に集合して現れ, Aether に溶ける他, Chloroform, Aceton, Alkohol 類には易溶, Petrolaether,

Hexan には可成難溶である.

分析 物質	3,490 mg	CO ₂ : 10,250 mg	H ₂ O: 3,280 mg	C % 80,10	H % 9,51
		C ₂₂ H ₃₂ O ₃ (328,26) として		„ 80,43	„ 9,83

本研究中の元素分析は笠原, 今井兩氏によつて施行されたもので, 謹んで兩氏に謝意を表する.

参 考 文 献

1) ステリンに関する著者在來の研究をこの標題下に一括し, 本研究を第 III 報とする.

第 I 報: epi-Dihydro-cholesterin-acetat の CrO₃-酸化

epi-Oxy-allocholansäure について 本誌; **643**, 978 (1935)

第 II 報: Dibrom-cholesterin-acetat の一新酸化體

3-Oxy- $\Delta^{5,6}$ -ätiobiliensäure について本誌; **648**, 75 (1935)

2) Ruzicka u.a.: Helv. **18**, 1487 (1935).

3) Butenandt u. a.: B. **69**, 448 (1936).

4) „ : B. **69**, 882 (1936).

5) 藤井, 松川: 本誌; **650**, 224 (1936.)

ステリン類の研究 (第 IV 報) 3-Oxy- $\Delta^{5,6}$ -ätiobiliensäure の知見

桑 田 智
宮 坂 宗 麿

(株式会社武田長兵衛商店研究部)

(昭和 11 年 7 月 20 日受理)

Untersuchungen über Sterine. IV. Mitteil.

Zur Kenntnis der 3-Oxy- $\Delta^{5,6}$ -ätiobiliensäure.

著者等の一人(桑田)は, Dibromcholesterinacetat の CrO₃ 酸化に際し, Kalilauge に可溶の酸化物中から一種の Dicarbonsäure を分離し, これが Polyhydrophenanthren の誘導體であ