Journal of the Pharmaceutical Society of Japan

VOLUME 57

January 1937

NUMBER 1

**Synthetische Versuche über einige Pyrrol-Derivate, die dritte
Mitteilung. Ueber die Kondensation des α -Aminoketons
mit den β -Diketonen in Alkalischem Medium.**

von

Heizabro KONDO, Setsuro OHNO und Nobuyasu SATO

[Aus den Itsuu Raboratorium, Tokyo.]

(Eingegangen am 10. Dezember 1936)

In unsrer II. Mitteil. (C. 1934, I, 3252) (Journ. pharm. Jap. **54**, 683) gezeigt, daß die Kondensation des α -Aminoacetessigaethylesters mit dem Acetbrenztraubensäureäthylester in essigsäurem Medium hauptsächlich den 2-4-Dimethyl-5-carbäthoxyl-3-pyrroylameisensäureäthylester von Smp. 126° neben einer kleinen Menge Tafeln von Fp. 61° gibt.

Damals liessen die Verff. wegen Materialmangel die Frage von den letzteren zurück. Da die derartige Knorr'sche Pyrrolsynthese je nach den Kondensationsbedingungen verschiedenen Pyrrole erzielen könnte, untersuchen die Verff. diesmal dieselbe Komponenten in ca. 10% iger Natronlauge bei 40° reagiren zu lassen, wobei sich eine farblosen Nadeln von Fp. 207° als Hauptprodukt neben einem Pyrazin bildeten.

Das Pyrazin mag wohl durch die Vereinigung von Aminoacetessigester mit sich entstanden sein.

Die ersteren sind eine Säure, besitzen eine Zusammensetzung $C_9H_{11}NO_4$ und enthalten ein Aethoxylradikal. So ist es als eine Methylpyrrolestersäure: $CH_3 \cdot C_4H_2N \begin{matrix} \swarrow CO_2H \\ \searrow CO_2C_2H_5 \end{matrix}$ zu bezeichnen. Dieses verhält sich weder auf Ketonreagenzien, noch auf die Ehrlich'sche Farbreaktion, aber mit fichtenspanreaktion positiv. Bei der Entcarboxylierung desselben liefert es eine Substanz von Fp. 88°, die die Ehrlich's- und Fichtenspanreaktion deutlich zeigt.

Diese hat eine Zusammensetzung $CH_3 \cdot C_4H_5NCO_2C_2H_5$, ist nichts anders als ein

Methylpyrrolcarbonsäureaethylester. Bei Einwirkung von Diazomethan bzw. Diazoäthan auf die oben genannte Methylpyrrolcarbonsäureester von Fp. 207° entsteht Methyläthylester vom Fp. 78–9° bzw. ein Fp. 60°, welcher letzterer mit den Tafeln vom Fp. 61°, dem Nebenprodukte in der II. Mitteil., zum Vergleich gestellt, einen Mischschmelzpunkt 61° zeigt.

Infolge dessen ist diese letzteren als der Aethylester der Methylpyrroläthylestersäure vom Fp. 207°, des Hauptproduktes in der Alkalischen Kondensation, anerkannt. Was für Stellen im Pyrrolkerne nun durch diese CH₃- und die 2 CO₂H-gruppen eingenommen sind, könnte man es doch dadurch festlegen, daß man erst an die möglichen Kondensationsvorgänge beider Komponenten überlegt, wie folgende Schemata:

Unter 3 Schemata wurde (A) schon früher als Hauptprodukt (II Mitteil.) bei saurer Kondensation erwiesen.

Die (C)-Formel ist an ihren Existenz sehr fraglich, weil es die CH₃·CO-Gruppe des Acetbrenztraubensäureesters sich zur Pyrrol-kernbildung weniger geeignet zu sein scheint, als seine -CH₂·CO-Gruppe. Dagegen muß das Schema (B) höchst wahrscheinliches sein, um es durch die Wegverseifung von der 4-Acethylgruppe den 3-Methylpyrrol-2,5-dicarbonsäurediäthylester (Fp. 60°) entw. die 3-Methylpyrrol-2, 5-dicarbonäthylestersäure (Fp. 207°) zu bilden. Die letztere mag also entweder die Formel (I) oder die (II) sein.

Nun erhält man aber den 3-Methylpyrrol, 2-carbonsäureaethylester vom Fp. 56° durch die Entcarboxylierung der Substanz (II), während bei analoger Behandlung mit der Estersäure vom Fp. 207° eine Krystalle vom Fp. 88° entsteht. Damit ist es sicher erwiesen, daß der Estersäure vom Fp. 207° die 5-Carbäthoxy-3-methylpyrrol,

2-carbonsäure und der vom Fp. 88° der 3-Methylpyrrol-5-carbonsäureäthylester (I) zuertheilt werden soll, d. h. die Knorr'sche Kondensation von Aminoacetessigester mit Acetbrenztraubensäureester verläuft bei alkalischer Bedingung nach (B) hauptsächlich, bei saurer aber nach (A) vorwiegend und nach (B) sehr wenig.

Beschreibung der Versuche.

3-Methyl, 5-carbäthoxypyrrol, 2-carbonsäure.

4.05 g Aminoacetessigesterchlorhydrat wurden in 3 cc Wasser gelöst und mit einer Lösung von 3.5 g Acetbrenztraubensäureäthylester in 15 cc ca. 10% iger Aetznatron bei 40° im Laufe von 5 Tagen allmählich versetzt.

Nach Ansäuren mit H₂SO₄, die Säure fällt schliesslich unter Reiben und guter Kühlung aus. Nach der Beseitigung des Pyrazins durch die Digirierung mit Petroläther, es aus verd. Alkohol krystallisiert um. Farblose Nadeln. Smp. 207°.

3.293 mg,	4.637 mg	Subst.:	6.663 mg,	9.332 mg	CO ₂	1.718 mg,	2.285 mg	H ₂ O	
0.1080 g	Subst.:		7.1 cc	N ₂	(19.5°	759 mm.)			
0.0351 g	Subst.:		0.0400 g	AgJ					
C ₉ H ₁₁ O ₄ N	Ber.	C 54.8		H 5.6		N 7.1		Aethoxyl	22.8
	Gef.	C 55.18	55.18,	H 5.8	5.52	N 7.66			21.9

Methylester, Aus verd. Alkohol farblose Tafeln. Smp. 78-9°.

4.349 mg Subst.	9.096 mg CO ₂	2.521 mg H ₂ O
4.645 mg Subst.	0.27 cc N ₂ (760 mm 25°)	
C ₁₀ H ₁₃ O ₄ N	Ber. C 56.9	H 6.1 N 6.6
	Gef. C 57.04	H 6.48 N 6.52

Aethylester. farblose Tafeln aus verd. Alkohol. Smp. 61°.

3.788 mg Subst.	8.122 mg CO ₂	2.269 mg H ₂ O
C ₁₁ H ₁₅ O ₄ N:	Ber. C 58.6	H 6.7
	Gef. C 58.43	H 6.70

Descarboxylierung der 3-methyl, 5-carbäthoxypyrrol, 2-carbonsäure vom Smp. 207°.

Die Substanz wurde in Chinolin-lösung mit Kupferchromit auf 210° erhitzt. Das Reaktionsprodukt wurde nach Ansäuren in Aether aufgenommen, vom Lösungsmittel befreit und im Vacuum sublimiert: Kristalle vom Fp. 88°.

3.365 mg Subst.	7.778 mg CO ₂	2.031 mg H ₂ O
3.984 mg Subst.	0.317 cc N ₂ (13.5° 762 mm)	
C ₈ H ₁₁ O ₂ N:	Ber. C 62.7	H 7.2 N 9.2
	Gef. C 63.04	H 6.75 N 9.3

Ueber Oestriol

von

Tokuichi SANO

[Aus der pharmaceutischen Hochschule zu Kyoto]

(Eingegangen am 10. Dezember 1936)

Ich habe die Methode, die Ito und seine Mitarbeiter (C. 1934 I 3222) benutzten, um Oestron aus dem Harn trächtiger Stuten zu extrahieren, auf den Harn schwangerer Frauen übertragen und nach dem Auswaschen des Benzols, das jene Forscher nicht gebraucht hatten, mit Natriumcarbonat Oestriol aus der Waschflüssigkeit erhalten. Seine physiologische Wirkung entspricht nach den vier geteilten Injektionen der wässrigen Lösung 30,000 M.E. per 1 mg; daher erkannte ich, daß es viel stärker wirkt als bisher über Oestriol angegeben worden ist.

藥 學 雜 誌

第五十七卷 第一號

昭和十二年一月發行

報 文

ピロール誘導體の研究 第三報

〔 α -アミノケトンと β -ヂケトンとの縮合(其二)〕

近 藤 平 三 郎

大 野 節 郎

佐 藤 信 保

(昭和 11 年 12 月 10 日受理)

H. Kondo, S. Ohno, S. Sato: Synthetische Versuche über einige Pyrrolderivate
(3 Mitt). Über die Kondensation des Aminoketons mit den β -diketonen (II).

本研究其一(藥誌 54, 683) に於て近藤大野は Knorr のピロール合成反應中其の一方の成分が β -ヂケトンなる場合縮合條件により異なるピロールを成生すべき事を想定し其の反應條件を吟味する爲先づ醋酸酸性に於ける縮合を研究し α -Aminoacetessigester と Acetbrenztraubensäureester より 2-4-dimethyl-5-carbäthoxy-3-pyrroylameisensäureester (Fp 126°) を主產物とする外少量の Fp 61° の板狀晶を捕捉せり。後者に關しては資料缺乏の爲之を解決する能はず其後の研究に保留せり。

余等は今回兩者のアルカリ性縮合反應を吟味する爲兩者の當量を 10% NaOH を媒質とし 40° に放置縮合せしめ反應成積體として Aminoacetessigester それ自身の縮合による Pyrazin 誘導體の外主として Fp. 207° $C_9H_{11}NO_4$ なる針狀晶を得たり。本物質は一種の酸にしてソーダアルカリに易溶一個の OC_2H_5 基を有し C_5H_5N $\left[\begin{smallmatrix} COOH \\ COOC_2H_5 \end{smallmatrix} \right]$ なる構造を有する事明かなり。 C_5H_5N は Methylpyrrol 基に相當す。本物質はケトン試藥に對し陰性にして Ehrlich 氏呈色反應を呈せざるも松材反應を呈し而も之を脱カルボキシル化せば Fp. 88° 松材反應及び Ehrlich 氏反應共に強陽性なる $C_5H_5N \cdot COOC_2H_5$ 即ち一種の Methylpyrrolcarbonsäureäthylester に移行す。

又本物質 (Fp. 207°) をジアゾメタン, ディアゾエタンにてエステル化すれば夫々 Fp. 78-9° のメチルエステル Fp. 60° のエチルエステルを生成す. 後者を前報の Fp. 61° の副産物と混融するに同一物なる事を知る. 即ち Fp. 61° の結晶は一種の Methylpyrroldicarbonsäureaethylester なり.

今 Aminoacetessigester と Acetbrenztraubensäureester との縮合反應を考ふるに次の三つの場合を想定するを得べし.

此の中 (A) は前報處載の如く醋酸酸性縮合により生成する主産物なり. 又 3) の反應経路が CH_3 水素の活性が 1) 2) の CH_2 のそれに比し遙かに微弱なるべきを以て可能性最も少なり.

A, B, C, 三種の Pyrrol の加水分解により Pyrroldicarbonsäureester を生成し得るは B のみ可能なり. 何となれば $\text{>C}-\text{CH}_3$ 基の CH_3 が加水分解によりて脱離するは不可能にして B の Pyrrol 炭素に直結する Acetyl 基の脱離のみ可能性を考えらるゝが故なり.

故に Fp. 60° の Methylpyrroldicarbonsäureaethylester は B の脱 Acetyl 化によりて生成せる 3-Methylpyrrol-2,5-dicarbonsäureaethylester なる事を推定せしむ.

従つて Fp. 207° の酸は I 又は II に相當す. 然るに II の脱カルボキシル化によつて得らるべき 3-Methylpyrrol-2-carbonsäureäthylester は Fp. 56° にして余等の得たる Fp. 88° の結晶とは全く異なる事明かなり. 故に Fp. 207° の酸は I にして Fp. 88° のものは 3-Methylpyrrol-5-carbonsäureäthylester なる事を知る.

即ち Aminoacetessigester と Acetbrenztraubensäureester との縮合は醋酸酸性の場合 (A) の反應を主反應とし (B) の反應を副反應とするがアルカリ性の場合には主として (B) の反應のみ進行する事を知る. 而して (B) の反應によつて生成する 3-Methyl-4-acetylpyrrol-2,5-dicarbonsäureäthylester の Acetyl 基は酸アルカリにより鹼化せられて比較的脱離し易く又アルカリ性にては更に 2- の位置の Carbäthoxy 基加水分解せられ既記の反應成積體を生成する事を明かならしむるを得たり.

實 験 の 部

3-Methylpyrrol-5-carbäthoxy-2-carbonsäure

Aminoacetessigesterchlorhydrat 4.05 g を水 3 c.c. に溶解し徐々に Acetbrenztraubensäureäthylester 3.8 g を NaOH 2 g 水 15 c.c. に溶解し 0° に保持せる液を一日 5 c.c. ずつ加へ 5 日間時々振盪し塞栓し 40° に加温. 針狀結晶折出し液は赤褐色になる. 充分冷却して結晶を濾集し石油エーテルにて少し加温して處理するに副成する Pyrazin は石油エーテルに易溶. Pyrazin の Fp. 65°, 別に合成品と混融して融點降下せず. 石油エーテルに不溶の結晶は二回稀アルコールより再結晶するに無色の針狀晶. Fp. 207° となる.

Subst. 3.293 mg	CO ₂ 6.663 mg	H ₂ O 1.718 mg
Subst. 4.637 mg	CO ₂ 9.332 mg	H ₂ O 2.285 mg
Gef. C: 55.18, 55.18	H: 5.8, 5.52	
N: 定量:—Subst. 0.1080 g Vol. N: 7.1 c.c. 19.5° 758.8 mm.		
Gef. N: 7.66%		
Äthoxyzahl:—Subst. 0.0351 g	AgJ. 0.0400 g	Gef: 21.9%
C ₉ H ₁₁ O ₄ N として Ber. C: 54.8	H: 5.6	N: 7.1 Äthoxy 22.8

Fp. 207° のものの Diazoäthan, Diazomethan によるエステル化

1) Diazoäthan: 28% アンモニア水 100 c.c. を 10° 以下に冷却攪拌しつつ Diäthylsulfat 60 g を少しづつ加ふ。Diäthylsulfat の消失するを待ち水浴上に 2 時間徐々に加温後更に 10-15 分間煮沸し之れを KCNO 30 g 水 50 c.c. 溶液中に加へ 15 分間 60-80° に保持し後更に短時間煮沸す。之の液を三頸 Kolben に移し NaNO₂ 24.0 g 水 40 c.c. 溶液を加へ水と鹽とにて充分冷却し攪拌しつつ H₂SO₄ を加ふ。(Konz H₂SO₄ 24 g + 水 100 c.c.) 発泡と同時に Monoäthylis-nitrosoharnstoff の無色の軽い結晶を生ず。濾集し 0° の水にて洗ひ陶板上に乾かし除湿器中に真空に保存す。得量 26.0 g.

Monoäthylisnitrosoharnstoff 3.3 g を Äther 33 c.c. 40% KOH 10 c.c. を 0° に冷した中に徐々に加ふ。時々振り動かす。生じた Diazoäthan は Äther 層に移る。傾斜により Äther 層を分ち粒状 KOH にて 2-3 時間乾かして用ふ。

2) Fp. 207° のものを Methanol-Äther に溶解し Diazoäthan Äther 溶液を加ふ。発泡して反應す。Äther-Methanol を除き減壓昇華せしめて精製す。Fp. 60° 前報告の Fp. 61° のものと混融して融點降下せず。

Subst. 3.788 mg	CO ₂ 8.122 mg	H ₂ O 2.269 mg
• / Gef. C: 58.43	H: 6.70	
C ₁₁ H ₁₅ O ₄ N として Ber. C: 58.6	H: 6.7	

3) Fp. 207° のものを Diazomethan による Methylester 化, 稀アルコールより再結晶。無色板状晶 Fp. 78-79°.

Subst. 4.349 mg	CO ₂ 9.096 mg	H ₂ O 2.521 mg
Gef. C: 57.04	H: 6.48	
Subst. 4.645 mg	Vol. N: 0.27 c.c. 760 mm. 25°	Gef. N: 6.52%
C ₁₀ H ₁₃ O ₄ N として Ber. C: 56.9	H: 6.1	N: 6.6

Fp. 207° Estersäure の Descarboxylierung

合成したる物質を Chinolin を溶媒として Kupferchromit を Katalysator として 210° に熱して decarbonieren する。後酸性になし Äther にとり Äther 蒸發殘留物を減壓昇華して精製す。

Fp. 88°.

松材反應 Ehrlich Reaktion 共に陽性なり.

Subst. 3.365 mg	CO ₂ 7.778 mg	H ₂ O 2.031 mg
Gef. C: 63.04	H: 6.75	
C ₈ H ₁₁ O ₂ N として Ber. C: 62.7	H: 7.2	N: 9.2
Subst. 3.984 mg	Vol. N: 0.317 c.c. 13.5° 762 mm.	Gef. N: 9.3%

有機硫黄酸に関する研究（附記 硫黄酸の殺菌作用） （過酸化水素と有機硫黄化合物との反應¹⁾ 第四報）

北 村 良 一

「北村化学研究所（大阪）」

（昭和 11 年 12 月 10 日受理）

R. Kitamura: Über die Reaktion zwischen Organischen Schwefelverbindungen
und Wasserstoffsuperoxyd (IV. Mitteil.) Untersuchung über Thiosäuren.

有機硫黄酸は其の分子中各次の如き原子團を持つて居る.

但し I, II は遊離酸並其の鹽類に於ては Tautomerie で兩型の平衡状態にある事は Hantsch u. Scharf (B. 46, 3570) が分光化学的に提唱せる處である²⁾. 以上は何れも S に隣接せる C-Atom に二重結合が存在する, 如斯結合状態にある S-Atom は著者の H₂O₂-Reaktion により容易に定量的に H₂SO₄ となりて脱硫され次式に従ひ對應カルボン酸に轉換する事は第三報反應の機作に就て詳論せる處より明瞭である.

既に第一, 第二報に於て Thioessigsäure, Thiobenzoessäure に就ての反應並類似の構造を有する Thion-thiol-kohlensäure の誘導體たる Kalium-xanthogenat に就ての定量的實驗を記述したが,

¹⁾ 第一報, 本誌 54 卷 1 頁; 第二報, 本誌 54 卷 98 頁; 第三報, 本誌 55 卷 300 頁.

²⁾ 硫黄酸(並カルボン酸)の構造に関する著者(北村)の見解は別に論議の機會ありと思ふ.