**Histologische Studien über die Drogen auf die
„durchscheinende Weise,“ (IV. Mitteil.).
Ueber die Krautdrogen in der Pharmacopoea
Japonica V. (I. Teil)
*Swertia japonica Makino.***

von

Jisuke TAKATORI

[Aus d. Pharmaceut. Inst. d. Medizin. Fakultät zu Nagasaki.]

(Eingegangen am 10. October 1938.)

„Durchscheinende Weise“ (Diese Zeitschrift 58, 118, 1938) ist bisher hauptsächlich über die Blattdrogen von der Verfasser angewandt.

Wenn aber der angewandte Bereich von dieser Weise bis die Krautdrogen erweitert werden können, dann sie ermöglichen eine leichtere Ausführung ihrer Untersuchungen.

Der Verfasser hat schon auf dieser Weise ihre Blattkörper studiert, ferner ihre Blütenteile zu studieren versucht, und damit es fertig machen können.

Zuerst der Vefasser habe über Herba Swertiae auf die „durchscheinende Weise“ studiert.

Herba Swertiae stammt von *Swertia japonica Makino* und *Swertia chinensis Hemsley* (Gentianaceae), welche in Japan einheimisch sind, diese obengenannte wird zur Blütezeit gesammelt und seit alters her als bitteres Magenmittel verwandt.

Die wichtigsten Bestandteil von Herba Swertiae sind von Dr. T. Kariyone u. Y. Matsushima (Referat von J. of the Pharm. Soc. Japan Jhrg. 1927, Nr. 540, Seite 25) und T. Nakaoki (Referat von J. of the Pharm. Soc. Japan Jhrg. 1927, Nr. 540, Seite 27) aufgeklärt worden, und haben über die anatomische Untersuchung der Drogen von M. Fujita (J. of Japanese Botany Vol. XII, Seite 190, 234.) versucht, er hat nicht bloss die mikroskopisch-histologischen Untersuchungen über *Swertia japonica*, *Swertia chinensis* und *Swertia tosaensis*, sondern auch die aufklärung der Verschiedenheit zwischen dieser drei Arten versucht.

Zum Zwecke der zu ergänzenden Studien über Herba Swertiae hat der Verfasser

zuerst über *Swertia japonica* im drei Arten auf die „durchscheinende]Weise“ studiert und die Resultaten dieser Mitteilung erhalten:

Die Untersuchungsmethode ist im allgemeinen derselben der I. Mitteilung ähnlich, aber ein wenig verbessert.

Erläuterung der Figuren. (30 Figuren der Originalmitteilung)

Figur 10

- A. Blütenblatt $\times$ ca. 12
- B. Fruchtknoten mit Griffel und zweispaltige Narbe, viele Samenanlagen enthaltend $\times$ 29
- C. Narbe mit vielen Pollenkörnern $\times$ 103
- D. Seitenflächenansicht der Fruchtknotenwandung und Teil der Samenanlage $\times$ 103
- E. Ihre Vergrößerung $\times$ 345
- F. Oberflächenansicht der äusseren Epidermis der Fruchtknoten $\times$ 345
- G. Oberflächenansicht der inneren Epidermis der Fruchtknoten $\times$ 345
- H. Samenanlage in Fruchtknoten $\times$ 103

Figur 11

- A. Reifes Staubgefäss $\times$ 29
- B. Kelchblatt $\times$ 29
- C. Seitenflächenansicht der Zellen der inneren Wand des Staubbeutels $\times$ 345
- D. Oberflächen- und Schrägflächenansicht der Zellen der inneren Wand des Staubbeutels $\times$ 345
- E. Seitenflächenansicht der Wand des vielen Pollenkörnern enthaltend Staubbeutels $\times$ 345
- F. Grundgewebezellen des Staubfadens $\times$ 345
- G. Teil des Staubbeutels mit vielen Pollenkörnern $\times$ 103
- H. Pollenkörnern $\times$ 345
- I. Epidermiszellen des Blütenblattes $\times$ 345
- J. Zwei Honigdrüsen auf der Innenseite des Blütenblattes $\times$ 29
- K. Mehrzellige Haare der Honigdrüsen $\times$ 103

Figur 12

- A. Nähe der Spitze des Blattes $\times$ 29
- B. Ihre Spitze $\times$ 103
- C. Obere Epidermis $\times$ 103
- D. Ihre Vergrößerung $\times$ 345
- E. Untere Epidermis mit Spaltöffnungen $\times$ 103
- F. Ihre Vergrößerung $\times$ 345
- G. Palisadengewebe $\times$ 345
- H. Schwammparenchym $\times$ 345
- I. Vorspringende Mittelnerve auf der Unterseite des Blattes $\times$ 103
- J. Spiralgefässe in der Mittelrippe $\times$ 345
- K. Randpartie: Seitenflächenansicht der shortsägezähne Wollhaare der oberen Epidermiszellen $\times$ 103

透明法による生薬類の組織學的研究（第四報）

日本薬局方收載草卉類生薬に就て（其一）

Swertia japonica Makino（センブリ）

高 取 治 輔

（長崎醫科大學附屬藥學專門部）

（昭和 13 年 10 月 10 日受理）

1 緒 言

著者は其の考案せし透明法を主として比較的截斷に困難を感じる事ある葉類生薬に應用し來れり。

今茲に草卉類生薬に就て其の葉部は勿論更に重要な花部の透明化觀察を行ふ事を得ば從來の解剖的方法に加へ是等の鑑識上甚しく其の實驗方法を簡易化せしむるを得べし。

此の目的のもとに著者は先づ第五改正日本薬局方收載草卉類生薬の一たる當薬を選びて之を試みたり。

當薬の有効成分に就ては曩に淺野氏（本誌，14，418〔明治 27〕）堀，黒部兩氏（同，14，595〔明治 27〕）矢野氏（同，27，1，〔明治 40〕）等により報告せられ刈米，松島兩氏（同，47，133，〔昭和 2〕）中沖氏（同，47，142，〔昭和 2〕）等により闡明せられし所なり。

而て其の生薬學的研究に就ては既に藤田路一氏（植物研究雜誌 XII，190，284〔昭和 11〕）に依りて詳細なる報告あり，即ち氏は當薬の基原植物たる *Gentianaceae*（リンドウ科）に屬する *Swertia japonica Makino*（センブリ），*Swertia chinensis Hemsley*（ムラサキシセンブリ）竝に類似生薬たる *Swertia tosaensis Makino*（イヌセンブリ）の 3 種に就き根，莖，葉及び花部等の詳細なる剖見により其等の異同を闡明せられたり。

著者は透明法を以て是等の葉部及び花部に就て主として平面的觀察により其の顯微鏡的構造の觀察實驗を試み，以て從來葉類生薬のみに應用し來れる透明法の範圍を擴大して草卉類生薬殊に其の花部に及ぼさんと企圖したるものなり。

2，實驗方法及び材料

實驗の方法は概ね第一報（本誌，58，482〔昭和 13〕）記載の方法に依りたり。而て花部はピンセットを以て萼，花冠，雄蕊，雌蕊を分離し癒合せる萼筒及び花冠は夫々 1 箇所にて縦割し置き其儘アルカリ液に浸漬する時は直に展開す。

尙著者は第一報實驗方法の末尾に於て苛性カリ及び氷醋酸の溶劑として稀アルコールを用ふる事を提唱せり、然るに其後の經驗により生薬類をスライドガラスにて保護することなく其儘を之等の水溶液を以て處理するも加熱溶出時少く注意を拂へば組織の破損する恐れ殆どなく、然も稀アルコール溶液に比して遙に溶出透明化の時間を短縮せしめ得るを知り本研究に於ては主として此の方法に依れり。

材料としては昭和4年6月津村研究所より購入せし標本にして *Swertia japonica Makino* (センブリ) に就て先づ實驗を試みたるを以て茲に其の結果を報告せんとす。

本稿を草するに當り終始御懇篤なる御指導を賜りたる 恩師厚生省東京衛生試験所刈米先生竝に本研究上數々の便宜と御激勵を 賜りたる長崎醫科大學附屬藥學專門部主事大倉東一先生に對し衷心より感謝の意を表す。

3. 透明法による生薬の觀察實驗

(1) 花 部

雌 蕊

柱頭、蕊柱、子房の3部よりなり全長6-7mm 直徑は子房の膨大部に於て約1.5mm なり、柱頭は2裂し其の表面には長き突起毛を具へ多數の花粉附着し發芽せるものあり(第X圖版C.)、蕊柱は短く次第に膨大して子房に移行す。故に雌蕊の全形は披針狀紡錘形を示す(同、B.)。

子房壁を通過する脈管束は主として螺旋紋脈管を有し其の位置は夫々2心皮の背縫及び腹縫の線に沿ひ後者は中途より分岐して夫々2裂せる柱頭に向ふ。

子房内には多數の卵子を包藏し之等は2裂柱頭の相重なる方向、即ち第X圖版Bと直角をなす側面より觀察する時は明に側膜胎座に坐着せり。

雌蕊は既に未熟或は成熟せる蒴果に變じ上端より開綻せるものもあり、其の長さ約9mm 直徑約2mm なり。

子房壁を平面視せば先づ外面上皮は幅約20 μ 長さ約140 μ の縦に延長せる細胞よりなり(同、F.)、次に實體組織も略同様なれど薄壁且つ少々短小の柔細胞よりなり胞間を存す、更に内面上皮は著しく趣を異にし横に延長せる細胞よりなり其の長さ約60 μ 幅約10 μ なり(同、G.)。

子房壁を側面視せば外面上皮及び實體組織は平面觀と略同様に縦長の細胞よりなり實體組織は3-4層の柔細胞よりなれり、之に對して内面上皮は縦約10 μ 横約18 μ の略矩形をなす1層の小細胞列よりなる(同、D.E.)。

斯の如く子房壁の外面上皮細胞と内面上皮細胞とは其の配置上直角の關係にあるは極めて興味ある事實にして、蓋し子房壁の鞏固性を保つ爲か或は成熟の後果被の乾燥開綻するに當り内外其の收縮の度を異にし以て裂開に適する構造をとれるものと思惟され組織の力學的研究に一示唆を提供するものと信ず。

卵子は直徑210-320 μ の略圓形或は橢圓形球狀をなし卵膜は平面視せば長さ約20 μ の多角形細胞よりなり又内部も略同様の細胞よりなり偏心的に橢圓形の胚囊を認めらるるものあり(同、H.)。

蒴果内の種子は長徑約550 μ 短徑約350 μ 或は此以上に達する橢圓或は卵球狀にして表面に特異の紋理を示す。

雄 蕊

雄蕊は花瓣と互生し其の癒合部に癒着す。

粉嚢は左右兩半部に分れ各々長さ約 1 mm 幅約 0.3 mm の長橢圓形にして其の略中央部に於て粉絲の末端に坐着するを以て嚢帯は明瞭ならず、而て粉嚢は雌蕊に對して内向の配置をとる（第 XI 圖版, A.）。

未だ縦裂せずして粉房内に花粉を充すものあり（同, G, E.）と雖も多くは既に破綻して小數の花粉を留む。

粉房の壁は側面觀に於ては 2 列の細胞層よりなる（同, E.）。即ち外面上皮は側面視せば長軸に延長せる略矩形をなし外面に少しく突起し其の長徑 23-27 μ 短徑約 18 μ なり、之を平面視せば粉嚢の長軸に延長せる多角形にして其の長徑約 25 μ 短徑 9-18 μ の細胞よりなる。

之に對し上皮下の 1 層をなす細胞、即ち粉房の内側壁をなす細胞は側面觀に於ては長徑 30-36 μ 短形 15-20 μ の橢圓形細胞にして（同, C.）之を平面視或は斜面視する時は（同, D.）粉嚢の短軸の方向に明瞭なる螺旋紋を示す。

著者は此の螺旋紋の存在の意義も亦其の方向より推して各細胞の縦の收縮を阻碍し横の收縮に便ならしめ以て粉嚢成熟の後、其の縦裂に對して最適の構造をとれるものと思惟し茲にも組織の力學的構造を示唆せんとす。

粉絲は長さ約 4.5 mm 太さ基部に於て約 0.3 mm 上部に至るに従ひ漸次細小となり先端附近にて約 0.1 mm なり、中心を螺旋紋脈管を有する 1 本の脈管束通走す。

其の上皮を平面視せば幅 18-27 μ の著しく長軸に延長せる細胞よりなる、更に其の實體組織は略同様に縦長の細胞よりなり薄壁にして胞間を有す（同, F.）。

花粉は直徑 18-20 μ の平滑なる球狀にして花粉膜には 3 箇所の裂隙様場所を存す（同, H, G, E.）。

花 冠

花冠は 5 枚の花弁の癒合よりなり、癒合部は短き筒部を形成す。

花弁は長さ約 10 mm 幅約 3 mm の長橢圓狀披針形、尖銳にして先端部邊緣は少く内面に卷曲す、基部の花床着生部近くの内面には少數の複細胞列性多細胞毛茸を發生し之より少しく上方に普通約 10 本の睫毛狀毛茸を生ずる 2 箇の蜜窩並列せり（第 X 圖版 A.）。

基部内面の多細胞性毛茸は長さ 120-150 μ 直徑約 30 μ にして鈍頭をなし略棍棒狀をなす。

蜜窩は長さ約 1 mm 幅約 0.3 mm の長橢圓形碗狀にして背面は花瓣に癒着し前面は縦に裂開し其の邊緣より睫毛狀毛茸を發生す（同, J.）毛茸は長さ約 2 mm 太さ 40-120 μ にして基部より先端に僅に細小となる、而て内外ともに幅約 10 μ にして長軸に延長せる細胞の數列よりなる、先端は少しく膨大して頭部をなすも該部の細胞は概ね萎縮せり（同, K.）。

花瓣の中部に於て其の内面上皮を平面視するに上皮細胞は幅約 10-20 μ にして長軸に延長せる細胞よりなり、然も其の縦の膜壁は波狀或は屈曲せる直線よりなる、而て表面膜には縦に線紋を示す（第 XI 圖版 I.）。外面上皮も略同様なり。

上皮下に實體組織を平面視せば上皮同様に延長せる柔細胞よりなる薄壁にして胞間を有す。

基部より先端に明瞭なる 5 本の脈管束並走し脈管は主に螺旋紋なり。

萼

5 枚の萼片は幅約 0.6 mm 長さ約 5 mm の線狀披針狀形にして（同, B.）邊緣は少しく外面に卷曲し基部に於て互に僅に癒合して筒部をなす。

内外兩面とも其の上皮は平面視せば長さ 45-86 μ 幅 18-27 μ の波狀の膜壁を有し長軸に延長せる細胞よりなる、内面上皮を邊緣卷曲部に於て側面視せば高さ約 15 μ 底約 36 μ にして稍々萼の先端に向て傾斜せる鋸齒狀突起をなす。氣孔は外面上皮に多く存す。

萼片の基部内面上皮に多細胞性毛茸を發生し該部は葉の基部に存するものと略同様なり。

第 X 圖版

第 XI 圖版

第 XII 圖版

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

上皮下に實體組織を平面視せば胞間を有する圓形乃至橢圓形の柔細胞よりなり其の大きさ $18-27\mu$ なり。主として螺旋紋よりなる明瞭なる 3 本の脈管束之を貫き竝走す。

(2) 葉 部

葉體は普通幅 $2-3\text{ mm}$ 長さ $2-3\text{ cm}$ の線狀披針形、尖銳、無柄にして莖に對生す（第 XII 圖版 A は其の一部分）。

上皮細胞及び氣孔

上面上皮細胞は波狀に彎曲せる膜壁を有し僅に葉の短軸に延長せり、其の長徑 $50-90\mu$ 短徑 $20-45\mu$ にして長軸の方向に比較的規則的配列をなす（同、C），而て各細胞は表面に隆起して突起毛をなすを以て平面觀に於ては細胞の中心より放射狀に走る線紋を見る（同、D）。

邊緣に於て之を側面視せば突起毛は莖に於ると同様に鋸齒狀の觀を示す（同、K）。

下面上皮細胞も亦波狀をなし却て葉の長軸に延長し長徑 $47-90\mu$ 短徑 $13-36\mu$ にして（同、E），各細胞の表面膜は葉の長軸に平行なる線紋を現す（同、F）。又下面に於て隆起せる主脈上の細胞は之と平行に延長せる多角形細胞にして波狀縁をなさず長さ $64-146\mu$ 幅 $27-36\mu$ なり（同、I）。

氣孔は概ね下面に存し長徑 $27-42\mu$ 短徑 $18-22\mu$ の橢圓形にして 2-3 個の細胞にて圍繞せられ閉鎖細胞の長徑は概して葉の長軸に平行に配置す（同、E, F）。

毛茸及び腺毛

葉體部には兩面ともに毛茸及び腺毛を認めずと雖も葉の莖に坐着する内側即ち葉腋に萼筒内面に發生する毛茸と略同様な複細胞列性多細胞毛茸を生ず。其の長さ $128-250\mu$ 或は其以上に達し直徑は普通 $36.6-49.4\mu$ に達し鈍頭略棍棒狀を呈す。

葉 肉

柵狀組織は直徑 $18-31\mu$ の略圓形の細胞の密接なる配列として上面上皮下に觀察せらる（同、G）。

更に海綿組織は短腕性細胞よりなり突起を生じて分岐せるものありて互に圓孔を以て連絡し略圓形をなす胞間を有する鬆粗なる組織なり（同、H）。

脈管組織

脈管は主として螺旋紋にして主脈の兩側に數本の支脈之と竝走す、纖維を伴ふも顯著ならず（同、J, A, B）。

邊 緣

下面に向て稍卷曲し平坦なるも之を廓大視せば上皮細胞の突起により細鋸齒狀を示す（同、K, A）。

磷酸石灰の結晶

之を認めず。

圖 版 解 說

第 X 圖版

- A. 花瓣、基部に近く睫毛狀毛茸を有する 2 個の蜜窩竝列す $\times \text{ca. } 12$
- B. 雌蕊、柱頭は 2 裂し子房内に多數の卵子を藏す $\times 29$
- C. 柱頭、多數の花粉を附着す $\times 103$
- D. 子房壁の側面觀及び卵子の一部 $\times 103$
- E. 子房壁の側面觀廓大 $\times 345$
- F. 子房壁の外面上皮の平面觀 $\times 345$
- G. 子房壁の内面上皮の平面觀 $\times 345$
- H. 子房内の卵子、内部に胚囊を認む $\times 103$

第 XI 圖版

- A. 雄蕊, 粉嚢は既に縦裂し粉房には小數の花粉を留む × 29
- B. 萼片 × 29
- C. 粉房の内側壁細胞の側面觀 × 345
- D. 同じく其の平面觀 × 345
- E. 花粉を充す粉房の壁の 2 層の細胞よりなるを見る × 345
- F. 粉絲の實體組織の細胞 × 345
- G. 未だ裂開せず粉房内には花粉を充せる粉嚢の一部 × 103
- H. 花瓣に附着せる花粉粒 × 345
- I. 花瓣の上皮細胞 × 345
- J. 花瓣の内面基部近くに存する 2 個の蜜窩 29
- K. 蜜窩の睫毛狀毛茸 × 103

第 XII 圖版

- A. 葉の一部分 × 29
- B. 同先端 × 103
- C. 上面上皮 × 103
- D. 同廓大, 各細胞の突起により放射狀線紋を示す × 345
- E. 下面上皮 × 103
- F. 同廓大, 平行線紋を示す上皮細胞及び氣孔 × 345
- G. 柵狀組織 × 345
- H. 海綿組織 × 345
- I. 下面に於て隆起せる主脈上の上皮細胞 × 103
- J. 主脈内の螺旋紋脈管 × 345
- K. 邊緣部, 上面上皮細胞の突起毛の側面觀 × 103

Sinomenium 及 Cocculus 屬アルカロイド に関する研究 (第四十八報)

近 藤 平 三 郎

Cepharanthin の構造 (タマサキツツラフヂの アルカロイドに就て, 其五)

慶 松 一 郎

(三樂病院藥局)

(昭和 13 年 11 月 1 日受理)

著者は先に近藤教授と共に臺灣産防己科植物「タマサキ (玉咲) ツツラフヂ」*Stephania cepha-*