Ueber die Konstitution des Rhapontins.

von

Syun KAWAMURA.

[Aus dem Wissenschaftlichen Laboratorium der Firma Takeda-chôbei, Osaka.]

(Eingegangen am 1. Mai 1938.)

Im Jahre 1822 fand Hornemann¹⁾ in den Rhapontikwurzeln eine krystallinische Substanz, die er "Rhapontizin" nannte. Später wurde dasselbe von verschiedenen Autoren namentlich von Tschirch und Christofletti²⁾, Gilson³⁾ und Hesse⁴⁾⁵⁾ untersucht. Gilson gab seinem Präparat den Namen "Pontizin" und Hesse den Namen "Rhapontin". Nach Hesse bildet das Rhapontin $C_{21}H_{24}O_9$ weisse Nadeln, die sich bei 215° bräunen und bei 230–236° unter Zersetzung zu einer dunkeln Masse schmelzen und $[\alpha]_D: -63^\circ$ (in Aceton-Wasser-Lösung) besitzen. Das Rhapontin ist unlöslich in Benzol, Ligroin und Chloroform, schwer löslich in Aether, absol. Alkohol und reinem Aceton, leicht in verd. Alkohol und verd. Aceton, namentlich in der Wärme. Durch Kochen mit Mineralsäure spaltet sich das Rhapontin in Rhapontigenin und Glukose, so dass seine Hydrolyse nach der Gleichung erfolgt:

Das Rhapontigenin $C_{15}H_{14}O_4$ vom Schmp. 190–191° enthält drei Hydroxyl- (Triacetat vom Schmp. 112°) und eine Methoxylgruppe.

Verfasser hat das Rhapontin aus käuflichen "türkischen Rhabarber-Wurzeln" mit Aceton extrahiert (Ausb. 3.2%) und durch die Untersuchung des Aglykons erkannt, dass es ein Glukosid des 3,5,3'-Trioxy-4'-methoxy-stilben ist.

Das Rhapontigenintribenzoat vom Schmp. 142° entfärbt die alkalische Kaliumpermanganat-Lösung. Beim Oxydieren in Eisessig mit Chromtrioxyd bei 60–65° entstehen daraus Benzoyl-isovanillinsäure und Dibenzoyl- α -resorcylsäure.

Auch beim Oxydieren des Rhapontigenins mit Ozon in Eisessig und darauffolgender Spaltung des Ozonids bekommt man Isovanillin vom Schmp. 115° und α -Resorcyaldehyd vom Schmp. 157°. Die ätherische Lösung des Rhapontigenins absorbiert 1 Mol. Wasserstoff (Pt-Katalysator) und das so gebildete Dihydrorhapontigenin $C_{15}H_{16}O_4$ vom

Schmp. 135–136° liefert das Tribenzoat $C_{15}H_{13}(C_6H_5CO)_3O_4$ vom Schmp. 106–107°, welches gegen Kaliumpermanganat beständig ist.

Aus diesen Resultaten kommt dem Rhapontigenin die Konstitution zu:

Die Uebersicht obiger Reaktionen wird durch folgendes Schema veranschaulicht:

Durch Kochen des Rhapontigenins mit Essigsäureanhydrid wird das Triacetyl-rhapontigenin $C_{15}H_{11}(CH_3CO)_3O_4$ vom Schmp. 114° dargestellt, aber mit Natriumacetat und Essigsäureanhydrid bildet es Nadeln vom Schmp. 128°, die dieselbe Zusammensetzung $C_{15}H_{11}(CH_3CO)_3O_4$ besitzen. Diese Erscheinung lässt sich durch die cis-trans-Isomerie erklären.

Mit Chlorkalk färbt sich das Rhapontigenin blutrot (1,3-Dioxy-Verbindung!) und das Dihydrorhaptigenin violett, aber das Rhapontin zeigt diese Farbenreaktion

nicht. Durch CrO_3 -Oxydation des Rhapontinbenzoats vom Schmp. $116-117^\circ$ in Eisessig bekommt man Benzyl-isovanillinsäure und eine in Na_2CO_3 -unlösliche Substanz. Deshalb ist zu schliessen, dass der Zucker im Rhapontin am Resorcinkern verankert ist:

Konstanten der wichtigen Präparaten.

Rhapontin $\text{C}_{21}\text{H}_{24}\text{O}_9$; farblose, glänzende Nadeln vom Schmp. $236-237^\circ$ (unter Zers.).

Rhapontigenin $\text{C}_{15}\text{H}_{14}\text{O}_4$; farblose Nadeln vom Schmp. $186-187^\circ$.

Triacetyl-rhapontigenin $\text{C}_{15}\text{H}_{11}(\text{CH}_3\text{CO})_3\text{O}_4$; 1) farblose Tafeln vom Schmp. 114° .

2) farblose Nadeln vom Schmp. 128° .

Tribenzoyl-rhapontigenin $\text{C}_{15}\text{H}_{11}(\text{C}_6\text{H}_5\text{CO})_3\text{O}_4$; farblose Nadeln vom Schmp. 142° .

Dihydrorhapontigenin $\text{C}_{15}\text{H}_{16}\text{O}_4$; farblose Nadeln vom Schmp. $135-136^\circ$.

Tribenzoyldihydrorhapontigenin $\text{C}_{15}\text{H}_{13}(\text{C}_6\text{H}_5\text{CO})_3\text{O}_4$; farblose Nadeln vom Schmp. $106-107^\circ$.

Benzoylisovanillinsäure $\text{C}_8\text{H}_7\text{O}_4(\text{C}_6\text{H}_5\text{CO})$; farblose Tafeln vom Schmp. 177° .

Isovanillinsäure $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_4$; farblose, filzige Nadeln vom Schmp. $251-252^\circ$.

Dibenzoyl- α -resorecylsäure $\text{C}_7\text{H}_4\text{O}_4(\text{C}_6\text{H}_5\text{CO})$; farblose Nadeln vom Schmp. 226° .

α -Resorecylsäure $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_4$; farblose Nadeln vom Schmp. 234° .

Isovanillin $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3$; farblose Säulen vom Schmp. 115° .

α -Resorecylaldehyd $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_3$; farblose Nadeln vom Schmp. 157° .

Literatur

- 1) Berl. Jahrb. f. d. Pharm., 252 (1822).
- 2) Ar. 243, 443 (1904).
- 3) Bull. de l'Acad. roy. med. de Belgique, 106 (1903).
- 4) A. 309, 32 (1899).
- 5) J. pr., 2, 77, 321 (1908).

(Autoref.)

鹽酸鹽 無水アルコール, 無水エーテルより再結晶して微黄色針狀晶 Zp. 232°

物質 2.851 mg; CO₂ 6.098 mg H₂O 1.577 mg C, 58.3% H, 5.0%, 物質 2.497 mg; N₂ 0.135 cc (760.6 mm 11°C) N, 6.5% C₁₁H₁₁O₂HCl とするの理論數 C, 58.5% H, 5.3% N, 6.2%

Pikrat 氷醋酸より再結晶して黄色針狀晶 Zp. 251~2°

物質 2.848 mg; CO₂ 5.073 mg, H₂O 0.820 mg C, 48.6% H, 3.2% 物質 3.633 mg; N₂ 0.419 cc (759.5 mm 10°C) N, 13.6% C₁₇H₁₄O₉N₄ とするの理論數 C, 48.8% H, 3.3% N, 13.4%

Rhapontin の構造に就て

河 村 俊

(株式會社武田長兵衛商店研究部)

(昭和 13 年 5 月 1 日受理)

Rhapontin は Schürhoff 等¹⁾ に依れば *Rheum Rhaponticum* L. (pontischer Rhabarber) 及其の栽培による各變種 (Altai-, sibirische-, Tientsin-, Himalaya-Rhabarber 等) 即 Rhapontik-wurzel に含有せられる Glykosid で, 下劑として賞用される大黃中之を含むものは低級品とされて居る. S. K. Creur²⁾, Schürhoff u. Plettner¹⁾ 等は大黃中 Rhapontin の存否, 或は真正大黃に贗造品として Rhapontin 含有の大黃が混合されて居るか否かを鑑識する方法について報告して居る.

Rhapontin は 1822 年 Hornemann³⁾ により初て Rhapontik-wurzel から結晶として取出され Rhaponticin と命名された物質である. 其後 Weppen⁴⁾ は本品の存在を否定したが, Tschirch u. Christofletti⁵⁾ が Hornemann の報告の正しい事を證し, 次で Gilson⁶⁾ (同じものを取出し Ponticin と命名した), O. Hesse^{7) 8)} により稍々その性質が檢明せられたのである.

Hesse は Radix Rhei Rhapontici 及び Radix Rhei austriaci を Aether 及び Aceton で浸出し, 黄白色の結晶を取出して Rhapontin と命名し, 前の Rhaponticin 及び Ponticin と同一物であるとした. そして Rhapontin を初は C₂₂H₂₄O₉ としたが, 後 C₂₁H₂₄O₉ なる Glykosid であると訂正した. Rhapontin は熱すれば 215° で褐色に着色し初め 230-236° で熔融して黑色となり, $[\alpha]_D^{15} = -63^\circ$ (Aceton-水 [1:1] に溶す), Benzol, Ligroin, Chloroform に不溶, Äther, absol. Alkohol, Aceton に難溶, 稀 Alkohol, 稀 Aceton に熱時易溶で, Pentaacetylrrhapontin (Fp 95°), Hexaacetylrrhapontin (Fp 138°) を生成する. Rhapontin を稀硫酸で煮沸すれば Rhapontigenin (Fp 188°) C₁₅H₁₄O₄ と Glukose となる. Rhapontigenin は Triacetat (Fp 112°) を生じ, 又 Methoxyl 基 1 個を有する事から C₁₄H₈(OCH₃)(OH)₃

の組成式を與へられ, Zucker は之を結晶にし分析, $[\alpha]_D$ 等から Glukose である事が確證された。

Hesse の報告以後尙二三の文獻⁹⁾ があるが, その構造については大體上記以上の報告がない。

著者は市販土耳其産大黃の成分を抽出し, その有効成分を純粹に分離しやうとした所, 下劑として有効と思はれる Anthrachinon 系色素及び其の Glukoside の含量は僅かで, 却て多量に即ち原料生藥の約 3% に當る無色の針狀晶を得た。原料生藥をよく乾燥粉碎し, 先づ Äther を以て浸出し Oxymethylantrachinon 類 (Chrysophansäure, Emodin, Rhein, Emodinmonomethyläther) を分離し (收量 Roh 約 0.7%), 次に Aceton で浸出した。Aceton 浸出液は濃厚な赤褐色を呈し之を放置すれば黄色及び白色の結晶を析出して来る。此 Aceton 溶液を濃縮して兩結晶の混合物を得た。兩者は Essigester により略々分離され, 黄色結晶 (收量 Roh 約 1.2%) 及び白色結晶 (收量 Roh 約 3.2%) となる。

黄色結晶は既知の Rheopurgarin^{10), 11)} 即ち Chrysophanein, Emodinglucosid 及び Rheochrysin の Gemisch である。

白色結晶は稀 Aceton から再結晶を繰返すと遂に Fp 236-237° (u. Zers) の無色光澤ある針狀晶となる。本品は Benzol, Ligroin, Chloroform 等に不溶, Äther, absol. Alkohol, Aceton に難溶, 稀 Alkohol, 稀 Aceton に熱時易溶, $[\alpha]_D^{20} = -59.5^\circ$ で, 分析の結果は $C_{21}H_{24}O_9$ に相當し, Pyridin と無水醋酸で Acetylieren して得た Acetat (Fp 135-136°) は Hexaacetylderivat, $C_{21}H_{18}(CH_3CO)_6O_9$ に一致する。これらの結果から本品は文獻所載の Rhapontin (Ponticin, Rhaponticin) なる事を知つた。本品は又最近 Schürhoff u. Plettner¹⁾ の發表した呈色反應による證明法の各反應をもよく示す。

此物質の現在迄に知られて居る化學的構造は前述の程度なので, 著者は此構造を決定せんと試み次の如くにして之を明らかにする事が出来た。

Rhapontin を Alkohol 中鹽酸を用ひて加水分解すれば文獻所載の如く Rhapontigenin 及び Zucker が得られる。

Zucker は既に Hesse の證した如く Fehling 液を強く還元し, Osazon, Phenylhydrazon 等から Glukose なる事明かである,

Rhapontigenin は Äther, Alkohol, Methanol, Aceton, 氷醋酸等に易溶, Benzol, Petroläther, 水に不溶, 溫湯には僅かに溶け, その Alkohol 溶液は $FeCl_3$ で綠色を呈し, 又濃硫酸で赤色を呈する。含水 Alkohol から脱色炭を用ひて數回再結晶を繰返すと殆ど無色の針狀晶, Fp 186-187° となる。元素分析, Methoxyl-基, 分子量測定の結果は $C_{14}H_{11}O_3(OCH_3)$ によく一致する。

Rhapontigenin を無水醋酸で Acetylieren し氷醋酸から再結晶すれば Fp 114° の無色板状品が得られる本品は元素分析, Methoxyl-基, Acetyl-基の測定成績から Triacetyl-rhapontigenin $\text{C}_{14}\text{H}_8\text{O}_3(\text{CH}_3\text{CO})_3(\text{OCH}_3)$ と考えられる. 然るに同 Rhapontigenin を熔融直後の Na-acetat と無水醋酸とで常法の如く Acetylieren すれば無色の光澤ある針状品, Fp 128° となり分析数は $\text{C}_{15}\text{H}_{11}(\text{CH}_3\text{CO})_3\text{O}_4$ によく一致する. 依て Debye-Scherrer 寫眞を撮つたところ, 兩者の構造は明に異なつて居る (Fig. 1. 参照). 之は後述の如く Rhapontigenin 中に二重結合が存在する爲 $-\text{CH}=\text{CH}-$ の H が Cis-trans-Isomerie を生成するためではあるまいかと想像される.

Fig. 1

Fp 114°

Fig. 2

Fp 128°

Rhapontigenin を Pyridin と Benzoylchlorid とで常法の如く Benzoylieren すると無色針状品, Fp 142° の Tribenzoyl-rhapontigenin $\text{C}_{15}\text{H}_{11}\text{O}_4(\text{C}_6\text{H}_5\text{CO})_3$ が得られる. 本品の Aceton 溶液は alkalisch の KMnO_4 -溶液を脱色する.

依て Rhapontigenin の Äther 溶液を Pt-Katalysator で接觸還元したところ, 1 Mol の水素を吸収し, 芳香性を有する無色針状品

品, Fp 135-136° の Dihydrorhapontigenin を得た. 本品の Tribenzoat $\text{C}_{15}\text{H}_{13}(\text{C}_6\text{H}_5\text{CO})_3\text{O}_4$ は Fp 106-107° で KMnO_4 -溶液を脱色せず, 又後述の Rhapontigeninbenzoat の CrO_3 -酸化に於ける場合と同一條件では酸化されない.

Tribenzoyl-rhapontigenin の氷醋酸溶液を 60-65° で CrO_3 を用ひて酸化すれば容易に酸化は進行し, その反應成績體を氷醋酸から再結晶すると Fp 226° の少々溶け難い無色針状品及び Fp 177° の易溶性結晶が得られる. 前者は Methoxyl-基を有せず, 鹼化すれば Zp 234° の Äther, Alkohol, 水及び重曹水にも易溶の物質となり, Benzoesäure より合成した α -Resorecylsäure と全く一致し, 従つて Fp 226° の物質は Dibenzoyl- α -resorecylsäure なる事が解つた. 後者は Methoxyl-基 1 個を有し, 鹼化すれば Alkohol, 重曹水に易溶, Äther に難溶, Petroläther, 水等に不溶の Fp 251-252° の絹絲様針状品となり, 合成した Isovanillinsäure と全く一致し, 従つて Fp 177° の物質は Isovanillinsäurebenzoat なる事が解つた.

以上 Ⅱ , 等の存在を証明したことから Rhapontigenin は

と考へるのが至當であるが更に Ozon 酸化でその中間成績體

を捕捉したので上式は一層確實となつた。

即ち Rhapontigenin の氷醋酸溶液を冷却しつつ之に Ozon を通じたところ、Ozon は盛に吸収された。反應終了後水で分解し反應成績體を分離し Fp 114-115° の Isovanillin と Fp 157° の α -Resorcyllaldehyd とを得た。

以上の反應關係を圖示すれば次の如くである。

尙 Rhapontigenin, Dihydrorhapontigenin の吸収曲線を比較するに Fig. 2 の如くである。

更に Zucker の位置を知る爲に Rhapontinbenzoat, Fp 116-117° を CrO_3 で酸化し、その酸化成績體を分離したところ、Isovanillinsäurebenzoat, Fp 177° と Na_2CO_3 -溶液に不溶の物

質とを得た。Rhapontigenin を Chlorkalk 溶液に加へると液は直に血赤色を呈し、又 Dihydrorhapontigenin を加へると紫色を呈する (α -Resorecylsäure は紫赤色を呈する)。然るに Rhapontin 其物は Chlorkalk に依て直には呈色しない (暫時後黄色となる)。此事は Zucker

Fig. 2
Rhapontigenin u.
Dihydrorhapontigenin

----- Rhapontigenin 0.001%
in Alkohol
—— Dihydrorhapontigenin
0.01% in Alkohol

が =HC の一つの -OH と結合して居る事を示すものである。依て Rhapontin は

であると推定せられる。

本研究に於て御懇篤な御指導を賜つた恩師朝比奈先生、御指導と本稿の御校閲とを賜はつた桑田博士に謹謝し、元素分析を施行せられた笠原、今井兩氏、光學的測定を施行せられた渡邊厚、神尾兩氏に深謝する。

實 驗 之 部

土耳其大黃の浸出

市販土耳其大黃をよく乾燥粉碎して粉末となし、Äther で 30-35 時間浸出後更に Aceton で約 70 時間浸出し、各浸出液を濃縮し析出し来る結晶を濾取する。

Oxymethylantrachinone: Äther 濃液より析出する結晶性物質は赤褐色を呈し収量は粗成物で約 0.7% である。本品は Zucker-frei の Chrysophansäure, Emodin, Rhein 等より成る Oxymethylantrachinon である。

Rheopurgarin:^{10), 11)} Aceton 濃縮液に水を加へ、析出する黄色及び白色の結晶を濾取、濾液を Essig-ester で數回振盪し Essigester 溶液を濃縮し更に残りの結晶を得る。本品は 2 種の混合物故乾燥後 Essigester と共に煮沸すれば黄色結晶の大部分及び一部の白色結晶は溶解し、その溶液から冷後黄色針狀晶を析出し大體の分離ができる。収量は黄色結晶粗成物約 1.2%, 白色結晶粗成物約 3.2%。

黄色結晶を Essigester-Methanol 混液から再結晶すれば黄色絹絲様の針狀晶となる。Fp は 231° 前後にある。本品の分析値は混合物の爲一定せず、次の如く Oxymethylantrachinone 及び Zucker を得る事により Gilson の Rheopurgarin と同一物と推定せられる。本物質を 3% 酒精性鹽酸と水浴中で加熱加水分解し反應後 Äther 易溶性の黄色物質を順次重曹水、炭酸曹達溶液、Kalilauge で抽出分離し、炭酸曹達溶液からは Emodin (Acetat が Fp 194-196° で既知の Emodintriacetat と混融して變化なし)、Kalilauge に溶ける部分から Chrysophansäure, Fp 186° を得た。但し Chrysophansäure の Fp は Sintern するので Methoxyl-基を調べたところ 3.50% の値を得た。之は恐らく Rheochrysidin の一部を含んで居る爲であらう。分解液の Äther 不溶の部分処理し Fehling 液を強く還元する Syrup を得た。本品は Fp 205°, 黄色の Phenylsazon を生ずる。

Rhapontin

Aceton 浸出液から得た白色の結晶を Aceton-水 (1:1) の混液より脱色炭を用ひ數回再結晶すれば無色の光澤ある針狀晶となる。Fp 236-237° (u. Zers.)

分析 (20 mm, 120-130°, 4 時間乾燥) 物質: 4.380 mg CO₂: 9.650 mg H₂O: 2.345 mg C%: 60.09 H%: 5.99 C₂₁H₂₄O₉ とすれば C%: 59.97 H%: 5.76

旋光度 物質 0.2150 g を 10 cc の Aceton-水 (1:1) の混液に溶解。1 dm 管で觀測。α_D²⁰ = -1.28°, [α]_D²⁰ = -59.5°.

本品は濃硫酸に深紅色, Alkali には無色に溶け次第に褐色となり, 10% Vanillin と濃硫酸との混液には褐色から赤紫色, 10% Chloralhydrat と濃硫酸との混液には黄金色を呈し後無色となる。〕

Hexaacetyl-rhapontin: Rhapontin 1 g を 6 cc の Pyridin に溶し 3 cc の無水醋酸を加へ加熱煮沸後直ちに加熱を止め 2 時間放置後鹽酸々性の水中に注入, 物質の固化後濾過乾燥すれば白色無晶形の物質となる粗成物 1.8 g Fpca 105°. 本品を Alkohol より再結晶するに Fp 135-136° の針狀晶となる。

分析 (20 mm, 100°, 4 時間乾燥) 物質: 3.380 mg CO₂: 7.275 mg H₂O: 1.675 mg C%: 53.70 H%: 5.54 C₂₁H₁₈(CH₃CO)₆O₉ とすれば C: 53.90 H%: 5.40.

Acetyl 基の測定.

物質 60.00 mg を濃硫酸 5 cc に溶解し 1 時間水蒸氣蒸溜に附し, 溜液を中和するに N/10 alkoholisch. Kalilauge (F=1.050) 5.37 cc を要した盲檢では N/10 KOH の消費量 0.12 cc 依て CH₃CO% = 39.4 となる。Hexaacetat C₂₁H₁₈(CH₃CO)₆O₉ とすれば CH₃CO% = 38.4, Pentaacetat C₂₁H₁₉(CH₃CO)₅O₉ とすれば CH₃CO% = 34.1

Rhapontin の加水分解

3 g の物質を 3% 酒精性鹽酸 (又は稀硫酸) と 1 時間水浴中で煮沸後 Alkohol を溜去し水を加へ Äther を以て抽出する。

Glukose: Rhapontin を稀硫酸で分解し Rhapontigenin を Äther で振取した殘液に過剰の Bariumcarbonat を加へて硫酸を沈澱せしめ, 濾液に更に鉛糖を加へて不純物を除去, 濾液は H₂S で脱鉛濃縮するに Syrup 狀物質を得る。本物質は Fehling 液を強く還元する。又本品 1 g を 50 cc の水に溶解し Phenylhydrazinhydrochlorid 及 Na-acetat を加へ醋酸々性として水浴中に 1 時間加熱するに著量の黃色無晶形沈澱を生ずる。此物質を水及び Aceten でよく洗滌し, 殘溜物を 50% Alkohol から再結晶すれば Fp 205-206 の黃色針狀晶を生じ, 之を Glukose の Phenylsazon と比較するに全く一致する。

分析 物質: 3.880 mg CO₂: 8.615 mg H₂O: 2.070 mg C%: 60.56 H%: 5.97 C₁₈H₂₂O₄N₄ とすれば C%: 60.31 H%: 6.19

Rhapontigenin: Äther 溶液は Äther を溜去後含水酒精より脱色炭を用ひて再結晶すれば殆ど爲色の針狀晶となる。Fp 186-187°.

分析 (20 mm, 140°, 4 時間乾燥) 物質: 4.130 mg CO₂: 10.570 mg H₂O: 2.080 mg C%: 69.80 H%: 5.64 C₁₅H₁₄O₄ とすれば C%: 69.74 H: 5.46

Methoxyl 基の測定 物質: 4.003 mg AgJ: 3.620 mg CH₃O: 11.95 物質 3.557 mg AgJ: 3.300 mg CH₃O% 12.25 C₁₄H₁₁O₃(OCH₃) とすれば CH₃O% 12.01

分子量測定 (Mikro-Rast 法) 物質: 0.283 mg Kampher: 3.527 mg ΔT = 12° M.G. = 267.5 C₁₅H₁₄O₄ とすれば M.G. = 253.1

Triacetyl-rhapontigenin

1) Fp 114° のもの: Rhapontigenin 0.2 g を無水醋酸 10 cc と 1 時間 120-130° に加熱後冷水中に注入, 放冷するに白色, 無晶形物質となる。收量 0.25 g 醋酸より再結晶するに光澤ある板狀晶となる。Fp. 114°.

分析 (20 mm, 70°, 4 時間乾燥) 物質: 3.545 mg CO₂: 8.555 mg H₂O: 1.700 mg C%: 65.82 H%: 5.37 C₁₅H₁₁(CH₃CO)₃O₄ とすれば C%: 65.59 H%: 5.26

Methoxyl 基の測定. 物質: 4.283 mg AgJ: 2.610 mg CH₃O%: 8.05 物質: 4.148 mg AgJ: 2.535 mg CH₃O%: 8.07 C₁₄H₈O₃(CH₃CO)₃(OCH₃) とすれば CH₃O% 8.07

Acetyl 基の測定. 物質 52.4 mg を濃硫酸 5 cc に溶解し水 20 cc を加へ水蒸気蒸溜を行ふ. 溜液を中和するに N/10 KOH (F=1.050) 4.05 cc を要す. 盲検に於ける N/10 KOH の消費量は 0.12 cc. 依て CH₃CO%=33.88 となる. Triacetat C₁₅H₁₁(CH₃CO)₃O₄ とすれば CH₃CO%=33.60.

2) Fp 128° のもの: Rhapontigenin 0.2 g を熔融直後の Na-acetat 0.2 g 及び無水醋酸 2 cc と 1 時間煮沸, 以後 1) と同様に処理すれば Fp 128° の針状晶を得る.

分析 (20 mm, 90°, 4 時間乾燥) 物質: 3.560 mg CO₂: 8.575 mg H₂O: 1.670 mg C%: 65.69 H%: 5.25 C₁₅H₁₁(CH₃CO)₃O₄ とすれば C%: 65.59 H%: 5.26

Tribenzoyl-rhapontigenin

Rhapontigenin 0.2 g を Pyridin 10 cc に溶解し氷冷しつつ徐々に 2 g の Benzoylchlorid を滴下すれば, 暫時で液は深紅色となり Pyridin の鹽酸鹽を析出する. 2 時間後過剰の Benzoylchlorid を炭酸曹達で分解し稀鹽酸中に注入し Pyridin を除去すれば黄色油状物質を残し暫時にして固化する. これを濾取し Ton で細末となし Petroläther で Benzoessäure を除去後 Aceton, Alkohol, 水の混液から再結晶するに絹絲様の針状晶となる. Fp 142°.

分析 (20 mm, 80°, 4 時間乾燥) 物質: 3.330 mg CO₂: 9.230 mg H₂O: 1.320 mg C%: 75.60 H%: 4.44 C₁₅H₁₁(C₆H₅CO)₃O₄ とすれば C%: 75.76 H%: 4.60

本品は Petroläther, Äther, Hexan, 水に殆ど不溶, Alkohol には可成溶解, Aceton, Benzol 等に易溶である. 又本物質の Aceton 溶液に炭酸曹達 Alkali 性の KMnO₄-溶液を加へると暫時でその紫色を失ふ.

Dihydro-rhapontigenin

Rhapontigenin 1 g を absol. Äther 100 cc に溶解し, Pt-Mohr を觸媒として接觸還元すれば約 3 時間で水素を吸収しなくなる. Pt を濾別し, Äther を溜去すれば芳香性の白色結晶を得る. 水より再結晶するに Fp 135-136° の針状晶となり, 90-100° 減壓で乾燥すれば結晶水を放出する.

分析 (20 mm, 90-100°, 8 時間乾燥) 物質: 3.635 mg CO₂: 9.240 mg H₂O: 2.100 mg C%: 69.33 H%: 6.46 C₁₅H₁₆O₄ とすれば C%: 69.20 H%: 6.20

本物質は Alkohol, Äther, Aceton, 氷醋酸, Essigester 等に易溶, 炭酸曹達溶液に溶解すれば桃赤色→褐色→帶緑褐色→緑色の色調變化を起す.

Dihydrorhapontigenintribenzoat: Dihydrorhapontigenin を Pyridin と Benzoylchlorid とで常法の如く Benzoyl 化し, Aceton-水の混液から再結晶するに Fp 106-107° の結晶となる.

分析 物質: 3.965 mg CO₂: 10.940 mg H₂O: 1.700 mg C%: 75.25 H%: 4.80 C₁₅H₁₃(C₆H₅CO)₃O₄ とすれば C%: 75.50 H%: 4.93

本物質は KMnO₄-溶液を脱色しない, 又 Rhapontigeninbenzoat の酸化と同條件で CrO₃ 酸化を行つたが酸化反應は起らなかった.

Tribenzoylrhapontigenin の CrO₃ 酸化

物質 1.5 g を氷醋酸 70 cc に溶解し 60-65° に保ちつつ 2 g の CrO₃ の氷醋酸溶液を滴下する. 反應時間 1 時間. 反應後過剰の CrO₃ を Methanol で分解し大部分の氷醋酸を減壓下で溜去, 残渣を水で稀釋し ausäthern. する Äther 溶液を鹽酸で洗滌重曹で醋酸を除去し, 脱水後 Äther を溜去すれば淡褐色結晶性の物質を残留する. 收量約 1.2 g.

此物質を氷醋酸から再結晶すれば少々溶難い結晶と易溶性の結晶とに分離する事が出来る.

(1) α -Resorcylsäuredibenzoat 及び α -Resorcylsäure:

上記酸化成績液中氷醋酸から先づ析出する結晶は之を更に氷醋酸から再結晶を繰返せば無色の針状晶となる。Fp 226°.

分析 (20 mm, 100°, 4 時間乾燥) 物質: 4.310 mg CO₂: 10.960 mg H₂O: 1.495 mg C%: 69.35 H%: 3.88 C₂₁H₁₄O₆ とすれば C%: 69.59 H%: 3.89

α -Resorcylsäure: Fp 226° の結晶を過剰の Alkalilauge と 30 分間水浴中で加熱鹼化し、鹽酸々性として冷却、析出する Benzoessäure を Petroläther で抽出除去し、次で液を ausäthern, Äther を溜去すれば淡褐色の結晶が得られる。収量は 0.8 g より 0.5 g.

本品は Äther, Alkohol, 水等に易溶, Benzol, Chloroform, Petroläther, Hexan 等に不溶, 又重曹溶液にも可溶である。Äther-Petroläther 混液から再結晶すれば Fp 234° (u. Zers) となる。その Alkohol 溶液は FeCl₃ で呈色せず、濃硫酸に依て深紅色を呈する。Methoxyl 基を検するに陰性。

分析 (20 mm, 100°, 10 時間乾燥) 物質: 3.790 mg CO₂: 7.525 mg H₂O: 1.320 mg C%: 54.15 H%: 3.90 C₇H₆O₄ とすれば C%: 54.52 H%: 3.93

本物質を Benzoessäure から合成した α -Resorcylsäure¹²⁾ (Zp 234°) と混融するに融點の降下を起さない。

(2) Iovanillinsäurebenzoat 及び Iovanillinsäure:

酸化成績液中 α -Resorcylsäurebenzoat を濾取した母液からは更に無色の結晶が得られる。之を稀酒精より再結晶すれば Fp 177° となる。本物質は Methoxyl 基を含有する。

分析 (20 mm, 100°, 4 時間乾燥) 物質: 3.675 mg CO₂: 8.900 mg H₂O: 1.405 mg C%: 66.05 H%: 4.28 C₁₅H₁₂O₅ とすれば C%: 66.17 H%: 4.41

Methoxyl 基の測定。物質: 3.769 mg AgJ: 3.308 mg CH₃O%: 11.59 M.G: 267 C₁₄H₉O₄(OCH₃) とすれば CH₃O%: 11.40 M.G: 272

Iovanillinsäure: Fp 177° の結晶を過剰の Alkalilauge と 20 分間水浴中で加熱鹼化し、鹽酸酸性として冷却し、冷後析出する結晶を濾取乾燥し Petroläther で Benzoessäure を除去するに尚絹絲様の針晶が残る。之を稀 Alkohol より再結晶すれば Fp 251-252° となる。本品は Äther, Petroläther に不溶, Aceton, Alkohol 等に易溶で重曹溶液にもよく溶解する。

分析 (20 mm, 120°, 4 時間乾燥) 物質: 3.925 mg CO₂: 8.185 mg H₂O: 1.710 mg C%: 56.87 H%: 4.87 C₈H₈O₄ とすれば C%: 57.14 H%: 4.76

Methoxyl 基の測定。物質: 2.904 mg AgJ: 4.070 mg CH₃O%: 18.51 M.G. 167 C₇H₅O₃(OCH₃) とすれば CH₃O% 18.45 M.G.: 168

本物質を Protocatechusäure から合成した Iovanillinsäure¹³⁾ (Fp 250°) と混融するに融點の降下を起さない。

Iovanillinsäure-acetat: Fp 251° の物質を無水醋酸と 3 時間煮沸後水中に注いで放冷し無水醋酸を分解すれば間もなく針状晶が析出する。Fp 210° で合成の Iovanillinsäureacetat と全く一致する。

Rhapontigenin の Ozon 酸化

Rhapontigenin 0.5 g を氷醋酸 40 cc に溶解し外部を氷水で冷却しつつ Ozon を通ずればよく吸収されて液は赤色を呈して来る。反應終了後氷水を加へ暫時放置、後水浴上で徐々に加温し Ozonid を分解し、減壓で氷醋酸溶液を濃縮、残渣を ausäthern し、Äther 溶液を重曹水で充分に洗滌、乾燥後 Äther を蒸溜すれば淡褐色を帯びた結晶が残る、此結晶を Benzol で可溶部と不溶部とに分ける。

Iovanillin: Benzol 溶液から Benzol を溜去し、残渣を水で反覆再結晶すれば Fp 115° の柱状結晶が得られる。本品は FeCl₃ で呈色せず、濃硫酸により黄色を呈する。又本品は Ammonia 性銀液を温時直ちに還元し、又 KMnO₄ 溶液を脱色する。

分析 (20 mm, 90-100°, 4 時間乾燥) 物質: 3.730 mg CO₂: 8.600 mg H₂O: 1.800 mg C%: 62.88 H%: 5.40 C₈H₈O₃ とすれば C%: 63.13 H%: 5.30

本品を合成した Isovanillin¹⁴⁾ と混融するに融點降下しない。

α -Resoreylaldehyd: Benzol 不溶性の物質を直に水で再結晶すると針状晶が得られる。Fp 157°。本物質は濃硫酸により紅紫色を呈し, Isovanillin 同様の還元性を有する。

分析 (20 mm, 100°, 4 時間乾燥) 物質: 3.297 mg CO₂: 7.370 mg H₂O: 1.220 mg C%: 60.96 H%: 4.14 C₇H₆O₃ とすれば C%: 60.86 H: 4.38

Rhapontinbenzoat の CrO₃ 酸化

Rhapontin を其儘氷冷しつつ常法の如く Pyridin と Benzoylchlorid で Benzoylieren し, Äther-Petrol-äther 混液から再結晶すれば Fp 116-117° の白色結晶となる。

此 Benzoat を Rhapontigenintribenzoat の CrO₃ の酸化の場合と全く同様に 60-65° で酸化し, ausäthern し, Äther を溜去すれば白色結晶が得られる。之を炭酸曹達に溶し濾液を酸性とし, 析出する物質を稀酒精から再結晶すれば Fp 177° となり Isovanillinsäurebenzoat と混融するに融點降下しない。

引用文献

- 1) Ar. 275, 281, (1937). 2) C. 1937, I, 4666; Quart. Jour. pharmac. Pharmacol. 9, 434, (1936)
- 3) Berl. Jahrb. f. d. Pharm. 252, (1822). (Schürhoff に依る) 4) Handwörterb. d. Chemie 6, 827.
- 5) Ar. 243, 443 (1904.) 6) Bull. de l'Acad. roy. de med. de Belgique 106, (1903.) (Pfl. Analyse に依る)
- 7) A. 309, 32 (1899). 8) J. pr. [2] 77, 321 (1908). 9) C. 1921, III 43; 1933, II, 1059.
- 10) Mém. cour. par l'Acad. roy. med. Belgique 455, (1905). (Pfl. Analyse に依る)
- 11) Klein: Handb. d. Pfl. Analyse III/2, S. 998. 12) 本誌. 44, 527. (大 13) 13) B. 11, 126 (1878).
- 14) Frdl. III, 895.

蟾酥の成分 (第七報)

邦産蟾有毒分泌液中の一新成分

近 藤 平 三 郎

大 野 節 郎

(乙卯研究所)

(昭和 13 年 5 月 9 日受理)

著者等は蟾酥の成分第六報 (本誌, 58, 37) に於て日本産蟾 (*Bufo vulgaris formosus*) の毒分泌液中に発見せられたる成分 Gamabufotoxin C₃₈H₆₀O₁₀N₄ Zp. 205-7°, Gamabufotalin (= Gamabufogenin) C₂₄H₃₄O₅ Fp. 261-2°, 歐州産蟾より得られたる Bufotalin C₂₆H₃₆O₆ と同一