Untersuchungen über Sterine. XIV. (Mitteil.) Über die Keton-cyanhydrine der Steringruppe.

von

Satoru KUWADA und Munemaro MIYASAKA.

[Aus dem Wissenschaftlichen Laboratorium der Firma Takeda-chōbei, Osaka.]

(Eingegangen am 28. April 1938.)

In letzterer Zeit berichteten die Verfasser über die Darstellungsweise und die Eigenschaften des trans-Dehydro-androsteron-cyanhydrins (I). Dieses Cyanhydrin ist unlöslich in Wasser, Aether und anderen organischen Lösungsmitteln, und unbeständig gegen schwache Alkalilauge (leichte Spaltung in Komponenten).

Durch die gleiche Methode wie beim trans-Dehydro-androsteron-cyanhydrin wurde nun Isoandrosteron-cyanhydrin ($C_{20}H_{31}O_2N$) vom Zp. 210° (unkorr.) (II) dargestellt. Es krystallisiert aus Chloroform-Methanol in Nadeln, löst sich nicht in Wasser und Aether, und bildet durch Acetylieren das Diacetat ($C_{24}H_{35}O_4N$) vom Schmp. 144° (unkorr.). Dagegen löst sich das Androsteron-cyanhydrin (III) in Aether und in anderen organischen Lösungsmitteln. Beim Umlösen des Aether-rückstandes aus verd. Methanol bildet es Nadeln vom Zp. 163° (unkorr.), die die Formel $C_{20}H_{31}O_2N$ besitzen. Sein Diacetat ($C_{24}H_{35}O_4N$) schmilzt bei 183° (unkorr.).

Auf Grund dieses verschiedenen Verhalten gegen Cyanwasserstoff lassen sich das Gemisch von I u. II, sowie das von II u. III leicht in einzelnen Bestandteilen trennen.

Die obenerwähnten drei Cyanhydrine sind gegen verd. Alkalilauge unbeständig. Zum Vergleichen stellten die Verfasser das Cholestanoncyanhydrin (IV) dar, das in Aether sehr leicht löslich ist und aus Hexan in Schuppen vom Schmp. $125-150^\circ$ (unkorr.) krystallisiert und seine Analysen-Zahlen für die Formel $C_{28}H_{47}ON$ spricht. Wenn man dies Cyanhydrin mehrmal aus Hexan umkrystallisiert, so erhält man das

Präparat vom Schmp. 155° (unkorr.), welches dieselbe Zusammensetzung wie das Präparat vom Schmp. 125–150° besitzt, und nach der Aufbewahrung im Exsikkator wieder den unscharfen Schmelzpunkt 125–150° zeigt. Die Hydroxylgruppe dieses Cyanhydrins lässt sich nicht acetylieren. Durch Essigsäure-anhydrid und Natrium-acetat bildet es eine Substanz vom Zp. 125° (unkorr.), aber ihre Analysen-Zahlen stimmen mit denen des Ausgangs-cyanhydrins gut überein.

Löst man das Cholestanon-cyanhydrin vom Schmp. 125–150° in Aether und schüttelt mit verd. Alkalilauge, so bekommt man aus dem Aether-rückstand nur Ausgangsmaterial zurück. Aber, wenn man das Cyanhydrin mit 1% iger methanolischen Kalilauge erwärmt, so gewinnt man aus Aetherauszüge das Cholestanon. Deshalb verhält sich das Cholestanon-cyanhydrin gegen Alkalilauge weit beständiger wie die Cyanhydrine der Androsterongruppe.

Tropft man eine Aetherlösung des trans-Dehydro-androsteron-cyanhydrin-diacetats in Aetherlösung von CH_3MgJ in der Kälte ganz langsam unter stetstem Umrühren hinein, und erwärmt noch 4 Stdn. auf dem Wasserbade, dann schüttelt mit Mineralsäure und destilliert den Aether ab, so bekommt man einen krystallinischen Rückstand, der mit Semicarbazid-acetat kein Semicarbazon bildet und sich als 17-Methyl- $\Delta^{5,6}$ -trans-androsten-3,17-diol vom Schmp. 198° (unkorr.) erweist (aus Methanol). Sein Diacetat (V) schmilzt bei 146° (unkorr.). Diese zwei Präparate zeigen keine Erniedrigung bei Mischschmelzen mit dem 17-Methyl- $\Delta^{5,6}$ -trans-androsten-3,17-diol und sein Diacetat, die aus trans-Dehydro-androsteron durch Grignard-Reaktion dargestellt werden.

Das Cholestanon-cyanhydrin (Zp. 125–150°) wurde in absol. Aether mit CH_3MgJ behandelt und der Aetherrückstand mit Semicarbazid-acetat im Alkohol erwärmt.

Das ausgeschiedene flockige Substanz wurde abfiltriert, die Mutterlauge eingedampft und mit Wasser und Aether umgeschüttelt. Beim Umlösen des Aether-Rückstandes aus Methanol bekam man zuerst die Krystalle vom Schmp. 147-148° (unkorr.), dann aus ihrer Mutterlauge die Krystalle vom Schmp. 125° (unkorr.). Beide Substanzen gaben gleiche Analysen-Werte des 3-Methyl-cholestanols-3, und die beiden durch Behandlung mit Essigsäure-anhydrid oder Isovaleriansäure oder in Pyridin mit Essigsäure-anhydrid dasselbes Kohlenwasserstoff vom Schmp. 84° (unkorr.), das dem Δ^2 - oder Δ^3 -3-Methyl-cholesten (VII) identisch ist. Stanley hat aus Cholestanon durch Behandlung mit CH_3MgJ eine rohe Reaktionsprodukt vom Schmp. 90° gewonnen, die aus Eisessig 3-Methyl-cholestanol-3 vom Schmp. 147-148° auskrystallisieren lässt und es liefert durch Destillieren unter vermindertem Druck mit Anilinhydrobromid das Δ^2 - oder Δ^3 -3-Methyl-cholesten ($\text{C}_{28}\text{H}_{48}$) vom Schmp. 81-82°. Verfasser haben die Arbeit von Stanley nachgeprüft und aus rohem Grignard-Reaktionsprodukt durch fraktionierte Krystallisation aus Methanol die zwei Substanzen vom Schmp. 147-148° und vom Schmp. 125° isoliert. Verfasser glauben dass diese zwei Substanzen als Stereoisomere aufzufassen sind, indem sie durch Behandlung mit Essigsäure-anhydrid ein und dasselbe Kohlenwasserstoff ($\text{C}_{28}\text{H}_{48}$) vom Schmp. 84° (unkorr.) liefern.

Die obenerwähnte flockige in vielen Lösungsmitteln sehr schwer lösliche semicarbazonartige Ausscheidung wurde abfiltriert, und nochmals aus Chloroform flockig ausgescheiden. Sie zersetzt sich bei 250° (unkorr.) und ihre Analysen-Zahlen sprechen für die Formel des 3-Methylketo-cholestanol-3-semicarbazons. Verseift man dies Semicarbazon in Eisessig mit Schwefelsäure, so gewinnt man die Methylketo-Verbindung vom Schmp. 173° (unkorr.) (VIII).

Diese anomale Bildung von VI durch Einwirkung von $\text{CH}_3\text{-MgJ}$ auf trans-Dehydroandrosteron-cyanhydrin lässt sich so deuten, dass entweder das Grignard-Reagenz reagiert als schwaches Alkali, spaltet von dem Cyanhydrin Cyanwasserstoff und dann bildet mit dem ursprünglichen Keton das 17-Methyl- $\Delta^{5,6}$ -trans-androsten-3,17-diol, oder die Nitril-Gruppe des Cyanhydrins einfach durch Alkylgruppe des Grignard-Reagenz ausgetauscht (vergl. Bruylant, Bl. Acad. Belgique (5), II, 26 [1925]; C. 1926 I, 874; Wieland und Hsing, A. 526, 188 [1936]). Verfasser zogen die erstere Interpretation vor und führten den verschiedenen Verlauf der Reaktion bei trans-Dehydroandrosteron-cyanhydrin-diacetat und Cholestanon-cyanhydrin auf die verschiedene Beständigkeit gegen Alkali zurück.

(Autoref.)

**Histologische Studien über die Drogen auf die
„durchscheinende Weise“. (I. Mitteil.)
Ueber die Blattdrogen in der Pharmacopoea
Japonica V. (I. Teil)**

VON

JISUKE TAKATORI

[Aus d. Pharmaceut. Inst. d. Medizin. Fakultät zu Nagasaki.]

(Eingegangen am 5. Mai 1938.)

In Anbetracht, dass bei bisherigen mikroskopisch-histologischen Untersuchungen die Schnitte grosse Schwierigkeiten bereiteten, hat Verfasser zur Aufklärung des inneren und äusseren histologischen Baues von Blattkörpern eine neue Methode ersonnen, durch welche brauchbare, mikroskopische Praeparate leicht gemacht werden können, ohne dass irgend welche Schnitte praepariert zu werden brauchen indem durch Erwärmen der Blattdrogen mit Alkalilauge und verdünnter Säure der Zelleninhalt des

ステリン類の研究 (第 XIV 報)

Sterin 系 Carbonyl- 化合物の Cyanhydrin について

桑 田 智
宮 坂 宗 麿

(株式会社武田長兵衛商店研究部)

(昭和13年6月6日受理)

Satoru Kuwada und Munemaro Miyasaka: Untersuchungen über Sterine. XIV. Mitteil.

Über die Keton-cyanhydrine der Steringruppe.

著者等は嘗て本誌 (57, 459 [昭和12年4月]) に trans-Dehydro-androsteron の Cyanhydrin (I) についてその製法と性状とを報告した。本品の特徴は水, Äther の何れにも不溶であり, 他の多くの有機溶媒に難溶であることが第一, 第二は例へば本品を冷時濃鹽酸と5日間振盪しても或は多量の Alkohol に加熱溶解し濃鹽酸を和して8時間煮沸しても何等の變化も見られなかつたやうに, 酸に對しては極めて安定であるに拘らず, 稀 Alkalilauge に接すれば冷時容易に HCN を離して元の Keton に復歸するといふ點である。

第一の特性を Sterin 系の他の Carbonyl 化合物についても檢明し度いと考へ, trans-Dehydro-androsteron に HCN を作用させたのと全く同一の條件で Isoandrosteron の Cyanhydrin (II) を造つた。本品も水, Äther 兩溶媒に不溶で, 白色結晶性となつて兩液層間に析出する。之を Chloroform-Methanol から再結晶すれば Zp. 210° (unkorr.) の針晶となり $C_{20}H_{31}O_2N$ に一致する。ところが之と全く同一の方法で Androsteron 即ち C_3 位の水酸基が epi-型に結合して居るものの Cyanhydrin (III) は有機溶媒に極めて易溶で, その Äther 溶液を水と共に振盪したが兩液層間には何等の析出物も現れぬ。Äther の蒸溜殘渣を稀 Methanol から反覆結晶すると Zp. 163° (unkorr.) の針晶となり分析の結果は $C_{20}H_{31}O_2N$ によく適合する。

敘上は寔に乏しい數例に過ぎないけれど, Androsteron 系の化合物に於ては二重結合の在否

に關係なく, C_3 位の水酸基が *trans*- 型か *cis*- 型かの差異により, C_{17} 位の Carbonyl 基に造られる Cyanhydrin の溶解性が變るものと考へられる. 著者等はこの他, Androsteron の C_{5-6} に二重結合のある Dehydroandrosteron と稱す可き物質についてもこの性状を検明し度いと思つたが未だか様な物質を座右にする機會に恵まれない. がとも角, a 及び c, b 及び c の Oxy-keton の混合體が在ると假定し, この兩者を各々分離するにはその Cyanhydrin を作り Äther を用ひて可溶のものと不溶のものに分離すればよい譯で, d の Cyanhydrin も恐らく

Äther に可溶の物質だらうと想像して居る. 従來 Sterin の C_3 にある水酸基が *trans*- か *cis*- 型かを見分けるには Digitonin によつて沈澱を作るや否やの反應に據つた. 然るに上記の 3 者について見れば, 簡単な Cyanhydrin 化合物を作ることによつて Digitonin を用ふると全く同一の結果を期待し得るので, 單に學術的のみでなく實際的にもこの點甚だ興味深い示唆を與へるものと信する.

次は第二の特性たる Alkali に對する 安定度の問題である. 前記 3 種の Cyanhydrin はいづれも Alkali に對し不安定で, 容易に HCN を離して元の Keton 體に還る. そこで C_{17} 位の Ketonecyanhydrin の代りに, Dihydrocholesterin を用ひ C_3 位の水酸基を CrO_3 で酸化し

て得た Cholestanon の Cyanhydrin (IV) を造つて比較を試みた. 本品は Äther に可溶, その蒸溜殘渣を Hexan から結晶させると Zp. 125-150° (unkorr.) の鱗片狀晶となり分析の結果は $C_{28}H_{47}ON$ によく一致する. 本品を Hexan から更に反覆再結晶すると Zp. 155° (unkorr.) を示すが, 分析の結果は依然として $C_{28}H_{47}ON$ に一致し, 標品を Exsikkator 中に暫時貯藏した後取り出して Zp. を測定すると 125-150° を示す. 本品の含

む水酸基が *trans*-Dehydro-androsteron-cyanhydrin の場合のやうに醋化可能か否かを見やうとして, 先づ之を無水醋酸のみと共に 2 時間, 或は無水醋酸と 1 滴の濃硫酸と共に加熱を試みたが, 原物質を回収しただけ Acetat と思はれる異種の物質は得られなかつた. 然るに無水醋酸と Na-Acetate と共に 2 時間煮沸して得られた物質は Zp. 125° (unkorr.) を示し, Acetat が生じたものと想像したが分析の結果は依然として原品 $C_{28}H_{47}ON$ によく一致した.

Zp. 155° の原品は $[\alpha]_D: +28.58^\circ$ だが, この Zp. 125° のものは $[\alpha]_D: +39.40^\circ$ を示し兩者相異なるかのやうに見える. 然るに兩者は混融に於て Fp. 降下を起さないし, 又兩者を除濕器中に貯へた後 Zp. を検するといづれも 125-150° の不鋭敏な物質となる. 故に Cholestanon の Cyanhydrin も強固な結合状態にあるものではなく, Hydroxyl と Nitril とは容易にその立體的配位を交換し, 常溫に永く貯藏すれば常に平衡の状態を保つものと想像される, 尙 C₃ の Keton に作つた Cyanhydrin は C₁₇ の Keton に作つた Cyanhydrin と異り容易に醋化されない事實も留意すべきことと思ふ.

Cholestanon-cyanhydrin は Alkali に對して稍々安定である. 即ち本品を Äther に溶して置き 10% の Alkalilauge と共に振盪しても HCN の離脱は起らない. 1% の Methanol 性 Kali 10 cc と本品 0.1 g とを少時加溫すると HCN は直ちに離れて Cholestanon が回收される. 又, Nitril 基を $-\text{CH}_2-\text{NH}_2$ に還元する目的で本品 0.5 g を Alkohol 40 cc に溶し konz. HCl 10 cc, Zn-末 4 g と共に 11 時間煮沸し, 或は PtO₂ 0.5 g を觸媒とし本品 0.5 g を Alkohol 50 cc に溶し水素氣流中に 8 時間振盪したが, いづれも原物質を回收したのみであつた. 又, Nitril 基を鹼化して $-\text{COOH}$ にする目的で本品 0.5 g を Alkohol 40 cc に溶し, konz. HCl 10 cc を加へ 3 時間煮沸したが鹼化は行はれないで原品を回收したに留まる. 又, 本品の Alkohol 溶液は Digitonid の沈澱を作らない. 以上は Cholestanon-cyanhydrin の大體の性狀であるが, 要するに本品も trans-Dehydro-androsteron の Cyanhydrin の如く, 酸に對しては極めて安定であるが Alkali に對しては弱い. ただこの兩者の Alkali に對する安定性を比較するときは, 前者の方が稍々大きな安定性を持つて居ると言ひ得られる.

この比較は trans-Dehydro-androsteron-cyanhydrin-diacetat と Cholestanon-cyanhydrin とに對する Grignard 反應の成績に徴しても覗知できる, trans-Dehydro-androsteron-cyanhydrin は前記の通り Äther に不溶なのでその Diacetat (Fp. 203°) を造り, 之を多量の absol. Äther に溶し, 最初氷冷, 後煮沸して CH₃MgJ を作用させ, 稀鹽酸で分解して Äther 層を分取し, Äther の蒸溜殘渣に直ちに Semicarbazid-acetat の Alkohol 溶液を加へ加熱して Keton 體の分離をしようとしたが Semicarbazon と認め得られる物質を生成しない. Äther の蒸溜殘渣から結晶性に得られるものは常に 17-Methyl- $\Delta^{5,6}$ -trans-androsten-3,17-diol, Fp. 198° (unkorr.) で, 醋化すれば Fp. 146° (unkorr.) の Diacetat (V) となる. これらの物質は trans-Dehydro-androsteron そのものに CH₃MgJ を作用させて得られる 17-Methyl- $\Delta^{5,6}$ -trans-androsten-3,17-diol 及びその Diacetat と全く同様の性質を有し, 混融によるも Fp 降下は認められない. 故に上記の反應を式で示せば,

Cholestanon-cyanhydrin (Zp. 125–150°) に全く同一の條件で CH_3MgJ を作用させ、酸で分解した後 Äther に振取り、その蒸溜残渣を Alkohol に溶し、Semicarbazid-acetat の Alkohol 溶液を加へて少時間煮沸すると絮状の物質が析出して来る。故に反應液を放冷し析出物を濾別、濾液を濃縮して水を加へ Äther と共に振盪し、Äther の蒸溜残渣を Methanol に溶して放置すれば初に Fp. 147–148° (unkorr) の結晶が現れ、更にその母液から Fp. 125° (unkorr) の結晶が生成する。分析の結果は兩者とも 3-Methyl-cholestan-3-ol (VI) に一致し、いずれも無水醋酸又は Isovaleriansäure と共に、或は Pyridin に中無水醋酸と共に永く煮沸することによつて Fp. 84° (unkorr.) の骰子状結晶をなす炭化水素となり、分析の結果は Δ^2 又は Δ^3 -3-Methyl-cholesten (VII) に全くよく一致する。Stanley (Soc. 1937, 414) は Cholestanon に CH_3MgJ を反應させて Fp. 90° 前後の粗製結晶を製出し、之を氷醋酸から反覆結晶させて Fp. 147–148° の 3-Methyl-cholestanol-3 のみを分離し、更に之を Anilinhydrobromid と共に減壓下に蒸溜して Fp. 81–82° の Δ^2 -oder Δ^3 -Methyl-cholesten, $\text{C}_{28}\text{H}_{48}$ を得た。著者等も本報告を追試し、粗製の Grignard 反應體を Methanol から再結晶したところ Fp. 147–148° の物質と Fp. 125° の物質とに分離された。分析の結果はいずれも 3-Methyl-cholestanol-3 に一致し、上記 Cholestanon-cyanhydrin に CH_3MgJ を作用させて得た Fp. 147–148° 及び Fp. 125° のものに一致し、混融するも Fp. 降下を惹起しない。又、Fp. 147–148° 及び Fp. 125° の 3-Methyl-cholestanol-3 を無水醋酸と共に煮沸すれば Fp. 84° の Δ^2 -oder Δ^3 -Methyl-cholesten となり、Cholestanon-cyanhydrin から出發した夫と全く一致する、尙 Fp. 147–148° の 3-Methyl-cholestanol-3 と新に著者等が分離した Fp. 125° のものとが分析、 $[\alpha]_D$ の測定成績全く同一である點から推して、この兩者は Cyanhydrin の場合に見られるやうな Hydroxyl と Methyl 兩基が空間的配位を異にした物質だらうと考へられる。その各々から無水醋酸處理によつて同一の炭化水素を生成することは、脱水による Methylen 基の成立を中間體とし、最も安定な形に二重結合が轉位することを考へれば容易に説明し得る。

前記 Cholestanon-cyanhydrin に Grignard 反應を施した後 Semicarbazidacetat を作用させ絮状の析出物を濾取したが、本品は有機溶媒に極めて難溶、Chloroform から依然として絮状に析出し Zp. 250° を示す。Grignard 反應中 HCN が離脱して Cholestanon に還りその Semicarbazon が出來たのではないかと疑つたが、Cholestanon-semicarbazon は Zp. 242° (un-

kor.) であり, 試みにこれら兩者の混融を行ふと 5° 前後の降下が認められる. 分析の結果は 3-Methylketo-cholestanol-3 (VIII) の Semicarbazon に一致する. 本品を氷醋酸に溶し硫酸で鹼化して Methylketon 體を分離し, Hexan から再結晶すれば Fp. 173° (unkorr.) の長針狀晶を生じ, 分析の結果は $C_{29}H_{50}O_2$ に極めてよく一致する. 若し之が Semicarbazon の場合に懷いた疑の如く Cholestanon であるならば Fp. $127-129^{\circ}$ (unkorr.) を示す筈である. 兩者の混融に當つても著明な降下を惹起し明に異物質であることが認められる.

著者等は當初 trans-Dehydro-androsteron-cyanhydrin の Diacetat に Grignard 反應を施して豫期した Oxy-methylketon 化合物を捕捉し得ず, 様々に條件を變更して反應を繰返したにも拘らず常に trans-Dehydro-androsteron そのものに CH_3MgJ を作用させて得られると全く同一の 17-Methyl- $\Delta^{5,6}$ -trans-androsten-3,17-diol のみを得たことは Cyanhydrin が Alkali に極めて不安定なため, Grignard 反應中に HCN が離脱して元の Keton に還り, 之に更に Grignard 試薬が作用して Oxy-methyl 化合物になるのであらうと考へた. ところが文献中に, Bruylants (Bl. Acad Belgique (5), 11,26 [1925]; C. 1926. I, 874) が Dimethylamin- α -methyl-butyronitril に $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgHal}$ を作用させて Methyl-diäthyl-dimethylamino-methan を

得たやうに, 又, Wieland 及び Hsing (A. 526, 188 [1936]) が 5-Methoxy-indolyl- β -magnesiumjodid に Dimethylamino-acetonitril を反應させて β -Dimethylamino-methyl-5-methoxy-

indol を得たやうに, Keton の Cyanhydrin に於ても Nitril 基が Magnesium と結合する性質強くなり, Alkyl 基と直接交換した形となり, この點 Aldehyd の Cyanhydrin とは自ら異つた反應経路を辿るのではあるまいかと想像した。

若し上記兩様の機構のうち後者により多くの妥當性がありとすれば, Cholestanon の Cyanhydrin に於ても 3-Methyl-cholestanol-3 のみが生成し, Oxy-methylketon 體の生成は考へ難い。故に Grignard 試薬の有する弱い alkali 性のために, trans-Dehydroandrosteron-cyanhydrin の Diacetat からは極めて容易に Nitril 基が離脱して元の Keton に還り, 従つて 17-Methyl-androsten-3,17-diol のみを生成し, Alkali に對して稍々安定な Cholestanon-cyanhydrin に於ては一部分 Grignard 試薬が CN に作用して $-\text{CO}-\text{CH}_3$ に變ずるが, 永くこの試薬と反應させて居る間に HCN の離脱が起つて元の Cholestanon に還り Oxymethyl 化合物を生成するものと考えるのが最も穩當だらうと信ずる。

本研究に當り懇切な御教示と御鞭撻とを賜つた恩師朝比奈先生に謹謝する。實驗の部中元素分析は笠原, 今井兩氏の施行に據る。深謝の意を表する。

實 驗 の 部

Isoandrosteron-cyanhydrin.

Isoandrosteron 3 g を absol. Alkohol 300 cc に溶し, KCN 末 30 g を混じ氷冷下に攪拌しつつ konz. HCl 70 cc を滴下して一夜放置する。Alkohol 溶液を多量の水中に投じ Äther を和して振盪すれば兩液層間に Cyanhydrin が析出する。之を濾取し, Chloroform-Methanol から反覆再結晶すれば無色の針狀晶となり Zp. 210° (unkorr.) に固定する。

分析 (常壓, $80-90^\circ$ に 4 時間乾燥後減壓下硫酸乾燥器中に 1 夜放置)

物質 3.577 mg CO_2 : 9.890 mg H_2O : 3.110 mg C% 75.41 H% 9.73 物質 4.275 mg N_2 -Volum: 0.164cc (16° , 770 mm) N% 4.59 $\text{C}_{20}\text{H}_{31}\text{O}_2\text{N}$ (317.25) として C% 75.65 H% 9.85 N% 4.41

Isoandrosteron-cyanhydrin-diacetat

上記の Cyanhydrin 0.5 g を無水醋酸 10 cc と共に 2 時間煮沸し, 冷後水を加へて無水醋酸を分解し Äther と共に振盪, Äther 層を 10% Na_2CO_3 水で洗滌し, 乾燥後 Äther を溜去, その結晶性残渣を少量の水を添加した Methanol から反覆再結晶すれば, Fp. 144° (unkorr.) に固定する鱗片狀晶となる。

分析 (20 mm, $80-90^\circ$ に 4 時間乾燥)

物質 3.635 mg CO_2 : 9.565 mg H_2O : 2.800 mg C% 71.76 H% 8.62 物質 3.920 mg N_2 -Volum: 0.118cc (15.5° , 773 mm) N% 3.62 $\text{C}_{24}\text{H}_{35}\text{O}_4\text{N}$ (401.28) とすれば C% 71.77 H% 8.79 N% 3.49

Androsteron-cyanhydrin.

Androsteron 1 g を absol. Alkohol 150 cc に溶し KCN 末 10 g を混じ, 氷冷下に攪拌しつつ konz. HCl 30 cc を滴下して 1 夜放置後, 之に多量の水と Äther とを和して振盪したが, 兩液層間には何物も析出して來ない。Äther 層を分取, 水洗, 乾燥し, Äther を溜去して油狀の残渣を得た。之を稀 Methanol から再結晶すれば無色針狀の結晶となり, Zp. 163° (unkorr.) を示す。

分析 (常壓, $90-100^\circ$ で 4 時間乾燥後減壓下硫酸乾燥器中に 1 夜放置)

物質 3.330 mg CO_2 : 9.215 mg H_2O : 2.925 mg C% 75.47 H% 9.83 物質 4.305 mg N_2 -Volum: 0.167cc

(16.5° 765 mm) N% 4.60 $C_{20}H_{31}O_2N$ (317.25) として C% 75.65 H% 9.85 N% 4.41

Androsteron-cyanhydrin-diacetat

上記の Cyanhydrin 0.1 g に無水醋酸 10 cc を和して 2 時間煮沸し, 水を加えて無水醋酸を分解した後 Äther と共に振盪, Äther 層を 10% Na_2CO_3 水で洗滌, 乾燥し Äther を溜去すれば結晶性の残渣が得られる. 之を Aceton-Hexan から再結晶すれば Fp. 183° (unkorr.) に固定する無色の柱状晶となる.

分析

物質 3.196 mg CO_2 : 8.410 mg H_2O : 2.450 mg C% 71.77 H% 8.58 物質 4.595 mg N_2 -Volum: 0.137 cc (15.5° 773 mm) N% 3.59 $C_{24}H_{35}O_4N$ (401.28) とすれば C% 71.77 H% 8.79 N% 3.49

trans-Dehydroandrosteron-cyanhydrin-diacetat に対する CH_3MgJ の作用: 17-Methyl- $\Delta^{5,6}$ -trans-androstendiol-3,17 の生成

Magnesiumband の切片 2 g, Jodmethyl 11 g 及び absol. Äther 100 cc で Grignard 試薬を造り, 0° に保ち且つ攪拌しつつ之に Cyanhydrin-diacetat 化合物 3 g を absol. Äther 400 cc に溶して徐々に添加し, 添加後更に 4 時間氷冷下に攪拌し後水浴上に煮沸しつつ再び 4 時間反応させた. この反応液に verd. H_2SO_4 と氷とを加えて振盪し, Äther 層を分取し verd. Alkalilauge, 水で洗滌, 乾燥し Äther を溜去すれば結晶性の残渣が得られる. 之を Methanol から数回再結晶すると Fp. 198° (unkorr) に一定した無色の針状晶となり, trans-Dehydro-androsteron に Grignard 反応を施して得た 17-Methyl- $\Delta^{5,6}$ -trans-androstendiol-3,17, Fp. 197-199° (unkorr) と混融するも Fp. 降下を惹起しない.

分析 (20 mm, 100-110° で 4 時間乾燥)

物質 4.785 mg CO_2 : 13.810 mg H_2O : 4.515 mg C% 78.71 H% 10.56 $C_{20}H_{32}O_2$ (305.26) として C% 78.63 H% 10.91

Diacetat

上記の Diol 化合物 0.5 g に無水醋酸 10 cc を加えて 2 時間煮沸し, 常法に従つて処理した醋化體を Methanol から再結晶すると無色針状の結晶, Fp. 144° (unkorr.) が得られる.

分析 (20 mm, 99-100° で 4 時間乾燥)

物質 3.645 mg CO_2 : 9.90 mg H_2O : 2.979 mg C% 74.12 H% 9.16 $C_{24}H_{30}O_4$ とすれば C% 74.17 H% 9.35

本品と trans-Dehydro-androsteron に CH_3MgJ を作用させて得た 17-Methyl- $\Delta^{5,6}$ -trans-androstendiol-3,17 の Diacetat, Fp. 144° と混融を試みたが毫も Fp. 降下は起らない.

Cholestanon-cyanhydrin

Cholestanon 1 g を absol. Alkohol 100 cc に溶し之に KCN 末 10 g を混じ 0° に冷却攪拌しつつ konz. HCl 25 cc を滴下し, 3 時間放置後之に多量の水と Äther とを加えて振盪し, Äther 層を水洗, 乾燥し, その結晶性蒸發残渣を Hexan から 1-2 回再結晶すれば無色鱗片状の結晶 Fp. 125-150° (unkorr.) が得られる.

分析 (20 mm, 80-90° で 6 時間乾燥)

物質 3,235 mg CO_2 : 9.645 mg H_2O : 3.355 mg C% 81.31 H% 11.60 $C_{28}H_{47}ON$ (413.38) とすれば C% 81.23 H% 11.46

上記の結晶は軟化から分解溶融に至る迄の間隔が甚しいので Hexan から更に数回再結晶を繰返し, 乾燥後その Zp. を検すると 155° を示し著しく scharf となつた. 然るに本品の分析成績は Fp. 125-150° の場合と全く同様であり, 且つ本品を暫く除湿器中に貯藏して置くと Fp. は再び unscharf となり 125-150° を示するに至る.

分析 (20 mm, 80-90° で 5 時間乾燥)

物質 4.083 mg CO₂: 12.150 mg H₂O: 4.160 mg C% 81.16 H% 11.40 物質 5.925 mg N₂-Volum: 0.195cc (23.5° 762 mm) N% 3.72 C₂₈H₄₇ON (413.38) として C% 81.28 H% 11.46 N% 3.39

旋光度 物質 46 mg を absol. Alkohl 10 cc に溶し 2 dm 管で観測 $[\alpha]_D^{20} = +28.58^\circ$

本品を無水醋酸と Na-Acetate と共に 2 時間煮沸すると Zp. 125° (unkorr.) の物質となり, 再結晶を反覆しても Zp. は上昇しない. 又, Zp. 155° を示したものと混融したが Fp. 降下は認められなかつた. 分析の結果は次の如く Zp. 155° のものと同一である.

分析 (20 mm, 80-90° で 4 時間乾燥)

物質 3.760 mg CO₂: 11.240 mg H₂O: 3.720 mg C% 81.53 H% 11.07

旋光度 物質 40.6 mg を absol. Alkohol 10 cc に溶し 2 dm 管で観測. $[\alpha]_D^{20} = +39.40^\circ$

Cholestanon-cyanhydrin に對する CH₃MgJ の作用:

3-Methyl-cholestanol-3 及び 3-Methylketo-cholestanol-3 の生成

Magnesiumband 1 g, Jodmethyl 7 g, absol. Äther 100 cc で造つた Grignard 試薬を氷冷下に攪拌し, 之に, absol. Äther 120 cc に溶した Cholestanon-cyanhydrin (Fp. 125-150°) 4 g を滴下し, 滴下後 4 時間攪拌を續け, 更に之を氷浴上に煮沸しつつ 4 時間攪拌を行ふ. 反應終了の後 verd. H₂SO₄ と氷とを加へ, Äther 層を分取洗滌し, その蒸溜残渣に Semicarbazid-acetate の Alkohol 溶液を加へて少時間煮沸すると絮狀物質が析出する. この析出物を濾取し, 母液に氷を加へ Äther と共に振盪, Äther の蒸溜残渣を Methanol に溶して放置すれば最初に Fp. 147-148° (unkorr.) の結晶が析出し, その母液を少々濃縮して放置すれば Fp. 125° (unkorr.) の結晶が現れる.

分析 (いずれも 20 mm, 90-100° で 5 時間乾燥)

Fp. 147-148° の物質 3.71 mg CO₂: 11.330 mg H₂O: 4.050 mg C% 83.22 H% 12.20

Fp. 125° の物質 3.155 mg CO₂: 9.655 mg H₂O: 3.475 mg C% 83.46 H% 12.32 C₂₈H₅₀O (402.40) とすれば C% 83.50 H% 12.53

旋光度 Fp. 147-148° の物質 6.2 mg を absol. Alkohol 3 cc に溶し 2 dm 管で観測 $[\alpha]_D^{170} = +29.0^\circ$

Fp. 125° の物質 5.9 mg を absol. Alkohol 3 cc に溶し 2 dm 管で観測 $[\alpha]_D^{170} = +25.4^\circ$

3-Methylketo-cholestanol-3 の Semicarbazon.

上記の絮狀の析出物を多量の Chloroform に溶して放置すれば依然として無晶形絮狀の物質が析出する. Zp. 250 (unkorr) Chloroform, 氷醋酸に易溶, Alkohol, Äther, Benzol, Petroläther には不溶.

分析 (20 mm, 100-120° で 6 時間乾燥)

物質 3.180 mg CO₂: 8.595 mg H₂O: 3.000 mg C% 73.71 H% 10.55 物質 3.685 mg N₂-Volum: 0.272cc (13.5° 761 mm) N% 8.64 C₃₀H₅₃O₂N₂ (487.42) とすれば C% 73.86 H% 10.96 N% 8.62

3-Methylketo-cholestanol-3.

上記の Semicarbazon 0.4 g を氷醋酸 120 cc に溶し, 之に 25% 硫酸 50 cc を加へ 90-100° に 6 時間加温した後, 多量の水と Äther とを和して振盪し, Äther 層を verd. Alkaliange, 水で洗滌, 乾燥の後 Äther を溜去すれば結晶性の残渣が得られる. 之を Hexan から再結晶すれば Fp. 173 (unkorr.) の無色針狀の結晶となる.

分析 (20 mm, 100-110° で 5 時間乾燥)

物質 3.065 mg CO₂: 9.080 mg H₂O: 3.130 mg C% 80.80 H% 11.43 C₂₉H₅₀O₂ (430.48) とすれば C% 80.86 H% 11.71

1²-oder 1³-3-Methyl-cholesten.

前記 Fp. 147-148° 或は Fp. 125° の 3-Methyl-cholestanol-3 0.3 g を採り無水醋酸 10 cc と共に, 2.5

時間煮沸し、冷後水を加へて無水醋酸を分解し、Äther と共に振盪、Äther の蒸溜残渣を Methanol-Chloroform から反覆再結晶すれば Fp. 84° (unkorr.) を示す無色格子狀の結晶が得られる。

分析 (20 mm, 50° で 7 時間乾燥)

物質 3.343 mg CO₂: 10.700 mg H₂O: 3.760 mg C% 87.29 H% 12.53 C₂₈H₄₈ (384.38) とすれば C% 87.41 H% 12.58

無水醋酸の代りに Isovaleriansäure と 2.5 時間、或は Pyridin 中無水醋酸と長時間煮沸しても醋化物は得られないで上記 Fp. 84° の炭化水素が生成する。

Cholestanon に CH₃MgJ の作用: Stanley 氏報告の追試

Stanley の報告に従ひ Cholestanon に CH₃MgJ を反應させ、その反應成績體を Methanol から再結晶したところ、この場合にも最初に Fp. 127-148° (unkorr.) の結晶が現れ、その母液から Fp. 125° (unkorr.) の結晶が析出した。3-Methyl-cholestanol-3 に 2 つの形態があると考へられる。その各々に無水醋酸を作用させればいずれも Fp. 84° (unkorr.) の Δ²-oder Δ³-3-Methyl-cholesten に相當する物質を得る。さうしてこれらの物質は Cholestanoneyanhydrin に CH₃MgJ を作用させて得た 3-Methyl-cholestanol-3 及び Δ²-oder Δ³-3-Methyl-cholesten と混融したがすべて Fp. 降下を起さない。

(昭和 13 年 3 月末完稿)

Dibromcholesterin-acetat の一酸化成績體 „Nor-cholestenolon“ に就て

服 部 順 五

(株式会社武田長兵衛商店研究部)

(昭和 13 年 6 月 6 日受理)

Jungo Hattori: Über das „Nor-cholestenolon“, ein
Oxydationsprodukt des Dibromcholesterin-acetats

Dibromcholesterin-acetat の CrO₃-酸化成績體に脱臭素反應を施した後 Natronlauge で酸性物質を除去し、中性物質中から Dehydro-androsteron-acetat を Semicarbazon として分離する事は周知の事實である。此の場合粗製の Semicarbazon を Äther で洗滌して、之に夾雜する酸化反應に受けなかつた Cholesterin-acetat を分離するのが普通の Semicarbazon 精製法である。此の Äther-洗滌液中には Cholesterin-acetat の他 Dehydroandrosteronacetat-Semicarbazon 自身も幾分溶存する事は當然であるが、其の他に CrO₃-酸化によつて生じた Keton-體、就中 Corpusluteum-Hormon の原料として重要な Pregnenolon を始め尙未知の Keton-體の Semicarbazon の存在も豫想されるのであつて、此の Äther-洗滌液の研究は經濟上ばかりでなく學術的見地からも大變興味ある問題である。