Chlorplatinat.

Hellgelbe Kristalle vom Zp. 184° . $(C_{19}H_{21}NO_3)_2 \cdot 2HCl \cdot PtCl_4$.

Jodmethylat.

Farblose Prismen vom Fp. 184° u. Zers. $C_{19}H_{21}NO_3 \cdot CH_3J$.

- *4) 1-[4'-Methoxy-benzyl]-6,7-methylenedioxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin
(1-[4'-Methoxy-benzyl]-nor-hydrohydrastinin).

Die freie Base ist nicht kristallisierbar und bildet eine dicke Flüssigkeit.

Hydrochlorid.

Spindelartige Kristalle vom. Fp. 105° . $C_{18}H_{19}NO_3 \cdot HCl \cdot H_2O$.

(Autoref.)

Über die Einwirkung von Grignardschem Reagenz auf die Carboäthoxyl-Seitenkette des halogenierten Pyrimidins.

von

Eiji OCHIAI und Zentaro ITIKAWA

[Aus d. Pharmazeut. Institut d. Kaiserl. Universität Tokyo.]

(Eingegangen am 3. Juni 1938)

Das Halogenatom in der Stellung 2, 4 und 6 des Pyrimidinringes unterscheidet sich von Arylhalogenid und Vinylhalogenid und nähert sich darin dem Halogenalkyl, dass es durch nukleophiles Reagenz wie OH_2 , NH_3 etc. leicht substituiert wird. Aber es ist darin vom Halogenalkyl ganz verschieden, dass man durch Einwirkung von metallischem Magnesium das Grignard-Reagenz schwer bekommen kann¹⁾. In dieser Reaktion ist das Halogen des 3, 2, 4 bzw. 6-Halogenpyrimidins weniger aktiv als Arylhalogenid.

Zur Erforschung der Reaktion des Grignard-Reagenzes des so charakteristischen halogenierten Pyrimidins haben Verfasser die Einwirkung des Methylmagnesiumjodids auf 2-Methyl-4-chlorpyrimidin-5-essigsäureäthylester studiert.

¹⁾ nach noch nicht veröffentlichtem Versuche.

Je nach der Aktivität des Chloratoms in der Stellung 4 sollte die Reaktion nach einem der folgenden Schemata A, B bzw. C vor sich gehen:

Wenn die Reaktion nach A verläuft, so kann man sie zur allgemeinen Alkylpyrimidin-Synthese anwenden; verläuft sie jedoch nach B, so kann man sie unter Anwendung ihrer Reaktionsprodukte, nämlich des Ketons (I) oder des tertiären Alkohols (II), als Material für eine Synthese des Homologen von Vitamin B₁ anwenden. Selbst wenn das Halogen des Pyrimidins nicht nach A reagiert, aber noch etwas reaktionsfähiger gegen Grignard-Reagenz ist, so würde nach C unter Ringschluss ein Tetrahydrofuranring entstehen. Da der α -Kohlenstoff des so entstandenen Tetrahydrofuranringes 2 Methylgruppen hat, mithin die Ringspannung noch geringer wird, so kann man vermuten, dass der Ringschluss leicht eintreten wird.

Nach Versuchen geht die Reaktion nach dem Schema B vor sich und als Reaktionsprodukte wurde ausser geringer Menge Keton (I) hauptsächlich ein tertiärer Alkohol (II) nachgewiesen.

2-Methyl-4-chlor-5-acetonylpyrimidin (I) zersetzt sich bei 254° und ist kristallinisch. Es gibt ein Semicarbazon in Nadeln vom Zp. 174-175°.

2-Methyl-4-chlor-5-(β -oxyisobutyl)-pyrimidin (II) bildet ein hellgelbes Öl und gibt ein Hydrochlorid (weisse Schüppchen vom Zp. 267-268°).

Erhitzt man II mit alkoholischem Ammoniak auf 100°, so bildet sich ein 4-Amino-

derivat (III). Prismen vom Schmp. 160–162°.

Erhitzt man (III) mit Bromwasserstoffsäure-Eisessig auf 100°, so geht es in das Hydrobromid des 5-(β -Bromisobutyl)-Derivat (IV) über. Es bildet Nadeln, welche sich bei 187–188° zersetzen.

Es bereitet Schwierigkeiten, durch Einwirkung von Amin auf IV nach der allgemeinen Reaktion des Tertiäralkylbromides eine Ammoniumbase herzustellen, weil sie unter HBr-Abspaltung leicht Olefin bildet. Lässt man IV mit 4-Methyl-5- β -oxyaethyl-thiazol (V) reagieren, so entsteht kein Ammoniumbromid und zersetzt sich in das Hydrobromid von V und Olefin (VI). VI zersetzt sich bei 202° und bildet ein Pikrat (gelbe Nadeln).

Beschreibung der Versuche

2-Methyl-4-chlor-pyrimidin-5-essigsäure-aethylester.

Es wird durch Einwirkung von Phosphoroxychlorid auf 2-Methyl-4-oxypyrimidin-5-essigsäureester hergestellt. Es bildet Kristalle vom Schmp. 39–40°.

3.960 mg Sbst.: 7.344 mg CO₂, 1.802 mg H₂O.

C₉H₁₁N₂O₂Cl. Ber. C 50.8, H 5.33.

Gef. „ 50.53, „ 5.10.

Einwirkung von Grignard Reagenz auf 2-Methyl-4-chlor-pyrimidin-5-essigsäureester.

2-Methyl-4-chlor-5- β -oxyisobutylpyrimidin

Öl. Sdp. 0.01 mm 160–240°.

Hydrochlorid: weisse Schuppen. Zp. 267–268°.

3.11 mg Subst.: 5.245 mg CO₂, 1.735 mg H₂O. — 2.780 mg Subst.: 0.273 ccm N₂ (11°, 757 mm). — 6.055 mg Subst.: 5.070 ccm N/100 AgNO₃.

C₉H₁₃N₂OCl·HCl. — Ber. C 45.51, H 5.91, N 11.81, Cl 29.99.

Gef. „ 45.90, „ 6.19, „ 11.73, „ 29.69.

2-Methyl-4-chlor-5-acetonylpyrimidin

Zp. 254°

Semicarbazon: Zp. 174–175°.

3.410 mg Subst.: 5.595 mg CO₂, 1.540 mg H₂O. — 11.42 mg Subst.: 4.920 ccm N/AgNO₃

C₉H₁₂N₃OCl. Ber. C 44.9, H 4.99, Cl 14.7.

Gef. „ 44.75, „ 5.05, „ 15.28.

2-Methyl-4-amino-5- β -oxyisobutyl-pyrimidin

Schmp. 160–162°

3.255 mg Subst.: 7.135 mg CO₂, 2.87 mg H₂O. — 3.045 mg Subst.: 0.622 ccm N₂ (20.5°, 761 mm)

C₉H₁₅N₃O. Ber. C 59.73, H 8.23, N 23.10.

Gef. „ 59.73, „ 8.15, „ 23.31.

2-Methyl-4-amino-5- β -bromisobutyl-pyrimidinhydrobromid

Zp. 187–188°

3.220 mg Subst.: 5.435 mg CO₂, 1.105 mg H₂O.

C₉H₁₄N₃Br·HBr. Ber. C 33.22, H 4.62.

Gef. „ 33.27, „ 4.87.

4-Methyl-4-amino-5- Δ_1 -isobutenyl-pyrimidin

Pikrat: Nadeln Zp. 202°.

3.220 mg Subst.: 5.435 mg CO₂, 1.105 mg H₂O.

C₉H₁₃N₃·C₆H₅N₃O₇ Ber. C 45.09, H 4.03.

Gef. „ 46.03, „ 3.84.

を加へ 100~110° に 30 分間加熱後, 溶媒を減壓にて除き AlCl_3 を氷水にて分解, クロロフォルム可溶分をアセトンより再結晶するに Acetyl-methyl-chloroacetylaminindolizin を回收せり. 融點及混融にて證明す. 次に水層を炭酸アルカリ性となしクロロフォルムにて抽出, 黒褐色残渣微量を得たり. 再結晶すれど結晶せず. 精査せず.

猶同じ溶媒を用ひ 15 分間弱く沸騰せしめたと同様原料を回收せり.

ハロゲン化ピリミジンの側鎖カルボエトオキシル基に 對するグリニャル試薬の反應

落 合 英 二
市 川 善 太 郎

(昭和 13 年 6 月 21 日受理)

(東京帝國大學醫學部藥學科藥化學教室)

ピリミジン環の 2, 4 及び 6 位のハロゲンは二重結合に直結するハロゲンなるにもかかわらず, Vinylhalogenid, Arylhalogenid と趣を異にし, OH , NH_2 基等のアニオン基と置換せられ易し. 然れ共其活性は一般 Alkylhalogenid と趣を異にし, 之に金屬マグネシウムを作用せしめてグリニャル試薬を得んとする二三の實驗は悉く失敗に歸したり(未發表). 此點に於て其活性は Arylhalogenid にも劣る.

余等は斯る特異の反應性を示すハロゲン化ピリミジンのグリニャル試験に對する反應を吟味せんとし, 本研究の端を發せり.

余等の選べるハロゲン化ピリミジンは 2-Methyl-4-chloropyrimidin-5-essigsäureäthylester なり.

これ若し 4 位のハロゲンが金屬マグネシウムに對すると同様グリニャル試薬に對しても不活性ならば (A の如く進行せざる場合) 反應により生成するケトン或は第三級アルコールを原料としてビタミン B_1 の同屬列合成の希望を起さしむるを以てなり. (B)

又 4 位のハロゲンがグリニャル試薬に對し, 若干の反應性を有するならば (C) の如く閉環してテトラヒドロフラン核を生ずべし. 斯くして生ずるテトラヒドロフラン環は五角環にして α に 2 つのメチル基を有するを以て張力極めて小從つて閉環又容易なりと推せらる.

2-Methyl-4-chlor-pyrimidin-5-essigsäureester に過剰のメチルマグネシウムヨードを作用するに 4 位のクロル原子は全く反應にあづからず, カルボエトオキシル基が反應し, 反應は上記 (B) の如く進行し, 少量の 2-Methyl-4-chlor-5-acetonylpyrimidin (I) と共に主として 2-Methyl-4-chlor-5-(β-oxyisobutyl)-pyrimidin (II) を生ず. 前者は Zp. 254° の結晶にして Zp. 174~75° 針狀のセミカルバツーンを形成す. 後者 (II) は油狀にして白色鱗片狀 Zp. 267~68° の鹽酸鹽を形成す.

即ちピリミジン環 4 位のハロゲンは OH, NH₂ 等のアニオン基に對して活性大なるもグリニヤル試薬に對して全く不活性なる事を知る.

余等は此處に得られたる第三級アルコール (II) を原料としてビタミン B₁ 同屬列 (V) を次の如くにして合成せんとせり.

2-Methyl-4-chlor-5-(β-oxyisobutyl)-pyrimidin を酒精性アンモニアと 100° に加熱すれば

溶媒を去り褐色樹脂状の殘渣を得、之を III とす。

前後 2 回の實驗の結果其得量次の如し。

5 g Ester より	I	2.35 g	I	3.15 g
	II	1.25 g	II	0.65 g
	III	0.7 g	III	0.15 g

II: 之は遊離にて結晶せしめ得ざるも白色鱗片状の鹽酸鹽となる。メタノールアセトンより再結晶すれば Zp. 267~68° を示す。

3.11 mg Sbdt.: 5.245 mg CO₂, 1.735 mg H₂O; 2.780 mg Sbdt.: 0.278 cc. N₂ (11°, 757 mm);

6.055 mg Sbdt.: N/100 Ag NO₃. 5.07 cc

C₉H₁₃N₂OCl·HCl Ber. C 45.51, H 5.91, N 11.81, Cl 29.99.

Gef. C 45.9, H 6.19, N 11.73, Cl 29.69.

即 2-Methyl-4-chlor-5-(β-oxyisobutyl)-pyrimidin の鹽酸鹽に一致す。

I: 油状分を Hochvacuum にて蒸溜すれば 0.01 mm 浴温 160~240° にて溜出す。淡黄色粘稠の油にて少量の結晶を含む。之をメタノールにとかし、活性炭にて脱色後、メタノール溶液を濃縮し、アセトン 2~3 滴を加へ放置すれば結晶を少量析出す。之を濾別し、結晶を同様に處理して精製を繰返す。Zp. 254° (242° にて褐變, 252° にて黒變) となる。

母液を濃縮す。殘渣は II の主部分にして之を鹽酸鹽として精製すれば Zp. 267~268° にして II の物質と同一物なり。之を II に合す。

Zp. 254° の物質を分析す。若干不純なるも 2-CH₃-4-Cl-5-Acetylpyrimidin に近似す。(Aceton に殆ど不溶なり)

3.680 mg Sbdt.: 7.015 mg CO₂, 2.140 mg H₂O; 2.585 mg Sbdt.: N₂ 0.327 cc (13°, 758 mm)

C₉H₉N₂OCl Ber. C 52.1, H 4.90, N 15.18.

Gef. C 51.19, H 6.50, N 14.65.

I 中に上記 Keton を確實に捕捉する爲 I の蒸溜せざるもの 115 mg を 74 mg の醋酸ソーダ及び 111.5 mg の鹽酸セミカルバチトと共に少量の水に溶解して放置す。析出せる白色結晶をメタノールより再結晶して Zp. 174~75° の針状晶を得たり。

3.410 mg Sbdt.: 5.595 mg CO₂, 1.540 mg H₂O, 2.645 mg Sbdt.: 0.610 cc N₂ (11.5°, 759 mm);

11.42 mg Sbdt.: N/100 Ag NO₃ 4.92 cc

C₉H₁₂N₅OCl Ber. C 44.9, H 4.99, N 29.0, Cl 14.7.

Gef. C 44.75, H 5.05, N 27.04, Cl 15.28.

2-Methyl-4-amino-5-(β-oxyisobutyl)-pyrimidin.

上記 4-Chlorpyrimidin 1.15 g と無水酒精 5.5 g とを開管中に入れドライアイス-アセトン冷却下にアンモニア瓦斯を通じ容積が始めの約 1/3 増加するに至り閉管す。之を水浴上 5 時間加熱し、反應液を減壓下にとばす。殘渣を水にとかし苛性アルカリを加へ析出する油分を醋酸エステルに轉溶せしむ。醋酸エステル殘渣約 1 g. 之をエーテルにて温浸し、濃縮すればザラメ状の結晶となる。之をアセトンより再結晶すれば Smp. 160~62° の柱晶となる。ハロゲンを含有せず。

3.255 mg Sbdt.: 7.135 mg CO₂ 2.37 mg H₂O; 3.045 mg Sbdt.: 0.622 cc N₂ (20.5°, 761 mm)

C₉H₁₅N₃O Ber. C 59.78, H 8.23, N 23.1

Gef. C 59.78, H 8.15, N 23.31

2-Methyl-4-amino-5-(β -bromisobutyl)-pyrimidin.

2-Methyl-4-amino-5-(β -oxyisobutyl)-pyrimidin 0.2 g とブロム水素酸水酳 4 cc とを閉管中 100° に 4 時間加熱し、冷後、内容に無水エーテル多量を加へ析出し來るものをエーテルにて洗ひ乾燥す。之を冷時無水メタノール少量にとかし、活性炭にて脱色後、無水エーテルを加へ針狀晶を得。此操作を繰返し精製すれば Zp. 187~88° となる。

3.220 mg Sbzt. : 5.435 mg CO₂, 1.105 mg H₂O.

C₉H₁₄N₃Br·HBr Ber. C 33.22, H 4.62.

Gef. C 33.27, H 4.87.

2-Methyl-4-amino-5-(β -bromisobutyl)-pyrimidin と 4-Methyl-5- β -oxyäthylthiazol との反應

上記 5-(β -Bromisobutyl)-pyrimidin のブロム水素酸鹽 0.3 g 4-Methyl-5- β -oxyäthylthiazol 0.145 g 及び Butanol 1 g とを油浴中 130~40° に振盪しつつ溶解せしむ。冷後エーテルを加へ析出する結晶と母液とを傾瀉により分離す。

結晶をアセトンより再結晶して之に難溶なるアンモニウムブロミドを除き濃縮す。白色鱗片狀 Zp. 113.5~15° の結晶となる。Zp. 164° のビクラートを作る。兩者を夫々 4-Methyl-5- β -oxyäthylthiazol のブロム水素酸鹽、ビクラートと混融するに變化なく同一物なることを知る。

アセトンに易溶なる母液を濃縮すれば白色結晶 Smp. 114~38° を示し、再結晶困難なり。之をビクラートとすれば Zp. 202° の黄色針晶となる。之を上記 4-Methyl-5- β -oxyäthylthiazol のビクラートと混融すれば Smp. 93° に降下し異なることを示す。

3.330 mg Sbzt. : 5.435 mg CO₂, 1.105 mg H₂O.

C₉H₁₃N₃ C₆H₃N₃O₇ Ber. C 45.9, H 4.08.

Gef. C 46.03, H 3.84.

コバノトネリコの一成分

嶋 田 玄 彌

(京都藥學專門學校)

(昭和 13 年 6 月 23 日受理)

コバノトネリコ 一名アヲダモ *Fraxinus Sieboldiana* Blume (*F. Sieboldiana* Bl. var. *Serrata* Nakai) は本州、九州地方に最も普通なる *Fraxinus* 屬の植物にして之に近縁なるトネリコ、樺 *Fraxinus japonica* Blume は昔より漢藥秦皮に充てられ眼疾に應用せられたり、歐