Beiträge zur Kenntnis der Campher-Derivate.

von

Tyotaro TUKAMOTO

[Aus d. Pharmazeutischen Institut der Univ. Tokyo.]

(Eingegangen am 6. Februar 1939.)

I. Über 6-Oxycampher.

Vergl. Ber. d. deutschen chem. Gesell. **70**, 584 [1937]

II. Über den Isoaminocampher.

Vergl. Ber. d. deutschen chem. Gesell. **71**, 305 [1938]

III. Über Schwefelderivate des Camphers.

Bei der Reduktion von *d*-Campher-10-sulfochlorid mittels Zinns und Salzsäure nach Lowry und Donington¹⁾ konnte Verf. die Ausbeute an *d*-Campher-10-thiol bis auf 40% der Theorie steigern (früher 14%). Benutzt man dabei Zinkstaub und Eisessig als Reduktionsmittel, so erhält man weniger Thiol, was wohl darauf zurückzuführen ist, dass sich das Sulfochlorid eher in die zugehörige Sulfonsäure umwandelt und der Reduktion entzieht. Unter gewissen Bedingungen wird das *d*-Campher-10-sulfochlorid durch Behandlung mit Zinkstaub und Eisessig bis zum Campher reduziert.

Beim Oxydieren mit KMnO_4 liefert das *d*-Campher-10-thiol das bei 231° schmelzende Disulfid (Fp 224° nach Lowry und Danington l.c.).

Ebenso liefert *d*-Campher- π -sulfochlorid beim Reduzieren mit Zinn und Salzsäure das noch unbekannte *d*-Campher- π -thiol (Ausb. 21.7%). Wie bei 10-Sulfochlorid liefert das π -Sulfochlorid beim Reduzieren mit Zinkstaub und Eisessig das π -Thiol, aber die Ausbeute weniger (11.4%).

Reduziert man das 10-bezw. π -Chlorsulfoxydcampher²⁾ mit Zinkstaub und Eisessig, so erhält man neben dem 10-bezw. π -Thiol den 10-bezw. π -Oxo-campher.³⁾ Benutzt man dabei Wasser und Zinkstaub als Reduktionsmittel, so erhält man Oxo-campher allein. Diese interessante Bildungsweise der Oxo-campher ist wohl auf die reduktive

Hydrolyse des Sulfoxydcamphers zurückzuführen:

Zur Darstellung des Thio-camphers liess Verf. dem Campheroxim salpetrige Säure einwirken und behandelte das so erhaltene Gemisch von Campheriminnitrat und Pernitrosocampher mit Ammoniak, wobei aus beiden ein und dasselbe Campherimin entsteht.⁴⁾ Wird nun Schwefelwasserstoff in die heisse Benzollösung des Imins eingeleitet, so wird der Thiocampher mit befriedigender Ausbeute erhalten. Diese Methode ist der älteren Wuytsschen⁵⁾ wegen der einfacheren Operation vorzuziehen.

Reduktion des α -Campher- π -sulfochlorid: (α -Campher- π -thiol)

10 g π -Sulfochlorid werden in 150 ccm konz. Salzsäure unter Zusatz von 20 g pulv. Zinn eingetragen, anfangs bei 40–50° (Selbsterwärmung!) später auf dem Dampfbade digeriert und der Dampfdestillation unterworfen. Das Destillat wird ausgeäthert verdampft und der Rückstand (1.6 g) aus Petroläther umgelöst. Farblose Krystalle vom Schmp. 94°, leicht löslich in meisten organischen Solventien und Alkalilauge. $[\alpha]_D^{25}$: +108.7°.

3.580 mg Sbst.: 8.600 mg CO₂, 2.800 mg H₂O.—4.365 mg Sbst.: 4.73 ccm 0.01 n-NaOH (S-Bestim. nach Pregl).

C₁₀H₁₆OS. Ber. C 65.22, H 8.69, S 17.39. Gef. C 65.52, H 8.75, S 17.37.

Digeriert man 6 g π -Sulfochlorid in 150 ccm Eisessig unter Zusatz von 6 g Zinkstaub bei 40–50° (später auf dem Dampfbade), neutralisiert mit Soda, destilliert mit Wasserdampf und das Destillat ausäthert, so erhält man nur 0.5 g π -Thiol.

Acetat: Dargestellt durch Erhitzen mit Acetanhydrid und Natriumazetat auf 120°. Farblose Krystalle vom Schmp. 34° (aus Äther).

Semicarbazon: Farblose Krystalle vom Schmp. 219–220° (aus 50% igem Alkohol).

Disulfid: 0.8 g π -Thiol werden in 100 ccm Wasser suspendiert, 0.5 g KMnO₄ (1% Lösung) hinzugefügt, mit NaHSO₃ entfärbt und ausgeäthert. Farblose Krystalle vom Schmp. 215° (aus 50% Alkohol), unlöslich in Alkalilauge.

3.610 mg Sbst.: 8.720 mg CO₂, 2.675 mg H₂O.—5.535 mg Sbst.: 5.90 ccm 0.01 n-NaOH (S-Bestim. nach Pregl).

C₂₀H₃₀O₂S₂. Ber. C 65.57, H 8.20, S 17.48. Gef. C 65.88, H 8.29, S 17.09.

Quecksilber-Verb: Die alkoholische Lösung des π -Thiols wird durch alkoholische Sublimatlösung gefällt. Der Niederschlag schwärzt sich gegen 260°.

Reduktion des α -Campher-10-sulfochlorid: (α -Campher-10-thiol)

Beim Reduzieren von 20 g 10-Sulfochlorid mittels Zinns und Salzsäure nach Lowry und Donington wurden 5.8 g 10-Thiol (40%) erhalten. Farblose Krystalle vom Schmp. 66° (aus Alkohol).

Werden 10 g 10-Sulfochlorid in 150 ccm Eisessig gelöst und durch Zusatz von 10 g Zinkstaub wie bei π -Sulfochlorid operiert, so werden nur 0.7 g 10-Thiol vom Schmp. 66° erhalten.

3.770 mg Sbst.: 8.970 mg CO₂, 2.970 mg H₂O.—4.955 mg Sbst.: 5.35 ccm 0.01 n-NaOH (*S*-Bestim. nach Pregl).

C₁₀H₁₆OS. Ber. C 65.22, H 8.69, S 17.39. Gef. C 64.89, H 8.81, S 17.31.

Campher-Bildung: Bei einem Versuch wurden 5 g 10-Sulfochlorid in 100 ccm Eisessig gelöst und unter Erwärmen auf dem Wasserbade mit 5 g Zinkstaub versetzt. Nach 6 stündigem Umrühren in der Wärme wurde das Gemisch mit Soda neutralisiert und mit Wasserdampf destilliert. Hierbei gingen weisse, im Wasser unlösliche Krystalle über, die abfiltriert (1.5 g) und aus verd. Alkohol umgelöst wurden. Durch den Geruch, Schmp. 178° und Semicarbazon (Schmp. 247°) wurde die Substanz sofort als Campher erkannt.

Disulfid: 4 g 10-Thiol werden in 250 ccm Sodalösung (15%) suspendiert und anfangs bei Zimmertemperatur, später unter Erwärmen auf dem Wasserbade mit 5 g KMnO₄ (1%) versetzt. Das Filtrat wird angesäuert, zur Syrupkonsistenz eingedampft und mit Essigester extrahiert. Der beim Verdampfen des Essigäthers verbleibende Rückstand (2 g) bildet ein dicker Syrup. Extrahiert man aber den Manganschlamm mit Alkohol, so erhält man farblose Krystalle vom Schmp. 231° (aus Petroläther). Ausb. 2 g.

3.795 mg Sbst.: 9.080 mg CO₂, 2.892 mg H₂O.—4.713 mg Sbst.: 5.08 ccm 0.01 n-NaOH (*S*-Bestim. nach Pregl).

C₂₀H₃₀O₂S₂. Ber. C 65.57, H 8.20, S 17.48. Gef. C 65.25, H 8.53, S 17.30.

Reduktion von d - π -Chlorsulfoxydcampher: (π -Oxocampher)

4 g d - π -Chlorsulfoxydcampher werden in 100 ccm Eisessig gelöst und bei 40–50° mit 4 g Zinkstaub versetzt. Nach weiterem 5 stündigem Digerieren wird das Gemisch

mit Soda neutralisiert und der Dampfdestillation unterworfen. Dann wird das Destillat ausgeäthert, der Äther mit Bisulfitlösung geschüttelt, die letztere mit Kaliumcarbonat alkalisiert und ausgeäthert. Der beim Verdampfen des Äthers verbleibende Rückstand bildet farblose Krystalle vom Schmp. 195–196° (aus 20% Alkohol) und zeigt alle Eigenschaften des trans- π -Oxocamphers.

3.523 mg Sbst.: 9.300 mg CO₂, 2.710 mg H₂O.

C₁₀H₁₄O₂. Ber. C 72.29, H 8.43. Gef. C 72.00, H 8.60.

Die mit Bisulfit ausgeschüttelte, ätherische Lösung wird mit Alkalilauge geschüttelt, die letztere angesäuert und mit Äther extrahiert. Beim Verdampfen des letzteren wurde ca 0.1 g π -Thiol erhalten.

Reduktion des *d*-10-Chlorsulfoxydcampher: (10-Oxocampher)

4 g *d*-10-Chlorsulfoxydcampher werden genau so wie oben mit Zinkstaub und Eisessig behandelt. Die Aldehyd-Fraktion (0.5 g) bildete farblose Krystalle vom Schmp. 205° und wurde durch Oxydation mit Permanganat in die Ketopinsäure (Fp 234°) übergeführt, so dass es sich als 10-Oxocampher erwies.

3.613 mg Sbst.: 9.539 mg CO₂, 2.870 mg H₂O.

C₁₀H₁₄O₂. Ber. C 72.29, H 8.43. Gef. C 72.01, H 8.89.

Semicarbazon: Farblose Krystalle vom Schmp. 249°.

In der vom 10-Oxocampher befreiten, ätherischen Mutterlauge blieb ca 0.1 g 10-Thiol.

Werden 3 g *d*-10-bezw. π -Chlorsulfoxydcampher in 100 ccm Wasser suspendiert und unter Zusatz von 3 g Zinkstaub 2 Stunden auf dem Wasserbade digeriert und dann mit Wasserdampf destilliert, so erhält man ca 0.2 g 10-bezw. π -Oxocampher, wobei aber keine nennenswerte Menge Thiol nachgewiesen wurde.

Darstellung des Thiocamphers.

20 g Campheroxim werden in 300 ccm Äther gelöst, mit einer conc. wässrigen Lösung des Natriumnitrits unterschichtet und 14 g conc. Schwefelsäure (verdünnt zu 20%) tropfenweise hinzugefügt. Die so erhaltene violettrot gefärbte Ätherschicht wird aufgehoben und entwässert, wobei sich aus der allmählich verbleichende Lösung das Campheriminnitrat (6 g) ausscheidet. Der beim Verdampfen des Äthers verbleibt ca 14 g Pernitrosocampher. Werden das Gemisch von beiden Produkten mit 100 ccm

conz. Ammoniakwasser erwärmt und ausgeäthert, so wird ca 10 g Campherimin erhalten. Endlich werden 10 g Campherimin in 150 ccm Benzol gelöst und unter Erwärmen auf dem Wasserbade 5 Stunden Schwefelwasserstoff eingeleitet. Man entfernt das noch intakt bleibende Campherimin durch Schütteln mit Salzsäure und verdampft das Benzol. Fleischrote Krystalle vom Schmp. 118° Ausb. 7 g.

3.820 mg Sbst. : 10.062 mg CO₂, 3.364 mg H₂O.

C₁₀H₁₆S. Ber. C 71.42, H 9.52. Gef. C 71.82, H 9.85.

Litteraturverzeichnis.

- 1) Journ. Chem. Soc. London **83**, 479 [1903],
 - 2) Ber. d. deutsch. chem. Gesell. **56**, 633, 1519 [1923],
 - 3) Ber. d. deutsch. chem. Gesell. **67**, 71, 1202 [1934],
 - 4) Ber. d. deutsch. chem. Gesell. **29**, 2807 [1896],
 - 5) Ber. d. deutsch. chem. Gesell. **36**, 863 [1903].
-

樟腦誘導體の研究

塚本 長太郎

(東京帝國大學藥學科生藥學教室)

(昭和 14 年 2 月 6 日受理)

第一章 六・オキシ樟腦に関する研究

オキシ樟腦 (Oxycampher) には理論上 3-Oxycampher¹⁾, 4-Oxycampher²⁾, 5-Oxycampher³⁾, 6-Oxycampher, *trans*-並に *cis*- π -Oxycampher³⁾ 及び 10-Oxycampher⁴⁾ の 7 種が存在するも 6-Oxycampher 以外は總て確實なる化合物として知られたり. 予は未知の 6-Oxycampher を得んとして *l*-Borneol を原料とする實驗を試みしも不成功に終れり⁵⁾. 是に於て予は近年三宅馨氏⁶⁾ が Campher のクロム酸々化に依りて得たる 2,6-Dioxocamphan (6-Oxocampher) (I) 或は其の Dioxim を還元して 6-Oxy-2-oxocamphan 又は 2,6-Dioxycamphan を造らんとせしも 6-Oxocampher は既知の Campherchinon 或は *p*-Oxocampher と異り酸, アルカリに對して極めて弱く容易に Hydrolyse を起し 2,3,3-Trimethyl-cyclopentanone (1)-essigsäure (4) と成る性質を有するが爲め 6-Oxocampher の還元には多大の制限を受けたり. 先づ此の Diketon を低温下に沃度水素酸 ($D=2.00$) と亜鉛末を以て還元し *racem.* 6-Oxycampher を分離し得たり. 次に 6-Oxocampherdioxim を接觸還元せば 6-Oxocampher-monooxim を生じたり. 之は 1 個の $>C=NOH$ 基が $>C=NH$ 基に還元されし後加水分解により $>C=O$ 基に變化したるものと思ふを得. 然るに Dioxim を低温下に沃度水素酸 ($D=2.00$) と亜鉛末にて還元せば 2,6-Diiminocamphan-dihydrojodid を生ず. 此の沃度水素酸鹽をアルカリにて處理し生ずる遊離の鹽基を鹽酸と加温せば 2,3,3-Trimethyl-cyclopentanone (1)-essigsäure (4) を得るも之は先づ 6-Oxocampher に變じたる後其の Hydrolyse の結果生じたるものなること明かなり.

更に予は他の方面より 6-Oxy-2-oxo-camphan 或は 2,6-Dioxycamphan を造らんとし Nametkin 及 Zabrodin⁷⁾ に依りて造られたる α -Camphenon の Hydratation を試みたり. 今 N. 及 Z. 兩氏の α -Camphenon に関する研究業績を略記しあはせて α -Camphenon に對する新知見を述べんとす.

N. 及 Z. 兩氏⁸⁾ は Tricyclen (II) を封管中稀硝酸と加熱し一の中性物質を得 α -Nitrocamphen と命名せり. 本物質は第二級のニトロ化合物にして $KMnO_4$, Br に對する性質より不飽和なる

ことを知り得るも Tricyclen (II) より不飽和の第二級ニトロ化合物を生ずる爲には先づ Tricyclen の 1-2 或は 1-6 の間にて Ringspaltung が起り之に HNO_3 が anlagern して不安定な中間體 (III) と成り之が 1 分子の H_2O を分離して第二級のニトロ化合物 (IV) を生成すと論ぜり。尙彼等の經驗する所に據れば alicyclisch 及 bicyclisch の炭化水素に對する硝酸の作用は常に第一反應として Nitrierung が起り次に初めて Oxydation を招來するものなるも此の事實を tricyclisch の炭化水素に適用せば Tricyclen の Nitrierungsprodukt が (IV) 式の Camphen-Formel なる爲めには反應成績體中 α -Nitrocamphen 以外に Camphen の酸化成績體たる酸の存在を期待し得るも事實 Camphen 及 Camphenilon の酸化成績體たる Isocamphoronsäure を捕捉し得たるを以て (II) 式の Tricyclen が (IV) 式の Camphen-System に移行せしことを認め得となせり。扱彼等が α -Nitrocamphen に對し Camphen-System を與へんとする有力なる論據たる Isocamphoronsäure なる物は Camphen-System のみならず Camphan-及 Fenchan-System の酸化成績體たり得る物にして本酸の生成を以て直ちに α -Nitrocamphen が Camphen-System に屬す物なりとは斷じ得ざる所なり。況んや此の Isocamphoronsäure は α -Nitrocamphen より直接誘導せし物に非ずして Nitrierung の際の Nebenprodukt たるに於てをや。

又 α -Nitrocamphen がアルカリに溶解し Pseudonitrol を造ること依り第二級のニトロ化合物なることは明かなるも NO_2 基の位置に關しては實驗的證明を缺き單なる推定に過ぎず。

其後 N. 及 Z. 兩氏⁷⁾ は α -Nitrocamphen を Zinnchlorür で還元する際 α -Aminocamphen の傍はら α -Camphenon と稱する Keton 體を得しも最近⁹⁾兩氏は α -Nitrocamphen の KMnO_4 -酸化に依るも亦 α -Camphenon を得ることを報じ本 Keton 體が (IV) 式の α -Nitrocamphen より誘導せられし物なる故を以てその構造を (V) とせり。而るに既述せし如く α -Nitrocamphen (IV) が推定式たる以上 (V) 式亦推定式に過ぎずして實驗的確證を缺くものなり。

樟腦系化合物に於て第二級ニトロ化合物のアルカリ溶液を酸性にする際 Isonitro 化合物の生成を見る場合¹⁰⁾多ければ予は α -Nitrocamphen に就きて試みしに其の Isonitro 化合物 (IV') を製し得たり。次に α -Camphenon が果たして Camphen-Skelett を有するや否やを知らんが爲 Wolff の還元を行ひしに定量的に Camphen を得たるを以て之が Oxocamphen なることを知り得たり。 α -Camphenon が事實 (V) ならば Hydratation の結果 6-Oxycampher を生ず可き理なるを以て Bertram-Walbaum の原法を試みしに變化なく原物質を回收せしのみなりし故 F. W. Semmler u. Erwin W. Mayer¹¹⁾ が Camphen を蟻酸と煮沸して Isoborneol を得たる例に倣ひ α -Camphenon を 95% の蟻酸と煮沸せしに $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_2$ なる中性物質を生じたり。本品を減壓蒸溜にて精製せば冷却に依りて容易に固化するも (Schmp. 35° 位) 室温にて放置せば漸次流動體の状態を呈するに至る。之を 30% の NaOH と短時間煮沸せば Schmp. 89° の

Oxydihydro- β -campholensäure-Na-鹽¹²⁾ となり此の鹽の水溶液を酸性にせば Schmp. 105° の Oxydihydro- β -campholensäure¹²⁾ を生ずるを以て本物質が Dihydro-campholenolakton¹²⁾ (VIII) なること明かなり。今 α -Camphenon が Dihydro-campholenolakton に移行する機構を考察するに (V) $\rightarrow$ (VI) $\rightarrow$ (VII) $\rightarrow$ (VIII) 及び (V) $\rightarrow$ (VI') $\rightarrow$ (VII) $\rightarrow$ (VIII) 2 様の徑路を考へ得るも α -Camphenon 及び α -Nitrocamphen が Bertram-Walbaum の原法にて Ring-isomerisation を受けざる點を顧慮せば (V) $\rightarrow$ (VI') $\rightarrow$ (VII) $\rightarrow$ (VIII) の Prozess がより適當なるものの如し。

α -Camphenon が Dihydro-campholenolakton に變するに際し (V) $\rightarrow$ (VI), (V) $\rightarrow$ (VI') 何れの路を採るにせよ此の事實は α -Camphenon の Keton 基の位置を決定するものにして先に Wolff の還元にて Camphen を生ぜし事實とあはせ考ふれば α -Camphenon の構造は正に (V)

式ならざる可からず。是に予は N. 及 Z. 兩氏の (V) 式を支持す可き實驗的證明を與ふるを得たり。從つて逆に α -Camphenon の母體たる α -Nitrocamphen の構造も (IV) なること明かとなれり。次に α -Camphenon を酒精と Na にて還元しそれに對應する 6-Oxycamphen (IX) を造れり。本品は Hydratation の結果 2,6-Dioxycamphan を生ず可き物なるを以て Bertram-Walbaum の原法を試み K_{p14} 70°-72°, K_{p14} 180° の 2 種の反應成績體を得しも前者は Acetyl-6-Oxycamphen にして別途 Pyridin 及び Acetylchlorid にて 6-Oxycamphen をアセチル化し同一のアセチル誘導體を得たり。後者は水蒸氣蒸溜にて溜出せず且高き沸點を有する點より 6-Oxycamphen の Polymerisationsprodukt と思はれ $KMnO_4$ に對し安定なるもその $CHCl_3$ 溶液が Br と直ちに反應する性質は Tricyclen 環の存在を想はしむ。是の如く α -Camphenon より Oxycampher を造らんとする試みは成功せざりき。

第二章 イソアミノカンファーに関する研究

嘗て英國の化學者 M. O. Forster u. H. A. Howard¹³⁾ は Tiemann の Isoaminocampher¹⁴⁾ の Semicarbazon を蓐酸と加温して不安定な油狀物質を得之を β -Oxycampher と稱し 6-Oxycampher の構造を記載せり。當時は樟腦核の 6 位に於ける置換體を β -系化合物と稱せしも現在の見解に依れば本品は 10-Oxycampher に相當する物なり¹⁵⁾。而るに最近朝比奈、石館兩氏の造られし 10-Oxycampher⁴⁾ 及び本研究に於て造りし 6-Oxycampher は何れも白色結晶にして Forster u. Howard の β -Oxycampher (不安定な油狀物質) とは相異なる物質なること明かなり。

是に於て予は β -Oxycampher 及びそれと密接な關係にある β -Aminocampher (Tiemann の Isoaminocampher) の究明に志し幸ひにも兩者の本態を明確にし得たりと信するを以て以下その經過を記述す可し。

Isoaminocampher は初め F. Tiemann¹⁴⁾ が Campheroxim, Campholenitril 或は Campholenamid に強鹽酸を作用せしめて造りし $C_{10}H_{17}ON$ なる組成の鹽基性物質にして彼は自らの Campher-Formel に基きてそれに (X) 式の構造を與へたり。ヒドロキシラミンの作用に依り組成 $C_{10}H_{17}O_2N$ なる 2 種の Oxim を得て Isoaminocampher に於ける Ketocarbonyl 基が Oximino 基にて置換されると同時にアミノ基が水酸基に變じたる物なりと説明し Benzyliden 誘導體 (Schmp. 98° のみを記し分析を行はず) 及び Dimethylamino 誘導體を造ることよりアミノ基の第一級なることを示しアミノ基の結合は極めて弱く水と加熱ばせ容易にアンモニヤを放ちて Dihydro- β -campholeno-lacton に變ずるを認めたり。

其後 Forster u. Howard¹³⁾ は Brecht の Campher-Formel を採用して Tiemann の Isoaminocampher を (XI) 式に訂正し β -Bromcampher が酒精製アンモニヤの作用にて Isoaminocampher と成り逆に Isoamino-Campher-Chlorhydrat の乾溜成績體に Br を作用せしむれ

ば β -Bromcampher と成る事より Isoaminocampher のアミノ基は β -Bromcampher の Br と同位置を占める物なりとして之を β -Aminocampher と稱せり。Forster u. Howard は Isoaminocampher にセミカルバチドを作用せしめ 2 種 (α 及 β) の縮合體を得て β -Oxycampher の Semicarbazon なりと思へり。更に α -Semicarbazon を稀鹽酸と加温せば Dihydro-campholenolacton となるも蓂酸と加温する際 Borneol 様芳香を有する油狀物質に變じ之がヒドロキシラミンの作用で Isoaminocampher-Oxim と同一の Oxim を生成する事實より此の油狀物質が β -Oxycampher 其の物なりとせしも極めて不安定なる爲め精製すること能はざりき。

予は Forster u. Howard に従ひて彼等の謂ふ β -Oxycampher を製せしに彼等の記載する如く不安定な油狀物質にして容易に Dihydro-campholenolacton に變化する物なれば其のままにて精製し得ざりしも之に 30 % NaOH を少しく加ふれば直ちに $C_{11}H_{20}O_3N_3Na + H_2O$ の組成を有する白色結晶性物質を析出するを以て本品が Oxycampher に非ずして尙 Semicarbazid を保有する物なることを知り得たり。此の Na-鹽は水に會へば直ちに Dihydro-campholenolacton に變ず。

又 Forster u. Howard は Isoaminocampher に Toluolsulfochlorid を作用せしめて Toluolsulfonyl 誘導體を造りしも Benzolsulfochlorid に依りては Benzolsulfonyl 誘導體を生ぜずして α -Campholenamid を生ずと報告するも予は Benzolsulfonylisoaminocampher を純粹に分離精製し得たり。本品を稀アルカリと加温せば Dihydro-campholenolacton と Benzolsulfamid に分解す。次に Isoaminocampherchlorhydrat の水溶液を室温にて永く放置せば定量的に Dihydrocampholenolacton (XII) と成るも Chlorhydrat の水溶液を少しく加温せば瞬時に β -Campholenamid (XIII) に變じ逆に β -Campholenamid は沃度水素酸の作用にて Isoaminocampher となる。叙述の化學變化より考察せば Isoaminocampher が Dihydro-campholenolacton (XIV) なること最も妥當なりと信ず。

かかる Lacton の Imin は從來其例を見ざる所なるも之に近き物としては Ketimin $\begin{smallmatrix} R_1 \\ R_2 \end{smallmatrix} > C = NH$, Iminoäther $R-C \begin{smallmatrix} NH \\ OR \end{smallmatrix}$, 及び Amidin $R-C \begin{smallmatrix} NH \\ NH_2 \end{smallmatrix}$ 等が知られ而して之等の $>C=NH$ 基に關する反應は何れも Isoaminocampher の諸反應と一致す。即ち Pinner¹⁶⁾ 松井元興氏¹⁷⁾ の研究に依り Iminoäther はヒドロキシラミン或は硫化水素の作用にて其の $>C=NH$ 基を $>C=NOH$ 或は $>C=S$ に變ずるを知られたるも事實予は Isoaminocampher の Aether 溶液に硫化水素を通じ Isoaminocampher の Immo 基を S にて置換せる $C_{10}H_{16}OS$ なる物質を得たり。此のチオ化合物にヒドロキシラミンを作用せしむれば $C_{10}H_{17}O_2N$ の組成を有する 2 種の Oxim を生じ Isoaminocampher がヒドロキシラミンの作用に依りて生ずる 2 種の Oxim と夫々同一なるを見たり。従つて Isoaminocampher がヒドロキシラミンと縮合するは Keton 基ならずして Ketmin 基を有するが爲なり。

故に Isoaminocampher が (XIV) 式の Dihydro-campholeno-iminolacton にして硫化水素の作用に依り Thion-lacton (XV) を生成するを知り得可し。Dihydro-campholenolacton は Carbonlacton なる故 Oxim を造らずと雖も Thion-lacton が Oxim を生成するは Cumarin 及び Thioncumarin の場合に於けるが如し。

扱予は Dihydro-campholeno-thionlacton (XV) を別途合成せんとして α -及び β -Campholensäure-nitril (XVI 及び XVI') を常法に依り Iminoäther (XVII 及び XVII') に變じ硫化水素にて Thionsäure-ester (XVIII 及び XVIII') と成し之を沃度水素酸 ($D=2.00$) と加熱したるに α -系 β -系共に $C_{10}H_{10}OS$ なる同一物質を生じ (Schmp. 58°) 混融の結果 Dihydro-campholeno-thionlacton (XV) と異なる物質なることを示せり。Campholen-thionsäure-äthylester を沃度水素酸と熱する際エステルが鹼化され Thionsäure (a) の形のまま反應せば豫期の如く Dihydro-campholeno-thionlacton (XV) を生成す可き理なるも Hantzsch¹⁸⁾ の研究に據れば遊離の Thionsäure (a) は Thiolsäure (b) と Gleichgewichtsisomerie をなすものにして寧ろ Thiolsäure (b) の形をとらんとする傾向大なれば Campholen-thionsäure-ester の場合に於てもエステルの鹼化と同時に Thiolsäure (b) の形に轉移して反應する爲め Thionlacton を生ぜずして Dihydrocampholeno-thiol-lacton (XIX) を生成せしものならん。事實 Thion-lacton を稀鹽酸と加温せば硫化水素を放つて Dihydro-campholenolacton を生ずるも Thiol-lacton は其際變化せず。

Isoaminocampher はヒドロキシラミンの作用に依り Imino 基を Oximino 基に變じ (XX) 式の Oxim を生成すると同様セミカルバチドの作用に依り Semicarbazon (XXI) を生成す。之を稀酸と加温する際生ずる油狀物質 (Forster u. Howard の β -Oxycampher) は Partielle Hydrolyse を受けし Semicarbazino-oxy-化合物 (XXII) にして NaOH に依り $\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{O}_3\text{N}_3\text{Na}$ の組成を有する結晶性 Na-鹽を生ずるを知り得たり。

β -Bromcampher (10-Bromcampher)¹³⁾ が酒精製アンモニアの作用で Isoaminocampher に變ずるを以て其のアミノ基が β 位なりと斷ずるは當らず。何となれば 10-Bromcampher はアルカリの作用に依り容易に Campholensäure となる故加壓下にてアンモニアとの作用なれば之

が Campholenamid となり更に Isoaminocampher に移行し得る可能性あればなり。更に予は Forster 及び Howard の謂ふ Isoaminocampher より β -Bromcampher への移行¹³⁾を追試せんが爲め Isoammocampher-chlorhydrat を減壓蒸溜せしに Schmp. 86° の β -Campholenamid を得しのみにして Schmp. 71° の Cycloimin を得ること能はざりき、若し此の Cycloimin が確實なる存在ならば Campholensäure 誘導體より Camphan-Skelett への復歸反應として興味あるものなり。

第三章 樟腦の硫黃誘導體に関する研究

第一節 Camphersulfochlorid に就きて。

T. M. Lowry 及び G. C. Donington¹⁹⁾は *d*-Campher-10-sulfochlorid を粉末錫と鹽酸にて還元し理論値の 14% の得量を以て *d*-Campher-10-thiol を得しも予の追試の結果は得量を理論値の 40% に上げるを得たり。次に予は還元劑として氷醋と亞鉛末を使用せしに Thiol の得量悪しく理論値の 10% 前後を普通とす。Camphersulfochlorid を氷醋と加温せば容易に Camphersulfonsäure に成る事實より Sulfochlorid の氷醋と亞鉛に依る還元に於ては Thiol に還元されざる内に Sulfonsäure と成る量多きが爲め Thiol の得量悪しきを知り得可し。

Lowry 及び Donington は Thiol を鹽化第二鐵又は沃度を以て酸化して Schmp. 224° の Disulfid を造れるも予は KMnO_4 にて酸化し Schmp. 231° の Disulfid を得たり。

又氷酸と亞鉛末に依る還元にて少しく條件を變更せば Thiol を生ぜずして *d*-Campher を生成す。之は先づ亞硫酸ガスが脱離して Chlorcampher と成り更に之より Campher を化生せしものならん。

予は次に *d*-Campher- π -sulfochlorid を錫と鹽酸にて還元せしに理論値の 21.7% の得量にて π -Thiol を製し得たり。此の際氷醋と亞鉛末を使用せば Campher-10-thiol の場合と同様得量悪しく理論値の 11.4% なりき。此の新らしき Campherthiol の誘導體として Acetat (Schmp. 34°), Semicarbazon (Schmp. 219° - 220°), Disulfid (Schmp. 215°) 及び水銀化合物等を造りたり。

Camphersulfochlorid に Pyridin 或は Triäthylamin を作用せしむれば Chlorsulfoxydecampher なる物質を生ず²⁰⁾。予は π - 及び 10-Chlorsulfoxydecampher を氷醋と亞鉛末を以て還元せしに少量の Thiol の傍はら Oxocampher の生成を見たり。

此の際氷醋と亞鉛末の代はりに水と亞鉛末を以て處理せば Oxocampher のみを生ず。氷醋と

亞鉛末にて Chlorsulfoxydcampher より Thiol を生ずるは Sulfochlorid の還元にて Thiol を生ずる場合と同じ理なるも Oxocampher の生成は Chlorsulfoxydcampher の還元的加水分解と考ふるを得。π- 及び 10-Oxocampher の新製法として興味ある反應なり。

第二節 Thiocampher の新製法に就きて。

従來 Thiocampher の製法としては Campher を酒精製の硫化アンモンと加熱する方法²¹⁾ が知られたるも其の操作繁雜にして得量惡るし、予は本研究に於て舊法に比し簡便にして得量多き Thiocampher の新製法を見出せり。

即ち先づ Campheroxim に亞硝酸を作用せしむれば Campherimin 及び Pernitrosocampher を生ずるも Pernitrosocampher はアンモニヤ水と煮沸することに依り容易に Campherimin となる²²⁾。斯くして得る Campherimin に硫化水素を作用せしむれば Thiocampher を生成す。Campherimin に硫化水素を通ずるに當り溶媒として Aether を用ふれば反應速度極めて遅く長時間硫化水素を通ずるも Thiocampher の生成量少し。然るに溶媒として Benzol を用ひ熱時反應せしむれば反應速度速かにして好結果を得。

終りに臨み本研究に關し終始御懇篤なる御指導を賜はりし恩師朝比奈泰彦先生に謹みて感謝す。尙ほ元素分析を施行せられし宮澤嘉一郎、上松英寛兩氏に謝意を表す。

文 獻

- 1) Bredt u. Ahrens: J. pr. [2] **112**, 273 (1925). 石館: 本誌 Vol. **48**, 410 (1928).
- 2) Houben n. Pfankuch: Ann. **489**, 193 (1931).
- 3) 朝比奈, 石館: 本誌. Vol. **54**, 86 (1934).
- 4) 朝比奈, 石館: 本誌. Vol. **54**, 542 (1934).
- 5) 朝比奈, 石館, 塚本 (長): 本誌. Vol. **56**, 388, 395 (1936).
- 6) 本誌. Vol. **55**, 1004 (1935).
- 7) B. **59**, 368 (1926).
- 8) Ann. **441**, 181 (1925).
- 9) B. **69**, 1789 (1936).
- 10) Forster: Jour. chem. Soc. London **75**, 1144 (1899), **77**, 263 (1900).
- Lowry: 同上 **75**, 223 (1899); **83**, 935 (1903).
- Lapworth u. Kipping: 同上 **69**, 309 (1896).
- 11) B. **44**, 2012 (1911).
- 12) Tiemann; B. **30**, 404 (1897).
- 13) Jour. chem. Soc. London **103**, 63 (1913).
- 14) B. **30**, 321 (1897).
- 15) L. Simonsen, "The Terpenes", II, S. 321 (1932).
- 16) B. **17**, 184 (1884).
- 17) Mem. Coll. Eng. Kyoto I, 285 (1903), C **1909**, II, 423.
- 18) B. **46**, 3581 (1913).
- 19) Jour. chem. London **83**, 479 (1903).
- 20) E. Wedekind, D. Schenk u. R. Stüsser: B. **56**, 633 (1923).
- E. Wedekind u. R. Stüsser: B. **56**, 1557 (1923).
- 21) Henri Wuyts: B. **36**, 863 (1903).
- 22) Tiemann: B. **28**, 1080 (1895).
- Mahla u. Tiemann: 同上 **29**, 2807 (1896).
- 23) B. **69**, 2783 (1936).

實 験 の 部

第 一 章

2.6-Dioxo-camphan の還元

2.6-Dioxocamphan 2 g を D=2.00 の沃度水素酸 20 cc に溶解し氷と鹽にて器の外部を -10° 位に保ち

攪拌しつつ 5 g の亜鉛末を少量宛加ふ。全部の亜鉛を加へ終りたる後 12 時間放置後 100 cc の水を和し Aether と振りて Aether 液は順次 NaHSO_3 液及び Na_2CO_3 液 (A) と振りたる後溶媒を溜去したる残渣を水蒸氣蒸溜に附す。溜出液を Aether と振り Aether 液は充分乾燥後 Aether を溜去して得る残渣を 5 cc の Toluol に溶解し 1 g の 3,5-Dinitrobenzoyl-chlorid 及び 0.5 g の Pyridin を加へ 120° にて 1 時間加熱す。冷後内容物を Aether にて稀釋し H_2SO_4 , NaOH 液と振りたる後 Aether を溜去したる残渣を水蒸氣蒸溜に附し揮發性物質を全部驅逐せし後蒸溜コルペンを冷却せば器壁に附着する油狀物質漸次結晶化し來るを以て吸引濾過す (0.2 g) Ligroin より再結晶せば Schmp. 146° の白色長針狀晶を得。

3.775 mg Dinitrobenzoat : 7.835 mg CO_2 , 1.750 mg H_2O

4.930 mg Dinitrobenzoat : 3.55 cc N (27° , 755 mm).

$\text{C}_{17}\text{H}_{18}\text{O}_7\text{N}_2$, Ber. C 56.35, H 4.97, N 7.73. Gef. C 56.60, H 5.19, N 7.98.

上記 Na_2CO_3 液 (A) を HCl 酸性にせば α -Campholonsäure (2,3,3-Trimethylcyclopentanon (1)-essigsäure (4)) を析出するも之は 2,6-Dioxo-camphan の Hydrolyse に依りて生じたる物なること明かなり。

racem.-6-Oxy-2-oxo-camphan: 純粹の Dinitrobenzoat 0.3 g を 10% K_2CO_3 液 15 cc と共に水浴上 2 時間加温せば大部分の物質は溶解して液は赤褐色を呈す。熱時濾過して濾液は鹽析後 Aether と振り Aether 液を乾燥後 Aether を溜去せば白色粘着性残渣約 0.15 g を得。一般有機溶媒には極めて易溶性にして冷水にも可成り溶解す。減壓下に昇華せしめし物は Schmp. 130° の樟腦様外觀を有する粘着性物質なり。1% 酒精溶液は光學的活性無し。

3.733 mg Sb. : 9.745 mg CO_2 , 3.120 mg H_2O .

$\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_2$ Ber. C 71.43, H 9.53. Gef. C 71.20, H 9.35.

Semicarbazon: 稀酒精溶液にて鹽酸セミカルバチド及び醋酸加里を用ひて製す。酒精より再結晶せば Schmp. 200° の光輝ある白色針狀晶を得。

1.695 mg Sb. : 0.263 cc N (16° , 766 mm).

$\text{C}_{11}\text{H}_{19}\text{O}_2\text{N}_3$. Ber. N 18.67. Gef. N 18.48.

無水クローム酸に依る酸化: 0.1 g の Oxycampher を 10 cc の氷醋に溶解し 0.1 g の無水クローム酸を少量宛加へ時々 60° 位に加温して 5 時間放置後水を和し Na_2CO_3 にてアルカリ性となす。之を Aether にて抽出するに何物をも得られず。次に Na_2CO_3 アルカリ性水溶液を HCl 酸性として Aether にて抽出せば Aether 溜去後醋酸を共雜する油狀物質少量を残す。常法にて Semicarbazon を造れば Schmp. 240° の Semicarbazon 0.1 g を得。2,3,3-Trimethylcyclopentanon (1)-essigsäure (4) の Semicarbazon と混融して同一物なることを認む。

2,6-Dioxo-camphan-dioxim の還元

1) **2,6-Dioxo-camphan-monooxim:** 2,6-Dioxo-camphan-dioxim は三宅氏⁶⁾に依り始めて造られ Schmp. $241-242^\circ$ とされしも其後 Komppa 及び Beckmann²³⁾ は Schmp. $244-245^\circ$ と記せり。余は酒精より再三再結晶せしめて Schmp. 250° の物質を得たり。Pd-Kohle 存在の下に水素氣流中加温しつつ振盪せば 2 g の Dioxim が 280 cc の水素を吸収す (1 モルとして理論値 228 cc)。濾過後氷醋を減壓にて大部分溜去し水を加へて析出する結晶を Ligroin 次に水より再結晶せば Schmp. 170° の白色針狀晶 1 g を得。本品はソーダには溶解せざるも冷 KOH には溶解し酸性にせば再び原物質を析出す。

3.810 mg Sb. : 9.240 mg CO_2 , 2.905 mg H_2O . — 3.078 mg Sb. : 0.206 cc N (17° , 753.5 mm).

$\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{O}_2\text{N}$. Ber. C 66.30, H 8.28, N 7.73. Gef. C 66.14, H 8.53, N 7.81.

此の Monooxim を KOH と加温せば Schmp. 185° の α -Campholonsäureoxim を生ず。

3.780 mg Sb_{st}. : 8.370 mg CO₂, 2.865 mg H₂O.

C₁₀H₁₇O₃N.

Ber. C 60.20, H 8.61. Gef. C 60.39, H 8.48.

Monooxim の稀酒精溶液に鹽酸セミカルバチッド及び醋酸加里の水溶液を加へ1時間水浴上加温して放置せば Semicarbazon を析出す。未だ知られざる 2,6-Dioxo-camphan の Oxim-Semicarbazon にして稀メタノールより再結晶せば Schmp. 219° の白色結晶なり。

1.905 mg Sb_{st}. : 0.385 cc N (20.5°, 760 mm).

C₁₁H₁₈O₂N₄. Ber. N. 23.53 Gef. N. 23.50

2) 2,6-Diimino-camphan-dihydrojodid: 2,6-Dioxo-camphan-dioxim 3 g を D=2.00 の沃度水素酸 30 g に溶解し器の外部を氷にて冷却し攪拌しつつ 5 g の亜鉛末を少量宛加ふれば暫時にして結晶を析出し始め内容物は次第に粥狀を呈するに至る。約 30 分後反應を中止し析出せし結晶を吸引濾過す。之を極少量の Alkohol に溶解し Aether を注加して放置せば光輝ある白色針狀晶を析出す (3 g). Schmp. 232°-235°.

3.560 mg Sb_{st}. : 3.715 mg CO₂, 1.495 mg H₂O — 6.670 mg Sb_{st}. : 0.397 cc N (27°, 761 mm).

C₁₀H₁₈N₂J₂. Ber. C 28.57, H 4.28, N 6.66. Gef. C 28.46, H 4.69, N 6.64.

本物質にアルカリを作用せしむれば油狀の鹽基を得。之を稀鹽酸と温むれば定量的に α-Campholonsäure に移行す。

6-Isonitro-camphen.

油狀の α-Nitrocamphen 4 g を 10% の酒精性加里 50 cc と共に 1 時間水浴上にて加温後水にて稀釋し Aether と振りたる後のアルカリ性水溶液を注意して HCl 酸性となせば白色結晶性物質 3.2 g を析出す。50% の稀メタノールより再結晶すると Schmp. 114° の白色針狀晶となる。本品は KMnO₄, Br を直ちに脱色し熔融に依りて原の α-Nitrocamphen (油狀) に變化す。

3.515 mg Sb_{st}. : 8.535 mg CO₂, 2.605 mg H₂O. — 4.155 mg Sb_{st}. : 0.277 cc N (18°, 761 mm).

C₁₀H₁₅O₂N. Ber. C 66.24, H 8.35, N 7.75. Gef. C 66.22, H 8.29, N 7.83.

Pseudo-nitrol (6,6-Nitro-nitroso-camphen): 1 g の 6-Isonitro-camphen を少量の NaOH に溶解し 0.5 g の NaNO₂ 液を加へ氷冷しつつ徐々に稀硫酸を滴下せば結晶を析出して液は青色を呈するに至る。析出せし結晶を Ligroin より再結晶せば Schmp. 112-113° の顆粒狀白色結晶を得。

2.670 mg Sb_{st}. : 0.292 cc N (17°, 758 mm).

C₁₀H₁₄O₃N₂. Ber. N 13.33. Gef. N 12.82.

α-Camphenon.

Nametkin 及び Zabrodin⁹⁾ に従ひて α-Nitrocamphen を KMnO₄ 酸化して造り Semicarbazon を經て昇華に依りて精製せし物は Schmp. 77-78° にして N 及び Z 兩氏の記載と一致す。常法に依りて造りし Semicarbazon は酒精より再結晶するに Schmp. 213.5° の光輝ある白色小葉狀晶なり (N. 及 Z. 兩氏は 205° と記載す)。

3.615 mg Sb_{st}. : 8.445 mg CO₂, 2.605 mg H₂O. — 1.690 mg Sb_{st}. : 0.301 cc N (21.5°, 759 mm).

C₁₁H₁₇ON₃. Ber. C 63.77, H 8.21, N 20.29. Gef. C 63.71 H 8.06, N 20.62.

α-Camphenon より Camphen の生成 (Wolff の還元)。

1.5 g の α-Camphenon-semicarbazon (Schmp. 213.5°) を 1.3 g の Na より製せし Na-Äthylat と共に封管中 160° にて 16 時間加熱し開管して水にて稀釋せば多量の白色物質を析出す。Schmp. 45°, Kp 160° なり。0.2 g をとり Bertram 及び Walbaum の Hydratation を行へば Isobornylacetat を生ず (Schmp.

131° の Dinitrobenzoat として證明せり)。

**α -Camphenon に対する蟻酸の作用
Dihydro- β -campholenolacton の生成**

2 g の α -Camphenon を 95% の蟻酸 4 g と共に油浴中 120-125° にて 4 時間加熱し冷後水を和し Aether にて抽出す。Aether 抽出液は Na_2CO_3 と振りて酸性物質を除き Aether を溜去するに褐色の油状物質約 1.5 g を残す。減壓蒸溜にて精製せし物は 35° 頃にて熔融する白色物質にして室温にて永く放置せば一部液化し流動状態を呈するに至る。

4.030 mg SbSt. : 10.550 mg CO_2 , 3.500 mg H_2O .

$\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_2$. Ber. C 71.43, H 9.52. Gef. C 71.40, H 9.71.

本物質を少量の 30% NaOH と金網上加熱し温時少量の酒精に溶解せしめ之に Aether を注加して放置せば漸次白色針状晶を析出し来る。Schmp. 89°

Schmp. 89° の物質の水溶液を冷却しつつ注意して酸性となせば白色結晶を析出す。濾別せし物を Aether に溶解し Ligroin を加ふれば絹絲様光澤ある針状晶 (Schmp. 105°) を析出す。Oxydihydro- β -campholen-säure と混融して融點の變化を認めず。

α -Camphenon の還元 (6-Oxy-camphen の生成)。

2 g の α -Camphenon を酒精 150 cc に溶解し 12 g の Na を部分的に加へ熱時還元す。反應終了後水にて稀釋し水蒸氣蒸溜に附す。溜出液を Aether と振り Aether 溜去後の残渣を減壓下に加温して共蒸せる酒精分を除く時は容易に固化す。得量 1.5 g。減壓昇華にて精製せし物は Schmp. 114° の樟腦様外觀を有する粘着性物質なり。一般有機溶媒に易溶性にして KMnO_4 , Br を直ちに脱色す。

3.755 mg SbSt. : 10.845 mg CO_2 , 3.540 mg H_2O .

$\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}$. Ber. C 78.95, H 10.48, Gef. C 78.77, H 10.55.

6-Oxy-camphen を水和 (Hydratisieren) する試み。

4 g の 6-Oxy-camphen を 10 cc の氷醋に溶解し 50% の硫酸 0.5 g を加へ 50-60° にて 3 時間加温後水にて稀釋し Aether と振る。

Aether 液はソーダにて洗ひ酸性物質を除去後 Aether を溜去せば赤褐色の油状物質 4 g を残す。減壓蒸溜にて Kp_{14} 70-72° と Kp_{14} 180° の二部分に分つ。兩者の得量は共に約 2 g。

Kp_{14} 70-72° の物質に就きて：

無色の輕き芳香性液體にして KMnO_4 , Br を直ちに脱色す。

3.825 mg SbSt. : 10.425 mg CO_2 , 3.205 mg H_2O .

$\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}_2$. Ber. C 74.23, H 9.27. Gef. C 74.33, H 9.37.

6-Oxy-camphen を Pyridin と Acetylchlorid にてアセチル化せし物は上記 Kp_{14} 70-72° の物質と同性質を示す。

3.650 mg SbSt. : 9.975 mg CO_2 , 2.970 mg H_2O .

$\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}_2$. Ber. C 74.23, H 9.27. Gef. C 74.53, H 9.14.

Kp_{14} 180° の物質に就きて：

帶黄色飴状物質にて無臭なり。水蒸氣蒸溜にて溜出せず KMnO_4 に対しては安定なるも CHCl_3 溶液は Br. を直ちに脱色す。

3.625 mg SbSt. : 10.495 mg CO_2 , 3.335 mg H_2O

$(\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O})_n$ Ber. C 78.95, H 10.48. Gef. C 78.96, H 10.28.

第二章

Dihydro- β -campholeno-iminolacton (Isoaminocampher).

Tiemann¹⁴⁾ の記載に従ひ Campher-oxim に沃度水素酸を作用せしめて造りし Isoaminocampher は Schmp. 39° の白色結晶性物質にして特有の輕き不快臭を有し一般有機溶媒に易溶なり。

3.840 mg Sbst.: 10.080 mg CO₂, 3.510 mg H₂O. — 2.320 mg Sbst.: 0.157 cc N (16°, 771 mm).

C₁₀H₁₇ON. Ber. C 71.85, H 10.18, N 8.33. Gef. C 71.59, H 10.23, N 8.10.

Oxalat: Isoaminocampher の Äther 溶液に藤酸の Äther 溶液を加へると直ちに白色結晶を析出す。Schmp. 148°.

3.460 mg Sbst.: 0.170 cc N (16.5°, 766 mm).

C₁₀H₁₇ON, C₂H₂O₄. Ber. N 5.44. Gef. N 5.84.

Chlorhydrat: Isoaminocampher の無水 Äther 溶液に乾燥鹽酸ガスを通入せば直ちに白色の Chlorhydrat を析出す。Alkohol-Äther より再結晶せば Schmp. 89° を示す。本品の水溶液を 2 日間室温に放置せば油狀物質の析出するを認む。Kp.₁₀ 116°, Schmp. 30° にして Dihydro- β -campholenolacton なり。

α -Semicarbazon: Isoaminocampher-chlorhydrat 3.5 g と醋酸加里 3.5 g 及び鹽酸セミカルバツト 2.2 g を 20 cc の水に溶解して放置せば漸次油狀物質を析出し 10 時間後には全部結晶化す。得量 4.2 g。熱時 Petrolaether で處理し之に不溶性の部分 (大部分) を Benzol より再結晶せば Schmp. 170° の白色針狀晶 3.4 g を得。(Forster 及び Howard の α -Semicarbazon は 162° と記載さる)。

3.775 mg Sbst.: 8.160 mg CO₂, 2.845 mg H₂O. — 3.250 mg Sbst.: 0.512 cc N (13.5°, 759 mm).

C₁₁H₁₉O₂N₃. Ber. C 58.67, H 8.44, N 18.67. Gef. C 58.95, H 8.43, N 18.75.

Oxime: Isoaminocampher-chlorhydrat 1 g を稀酒精に溶解し鹽酸ヒドロオキシラミン 0.5 g と醋酸加里 1.5 g の水溶液を加ふれば直ちに結晶の析出を見る。稀酒精より再結晶せば Schmp. 171°。本結晶を濾過せし後の母液を Äther と振り Äther 液は乾燥後溶媒を溜去するに油狀物質を残すも硫酸乾燥器中減壓にて放置せば結晶化す。Ligroin より再結晶するに Schmp. 111° の白色針狀晶を得。

4.800 mg Sbst. (Schmp. 171°): 0.312 cc N (16°, 767 mm). — 3.390 mg Sbst. (Schmp. 111°): 0.225 cc N (16°, 768 mm).

C₁₀H₁₇O₂N. Ber. N 7.65. Gef. N 7.75, 7.92.

Isoaminocampher より Dihydro-campholenolacton の生成

Isoaminocampher-chlorhydrat 4 g を 100 cc の水に溶解し 2 日間室温にて放置するに油狀物質を析出して器底に沈積す。之を Äther に轉溶せしめ約 3 g の油狀物質を得。減壓蒸溜せば溜出後容易に固化す。Kp.₁₀ 116°, Schmp. 30°.

3.770 mg Sbst.: 9.840 mg CO₂, 3.305 mg H₂O.

C₁₀H₁₆O₂. Ber. C 71.43, H 9.52. Gef. C 71.18, H 9.81.

本品 2.5 g を 30% の NaOH 液 1 g と金網上にて暫時煮沸し熱時直ちに 5 cc の酒精を注加して得る溶液に Aether を加ふれば Schmp. 89° の白色針狀晶 3.6 g を析出す。本結晶を水に溶解し冷却しつつ硫酸々性となせば絹絲様光澤ある白色針狀晶 1.5 g を析出す。之を Äther に溶解したる物に Ligroin を加ふれば Schmp. 105° の Oxy-dihydro-campholensäure を得。

Isoaminocampher より β -Campholenamid の生成

i) Isoaminocampher-chlorhydrat の水溶液を水中で暫時加温せば冷後著量の白色結晶を析出す。之を

Benzol に溶解し Ligroin を加ふれば Schmp. 86° の白色針狀晶 (β -Campholenamid) を得.

2.512 mg Sbst.: 0.170 cc N (16° , 767 mm).

$C_{10}H_{17}ON$. Ber. N 8.38, Gef. N 8.07.

ii) Isoaminocampher-chlorhydrat の乾溜: 充分乾燥せる Isoaminocampherchlorhydrat を減壓蒸溜するに Kp_{25} 173° にて白色物質を溜出し受器中直ちに固化す. Benzol-Ligroin より再結晶せば Schmp. 86° の絹絲様光澤ある針狀晶となり β -Campholenamid と混融するに融點の變化を認めず.

β -Campholenamid より Isoaminocampher の生成.

Schmp. 86° の β -Campholenamid 0.5 g を $D=2.00$ の沃度水素酸 1 g と共に少時加熱して反應せしめし後水にて稀釋し Äther と振り之に轉溶性の物質を除去後水溶液を, アルカリ性となせば白濁す. Äther と振れば Äther-殘渣として 0.4 g の油狀物質を得. 氷室中放置せば固化して Schmp. 39° を示す.

本品の Oxalat を造るに Schmp. 148° にして Isoaminocampher-oxalat と一致す.

Dihydrocampholenolacton-semicarbazon の Partielle Hydrolyse.

Schmp. 170° の Semicarbazon 2.5 g を 15% の稀酸溶液 15 cc に浮遊せしめ暫時水浴上にて加温せば直ちに油狀物質に變じて芳香を放つ. 之を Äther にて抽出し Äther 液は Soda にて洗ひ乾燥後 Äther を溜去するに油狀物質 (Forster u. Howard の謂ふ β -Oxycampher) を殘す. 30% の NaOH 液少量を加ふれば直ちに結晶を析出して粥狀を呈するに至るを以て速かに吸引濾過し可及的水分を除去したる物を陶土板上にて乾燥後酒精に溶解し Äther を加へて放置せば白色鱗片狀結晶を析出す. Schmp. 160° . 本品は 1 モルの結晶水を有し P_2O_5 上 80° にて乾燥せば結晶水を失ひて Schmp. 185° を示す.

3.880 mg Sbst.: (wasserfrei): 7.130 mg CO_2 , 2.530 mg H_2O . — 3.692 mg Sbst. (wasserfrei):

0.987 mg Na_2SO_4 .

$C_{11}H_{20}O_3N_3Na$. Ber. C 49.81, H 7.54, Na 8.67. Gef. C 50.12, H 7.29, Na 8.65.

4.025 mg Sbst. (wasserhaltig): 6.905 mg CO_2 , 2.805 mg H_2O . — 3.900 mg Sbst. (wasserhaltig):

0.491 cc N (13° , 759 mm). — 42.895 mg Sbst. (wasserhaltig): 2.496 mg Gew.-Verlust.

$C_{11}H_{20}O_3N_3Na + H_2O$. Ber. C 46.64, H 7.77, N 14.84, H_2O 6.36.

Gef. C 46.79, H 7.80, N 15.01, H_2O 5.82.

(Kaliumbichromat を加へて燃焼を行へり)

Dihydrocampholeno-imino-lacton の Benzolsulfonyl 誘導體

1 g の Isoaminocampher と 1 g の Benzolsulfochlorid を 20 cc の KOH (10%) 液に加へ室温にて攪拌し 1 時間後析出せし白色結晶を吸引濾過して Ligroin より再結晶するに Schmp 108° の白色針狀晶 1.5 g を得.

3.675 mg Sbst.: 8.415 mg CO_2 , 2.300 mg H_2O . — 4.100 mg Sbst.: 0.172 cc N (26° , 762 mm).

$C_{16}H_{21}O_3NS$. Ber. C 62.54, H 6.84, N 4.56. Gef. C 62.45, H 7.00, N 4.80.

本品 0.5 g を 10 cc の KOH (5%) 液と共に水浴上 2 時間加温し冷後 Äther にて抽出せば油狀の中性物質 0.2 g を得たり.

Schmp. 89° の鹽基性 Na-鹽及び Schmp. 105° の Oxydihydro- β -campholensäure を造ることより Dihydro-campholenolacton なることを確認す.

Äther と振りし後のアルカリ性水溶液の方を酸性にせば白色結晶 0.2 g を析出す. 熱湯より再結晶せば Schmp. 153° の白色鱗片狀結晶となる (Benzolsulfamid).

4.050 mg Sbst.: 6.760 mg CO₂, 1.620 mg H₂O. — 4.675 mg Sbst.: 0.385 cc N (31°, 758 mm).

C₆H₇O₂NS. Ber. C 45.86, H 4.45, N 8.91. Gef. 45.52, H 4.48, N 9.22.

Dihydro-β-campholeno-thion-lacton.

10 g の Isoaminocampher を 200 cc の Äther に溶解し乾燥せる H₂S を 8 時間通じたる後 Äther 溶液は充分水洗後稀鹽酸と反覆振盪して未反應の Isoaminocampher を除去し Äther を溜去せば結晶性殘渣 6 g を得. 酒精に溶解せし後水を加へて放置するに Schmp. 60° の白色針狀結晶を析出す. 水には不溶なるも一般有機溶媒には極めて易溶性なり.

3.560 mg Sbst.: 5.500 mg CO₂, 2.752 mg H₂O. — 6.145 mg Sbst.: 6.79 cc

0.01-n. NaOH (S-Best. nach Pregl).

C₁₀H₁₆OS. Ber. C 65.22, H 8.69, S 17.41. Gef. C 65.12 H 8.65, S 17.73.

本品を 10% の HCl と共に 5 時間水浴上にて加温せば H₂S を放ちて Dihydro-camphenolacton に變化す.

Thion-lacton に対するヒドロキシラミンの作用

(Dihydro-camphenolacton-oxim の生成)

Thion-lacton 1 g を少量の酒精に溶解し 0.4 g の鹽酸ヒドロキシラミンと當量の酒精製 Na-Äthylat より製せし遊離のヒドロキシラミンを加へ 4 時間水浴上にて加温す. 水にて稀釋し析出する粗製 Oxim を稀酒精にて處理し易溶性物質と難溶性物質に分つ. 難溶性物質は稀酒精より再結晶せしむれば Schmp. 171° を示し易溶性物質は Ligron より再結晶するに Schmp. 111° の白色針狀晶となる. 兩者夫々 Isoaminocampher のヒドロキシラミン誘導體と混融して融點降下を示さず.

α-Campholen-iminoäther

α-Campholennitril 8 g を 50 cc の無水エーテルに溶解し純アルコール 2.5 g を加へ 5 時間乾燥鹽酸ガスを通す. 此の際少しく發熱する故氷水を以て冷却す. 反應終了後注意して氷水を加へ充分振盪せし後エーテル層と分離し水層をアルカリ性になし Äther と振れど Äther 蒸溜殘渣として 8 g の鹽基性物質を得. Kp₁₂ 123° にしてアミン臭を有する無色の輕き液體なり.

2.688 mg Sbst.: 7.257 mg CO₂, 2.599 mg H₂O. — 5.612 mg Sbst.: 0.350 cc N (20°, 751 mm).

C₁₂H₂₁ON. Ber. C 73.84, H 10.76, N 7.17. Gef. C 73.63, H 10.82, N 7.18

β-Campholen-iminoäther

α-の場合と同様にして β-Campholennitril より製す. Kp₄ 109-111° の輕き無色の液體なり,

3.275 mg Sbst.: 8.833 mg CO₂, 3.060 mg H₂O. — 3.517 mg Sbst.: 0.206 cc N (16°, 762 mm).

C₁₂H₂₁ON. Ber. C 73.84, H 10.76, N 7.17. Gef. C 73.56, H 10.45, N 6.93

Semicarbazon: α-Campholen-iminoäther より常法にて製せし Semicarbazon は 50% の稀酒精より再結晶するに Schmp. 165° の白色針狀晶なり.

3.825 mg Sbst.: 8.605 mg CO₂, 3.021 mg H₂O. — 2.310 mg Sbst.: 0.328 cc N (18°, 771 mm).

C₁₃H₂₃O₂N₃. Ber. C 61.66, H 9.09, N 16.60. Gef. C 61.36, H 8.83, N 16.90.

β-Campholen-iminoäther より製せし Semicarbazon は 50% の稀酒精より再結晶するに Schmp. 180° の白色葉狀晶なり.

3.565 mg Sbst.: 8.080 mg CO₂, 2.899 mg H₂O. — 2.315 mg Sbst.: 0.333 cc N (20°, 768 mm).

C₁₃H₂₃O₂N₃. Ber. C 61.66, H 9.09, N 16.60. Gef. C 61.81, H 9.10, N 16.93.

Campholen-thionsäure-äthylester.

α -Campholen-thionsäure-äthylester : 5 g の α -Campholen-iminoäther を 100 cc の Äther に溶解し乾燥 H_2S を 8 時間通じ Äther 液を水洗後稀鹽酸と振り未反應の Iminoäther を除去す。Äther 蒸溜残渣として 3.5 g の硫黄化合物を得。Kp₅ 106-107° 帶黄色の液體なり。

4.885 mg Sbst. : 12.226 mg CO_2 , 4.088 mg H_2O . — 5.455 mg Sbst. : 5.13 cc

0.01-n. NaOH (S-Best. nach Pregl).

$C_{12}H_{20}OS$. Ber. C 67.92, H 9.43, S 15.09. Gef. C 68.26, H 9.37, S 15.07.

β -Campholen-thionsäure-äthylester : α -の場合と同様 β -Campholen-iminoäther より製せし Thionsäure-äthylester は Kp₂₀ 127° の帶黄色液體なり。

4.585 mg Sbst. : 11.460 mg CO_2 , 3.970 mg H_2O . — 6.165 mg Sbst. : 5.68 cc 0.01-n. NaOH

(S-Best. nach Pregl).

$C_{12}H_{20}OS$. Ber. C 67.92, H 9.43, S 15.09. Gef. C 68.17, H 9.69, S 14.77.

Dihydro- β -campholeno-thiol-lacton.

α -或は β -Campholen-thionsäure-äthylester 1.5 g を 3 g の沃度水素酸 ($D=2.00$) と共に金網上弱く加熱せば後は自ら反應す。2-3 分間にして反應終了するを以て水にて稀釋し Äther と振る。Äther 液は水洗後 $NaHSO_3$, Soda にて洗ひ Äther を溜去せば油狀物質を残す。之を氷室中放置せば結晶性に固化せり。酒精に溶解し氷水を加ふれば白色鱗片狀結晶を析出す。Schmp. 58°. 得量 0.6 g にして一般有機溶媒には極めて易溶性なり。

Schmp. 60° の Campholeno-thion-lacton と混合せば室温にて熔融す。水浴上 10% の鹽酸と 5 時間加熱するも何等硫化水素臭を發せず原物質のまま殘留す。

3.708 mg Sbst. : 8.895 mg CO_2 , 2.790 mg H_2O . — 5.340 mg Sbst. : 5.83 cc 0.01-n. NaOH (S-Best. nach Pregl).

$C_{10}H_{16}OS$. Ber. C 65.22, H 8.69, S 17.41. Gef. C 65.42, H 8.42, S 17.51.

第 三 章 **d -Campher- π -sulfochlorid の還元. d -Campher- π -thiol の生成**

a) 鹽酸と錫に依る法。Sulfochlorid 10 g を容れたるコルベンに濃鹽酸 150 cc を加へ粉末錫 20 g を少量宛加へ行けば自ら 40°-50° 位に發熱して反應す。全部の錫を加へ終りたる後時々振盪して 20 時間室温に放置す。其の後 15 cc の濃鹽酸を加へ冷却器を附して 1 時間水浴上にて加温後水蒸氣蒸溜に附す。溜液は鹽析後 Aether と振り次に Aether 液を 10% の苛性曹達液と振る。此の苛性曹達液を酸性として Aether と振るに Aether 蒸溜残渣として白色結晶性物質 1.6 g を得。一般有機溶媒に極めて易溶性にして再結晶困難なるも石油エーテルに溶解して放置せば Schmp. 94° の白色結晶を得。特異の香を有する樟腦様粘着性物質にして水には殆んど不溶なり。

物質 0.253 g を Aceton に溶解して 10 cc となし 1 dm の管にて測定するに $\alpha_D^{25} = +2.75$ 従つて $[\alpha]_D^{25} = +108.7^\circ$

3.580 mg Sbst. : 8.600 mg CO_2 , 2.800 mg H_2O — 4.365 mg Sbst. : 4.73 cc 0.01-n. NaOH (S-Best. nach Pregl).

$C_{10}H_{16}OS$. Ber. C 65.22, H 8.69, S 17.39. Gef. C 65.52, H 8.75, S 17.37.

b) 氷醋酸と亜鉛末に依る法。Sulfochlorid 6 g を氷醋酸 150 cc に溶解し攪拌しつつ 6 g の亜鉛末を少量宛

加へ行けば 40°-50° 位に發熱す。全部の亜鉛末を加へ終りたる後水浴上にて加温しつつ 5 時間攪拌を續行す。冷後炭酸曹達にて中和し水蒸氣蒸溜に附し溜液を Aether と振る。Aether 液は苛性曹達液と振り次に苛性曹達液を酸性となし Aether と振るに Aether 蒸溜殘渣として約 0.5 g の π -Thiol を得。

d-Campher- π -thiol の誘導體

1) **Acetat:** π -Thiol 0.3 g を 0.1 g の醋酸曹達及び 2 cc の無水醋酸と共に 120° にて 1 時間加熱す。冷後水を和し炭酸曹達にて中和したる後 Aether と振る。Aether 蒸溜殘渣は油狀なるも永く放置せば漸次結晶性となる。溶媒に易溶なると融點の低き爲め再結晶不可能なりしも Aether に溶解し濾過して放置せば Aether の自然蒸發と共に漸次結晶を析出す。Schmp. 34°.

3.420 mg Shst.: 7.960 mg CO₂, 2.420 mg H₂O

C₁₂H₁₈O₂S. Ber. C 63.72, H 7.96. Gef. C 63.48, H 7.91.

2) **Semicarbazon:** π -Thiol 0.5 g を稀酒精溶液となし 0.3 g の鹽酸セミカルデチッド及び 0.5 g の醋酸加里の水溶液を加へ 4 時間水浴上に加温して一夜放置せば白色結晶を析出す。

50% の稀酒精より再結晶せば Schmp. 219°-220° を示す。

3.630 mg Sbst.: 7.330 mg CO₂, 2.615 mg H₂O. — 1.830 mg Sbst.: 0.278 cc N (24°, 760 mm)

C₁₁H₁₉ON₃S. Ber. C 54.77, H. 7.88, N 17.43. Gef. C 55.07, H 8.06, N 17.11.

3) **Disulfid:** π -Thiol 0.8 g を 100 cc の水に浮遊せしめ 0.5 g の KMnO₄ の 1% 溶液を攪拌しつつ滴下す。全部の KMnO₄ を加へ終りたる後 NaHSO₃ にて褐石を溶解せしめ Aether と振る。

Aether 蒸溜殘渣の結晶性物質を 50% 稀酒精より再結晶せば Schmp. 215° の白色結晶を得。本物質は Merkaptan の性質を失ひ最早やアルカリに溶解せず。

3.610 mg Sbst.: 8.720 mg CO₂, 2.675 mg H₂O — 5.535 mg Sbst.: 5.90 cc 0.01-n. NaOH (S-Best. nach Pregl).

C₂₀H₃₀O₂S₂. Ber. C 65.57, H. 8.20, S 17.48. Gef. C 65.88, H 8.29, S 17.09.

4) **水銀化合物.** π -Thiol の酒精溶液に昇汞の酒精溶液を加ふれば直ちに水銀化合物を析出す。本品は 260° 位にて黑變するも 300° 附近まで熱するに熔融せず。

d-Campher-10-sulfochlorid の還元. *d*-Campher-10-thiol の生成

a) 鹽酸と錫に依る法. Lowry 及び Donington の原報に従ふも收得量甚だ良好にして 20 g の Sulfochlorid より 5.8 g の Thiol を得。理論値の 40% なり。

b) 氷醋と亜鉛末に依る法. Sulfochlorid 10 g を氷醋 150 cc に溶解し 10 g の亜鉛末を攪拌しつつ少量宛加へ行けば自ら 40°-50° 位に發熱して反應す。全部の亜鉛を加へ終りたる後室温のまま尙 1 時間攪拌を續け其後水浴上にて加温しつつ 9 時間攪拌す。冷後炭酸曹達にて中和し水蒸氣蒸溜に附す。溜出液を Aether と振り此の Aether 液を苛性曹達液と振りし後苛性曹達液を酸性として Aether と振るに Aether 蒸溜殘渣として 0.1 g の Thiol を得。酒精より再結晶せば Schmp. 66° の白色柱狀晶なり。Lowry に従ひて造りし Thiol と混融するも變化なし。

3.770 mg Sbst.: 8.970 mg CO₂, 2.970 mg H₂O.—4.955 mg Sbst.:

5.35 cc 0.01-n. NaOH (S-Best. nach Pregl).

C₁₀H₁₆OS. Ber. C 65.22, H 8.69, S 17.39. Gef. C 64.89 H 8.81, S 17.31.

c) 氷醋と亜鉛末に依り Campher の生成. Sulfochlorid 5 g を 100 cc の氷醋に溶解し水浴上にて加温しつつ 5 g の亜鉛末を攪拌下に少量宛加ふ。6 時間加熱。攪拌を續けたる後曹達にて中和し水蒸氣蒸溜に附す。溜出液中に浮遊する白色結晶を濾過し (約 1.5 g) 稀酒精より再結晶せば Schmp. 178° を示し Semi-

carbazon は Schmp. 247° にして d-Campharsemicarbazon と混融するも融點の變化を見ず。

d-Campher-10-thiol の KMnO_4 酸化

4g の Thiol を 15% の炭酸曹達液 200 cc に浮遊せしめ置き室温にて攪拌しつつ 5g の KMnO_4 の 1%-水溶液を滴下し行けば KMnO_4 の色は瞬時に脱色さる。約半量の KMnO_4 を加ふれば最早や脱色瞬時に起らざれば水浴上にて加温するに直ちに脱色する。全部の KMnO_4 を滴下後褐石を濾過せし水溶液を酸性として水浴上蒸發乾固もしむれば粘稠性物質を共雜する殘渣を得るを以て醋酸エチルにて温浸し溶媒を溜去せば舍利別狀の飴狀物質約 2g を得。

褐石の方を酒精にて温浸したる後酒精を溜去せば白色結晶 2g を得。石油エーテルより再結晶せば Schmp. 231° を示す。本品は最早やアルカリに溶解せず。

3.795 mg Sb. : 9.080 mg CO_2 , 2.892 mg H_2O . — 4.713 mg Sb. : 5.08 cc 0.01-n. NaOH (S-Best. nach Pregl).

$\text{C}_{20}\text{H}_{30}\text{O}_2\text{S}_2$. Ber. C 65.57, H 8.20, S 17.48. Gef. C 65.25 H 8.53, S 17.30.

d-Campher-10-sulfochlorid を氷醋と加温すること

Sulfochlorid 5g を氷醋 20 cc と無水醋酸 4 cc の混液に溶解し 4 時間水洗上にて加温す。冷後柱狀晶を析出するを以て吸引濾過す。得量 4g. 其のままにて Schmp. 193° を示し醋酸エーテルより再結晶するも融點の變化なし。d-Campher-10-sulfonsäure と混融するも融點降下を見ず。

0.063 g の物質を水に溶解して 5 cc となし 1 dm の管にて測定せば $\alpha_D = +0.20^{\circ}$ 従つて $[\alpha]_D^{20} = +16^{\circ}$

d- π -Chlorsulfoxydcampher の氷醋と亜鉛末に依る還元

物質 4g を 100 cc の氷醋に溶解し攪拌しつつ 4g の亜鉛末を少量宛加へ行けば 40° – 50° 位に發熱して反應す。全部の亜鉛を加へ終りたる後水浴上加温しつつ 5 時間攪拌を續行す。

冷後曹達にて中和し水蒸氣蒸溜に附す。液出液を Aether と振り Aether 液は 10% の酸性亞硫酸曹達液と振る。次いで酸性亞硫酸曹達液に炭酸加里を加へて結合せるアルデヒドを分離せしめ鹽析して Aether と振る。Aether 蒸溜殘渣は白色結晶性にして 0.4g あり。20% の稀酒精より再結晶するに Schmp. 195° – 196° の樟腦様粘性物質を得。

3.523 mg Sb. : 9.300 mg CO_2 , 2.710 mg H_2O .

$\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}_2$. Ber. C 72.29, H 8.43. Gef. C 72.00, H 8.60.

酸性亞硫酸曹達と振りし後の Aether 液は苛性曹達液と振り之を酸性にして Aether と振れば Aether 蒸溜殘渣として約 0.1g の π -Thiol を得。

酸性亞硫酸曹達次いで苛性曹達と振りし後の Aether 蒸溜殘渣は粘稠なる物質なるも少量なりし爲め精査せず。

d-10-Chlorsulfoxydcampher の氷醋と亜鉛末に依る還元

4g の物質を 150 cc の氷醋に溶解し室温にて攪拌しつつ 4g の亜鉛末を少量宛加へ行けば自ら 60° 位に發熱して反應す。全部の亜鉛末を加へ終りたる後水浴上加温しつつ 5 時間攪拌す。冷後曹達にて中和し水蒸氣蒸溜に附す。溜出液を Aether と振り Aether 液は 10% の酸性亞硫酸曹達液と振る。酸性亞硫酸曹達に炭酸加里を加へてアルデヒドを分離せしめし後 Aether と振れば Aether 蒸溜殘渣として約 0.5g の樟腦様外觀の白色物質を得。稀酒精より再結晶するに Schmp. 205° を示す。

3.613 mg Sb. 9.539 mg CO_2 , 2.870 mg H_2O .

$C_{10}H_{14}O_2$. Ber. C 72.29, H 8.43. Gef. C 72.01, H 8.89.

アルデヒド (Schmp. 205°) の酸化. Ketopinsäure の生成.

物質少量を炭酸曹達液に浮遊せしめ 1% $KMnO_4$ 液を加ふるに瞬時に脱色さる. 褐石を濾過して除き濾液を Aether と振れば Aether 蒸溜残渣として Schmp. 234° (水より再結晶) の白色結晶を得. Ketopinsäure と混融して融點の變化を認めず.

Semicarbazon: Schmp. 205° のアルデヒドを稀酒精溶液となし鹽酸セミカルバチッド及び醋酸加里の水溶液を加ふるに室温にて瞬時に Semicarbazon を析出す. 酒精より再結晶せば Schmp. 249° を示す.

3.665 mg Sbst.: 0.580 cc N (17° 748 mm)

$C_{11}H_{17}O_2N_3$. Ber. N 18.82. Gef. N 18.34.

本品は 10-Oxocampher の Monosemicarbazon なり.

酸性亞硫酸曹達と振りし後の Aether 液は次に苛性曹達液と振り之を酸性として Aether と振れば Aether 蒸溜残渣として約 0.1 g の 10-Thiol を得.

酸性亞硫酸曹達及び苛性曹達と振りし後の Aether 液は溶媒を溜去するに少量の白色結晶を得. そのままにて 165° 附近で熔融するも少量なりし爲め追及せず.

d-10-Chlorsulfoxydcampher を亞鉛末及び水と共に加温すること

物質 3 g を 100 cc の水に浮遊せしめ置き 3 g の亞鉛末を加へて 2 時間水浴上に加熱攪拌す. 而る後水蒸氣蒸溜に附し溜出液を Aether と振る. Aether 液は 10% 酸性亞硫酸曹達液と振りし後炭酸加里にて結合せるアルデヒドを分離せしめ Aether と振れば Aether 蒸溜残渣として約 0.2 g の 10-Oxocampher を得. 稀酒精より再結晶するに Schmp. 205° なり.

酸性亞硫酸曹達と振りし後の Aether 液は Aether を溜去するに微量の油狀物質を残す.

d-π-Chlorsulfoxydcampher を亞鉛末及び水と共に加温すること

10-Chlorsulfoxydcampher の場合と全く同様にして π-Oxocampher を得. 收得量は氷醋を使用する時と大差なし.

Thiocampher の新製法

Campherimin-nitrat 及び Pernitrosocampher: Campheroxim 20 g を 300 cc の Aether に溶解し 20 g の亞硝酸曹達の水溶液と共に分液漏斗中 2 層をなさしめ之に 14 g の濃硫酸を 20% に稀釋せし物を徐々に注加して時々振盪す. 全部の硫酸を加へ終りたる後暫時放置せば Aether 層は美麗なる紫紅色を呈するに至る. 水層と分ちたる Aether 層を乾燥して靜置するに液は次第に褪色し同時に Campherimin-nitrat の白色針狀晶を析出す. 一夜放置後 Nitrat を濾過して Aether 液を蒸溜せば油狀の Pernitrosocampher を残すも容易に結晶化す. 得量は Campherimin-nitrat 6 g Pernitrosocampher 14 g なり.

Campherimin: Campherimin-nitrat 及び Pernitrosocampher の兩者を合して 100 cc の強アンモニヤ水と暫時煮沸し冷後 Aether と振り Aether 液は炭酸加里にて乾燥後溶媒を溜去するに Campherimin を得.

Thiocampher: Campherimin 10 g を 200 cc の Aether に溶解し乾燥せる硫化水素ガスを 10 時間通じたる後 Aether 液を充分水洗し稀鹽酸と振て未反應の Campherimin を除く. 其後 Aether を溜去せば約 1.5 g の Thiocampher を得.

減壓蒸溜を 1 同行ひし物は鮮紅色を呈する粘着性物質にして Schmp. 118° なり.

3.820 mg Sbst.: 10.062 mg CO_2 , 3.364 mg H_2O .

$C_{10}H_{16}S$. Ber. C 71.42, H 9.52. Gref. C 71.82, H 9.85.

Aether 液と振りし稀鹽酸を苛性曹達でアルカリ性となし Aether と振れば約 8 g の Campherimin を回收す。

Benzol を使用する例：10 g の Campherimin を 150 cc の Benzol に溶解し水浴上加温しつつ乾燥硫化水素ガスを 5 時間通じたる後鹽酸と振りて未反應の Campherimin を除けば約 7 g の Thiocampher を得。