Aceton umgelöst (2.5 g). Das Diketon stellt gelbe Nadeln vom Schmp. 152.5° dar. Mit FeCl_3 wird dunkelrot gefärbt (in Alkohol).

$\text{C}_{23}\text{H}_{18}\text{O}_6$	Ber. C	70.74,	H	4.65.
	Gef. „	70.83,	„	4.84.

5-Methoxy-6-oxyflavon (IV). Eine gelbe Lösung von 2 g Diketon (III) in 20 cc konz. H_2SO_4 wird nach 10 Minuten in Eiswasser gegossen und die gelbliche Masse werden aus Methanol umkrystallisiert (1.2 g). Fast farblose Prismen, Schmp. 185°. Löslich in Alkalien mit gelber Farbe und mit FeCl_3 nicht gefärbt (in Alkohol).

$\text{C}_{16}\text{H}_{12}\text{O}_4$	Ber. C	71.62,	H	4.51,	OCH_3	11.57.
	Gef. „	72.06,	„	4.41,	„	11.75.

5,6-Dimethoxyflavon (V). 2.7 g 5-Methoxy-6-oxyflavon (IV) in Aceton werden mit CH_3J und K_2CO_3 methyliert und aus Methanol umgelöst (2.1 g). Farblose Schuppen vom Schmp. 199°, die in Alkalien unlöslich und mit FeCl_3 nicht gefärbt werden.

$\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{O}_4$	Ber. C	72.31,	H	5.00,	OCH_3	21.99.
	Gef. „	72.71,	„	5.14,	„	21.49.

(Autoref.)

Untersuchungen über die γ -substituierten Resorcin-Derivate. (IV. Mitteil.) Über das 5,6-Dioxyflavon.

von

Kōichi NAKAZAWA

[Aus der Pharmazeutischen Fachschule zu Gifu.]

(Eingegangen am 24. Juli 1939.)

Entmethylierung von 6-Oxy-5-methoxyflavon (I)¹⁾ mit AlCl_3 unter milden Bedingungen²⁾ ergab 5,6-Dioxyflavon (II) vom Schmp. 190°. In denselben Weise entmethy-

¹⁾ K. Nakazawa: Diese Ztschr. **59**, 194 (1939).

²⁾ K. C. Gulati, K. Venkataraman: J. Chem. Soc. **1936**, 267.

iert auch 5,6-Dimethoxyflavon (III) partiell zu 5-Oxy-6-methoxyflavon (IV) vom Schmp. 129.5°. Diese beiden Entmethylierungsprodukte stimmten aber unerwartet mit Primetin³⁾ und dessen Monomethyläther nicht überein.

Auf Grund der Bildung von Benzoesäure bei der alkalischen Hydrolyse und auch der partiellen Methylierung des Primetins mit CH_2N_2 oder CH_3J , die auf ein 5-ständiges, schwer methylierbares OH schliesst, sind für es folgenden vier Formeln möglich.

- I $\text{R}_1 = \text{CH}_3$, $\text{R}_2 = \text{H}$
 II $\text{R}_1 = \text{H}$, $\text{R}_2 = \text{H}$
 III $\text{R}_1 = \text{CH}_3$, $\text{R}_2 = \text{CH}_3$
 IV $\text{R}_1 = \text{H}$, $\text{R}_2 = \text{CH}_3$

Da aber II ist wie oben mit Primetin nicht identisch und VI das bekannte Chrysin vorstellt, so kommen nur V und VII in Frage.

Um die Struktur des Primetins eindeutig festzustellen, hat Verf. kürzlich die Synthese von V und VII nach folgenden Weise unternommen.

³⁾ W. Nagai, S. Hattori: J. Chem. Soc., Japan **51**, 162 (1930); Acta Phytochim. **5**, 1 (1930).

XII bildet gelbe Schuppen vom Schmp. 146.5°. Mit FeCl_3 in Alkohol grün, auf Zusatz von Sodalösung dunkelrot; in Alkalien werden leicht oxydiert.

Beschreibung der Versuche.

5,6-Dioxyflavon (II)

Nachdem 0.5 g 6-Oxy-5-methoxyflavon (I) in 5 cc Nitrobenzol mit 0.2 g AlCl_3 im Ölbad 1 Stde. auf 100° erwärmt worden ist, leitet man unter Zusatz von Salzsäure durch das Reaktionsgemisch Wasserdampf, bis kein Nitrobenzol mehr übergeht. Zurückbleibende, gelbe Krystalle werden aus Methanol umgelöst (0.35 g). Tiefgelbe kleine Nadeln, Schmp. 190°. FeCl_3 färbt in Alkohol dunkelgrün, auf Zusatz von verd. Sodalösung schlägt die Farbe nach Dunkelrot um. In Natronlauge ist die Krystalle schwer löslich. In Alkohol durch Alkali bald dunkelblau gefärbt unter allmählicher Abscheidung von dunkelgrüner Nd.

$\text{C}_{15}\text{H}_{10}\text{O}_4$.	Ber.	C	70.84,	H	3.97.
	Gef.	„	71.18,	„	3.85.

Diacetat: Weisse Nadeln, Schmp. 167°, Dibenzoat: Weisse Prismen, Schmp. 195°; Monobenzoat: Schwach gelbgrüne Nadeln, Schmp. 175°. Mit FeCl_3 dunkelviolet gefärbt.

5-Oxy-6-methoxyflavon (IV).

Ein Gemisch von 0.28 g 5,6-Dimethoxyflavon (III) in Nitrobenzol mit 0.1 g AlCl_3 wird wie oben verarbeitet. Reaktionsprodukte wird aus verd. Methanol umgelöst (0.15 g). Gelbe, glänzende Schuppen, Schmp. 129.5°. Mit FeCl_3 in Alkohol grün, auf Zusatz von Sodalösung gelb. Schwer löslich in Natronlauge.

$\text{C}_{15}\text{H}_{10}\text{O}_3(\text{OCH}_3)$.	Ber.	C	71.62,	H	4.51,	OCH_3	11.57.
	Gef.	„	71.73,	„	4.68,	„	11.01.

(Autoref.)

薬 学 雑 誌

第五十九卷 第八號

昭和十四年九月發行

報 文

Resorcin の γ -置換誘導體に関する研究 (第四報) 5,6-Dioxyflavon に就て

中 澤 浩 一

(岐阜薬學専門學校)

(昭和 14 年 7 月 24 日受理)

著者は第三報¹⁾に於て 6-Oxy-5-methoxyflavon (I) 及 5,6-Dimethoxyflavon (II) を合成したることを發表せり。然るに最近兩化合物より脱メチル反應によつて夫々 5,6-Dioxyflavon (III) 及 5-Oxy-6-methoxyflavon (IV) を獲得したるが故にその経過を報告し、且前著者が Primetin に一致せざることを知り得たるを以て併せてその合成の計畫を發表せんと欲するものなり。

I	$R_1 = \text{CH}_3, R_2 = \text{H}$
II	$R_1 = \text{CH}_3, R_2 = \text{CH}_3$
III	$R_1 = \text{H}, R_2 = \text{H}$
IV	$R_1 = \text{H}, R_2 = \text{CH}_3$

カルボニル基に對し隣接位置にメトオキシ基を有するポリオキシフラボン化合物に對し脱メチル劑としてヨード水素酸を使用するときは閉環方向の變化²⁾を惹起することあり。著者はかかる危険あるべきを慮り極めて溫和なる條件の下に I 及 II の脱メチル反應を施行せり。即ち Gulati, Venkataraman 兩氏³⁾に従ひ I の 1 モルをニトロベンゾールに溶解し、0.75 モルの無水鹽化アルミニウムを加へ、100° に於て 1 時間加熱せしに反應は平易に進行し、5,6-Dioxyflavon (III) を收量よく捕捉せり。このフラボン化合物は F_p 190° を示し、メタノールより濃黃色細針狀結晶として析出す。オルトデオキシフェノール誘導體特有の鐵反應を有す。即ちそのアルコール溶液は過クロール鐵溶液によつて暗綠色を呈し、之に稀薄炭酸ソーダ溶液を添

¹⁾ 本誌 59, 495 [昭 14].

²⁾ R. C. Shah, R. C. Mehta, J. S. Wheeler: J. Chem. Soc. 1938, 1555.

³⁾ K. C. Gulati, C. Venkataraman: J. Chem. Soc. 1936, 267.

加すれば暗赤色に變ず。ジアセチル化合物 (Fp 167°), モノ (Fp 175°) 及デベンゾイル化合物 (Fp 195°) を生ず。

次に II を I に於けると全く同様に處理したるにカルボニル基に對しオルト位置 (5 の位置) のメトオキシ基のみ脱離せられ 5-Oxy-6-methoxyflavon (IV) を生成せり。この化合物は稀メタノールより明るき黄色の光輝ある鱗片狀結晶として析出し Fp 129.5° を示す。

上記の 5,6-Dioxyflavon 自體竝にアセチル及モノメチル誘導體の融點其他の諸性質は何れも Primetin 竝にその誘導體の文獻上の記載⁴⁾と一致せず、全く豫想に相反する結果に到達せり、從つて Primetin は 5,6-Dioxyflavon に非ざるべし。

依つて今既往の報告に従ひて Primetin の構造を再吟味すべき必要を生ぜり。Primetin をアルカリ分解に附して安息香酸得られたれば側ベンゾイル核に置換基なきこと明かなり。然らば 2 個の遊離の水酸基は共にベンゾピロン核上に存在すべく、而もその内の 1 個はジアゾメタン或はヨードメチルによつてメチル化せられざるが故にこの水酸基はカルボニル基に對してオルト位置 (5 の位置) に存在すべきこと推定せられたり。從つて他の 1 個は 3, 6, 7 或は 8 に結合すべし。ここに於て Primetin に對し下記の 4 種の構造式可能となる。

然れども只今 5,6-Dioxyflavon (III) が Primetin に一致せざること判明し; 又 5,7-Dioxyflavon (VI) は Chrysin として既知の化合物に屬す。依つてここにこの二式を除外すれば Primetin は 3,5-Dioxyflavon (V) か若くは 5,8-Dioxyflavon (VII) の何れかに該當すべきこととなる。著者はこの決定を行はんがため最近これら兩化合物の合成に着手せり。目下合成進行中につきここには豫定の徑路を示すに止め、その成績は合成の完成を俟ちて報告すべし。

⁴⁾ 長井(維), 服部(靜): 日化 15, 162 [昭 5]; Acta Phytochim. 5, 1 (1930).

因に VIII は常溫にて橙赤色の油をなし未だ結晶化するに至らず。XI は帶黄色の針狀結晶をなし、Fp 88°, 鐵反應は葡萄紅色なり(アルコール溶液)。XII は Fp 146.5° の黄色小板狀結晶にして Fp 132° のデベンゾイル化合物を生ず。アルカリ性に於て酸化せられ易し。アルコール溶液は過クロール鐵溶液によつて暗綠色を呈し、之に稀薄炭酸ソーダ溶液を加ふれば暗赤色に變ず。

本研究に對し御配慮を賜りたる東大藥學科朝比奈泰彦博士に謹謝し、御指導と御鞭撻を與へられたる學校長宮道悦男博士竝に助言を與へられたる東大理學部服部靜夫博士に深く感謝す。

實 驗 の 部

5.6-Dioxyflavon (III). 丸底コルベン内に於て 6-Oxy-5-methoxyflavon (I) 0.5 g をニトロベンゾール 5 cc に溶解し、之に無水鹽化アルミニウム 0.2 g を加へ、コルベンを 100° の油浴中に 1 時間浸漬後橙赤色の内容に鹽酸と水とを加へ直ちに水蒸氣蒸溜に附す。ニトロベンゾール溜出し終れば黄色の結晶一面に析出す。依つてこれを濾取し、メタノールより再結晶せしむ。收量 0.35 g。濃黄色細針狀結晶。Fp 190°。鐵反應は暗綠色、之にソーダ溶液を加ふるに暗赤色となる。苛性ソーダ溶液を加ふるに結晶は暗赤色に着色し極めて僅微に溶解するのみ。又そのアルコール溶液にアルコール性苛性ソーダ溶液を加ふるに、その瞬間に於て溶液は橙黄色を呈すれ共直ちに暗黄色より暗青色に變じ、遂に暗黄綠色の不溶物を析出す。即ちアルカリ性に於て酸化せられ易きことを暗示す。

試料 3.823 mg: CO₂ 9.978 mg, H₂O 1.316 mg.

C₁₅H₁₀O₄ 計算値 C 70.84, H 3.97. 實驗値 C 71.18, H 3.85.

デアセチル化合物. 常法に従ひ無水醋酸及無水醋酸ソーダより製す。無色の針狀結晶(アルコールより)。Fp 167°。鐵反應は陰性。

試料 3.798 mg: CO₂ 9.401 mg, H₂O 1.294 mg.

C₁₉H₁₄O₆ 計算値 C 67.43, H 4.17. 實驗値 C 67.51, H 3.81.

デベンゾイル化合物. フラボン 0.1 g をピリジン 0.5 cc に溶解し、鹽化ベンゾイル 0.2 g を加へ沸騰水浴上に 15 分間加熱し、直ちに 5% 稀硫酸を加へ攪拌しつつ放置すれば析出物は結晶化する。ここに於て少量のエーテルを加へ研磨するに粉末化するを以つてこの不溶物を濾取し、醋酸エチルより再結晶せしむ。無色の稜柱狀結晶にして Fp 195°。鐵反應は陰性なり。

試料 4.618 mg: CO_2 12.836 mg, H_2O 1.632 mg.

$\text{C}_{20}\text{H}_{18}\text{O}_6$ 計算値 C 75.31, H 3.93. 實驗値 C 75.81, H 4.03.

モノベンゾイル化合物. フラボン 0.1 g を ピリジン 3 cc に溶解し, 氷冷しつつ注意して鹽化ベンゾイル 0.2 g を滴下し, 一夜放置後前記同様に處理し, 不溶物を稀アセトンより再結晶せしむ. 微に黄綠色を帯ぶる針狀結晶, Fp 175°. 有機溶劑に對する溶解性はデベンゾイル化合物より大なり. 過クロール鐵にて暗紫色を呈す.

試料 4.444 mg: CO_2 11.966 mg, H_2O 1.600 mg.

$\text{C}_{22}\text{H}_{14}\text{O}_5$ 計算値 C 73.72, H 3.94. 實驗値 C 73.44, H 4.03.

5-Oxy-6-methoxyflavon (IV). 5,6-Dimethoxyflavon (II) 0.28 g をニトロベンゾール 3 cc に溶解し, 無水鹽化アルミニウム 0.1 g を加へ, 前記 I の場合と同様に處理す. 水蒸氣蒸溜後に殘留せる黄色の結晶を稀メタノールより再結晶す. 收量 0.15 g 鮮黄色の光輝ある鱗片狀結晶, Fp 129.5°. 有機溶劑に對しては III よりよく溶解す. 過クロール鐵溶液にて綠色を呈すれども (アルコール溶液), 稀薄炭酸ソーダ溶液を加ふるに黄色に變ず. 苛性ソーダ溶液に難溶性なり. アルコール溶液に苛性ソーダ溶液を加ふれば橙黄色となり間もなく同色の不溶物を析出す.

試料 4.181 mg: CO_2 10.997 mg, H_2O 1.748 mg. 一試料 5.407 mg: AgJ 4.506 mg.

$\text{C}_{15}\text{H}_9\text{O}_3\text{OCH}_3$ 計算値 C 71.62, H 4.55, OCH_3 11.57.

實驗値 C 71.73, H 4.68, OCH_3 11.01.

Resorcin の γ -置換誘導體に関する研究 (第五報)

Primetin (5,8-Dioxyflavon) の合成

中 澤 浩 一

(岐阜藥學專門學校)

(昭和 14 年 8 月 31 日受理)

著者は第四報¹⁾に於て, 合成法によつて得られたる 5,6-Dioxyflavon とその二三の誘導體が Primetin 及びその誘導體と明に相違することを認め, Primetin の構造は寧ろ 5,8- 或は 3,5-Dioxyflavon なるべきことを論じ, 且これ等最後の兩化合物の合成計畫を發表せり.

然るに W. Baker²⁾ 氏も亦同様に 5,6-Dioxyflavon の合成を報告せられたり. 同氏は著者と

¹⁾ 本誌 59, 521 [昭 14]

²⁾ W. Baker: J. Chem. Soc. 1939, 956.